



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2012-2013

Région Centre

Septembre 2014



Centre d'études de l'emploi



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2012-2013 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Centre

L'exploitation des données de la région Centre a porté sur **1 408** remplies par les salariés et leurs médecins en 2012 (n=595) et 2013 (n=813).

Au niveau de la région Centre, l'échantillon des salariés Evrest semble plus proche du champ des salariés du privé seul (données ACOSS) (tout du moins en ce qui concerne les secteurs d'activité représentés), que du champ des salariés des DADS, comprenant les secteurs publics et privés (tableau 1). Par rapport aux données ACOSS, l'échantillon Evrest surreprésente le secteur de l'Industrie, au détriment du secteur de la Construction.

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 2 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, et Commerce - réparations d'automobile et de motocycles (tableau 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Centre 2012-2013 aux données INSEE (DADS 2010) et ACOSS (2012).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Centre 2012-2013 (n=1 408)	Données INSEE 2010 (DADS)	Données ACOSS 2012
	%	%	%
Sexe			
Hommes	53,8	50,8	-
Femmes	46,2	49,2	-
Age			
≤ 24 ans	6,6	14,1	-
25-34 ans	24,0	22,9	-
35-44 ans	27,8	25,2	-
45- 54 ans	30,4	25,1	-
55 ans et plus	11,2	12,7	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,5	0,6	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	13,6	11,4	-
Professions intermédiaires	25,4	20,0	-
Employés	28,6	37,5	-
Ouvriers	32,0	30,6	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,0	0,0
Industrie	29,1	17,0	24,1
Construction	4,8	7,0	9,4
Commerce	16,6	12,9	16,7
Services	49,5	63,1	49,8

- : informations non disponibles

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Centre 2012-2013 selon les catégories socioprofessionnelles.

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	7	0,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures	191	13,6
Professions intermédiaires	358	25,4
Employés	402	28,6
Ouvriers	450	32,0
Total général	1 408	100,0

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Centre 2012-2013 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	0	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
INDUSTRIE	410	29,1
B. Industries extractives	1	0,1
C. Industrie manufacturière	256	18,2
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	145	10,3
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	8	0,6
CONSTRUCTION	67	4,8
F. Construction	67	4,8
COMMERCE	234	16,6
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	234	16,6
SERVICES	697	49,5
H. Transports et entreposage	73	5,2
I. Hébergement et restauration	30	2,1
J. Information et communication	53	3,8
K. Activités financières et d'assurance	65	4,6
L. Activités immobilières	20	1,4
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	65	4,6
N. Activités de services administratifs et de soutien	123	8,7
O. Administration publique	63	4,5
P. Enseignement	19	1,3
Q. Santé humaine et action sociale	137	9,7
R. Arts, spectacles et activités récréatives	13	0,9
S. Autres activités de services	35	2,5
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1	0,1
Total général	1 408	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n = 758	Femmes n = 650	Ensemble n = 1408
≤24 ans	7,0%	6,2%	6,6%
25-34 ans	26,5%	21,1%	24,0%
35-44 ans	27,0%	28,6%	27,8%
45-54 ans	29,2%	31,8%	30,4%
55 ans et plus	10,3%	12,3%	11,2%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,7%	0,3%	0,5%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	16,8%	9,8%	13,6%
Professions intermédiaires	27,8%	22,6%	25,4%
Employés	9,8%	50,5%	28,6%
Ouvriers	45,0%	16,8%	32,0%
C. Industrie manufacturière	21,1%	14,8%	18,2%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	15,8%	3,8%	10,3%
F. Construction	8,2%	0,8%	4,8%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	15,7%	17,7%	16,6%
H. Transports et entreposage	8,2%	1,7%	5,2%
I. Hébergement et restauration	1,8%	2,5%	2,1%
J. Information et communication	4,1%	3,4%	3,8%
K. Activités financières et d'assurance	2,2%	7,4%	4,6%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	4,4%	4,9%	4,6%
N. Activités de services administratifs et de soutien	7,4%	10,3%	8,7%
O. Administration publique	2,2%	7,1%	4,5%
Q. Santé humaine et action sociale	4,2%	16,2%	9,7%
S. Autres activités de services	0,9%	4,3%	2,5%

Conditions de travail	Hommes n = 758	Femmes n = 650	Ensemble n = 1408
- Changement de travail depuis 1 an :			
Non	88,0%	88,4%	88,2%
Oui, raison médicale	0,7%	0,2%	0,4%
Oui, autre raison	10,8%	10,2%	10,6%
Oui, raison non précisée	0,5%	1,2%	0,9%
Travail à temps plein	94,2%	77,9%	86,7%
Travail en journée normale	78,6%	80,0%	79,3%
Coupures de plus de 2 heures	14,7%	12,8%	13,8%
Horaires décalés	29,7%	21,6%	25,9%
Horaires irréguliers ou alternés	26,2%	22,7%	24,6%
Travail de nuit	13,5%	7,0%	10,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	12,2%	3,6%	8,2%
- Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	15,7%	24,5%	19,8%
Rarement	44,2%	42,9%	43,6%
Assez souvent	26,9%	21,9%	24,6%
Très souvent	13,2%	10,7%	12,1%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	45,0%	54,3%	49,3%
Rarement	36,5%	29,1%	33,1%
Assez souvent	13,4%	12,2%	12,9%
Très souvent	5,0%	4,3%	4,7%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	34,8%	41,4%	37,9%
Rarement	39,8%	34,1%	37,1%
Assez souvent	19,1%	18,9%	19,0%
Très souvent	6,2%	5,6%	6,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	4,6%	5,9%	5,2%
1	4,2%	5,1%	4,6%
2	8,5%	9,6%	9,0%
3	13,8%	10,8%	12,4%
4	9,8%	11,7%	10,7%
5	21,2%	19,8%	20,6%
6	10,7%	11,4%	11,1%
7	15,1%	13,6%	14,4%
8	8,0%	8,8%	8,4%
9	2,9%	2,0%	2,5%
10	1,1%	1,2%	1,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	37,8%	37,1%	37,5%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	53,2%	52,9%	53,1%
Parmi eux :			
- Perturbe le travail	61,6%	57,3%	59,6%
- Aspect positif du travail	41,4%	40,7%	41,1%

Appréciation sur le travail	Hommes n = 758	Femmes n = 650	Ensemble n = 1408
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	6,2%	6,5%	6,3%
Plutôt non	13,4%	13,9%	13,6%
Plutôt oui	44,4%	40,7%	42,7%
Oui tout à fait	35,9%	39,0%	37,3%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,2%	5,4%	4,8%
Plutôt non	13,8%	10,2%	12,1%
Plutôt oui	43,7%	37,2%	40,7%
Oui tout à fait	38,3%	47,1%	42,4%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	8,5%	9,5%	8,9%
Plutôt non	17,4%	17,4%	17,4%
Plutôt oui	42,8%	41,7%	42,3%
Oui tout à fait	31,4%	31,5%	31,4%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,3%	5,4%	4,3%
Plutôt non	10,8%	13,0%	11,8%
Plutôt oui	52,4%	48,8%	50,7%
Oui tout à fait	33,5%	32,8%	33,2%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,5%	2,3%	1,9%
Plutôt non	11,9%	13,6%	12,7%
Plutôt oui	55,4%	52,8%	54,2%
Oui tout à fait	31,2%	31,3%	31,2%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	4,3%	5,4%	4,8%
Plutôt non	16,1%	15,7%	15,9%
Plutôt oui	53,4%	51,2%	52,4%
Oui tout à fait	26,2%	27,7%	26,9%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	27,5%	36,1%	31,5%
Plutôt non	46,2%	43,8%	45,1%
Plutôt oui	22,8%	16,4%	19,8%
Oui tout à fait	3,5%	3,7%	3,6%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	57,0%	63,8%	60,1%
Plutôt non	29,0%	22,5%	26,0%
Plutôt oui	11,1%	9,7%	10,5%
Oui tout à fait	2,9%	3,9%	3,4%

Charge physique du poste de travail	Hommes n = 758	Femmes n = 650	Ensemble n = 1408
Postures contraignantes :			
Fréquence			
Non jamais	45,4%	57,2%	50,9%
Oui parfois	35,5%	24,0%	30,2%
Oui souvent	19,0%	18,8%	18,9%
Difficultés			
Pas de postures contraignantes	45,4%	57,2%	50,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	25,2%	23,8%	24,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	27,6%	16,5%	22,5%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	1,7%	2,5%	2,1%
Effort, port de charges lourdes :			
Fréquence			
Non jamais	53,1%	61,6%	57,0%
Oui parfois	31,8%	24,3%	28,4%
Oui souvent	15,1%	14,1%	14,6%
Difficultés			
Pas d'effort, port de charges lourdes	53,1%	61,6%	57,0%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	23,6%	22,2%	23,0%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	22,3%	13,3%	18,2%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,9%	2,9%	1,9%
Gestes répétitifs :			
Fréquence			
Non jamais	46,2%	40,5%	43,6%
Oui parfois	22,7%	21,4%	22,1%
Oui souvent	31,0%	38,2%	34,3%
Difficultés			
Pas de gestes répétitifs	46,2%	40,5%	43,6%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	18,2%	22,6%	20,3%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	33,0%	33,5%	33,3%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,5%	3,4%	2,9%
Importants déplacements à pieds :			
Fréquence			
Non jamais	53,6%	73,8%	62,9%
Oui parfois	22,8%	11,3%	17,5%
Oui souvent	23,7%	15,0%	19,7%
Difficultés			
Pas d'importants déplacements à pieds	53,6%	73,8%	62,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	8,7%	8,0%	8,4%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	36,2%	16,5%	27,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,5%	1,7%	1,6%
Station debout prolongée :			
Fréquence			
Non jamais	42,8%	53,7%	47,8%
Oui parfois	24,8%	12,3%	19,0%
Oui souvent	32,4%	34,1%	33,1%
Difficultés			
Pas de station debout prolongée	42,8%	53,7%	47,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	15,5%	18,7%	17,0%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	37,1%	24,0%	31,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	4,5%	3,7%	4,2%

Expositions	Hommes n = 758	Femmes n = 650	Ensemble n = 1408
Produits chimiques	31,4%	17,9%	25,2%
Poussières, fumées	41,8%	17,1%	30,4%
Rx ionisants	9,4%	2,0%	6,0%
Vibrations	31,8%	5,4%	19,7%
Gêne sonore	44,6%	29,3%	37,5%
Bruit > 80db	33,4%	11,6%	23,4%
Contrainte visuelle	34,1%	34,3%	34,2%
Conduite routière prolongée	20,4%	6,7%	14,1%
Chaleur intense	17,1%	9,2%	13,4%
Froid intense	14,5%	7,5%	11,2%
Intempéries	22,5%	4,5%	14,2%
Pression psychologique	26,1%	27,4%	26,7%
Agent biologique	8,6%	9,9%	9,2%
Contact avec le public	53,0%	63,5%	57,8%

Formation	Hommes n = 758	Femmes n = 650	Ensemble n = 1408
A bénéficié d'une formation depuis un an :	52,9%	48,1%	50,7%
Parmi eux :			
- En rapport avec le travail actuel	92,9%	89,8%	91,5%
- En rapport avec le travail futur	15,4%	7,8%	12,2%
- Formation d'intérêt général	43,9%	36,9%	40,9%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	32,8%	27,2%	30,2%

Mode de vie	Hommes n = 758	Femmes n = 650	Ensemble n = 1408
Activité sportive régulière	51,7%	44,6%	48,5%
Consommation de tabac	37,0%	27,3%	32,5%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	9,2%	4,8%	7,2%
Consommation de café	81,2%	70,0%	76,0%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	15,4%	10,3%	13,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,1%	14,1%	14,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n = 1408
	Hommes n = 459	Femmes n = 363	Ensemble n = 822	Hommes n = 299	Femmes n = 287	Ensemble n = 586	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	55,3%	66,9%	60,4%	39,2%	50,5%	44,8%	54,0%
- Surpoids	32,0%	20,9%	27,1%	42,0%	26,7%	34,5%	30,2%
- Obèses	12,8%	12,1%	12,5%	18,8%	22,7%	20,7%	15,9%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	3,8%	4,8%	4,2%	7,1%	4,3%	5,7%	4,8%
Plaîntes ou signes cliniques	3,1%	4,5%	3,7%	6,5%	3,9%	5,2%	4,3%
Gêne dans le travail	0,9%	1,4%	1,1%	1,4%	0,4%	0,9%	1,0%
Traitemennt ou autre soin	2,7%	3,7%	3,1%	3,1%	2,5%	2,8%	3,0%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	2,0%	2,2%	2,1%	6,1%	7,1%	6,6%	4,0%
Plaîntes ou signes cliniques	1,1%	2,0%	1,5%	5,1%	5,3%	5,2%	3,0%
Gêne dans le travail	0,2%	1,1%	0,6%	1,4%	1,1%	1,2%	0,9%
Traitemennt ou autre soin	1,3%	1,1%	1,2%	3,8%	5,0%	4,4%	2,5%
HTA							
Existence d'un problème	4,5%	5,4%	4,9%	22,7%	15,6%	19,2%	10,9%
Plaîntes ou signes cliniques	3,2%	3,5%	3,3%	17,6%	9,4%	13,6%	7,6%
Gêne dans le travail	0,7%	0,0%	0,4%	1,0%	1,1%	1,1%	0,7%
Traitemennt ou autre soin	2,0%	3,8%	2,8%	16,7%	13,5%	15,1%	7,9%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	20,8%	29,3%	24,6%	15,7%	27,6%	21,5%	23,3%
Plaîntes ou signes cliniques	20,8%	28,3%	24,1%	15,4%	26,6%	20,9%	22,8%
Gêne dans le travail	8,4%	14,8%	11,2%	7,9%	14,4%	11,1%	11,2%
Traitemennt ou autre soin	2,2%	3,1%	2,6%	2,1%	5,4%	3,7%	3,0%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	14,4%	22,2%	17,8%	20,1%	25,1%	22,5%	19,8%
Plaîntes ou signes cliniques	14,2%	21,3%	17,3%	19,0%	24,7%	21,8%	19,2%
Gêne dans le travail	6,0%	7,9%	6,8%	7,5%	12,8%	10,1%	8,2%
Traitemennt ou autre soin	0,7%	4,2%	2,2%	3,1%	6,7%	4,9%	3,3%
Troubles du sommeil							
Existence d'un problème	15,8%	22,0%	18,6%	21,4%	33,3%	27,3%	22,2%
Plaîntes ou signes cliniques	15,7%	21,5%	18,2%	19,6%	31,7%	25,5%	21,2%
Gêne dans le travail	6,7%	9,0%	7,7%	8,2%	12,8%	10,5%	8,9%
Traitemennt ou autre soin	2,5%	4,5%	3,4%	5,8%	10,3%	8,0%	5,3%
➤ Troubles neuro psychiques							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	4,9%	9,6%	6,9%	6,5%	13,1%	9,7%	8,1%
Plaîntes ou signes cliniques	4,7%	9,0%	6,6%	5,8%	11,8%	8,7%	7,5%
Gêne dans le travail	1,8%	3,1%	2,3%	2,4%	5,7%	4,0%	3,0%
Traitemennt ou autre soin	0,2%	0,6%	0,4%	0,7%	2,1%	1,4%	0,8%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n = 1408
	Hommes n = 459	Femmes n = 363	Ensemble n = 822	Hommes n = 299	Femmes n = 287	Ensemble n = 586	
Digestif							
Existence d'un problème	4,9%	7,7%	6,2%	8,7%	11,0%	9,8%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	7,7%	6,0%	7,7%	10,7%	9,1%	7,3%
Gêne dans le travail	0,7%	1,4%	1,0%	0,7%	1,5%	1,1%	1,0%
Traitements ou autres soins	2,0%	2,9%	2,4%	4,2%	6,7%	5,4%	3,6%
Dermatologie							
Existence d'un problème	5,1%	8,1%	6,4%	3,8%	5,7%	4,7%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	7,3%	6,1%	3,4%	4,3%	3,8%	5,2%
Gêne dans le travail	0,4%	2,3%	1,2%	0,0%	0,4%	0,2%	0,8%
Traitements ou autres soins	1,8%	4,0%	2,7%	1,4%	2,9%	2,1%	2,5%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	6,9%	3,1%	5,2%	12,7%	9,4%	11,1%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	2,8%	4,7%	12,4%	8,4%	10,4%	7,1%
Gêne dans le travail	0,9%	0,6%	0,7%	3,1%	4,7%	3,9%	2,0%
Traitements ou autres soins	0,4%	0,0%	0,2%	2,1%	1,8%	2,0%	1,0%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	5,7%	10,6%	7,9%	10,2%	18,4%	14,2%	10,5%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	10,6%	7,9%	9,5%	18,0%	13,7%	10,3%
Gêne dans le travail	2,2%	5,9%	3,8%	7,1%	9,3%	8,2%	5,6%
Traitements ou autres soins	1,1%	3,4%	2,1%	3,8%	5,0%	4,4%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	1,3%	4,5%	2,7%	9,5%	8,8%	9,2%	5,4%
Plaintes ou signes cliniques	1,3%	4,5%	2,7%	9,2%	8,5%	8,8%	5,3%
Gêne dans le travail	0,7%	3,6%	2,0%	4,4%	5,0%	4,7%	3,1%
Traitements ou autres soins	0,0%	2,5%	1,1%	3,4%	3,9%	3,6%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	4,0%	6,4%	5,1%	5,4%	17,1%	11,1%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	6,4%	5,1%	5,4%	17,1%	11,1%	7,6%
Gêne dans le travail	2,2%	4,2%	3,1%	3,7%	9,3%	6,4%	4,5%
Traitements ou autres soins	0,9%	1,4%	1,1%	1,7%	5,8%	3,7%	2,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	9,5%	16,2%	12,5%	19,7%	31,3%	25,3%	17,8%
Plaintes ou signes cliniques	9,5%	16,2%	12,5%	18,6%	31,3%	24,8%	17,6%
Gêne dans le travail	4,4%	9,8%	6,8%	11,2%	18,3%	14,6%	10,0%
Traitements ou autres soins	2,0%	5,0%	3,3%	7,2%	10,9%	9,0%	5,7%

Etat de santé	<45 ans			>=45 ans			Ensemble n = 1408
	Hommes n = 459	Femmes n = 363	Ensemble n = 822	Hommes n = 299	Femmes n = 287	Ensemble n = 586	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	10,2%	8,7%	9,5%	11,5%	19,5%	15,4%	12,0%
plaintes ou signes cliniques	10,2%	8,7%	9,5%	11,5%	19,5%	15,4%	12,0%
Gêne dans le travail	5,3%	4,5%	5,0%	7,5%	11,1%	9,2%	6,7%
Traitements ou autre soin	2,7%	2,8%	2,7%	5,1%	7,9%	6,4%	4,3%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	6,0%	8,9%	7,3%	7,2%	14,2%	10,6%	8,7%
plaintes ou signes cliniques	6,0%	8,9%	7,3%	7,2%	13,8%	10,5%	8,6%
Gêne dans le travail	2,9%	6,1%	4,3%	3,8%	7,5%	5,6%	4,9%
Traitements ou autre soin	2,4%	3,7%	3,0%	2,1%	4,6%	3,3%	3,1%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	18,2%	16,9%	17,6%	23,2%	19,4%	21,4%	19,2%
plaintes ou signes cliniques	17,8%	16,4%	17,2%	23,2%	19,1%	21,2%	18,9%
Gêne dans le travail	8,8%	9,9%	9,3%	13,0%	12,2%	12,6%	10,7%
Traitements ou autre soin	5,4%	4,3%	4,9%	7,2%	8,0%	7,6%	6,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis							
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	20,0%	20,8%	20,3%	26,5%	25,4%	26,0%	22,7%
plaintes ou signes cliniques	19,6%	20,3%	19,9%	26,5%	25,4%	26,0%	22,4%
Gêne dans le travail	9,2%	12,7%	10,8%	14,4%	14,7%	14,6%	12,4%
Traitements ou autre soin	6,1%	6,3%	6,2%	7,9%	10,5%	9,2%	7,4%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Intermédiaires n = 358	Employés n = 402	Ouvriers n = 450	Base Everest n = 1408
Répartition hommes / femmes	58,9% / 41,1%	18,4% / 81,6%	75,8% / 24,2%	53,8% / 46,2%
≤24 ans	5,0%	8,7%	8,0%	6,6%
25-34 ans	29,1%	24,6%	21,1%	24,0%
35-44 ans	25,7%	26,9%	28,7%	27,8%
45-54 ans	32,1%	26,4%	30,0%	30,4%
55 ans et plus	8,1%	13,4%	12,2%	11,2%
C. Industrie manufacturière	14,0%	5,7%	34,4%	18,2%
D. Production et distribution d'électricité, gaz,	23,5%	0,7%	4,4%	10,3%
F. Construction	3,4%	1,0%	9,8%	4,8%
G. Commerce; réparations automobile/motocycles	10,9%	26,1%	14,4%	16,6%
H. Transports et entreposage	2,2%	2,7%	11,8%	5,2%
I. Hébergement et restauration	0,8%	4,0%	2,0%	2,1%
J. Information et communication	5,0%	2,2%	0,4%	3,8%
K. Activités financières et d'assurance	3,4%	7,7%	0,0%	4,6%
M. Activités spécialisées, scient. et techniques	5,9%	5,7%	1,1%	4,6%
N. Activités de services admin. et de soutien	1,4%	9,2%	15,8%	8,7%
O. Administration publique	7,0%	7,0%	0,9%	4,5%
Q. Santé humaine et action sociale	13,4%	17,7%	2,7%	9,7%
S. Autres activités de services	2,5%	4,7%	1,1%	2,5%

Conditions de travail	Intermédiaires n = 358	Employés n = 402	Ouvriers n = 450	Base Everest n = 1408
- Changement de travail depuis 1 an :				
Non	87,7%	89,5%	88,0%	88,2%
Oui, raison médicale	0,6%	0,2%	0,7%	0,4%
Oui, autre raison	11,5%	9,0%	10,7%	10,6%
Oui, raison non précisée	0,3%	1,2%	0,7%	0,9%
Travail à temps plein	88,8%	76,3%	91,8%	86,7%
Travail en journée normale	84,6%	78,4%	69,8%	79,3%
Coupures de plus de 2 heures	14,3%	15,7%	12,3%	13,8%
Horaires décalés	22,4%	24,7%	34,7%	25,9%
Horaires irréguliers ou alternés	21,9%	25,5%	30,0%	24,6%
Travail de nuit	13,4%	6,9%	14,0%	10,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	10,4%	1,8%	5,0%	8,2%
- Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	9,0%	25,6%	29,3%	19,8%
Rarement	43,9%	47,5%	47,8%	43,6%
Assez souvent	32,4%	19,3%	17,3%	24,6%
Très souvent	14,6%	7,5%	5,6%	12,1%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	33,5%	57,5%	61,8%	49,3%
Rarement	45,9%	26,1%	27,2%	33,1%
Assez souvent	15,2%	11,8%	7,6%	12,9%
Très souvent	5,4%	4,5%	3,3%	4,7%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	28,6%	42,4%	49,8%	37,9%
Rarement	39,5%	34,5%	34,8%	37,1%
Assez souvent	24,6%	17,5%	11,7%	19,0%
Très souvent	7,3%	5,6%	3,8%	6,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	4,7%	7,0%	6,0%	5,2%
1	4,5%	4,3%	5,1%	4,6%
2	7,5%	10,6%	10,5%	9,0%
3	10,6%	10,3%	16,3%	12,4%
4	11,7%	10,3%	10,1%	10,7%
5	17,9%	23,1%	21,5%	20,6%
6	12,3%	11,3%	10,5%	11,1%
7	16,8%	12,1%	10,3%	14,4%
8	10,3%	8,0%	5,6%	8,4%
9	2,8%	2,0%	2,2%	2,5%
10	0,8%	1,0%	1,8%	1,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	43,0%	34,4%	30,4%	37,5%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	64,5%	50,3%	35,3%	53,1%
Parmi eux :				
- Perturbe le travail	64,9%	58,9%	50,0%	59,6%
- Aspect positif du travail	38,7%	43,0%	44,8%	41,1%

Appréciation sur le travail	Intermédiaires n = 358	Employés n = 402	Ouvriers n = 450	Base Everest n = 1408
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	2,0%	6,0%	12,8%	6,3%
Plutôt non	9,8%	12,5%	19,9%	13,6%
Plutôt oui	48,9%	43,1%	38,9%	42,7%
Oui tout à fait	39,4%	38,4%	28,4%	37,3%
-Travail varié				
Non pas du tout	0,8%	5,7%	8,5%	4,8%
Plutôt non	6,7%	13,2%	17,6%	12,1%
Plutôt oui	46,9%	36,8%	42,9%	40,7%
Oui tout à fait	45,5%	44,3%	31,0%	42,4%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	3,7%	8,3%	16,5%	8,9%
Plutôt non	19,1%	17,8%	18,1%	17,4%
Plutôt oui	47,2%	43,4%	38,2%	42,3%
Oui tout à fait	30,1%	30,6%	27,2%	31,4%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	2,8%	4,8%	6,5%	4,3%
Plutôt non	12,2%	13,0%	10,7%	11,8%
Plutôt oui	54,5%	47,9%	49,6%	50,7%
Oui tout à fait	30,4%	34,3%	33,3%	33,2%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	1,4%	2,8%	2,0%	1,9%
Plutôt non	14,0%	12,3%	11,6%	12,7%
Plutôt oui	59,6%	51,4%	49,4%	54,2%
Oui tout à fait	25,0%	33,5%	37,0%	31,2%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	3,7%	5,0%	7,2%	4,8%
Plutôt non	20,9%	16,0%	13,3%	15,9%
Plutôt oui	53,1%	48,8%	52,4%	52,4%
Oui tout à fait	22,3%	30,2%	27,2%	26,9%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	22,4%	38,2%	36,4%	31,5%
Plutôt non	53,7%	41,4%	36,2%	45,1%
Plutôt oui	21,6%	16,2%	22,5%	19,8%
Oui tout à fait	2,3%	4,2%	4,9%	3,6%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	60,7%	63,7%	58,9%	60,1%
Plutôt non	29,9%	24,2%	22,2%	26,0%
Plutôt oui	8,0%	8,3%	13,9%	10,5%
Oui tout à fait	1,4%	3,8%	4,9%	3,4%

Charge physique du poste de travail	Intermédiaires n = 358	Employés n = 402	Ouvriers n = 450	Base Everest n = 1408
Postures contraignantes :				
Fréquence				
Non jamais	58,4%	53,1%	29,1%	50,9%
Oui parfois	31,8%	26,2%	39,6%	30,2%
Oui souvent	9,8%	20,7%	31,3%	18,9%
Difficultés				
Pas de postures contraignantes	58,4%	53,1%	29,1%	50,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	17,6%	24,9%	38,9%	24,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	22,1%	20,0%	29,1%	22,5%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	2,0%	2,0%	2,9%	2,1%
Effort, port de charges lourdes :				
Fréquence				
Non jamais	64,0%	58,9%	35,4%	57,0%
Oui parfois	30,1%	24,3%	39,2%	28,4%
Oui souvent	5,9%	16,8%	25,4%	14,6%
Difficultés				
Pas d'effort, port de charges lourdes	64,0%	58,9%	35,4%	57,0%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	14,6%	23,6%	38,3%	23,0%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	19,1%	15,0%	24,5%	18,2%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	2,2%	2,5%	1,8%	1,9%
Gestes répétitifs :				
Fréquence				
Non jamais	62,8%	36,2%	20,7%	43,6%
Oui parfois	20,7%	23,2%	26,4%	22,1%
Oui souvent	16,5%	40,6%	52,9%	34,3%
Difficultés				
Pas de gestes répétitifs	62,8%	36,2%	20,7%	43,6%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	11,5%	20,9%	33,8%	20,3%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	24,0%	38,7%	42,0%	33,3%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,7%	4,2%	3,6%	2,9%
Importants déplacements à pieds :				
Fréquence				
Non jamais	62,6%	69,2%	50,1%	62,9%
Oui parfois	20,1%	11,8%	21,6%	17,5%
Oui souvent	17,3%	19,0%	28,3%	19,7%
Difficultés				
Pas d'importants déplacements à pieds	62,6%	69,2%	50,1%	62,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	5,9%	8,5%	13,4%	8,4%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	29,9%	20,8%	34,7%	27,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,7%	1,5%	1,8%	1,6%
Station debout prolongée :				
Fréquence				
Non jamais	55,5%	52,9%	23,5%	47,8%
Oui parfois	24,8%	11,3%	23,3%	19,0%
Oui souvent	19,7%	35,8%	53,1%	33,1%
Difficultés				
Pas de station debout prolongée	55,5%	52,9%	23,5%	47,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	10,7%	17,3%	28,3%	17,0%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	30,1%	24,8%	43,3%	31,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	3,7%	5,0%	4,9%	4,2%

Expositions	Intermédiaires n = 358	Employés n = 402	Ouvriers n = 450	Base Everest n = 1408
Produits chimiques	25,1%	17,5%	39,9%	25,2%
Poussières, fumées	22,6%	14,2%	58,7%	30,4%
Rx ionisants	12,6%	1,7%	2,4%	6,0%
Vibrations	14,8%	3,5%	43,1%	19,7%
Gêne sonore	33,7%	29,4%	56,8%	37,5%
Bruit > 80db	23,4%	6,3%	43,2%	23,4%
Contrainte visuelle	36,3%	34,3%	31,2%	34,2%
Conduite routière prolongée	17,1%	5,3%	15,8%	14,1%
Chaleur intense	14,6%	10,1%	19,8%	13,4%
Froid intense	8,9%	8,1%	19,6%	11,2%
Intempéries	14,3%	5,5%	25,4%	14,2%
Pression psychologique	28,7%	25,8%	23,2%	26,7%
Agent biologique	11,1%	12,8%	6,9%	9,2%
Contact avec le public	61,1%	76,9%	40,1%	57,8%

Formation	Intermédiaires n = 358	Employés n = 402	Ouvriers n = 450	Base Everest n = 1408
A bénéficié d'une formation depuis un an :	61,6%	49,2%	37,7%	50,7%
Parmi eux :				
En rapport avec le travail actuel	95,0%	93,7%	85,0%	91,5%
En rapport avec le travail futur	18,0%	6,1%	10,6%	12,2%
Formation d'intérêt général	43,6%	35,4%	38,1%	40,9%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	41,1%	23,9%	20,5%	30,2%

Mode de vie	Intermédiaires n = 358	Employés n = 402	Ouvriers n = 450	Base Everest n = 1408
Activité sportive régulière	56,9%	44,6%	40,2%	48,5%
Consommation de tabac	28,2%	32,7%	42,8%	32,5%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	4,8%	7,8%	10,1%	7,2%
Consommation de café	75,2%	69,8%	80,5%	76,0%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	11,7%	12,6%	15,8%	13,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,9%	13,2%	12,9%	14,1%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n = 214	≥ 45 ans n = 144	Ensemble n = 358	<45 ans n = 242	≥ 45 ans n = 160	Ensemble n = 402	<45 ans n = 260	≥ 45 ans n = 190	Ensemble n = 450	<45 ans n = 822	≥ 45 ans n = 586	Global n = 1408
Indice de masse corporelle												
- Normaux ou maigres	64,1%	46,7%	57,1%	61,3%	52,3%	57,8%	53,8%	39,5%	47,7%	60,4%	44,8%	54,0%
- Surpoids	26,7%	35,8%	30,3%	24,4%	25,8%	24,9%	29,6%	37,3%	32,9%	27,1%	34,5%	30,2%
- Obèses	9,2%	17,5%	12,5%	14,3%	21,9%	17,3%	16,6%	23,2%	19,4%	12,5%	20,7%	15,9%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	2,8%	5,6%	4,0%	5,4%	5,1%	5,3%	4,3%	6,9%	5,4%	4,2%	5,7%	4,8%
Plaîntes ou signes cliniques	2,8%	4,9%	3,7%	4,6%	5,1%	4,8%	4,0%	5,9%	4,8%	3,7%	5,2%	4,3%
Gêne dans le travail	0,9%	2,1%	1,4%	0,8%	0,0%	0,5%	1,6%	1,1%	1,4%	1,1%	0,9%	1,0%
Traitemennt ou autre soin	2,4%	3,5%	2,8%	4,2%	2,6%	3,5%	2,8%	3,2%	3,0%	3,1%	2,8%	3,0%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	2,4%	4,9%	3,4%	2,9%	8,3%	5,1%	1,6%	7,0%	3,9%	2,1%	6,6%	4,0%
Plaîntes ou signes cliniques	1,9%	4,9%	3,1%	2,1%	6,4%	3,8%	0,8%	5,3%	2,7%	1,5%	5,2%	3,0%
Gêne dans le travail	0,9%	0,7%	0,8%	1,3%	1,9%	1,5%	0,0%	1,6%	0,7%	0,6%	1,2%	0,9%
Traitemennt ou autre soin	1,4%	3,5%	2,3%	1,7%	5,2%	3,1%	0,8%	5,3%	2,7%	1,2%	4,4%	2,5%
HTA												
Existence d'un problème	4,3%	15,0%	8,6%	7,3%	19,6%	12,1%	4,0%	24,6%	12,8%	4,9%	19,2%	10,9%
Plaîntes ou signes cliniques	2,9%	10,1%	5,8%	4,7%	13,1%	8,0%	2,8%	18,3%	9,4%	3,3%	13,6%	7,6%
Gêne dans le travail	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	2,0%	0,8%	0,8%	1,1%	0,9%	0,4%	1,1%	0,7%
Traitemennt ou autre soin	2,4%	13,0%	6,7%	4,3%	16,4%	9,1%	2,4%	17,2%	8,7%	2,8%	15,1%	7,9%
Digestif												
Existence d'un problème	7,2%	9,9%	8,3%	8,1%	11,8%	9,6%	3,6%	11,1%	6,8%	6,2%	9,8%	7,7%
Plaîntes ou signes cliniques	6,7%	7,9%	7,2%	8,1%	11,2%	9,3%	3,6%	11,1%	6,8%	6,0%	9,1%	7,3%
Gêne dans le travail	1,4%	2,1%	1,7%	0,9%	1,3%	1,0%	0,4%	0,6%	0,5%	1,0%	1,1%	1,0%
Traitemennt ou autre soin	2,9%	5,7%	4,0%	3,0%	7,3%	4,7%	1,6%	5,6%	3,3%	2,4%	5,4%	3,6%
Dermatologie												
Existence d'un problème	2,8%	7,0%	4,5%	10,5%	4,5%	8,1%	6,7%	3,2%	5,2%	6,4%	4,7%	5,7%
Plaîntes ou signes cliniques	2,8%	6,3%	4,2%	9,7%	2,6%	6,9%	6,7%	2,7%	5,0%	6,1%	3,8%	5,2%
Gêne dans le travail	0,5%	0,0%	0,3%	2,5%	0,0%	1,5%	0,8%	0,5%	0,7%	1,2%	0,2%	0,8%
Traitemennt ou autre soin	2,8%	2,1%	2,5%	3,4%	1,9%	2,8%	2,4%	1,6%	2,1%	2,7%	2,1%	2,5%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n = 214	≥ 45 ans n = 144	Ensemble n = 358	<45 ans n = 242	≥ 45 ans n = 160	Ensemble n = 402	<45 ans n = 260	≥ 45 ans n = 190	Ensemble n = 450	<45 ans n = 822	≥ 45 ans n = 586	Global n = 1408
Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	31,1%	21,3%	27,2%	25,8%	26,6%	26,1%	18,2%	23,4%	20,4%	24,6%	21,5%	23,3%
Plaintes ou signes cliniques	30,7%	20,0%	26,4%	25,4%	26,6%	25,9%	18,2%	22,3%	20,0%	24,1%	20,9%	22,8%
Gêne dans le travail	17,5%	5,8%	12,9%	13,3%	16,6%	14,6%	4,7%	13,4%	8,4%	11,2%	11,1%	11,2%
TraITEMENT ou autre soin	6,6%	4,3%	5,7%	0,8%	3,2%	1,8%	0,8%	4,3%	2,3%	2,6%	3,7%	3,0%
Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	17,1%	21,7%	18,9%	22,2%	26,6%	23,9%	13,8%	22,5%	17,5%	17,8%	22,5%	19,8%
Plaintes ou signes cliniques	16,6%	20,3%	18,1%	21,3%	26,6%	23,4%	13,8%	21,9%	17,3%	17,3%	21,8%	19,2%
Gêne dans le travail	8,5%	10,6%	9,4%	7,6%	12,7%	9,6%	4,7%	8,6%	6,4%	6,8%	10,1%	8,2%
TraITEMENT ou autre soin	3,3%	5,6%	4,3%	3,0%	7,6%	4,8%	0,4%	2,2%	1,1%	2,2%	4,9%	3,3%
Troubles du sommeil												
Existence d'un problème	18,9%	23,8%	20,8%	23,2%	35,7%	28,2%	15,9%	25,7%	20,0%	18,6%	27,3%	22,2%
Plaintes ou signes cliniques	18,9%	22,0%	20,1%	22,9%	33,3%	27,0%	15,5%	24,6%	19,4%	18,2%	25,5%	21,2%
Gêne dans le travail	9,9%	8,4%	9,3%	8,1%	14,7%	10,7%	7,1%	10,2%	8,4%	7,7%	10,5%	8,9%
TraITEMENT ou autre soin	3,3%	6,3%	4,5%	4,3%	12,7%	7,7%	2,0%	6,5%	3,9%	3,4%	8,0%	5,3%
➤ Troubles neuro psychiques <i>(les 3 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	7,5%	8,4%	7,9%	9,7%	15,8%	12,1%	4,4%	9,1%	6,4%	6,9%	9,7%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,5%	7,0%	7,3%	8,9%	14,2%	11,0%	4,4%	9,1%	6,4%	6,6%	8,7%	7,5%
Gêne dans le travail	3,3%	2,8%	3,1%	3,8%	7,6%	5,3%	1,2%	2,7%	1,8%	2,3%	4,0%	3,0%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	2,1%	1,4%	0,0%	1,9%	0,8%	0,4%	0,0%	0,2%	0,4%	1,4%	0,8%
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	3,3%	8,5%	5,4%	3,4%	7,3%	4,9%	7,6%	17,6%	11,9%	5,2%	11,1%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	7,8%	5,1%	3,0%	6,7%	4,4%	6,5%	16,5%	10,8%	4,7%	10,4%	7,1%
Gêne dans le travail	0,5%	4,3%	2,0%	0,8%	2,0%	1,3%	0,8%	5,3%	2,8%	0,7%	3,9%	2,0%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	0,4%	4,9%	2,3%	0,2%	2,0%	1,0%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n = 214	≥ 45 ans n = 144	Ensemble n = 358	<45 ans n = 242	≥ 45 ans n = 160	Ensemble n = 402	<45 ans n = 260	≥ 45 ans n = 190	Ensemble n = 450	<45 ans n = 822	≥ 45 ans n = 586	Global n = 1408
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Existence d'un problème	8,1%	10,6%	9,1%	8,8%	16,5%	11,8%	9,4%	19,1%	13,5%	7,9%	14,2%	10,5%
Plaintes ou signes cliniques	8,1%	9,9%	8,8%	8,8%	16,5%	11,8%	9,4%	18,6%	13,3%	7,9%	13,7%	10,3%
Gêne dans le travail	3,3%	4,3%	3,7%	5,0%	7,6%	6,0%	4,7%	14,9%	9,0%	3,8%	8,2%	5,6%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	2,1%	2,0%	2,1%	4,5%	3,0%	2,8%	7,0%	4,5%	2,1%	4,4%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Existence d'un problème	1,4%	8,4%	4,2%	5,0%	10,8%	7,3%	2,0%	10,6%	5,6%	2,7%	9,2%	5,4%
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	7,7%	4,0%	5,0%	10,8%	7,3%	2,0%	10,1%	5,4%	2,7%	8,8%	5,3%
Gêne dans le travail	0,9%	4,2%	2,3%	3,8%	5,1%	4,3%	1,6%	6,9%	3,8%	2,0%	4,7%	3,1%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	2,8%	1,7%	2,5%	3,8%	3,0%	0,4%	4,8%	2,3%	1,1%	3,6%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Existence d'un problème	2,4%	9,8%	5,4%	5,8%	12,1%	8,3%	6,7%	15,5%	10,4%	5,1%	11,1%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,4%	9,8%	5,4%	5,8%	12,1%	8,3%	6,7%	15,5%	10,4%	5,1%	11,1%	7,6%
Gêne dans le travail	1,0%	5,6%	2,8%	4,2%	7,1%	5,3%	4,3%	9,6%	6,6%	3,1%	6,4%	4,5%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	4,3%	2,0%	0,8%	3,2%	1,8%	2,0%	5,3%	3,4%	1,1%	3,7%	2,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	9,0%	21,7%	14,1%	15,4%	25,5%	19,4%	14,1%	34,8%	22,9%	12,5%	25,3%	17,8%
Plaintes ou signes cliniques	9,0%	21,7%	14,1%	15,4%	25,5%	19,4%	14,1%	33,7%	22,4%	12,5%	24,8%	17,6%
Gêne dans le travail	3,8%	10,6%	6,5%	10,0%	13,5%	11,4%	7,9%	25,1%	15,2%	6,8%	14,6%	10,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	6,6%	3,7%	4,2%	7,8%	5,6%	4,4%	14,0%	8,4%	3,3%	9,0%	5,7%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n = 214	≥ 45 ans n = 144	Ensemble n = 358	<45 ans n = 242	≥ 45 ans n = 160	Ensemble n = 402	<45 ans n = 260	≥ 45 ans n = 190	Ensemble n = 450	<45 ans n = 822	≥ 45 ans n = 586	Global n = 1408
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	10,0%	17,5%	13,0%	10,4%	15,9%	12,6%	9,1%	17,6%	12,7%	9,5%	15,4%	12,0%
Plaintes ou signes cliniques	10,0%	17,5%	13,0%	10,4%	15,9%	12,6%	9,1%	17,6%	12,7%	9,5%	15,4%	12,0%
Gêne dans le travail	6,6%	7,0%	6,8%	3,3%	9,6%	5,8%	5,9%	12,8%	8,8%	5,0%	9,2%	6,7%
Traitements ou autre soin	2,4%	7,0%	4,2%	1,7%	7,7%	4,1%	4,0%	6,9%	5,2%	2,7%	6,4%	4,3%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	7,6%	7,0%	7,4%	7,9%	15,3%	10,8%	6,3%	10,8%	8,2%	7,3%	10,6%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	7,6%	6,3%	7,1%	7,9%	15,3%	10,8%	6,3%	10,8%	8,2%	7,3%	10,5%	8,6%
Gêne dans le travail	3,8%	2,1%	3,1%	4,6%	7,6%	5,8%	5,1%	8,6%	6,6%	4,3%	5,6%	4,9%
Traitements ou autre soin	2,9%	2,8%	2,8%	2,9%	5,7%	4,1%	2,8%	2,7%	2,7%	3,0%	3,3%	3,1%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires												
Existence d'un problème	14,9%	13,5%	14,3%	18,8%	20,0%	19,3%	18,5%	30,5%	23,6%	17,6%	21,4%	19,2%
Plaintes ou signes cliniques	14,9%	13,5%	14,3%	17,8%	19,5%	18,5%	18,2%	30,5%	23,4%	17,2%	21,2%	18,9%
Gêne dans le travail	4,8%	4,3%	4,6%	10,1%	12,9%	11,2%	11,4%	21,9%	15,9%	9,3%	12,6%	10,7%
Traitements ou autre soin	3,4%	2,9%	3,2%	2,6%	9,7%	5,4%	7,1%	10,2%	8,4%	4,9%	7,6%	6,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	18,3%	15,6%	17,2%	22,2%	26,9%	24,1%	20,1%	33,5%	25,7%	20,3%	26,0%	22,7%
Plaintes ou signes cliniques	18,3%	15,6%	17,2%	21,2%	26,9%	23,5%	19,8%	33,5%	25,6%	19,9%	26,0%	22,4%
Gêne dans le travail	6,7%	6,4%	6,6%	12,2%	14,8%	13,3%	12,6%	24,3%	17,5%	10,8%	14,6%	12,4%
Traitements ou autre soin	4,8%	5,0%	4,9%	4,3%	12,2%	7,4%	7,1%	10,9%	8,7%	6,2%	9,2%	7,4%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C- Industrie manufacturière n = 256	G- Commerce; réparations auto - moto n = 234	Base Everest n = 1408
Répartition hommes / femmes	62,5% / 37,5%	50,9% / 49,1%	53,8% / 46,2%
≤24 ans	4,3%	9,8%	6,6%
25-34 ans	17,2%	22,2%	24,0%
35-44 ans	30,1%	29,9%	27,8%
45-54 ans	35,5%	26,9%	30,4%
55 ans et plus	12,9%	11,1%	11,2%
Cadres	10,9%	9,4%	13,6%
Intermédiaires	19,5%	16,7%	25,4%
Employés	9,0%	44,9%	28,6%
Ouvriers	60,5%	27,8%	32,0%

Conditions de travail	C- Industrie manufacturière n = 256	G- Commerce; réparations auto - moto n = 234	Base Everest n = 1408
- Changement de travail depuis 1 an :			
Non	91,4%	92,7%	88,2%
Oui, raison médicale	0,4%	0,0%	0,4%
Oui, autre raison	7,8%	7,3%	10,6%
Oui, raison non précisée	0,4%	0,0%	0,9%
Travail à temps plein	91,8%	85,0%	86,7%
Travail en journée normale	74,4%	78,6%	79,3%
Coupures de plus de 2 heures	6,6%	22,2%	13,8%
Horaires décalés	29,3%	27,6%	25,9%
Horaires irréguliers ou alternés	26,0%	26,7%	24,6%
Travail de nuit	10,2%	5,0%	10,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	7,1%	7,0%	8,2%
- Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	25,1%	19,4%	19,8%
Rarement	43,9%	48,3%	43,6%
Assez souvent	23,5%	24,1%	24,6%
Très souvent	7,5%	8,2%	12,1%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	57,6%	54,9%	49,3%
Rarement	32,9%	27,9%	33,1%
Assez souvent	7,1%	12,9%	12,9%
Très souvent	2,4%	4,3%	4,7%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	38,6%	44,2%	37,9%
Rarement	39,0%	32,2%	37,1%
Assez souvent	18,1%	16,3%	19,0%
Très souvent	4,3%	7,3%	6,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	3,5%	5,6%	5,2%
1	4,7%	5,2%	4,6%
2	8,6%	9,9%	9,0%
3	14,5%	12,9%	12,4%
4	9,8%	11,2%	10,7%
5	20,4%	22,8%	20,6%
6	10,6%	12,5%	11,1%
7	15,3%	9,1%	14,4%
8	8,6%	6,9%	8,4%
9	2,4%	2,6%	2,5%
10	1,6%	1,3%	1,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	38,4%	32,3%	37,5%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	58,7%	48,7%	53,1%
Parmi eux :			
- Perturbe le travail	53,1%	58,2%	59,6%
- Aspect positif du travail	47,6%	38,2%	41,1%

Appréciation sur le travail	C- Industrie manufacturière n = 256	G- Commerce; réparations auto - moto n = 234	Base Everest n = 1408
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	11,0%	8,5%	6,3%
Plutôt non	17,6%	17,5%	13,6%
Plutôt oui	43,9%	42,7%	42,7%
Oui tout à fait	27,5%	31,2%	37,3%
-Travail varié			
Non pas du tout	5,5%	6,4%	4,8%
Plutôt non	10,9%	13,7%	12,1%
Plutôt oui	44,1%	40,2%	40,7%
Oui tout à fait	39,5%	39,7%	42,4%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	12,5%	6,8%	8,9%
Plutôt non	14,1%	15,8%	17,4%
Plutôt oui	44,7%	41,0%	42,3%
Oui tout à fait	28,6%	36,3%	31,4%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	4,7%	4,7%	4,3%
Plutôt non	12,5%	12,4%	11,8%
Plutôt oui	51,8%	48,5%	50,7%
Oui tout à fait	31,0%	34,3%	33,2%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	2,4%	2,1%	1,9%
Plutôt non	12,4%	10,3%	12,7%
Plutôt oui	54,6%	51,7%	54,2%
Oui tout à fait	30,7%	35,9%	31,2%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	7,5%	4,7%	4,8%
Plutôt non	17,0%	15,1%	15,9%
Plutôt oui	49,8%	45,7%	52,4%
Oui tout à fait	25,7%	34,5%	26,9%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	33,3%	35,6%	31,5%
Plutôt non	41,7%	42,9%	45,1%
Plutôt oui	20,6%	17,6%	19,8%
Oui tout à fait	4,4%	3,9%	3,6%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	55,0%	60,7%	60,1%
Plutôt non	26,3%	26,9%	26,0%
Plutôt oui	12,4%	10,7%	10,5%
Oui tout à fait	6,4%	1,7%	3,4%

Charge physique du poste de travail	C- Industrie manufacturière n = 256	G- Commerce; réparations auto-moto n = 234	Base Everest n = 1408
Postures contraignantes :			
Fréquence			
Non jamais	48,0%	44,6%	50,9%
Oui parfois	31,2%	31,3%	30,2%
Oui souvent	20,7%	24,0%	18,9%
Difficultés			
Pas de postures contraignantes	48,0%	44,6%	50,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	30,1%	31,3%	24,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	18,8%	22,3%	22,5%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	3,1%	1,7%	2,1%
Effort, port de charges lourdes :			
Fréquence			
Non jamais	54,1%	41,6%	57,0%
Oui parfois	30,2%	35,6%	28,4%
Oui souvent	15,7%	22,7%	14,6%
Difficultés			
Pas d'effort, port de charges lourdes	54,1%	41,6%	57,0%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	27,8%	33,9%	23,0%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	16,9%	20,6%	18,2%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	1,2%	3,9%	1,9%
Gestes répétitifs :			
Fréquence			
Non jamais	39,1%	34,3%	43,6%
Oui parfois	24,6%	26,6%	22,1%
Oui souvent	36,3%	39,1%	34,3%
Difficultés			
Pas de gestes répétitifs	39,1%	34,3%	43,6%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	30,9%	25,8%	20,3%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	27,0%	35,6%	33,3%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	3,1%	4,3%	2,9%
Importants déplacements à pieds :			
Fréquence			
Non jamais	54,7%	57,1%	62,9%
Oui parfois	23,8%	14,6%	17,5%
Oui souvent	21,5%	28,3%	19,7%
Difficultés			
Pas d'importants déplacements à pieds	54,7%	57,1%	62,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	8,2%	13,7%	8,4%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	34,0%	27,9%	27,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	3,1%	1,3%	1,6%
Station debout prolongée :			
Fréquence			
Non jamais	36,5%	42,3%	47,8%
Oui parfois	23,9%	16,2%	19,0%
Oui souvent	39,6%	41,5%	33,1%
Difficultés			
Pas de station debout prolongée	36,5%	42,3%	47,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	23,9%	19,7%	17,0%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	35,7%	33,8%	31,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	3,9%	4,3%	4,2%

Expositions	C- Industrie manufacturière n = 256	G- Commerce; réparations auto - moto n = 234	Base Everest n = 1408
Produits chimiques	36,7%	17,5%	25,2%
Poussières, fumées	49,2%	28,6%	30,4%
Rx ionisants	2,3%	0,4%	6,0%
Vibrations	22,7%	15,5%	19,7%
Gène sonore	55,1%	30,3%	37,5%
Bruit > 80db	46,2%	15,0%	23,4%
Contrainte visuelle	37,3%	28,0%	34,2%
Conduite routière prolongée	5,9%	10,8%	14,1%
Chaleur intense	15,4%	8,6%	13,4%
Froid intense	11,9%	15,6%	11,2%
Intempéries	7,1%	6,4%	14,2%
Pression psychologique	23,1%	23,6%	26,7%
Agent biologique	3,5%	2,6%	9,2%
Contact avec le public	28,3%	73,4%	57,8%

Formation	C- Industrie manufacturière n = 256	G- Commerce; réparations auto - moto n = 234	Base Everest n = 1408
A bénéficié d'une formation depuis un an	40,3%	45,3%	50,7%
Parmi eux :			
- En rapport avec le travail actuel	84,2%	91,1%	91,5%
- En rapport avec le travail futur	13,1%	7,2%	12,2%
- Formation d'intérêt général	44,4%	38,1%	40,9%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	30,0%	31,4%	30,2%

Mode de vie	C- Industrie manufacturière n = 256	G- Commerce; réparations auto - moto n = 234	Base Everest n = 1408
Activité sportive régulière	47,2%	45,3%	48,5%
Consommation de tabac	37,0%	34,1%	32,5%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	6,7%	7,8%	7,2%
Consommation de café	79,8%	71,5%	76,0%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	14,1%	17,1%	13,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	12,9%	14,3%	14,1%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations auto - moto			Base Everest région		
	<45 ans n = 132	≥ 45 ans n = 124	Ensemble n = 256	<45 ans n = 145	≥ 45 ans n = 89*	Ensemble n = 234	<45 ans n = 822	≥ 45 ans n = 586	Ensemble n = 1408
Indice de masse corporelle									
- Normaux ou maigres	59,5%	49,2%	54,6%	65,2%	42,0%	56,3%	60,4%	44,8%	54,0%
- Surpoids	30,5%	33,3%	31,9%	27,0%	33,0%	29,3%	27,1%	34,5%	30,2%
- Obeses	9,9%	17,5%	13,5%	7,8%	25,0%	14,4%	12,5%	20,7%	15,9%
Appareil respiratoire									
Existence d'un problème	6,9%	4,9%	6,0%	2,8%	3,4%	3,0%	4,2%	5,7%	4,8%
Plaîntes ou signes cliniques	6,9%	4,1%	5,6%	2,1%	3,4%	2,6%	3,7%	5,2%	4,3%
Gêne dans le travail	3,1%	0,8%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,9%	1,0%
Traitemennt ou autre soin	4,6%	2,5%	3,6%	2,8%	1,1%	2,1%	3,1%	2,8%	3,0%
Appareil cardio vasculaire									
Existence d'un problème	0,8%	6,6%	3,6%	2,8%	8,0%	4,7%	2,1%	6,6%	4,0%
Plaîntes ou signes cliniques	0,8%	5,7%	3,2%	2,1%	6,8%	3,9%	1,5%	5,2%	3,0%
Gêne dans le travail	0,0%	1,6%	0,8%	0,7%	1,1%	0,9%	0,6%	1,2%	0,9%
Traitemennt ou autre soin	0,0%	3,3%	1,6%	1,4%	4,6%	2,6%	1,2%	4,4%	2,5%
HTA									
Existence d'un problème	3,1%	19,5%	11,0%	9,2%	19,3%	13,0%	4,9%	19,2%	10,9%
Plaîntes ou signes cliniques	1,6%	12,8%	6,9%	7,0%	17,0%	10,9%	3,3%	13,6%	7,6%
Gêne dans le travail	0,0%	1,7%	0,8%	0,7%	1,1%	0,9%	0,4%	1,1%	0,7%
Traitemennt ou autre soin	2,3%	15,4%	8,6%	5,7%	12,6%	8,4%	2,8%	15,1%	7,9%
Digestif									
Existence d'un problème	7,9%	8,5%	8,2%	8,0%	10,3%	8,9%	6,2%	9,8%	7,7%
Plaîntes ou signes cliniques	7,9%	6,8%	7,4%	8,0%	10,3%	8,9%	6,0%	9,1%	7,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,9%	0,4%	1,4%	1,2%	1,3%	1,0%	1,1%	1,0%
Traitemennt ou autre soin	2,4%	4,3%	3,3%	3,6%	3,5%	3,6%	2,4%	5,4%	3,6%
Dermatologie									
Existence d'un problème	9,2%	4,9%	7,1%	4,1%	7,9%	5,6%	6,4%	4,7%	5,7%
Plaîntes ou signes cliniques	9,2%	4,1%	6,7%	3,5%	6,8%	4,7%	6,1%	3,8%	5,2%
Gêne dans le travail	0,8%	0,8%	0,8%	1,4%	0,0%	0,9%	1,2%	0,2%	0,8%
Traitemennt ou autre soin	4,6%	0,8%	2,8%	2,1%	4,5%	3,0%	2,7%	2,1%	2,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations auto - moto			Base Everest région		
	<45 ans n = 132	≥ 45 ans n = 124	Ensemble n = 256	<45 ans n = 145	≥ 45 ans n = 89*	Ensemble n = 234	<45 ans n = 822	≥ 45 ans n = 586	Ensemble n = 1408
Lassitude, fatigue									
Existence d'un problème	27,5%	27,6%	27,6%	23,6%	27,3%	25,0%	24,6%	21,5%	23,3%
Plaintes ou signes cliniques	27,5%	25,2%	26,4%	22,9%	27,3%	24,6%	24,1%	20,9%	22,8%
Gêne dans le travail	10,7%	12,4%	11,5%	6,9%	14,0%	9,6%	11,2%	11,1%	11,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	3,3%	2,4%	1,4%	5,8%	3,0%	2,6%	3,7%	3,0%
Anxiété, nervosité									
Existence d'un problème	19,1%	23,8%	21,3%	18,2%	28,1%	22,0%	17,8%	22,5%	19,8%
Plaintes ou signes cliniques	19,1%	22,1%	20,6%	17,5%	28,1%	21,6%	17,3%	21,8%	19,2%
Gêne dans le travail	8,4%	11,7%	10,0%	4,9%	13,6%	8,2%	6,8%	10,1%	8,2%
TraITEMENT ou autre soin	3,1%	1,7%	2,4%	0,0%	9,1%	3,5%	2,2%	4,9%	3,3%
Troubles du sommeil									
Existence d'un problème	22,5%	26,2%	24,3%	16,2%	30,3%	21,6%	18,6%	27,3%	22,2%
Plaintes ou signes cliniques	22,5%	24,8%	23,6%	16,2%	28,4%	20,9%	18,2%	25,5%	21,2%
Gêne dans le travail	12,5%	9,9%	11,2%	4,2%	12,4%	7,4%	7,7%	10,5%	8,9%
TraITEMENT ou autre soin	3,9%	5,8%	4,8%	2,1%	11,2%	5,6%	3,4%	8,0%	5,3%
➤ Troubles neuro psychiques <i>(les 3 signes ci-dessus)</i>									
Existence d'un problème	7,7%	8,2%	7,9%	7,0%	13,5%	9,5%	6,9%	9,7%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,7%	7,4%	7,5%	7,0%	12,5%	9,1%	6,6%	8,7%	7,5%
Gêne dans le travail	3,8%	2,4%	3,1%	0,7%	6,7%	3,0%	2,3%	4,0%	3,0%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	0,0%	0,4%	0,0%	3,4%	1,3%	0,4%	1,4%	0,8%
Troubles de l'audition									
Existence d'un problème	12,4%	15,4%	13,9%	4,9%	15,1%	8,7%	5,2%	11,1%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	11,7%	13,0%	12,4%	4,2%	15,1%	8,3%	4,7%	10,4%	7,1%
Gêne dans le travail	2,3%	6,6%	4,4%	0,7%	7,0%	3,1%	0,7%	3,9%	2,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	7,5%	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	2,0%	1,0%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations auto - moto			Base Everest région		
	<45 ans n = 132	≥ 45 ans n = 124	Ensemble n = 256	<45 ans n = 145	≥ 45 ans n = 89*	Ensemble n = 234	<45 ans n = 822	≥ 45 ans n = 586	Ensemble n = 1408
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule									
Existence d'un problème	12,2%	17,1%	14,6%	9,0%	13,5%	10,7%	7,9%	14,2%	10,5%
Plaîntes ou signes cliniques	12,2%	16,3%	14,2%	9,0%	12,4%	10,3%	7,9%	13,7%	10,3%
Gêne dans le travail	7,7%	12,3%	9,9%	3,5%	6,7%	4,7%	3,8%	8,2%	5,6%
Traitemennt ou autre soin	3,1%	3,3%	3,2%	1,4%	2,3%	1,7%	2,1%	4,4%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude									
Existence d'un problème	3,8%	7,3%	5,5%	2,8%	13,5%	6,9%	2,7%	9,2%	5,4%
Plaîntes ou signes cliniques	3,8%	6,5%	5,1%	2,8%	13,5%	6,9%	2,7%	8,8%	5,3%
Gêne dans le travail	3,8%	4,1%	4,0%	1,4%	7,9%	3,9%	2,0%	4,7%	3,1%
Traitemennt ou autre soin	1,5%	1,6%	1,6%	1,4%	4,5%	2,6%	1,1%	3,6%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet									
Existence d'un problème	9,9%	12,3%	11,1%	4,9%	13,5%	8,2%	5,1%	11,1%	7,6%
Plaîntes ou signes cliniques	9,9%	12,3%	11,1%	4,9%	13,5%	8,2%	5,1%	11,1%	7,6%
Gêne dans le travail	6,9%	7,4%	7,1%	1,4%	9,1%	4,3%	3,1%	6,4%	4,5%
Traitemennt ou autre soin	2,3%	4,1%	3,2%	0,7%	3,4%	1,7%	1,1%	3,7%	2,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>									
Existence d'un problème	19,8%	27,0%	23,3%	14,6%	29,2%	20,2%	12,5%	25,3%	17,8%
Plaîntes ou signes cliniques	19,8%	27,0%	23,3%	14,6%	28,1%	19,7%	12,5%	24,8%	17,6%
Gêne dans le travail	13,1%	19,7%	16,3%	5,6%	16,9%	9,9%	6,8%	14,6%	10,0%
Traitemennt ou autre soin	5,5%	8,3%	6,9%	2,8%	7,0%	4,3%	3,3%	9,0%	5,7%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations auto - moto			Base Everest région		
	<45 ans n = 132	≥ 45 ans n = 124	Ensemble n = 256	<45 ans n = 145	≥ 45 ans n = 89*	Ensemble n = 234	<45 ans n = 822	≥ 45 ans n = 586	Ensemble n = 1408
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur									
Existence d'un problème	6,9%	20,3%	13,4%	10,4%	12,4%	11,2%	9,5%	15,4%	12,0%
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	20,3%	13,4%	10,4%	12,4%	11,2%	9,5%	15,4%	12,0%
Gêne dans le travail	4,6%	14,6%	9,5%	4,2%	10,1%	6,4%	5,0%	9,2%	6,7%
Traitements ou autres soins	3,8%	6,5%	5,1%	1,4%	3,4%	2,1%	2,7%	6,4%	4,3%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales									
Existence d'un problème	10,8%	10,6%	10,7%	3,5%	6,9%	4,8%	7,3%	10,6%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	10,8%	9,8%	10,3%	3,5%	6,9%	4,8%	7,3%	10,5%	8,6%
Gêne dans le travail	7,7%	7,4%	7,5%	2,1%	4,6%	3,1%	4,3%	5,6%	4,9%
Traitements ou autres soins	5,4%	2,5%	4,0%	1,4%	2,3%	1,7%	3,0%	3,3%	3,1%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires									
Existence d'un problème	22,5%	26,0%	24,2%	23,2%	21,8%	22,7%	17,6%	21,4%	19,2%
Plaintes ou signes cliniques	21,9%	26,0%	23,9%	22,7%	21,8%	22,4%	17,2%	21,2%	18,9%
Gêne dans le travail	14,0%	17,1%	15,5%	12,0%	12,6%	12,2%	9,3%	12,6%	10,7%
Traitements ou autres soins	8,6%	4,9%	6,8%	4,9%	9,2%	6,6%	4,9%	7,6%	6,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis									
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>									
Existence d'un problème	24,8%	29,3%	27,0%	25,4%	27,1%	26,0%	20,3%	26,0%	22,7%
Plaintes ou signes cliniques	24,2%	29,3%	26,7%	24,8%	27,1%	25,7%	19,9%	26,0%	22,4%
Gêne dans le travail	14,7%	19,5%	17,1%	13,4%	15,3%	14,1%	10,8%	14,6%	12,4%
Traitements ou autres soins	9,4%	6,6%	8,0%	6,3%	10,6%	7,9%	6,2%	9,2%	7,4%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

