



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2012-2013

## Région Franche-Comté

Juillet 2014



GIS Evrest, Groupement d'Intérêt Scientifique, créé le 01 Janvier 2009

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2012-2013 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

## **Descriptif de l'échantillon Franche-Comté**

L'exploitation des données de la région Franche-Comté a porté sur **800 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2012 (n=403) et 2013 (n=397), puis saisies dans la base de données Evrest.

Au niveau de la région Franche-Comté, concernant les secteurs d'activité, l'échantillon de salariés Evrest semble plus proche du champ des salariés du privé (données ACOSS) que de celui des salariés des secteurs publics et privés confondus (données DADS de l'INSEE), avec toutefois une sur-représentation du secteur de la construction. Les hommes, les salariés de 45-54 ans et les ouvriers sont sur-représentés dans l'échantillon Evrest par rapport aux données INSEE (tableau 1).

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles ne permettent de fournir des résultats plus détaillés que pour les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Le nombre de fiches 2012-2013 de la région ne permet de fournir des résultats détaillés que pour le secteur de la construction (tableau 3) – secteur dont l'effectif est néanmoins faible, et dont les résultats seront à interpréter avec prudence.

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Franche Comté 2012-2013 aux données Insee (DADS 2010) et Acoss (2012).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Franche Comté 2012-2013 (n=800)	Données INSEE 2010 (DADS) %	Données ACOS 2012 %
	%		
<b>Sexe</b>			
Hommes	57,9	51,9	-
Femmes	42,1	48,1	-
<b>Age</b>			
≤ 24 ans	12,5	14,9	-
25-34 ans	24,1	22,0	-
35-44 ans	22,3	25,3	-
45- 54 ans	30,3	24,7	-
55 ans et plus	10,9	13,1	-
<b>Catégorie socioprofessionnelle</b>			
Artisans, commerçants et chefs d'entrep.	0,1	0,7	-
Cadres et professions intellectuelles sup.	6,9	11,4	-
Professions intermédiaires	20,0	19,1	-
Employés	29,1	35,9	-
Ouvriers	43,9	33,0	-
<b>Secteur d'activité</b>			
Agriculture	0,3	0,0	0,0
Industrie	21,0	21,9	31,4
Construction	23,9	6,1	7,8
Commerce	14,8	11,8	16,1
Services	40,1	60,1	44,7

- : informations non disponibles

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Franche Comté 2012-2013 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	1	0,1
Cadres et professions intellectuelles supérieures	55	6,9
Professions intermédiaires	160	20,0
<b>Employés</b>	<b>233</b>	<b>29,1</b>
<b>Ouvriers</b>	<b>351</b>	<b>43,9</b>
Total général	800	100,0

Tableau 3: Descriptif de l'échantillon régional Franche Comté 2012-2013 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
<b>AGRICULTURE</b>	<b>2</b>	<b>0,3</b>
A. Agriculture, sylviculture et pêche	2	0,3
<b>INDUSTRIE</b>	<b>168</b>	<b>21,0</b>
B. Industries extractives	4	0,5
C. Industrie manufacturière	155	19,4
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	9	1,1
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>191</b>	<b>23,9</b>
<b>F. Construction</b>	<b>191</b>	<b>23,9</b>
<b>COMMERCE</b>	<b>118</b>	<b>14,8</b>
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	118	14,8
<b>SERVICES</b>	<b>321</b>	<b>40,1</b>
H. Transports et entreposage	32	4,0
I. Hébergement et restauration	17	2,1
J. Information et communication	5	0,6
K. Activités financières et d'assurance	12	1,5
L. Activités immobilières	10	1,3
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	26	3,3
N. Activités de services administratifs et de soutien	36	4,5
O. Administration publique	28	3,5
P. Enseignement	15	1,9
Q. Santé humaine et action sociale	116	14,5
R. Arts, spectacles et activités récréatives	3	0,4
S. Autres activités de services	21	2,6
<b>Total général</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=463	Femmes n=337	Ensemble n=800
≤24 ans	14,9%	9,2%	12,5%
25-34 ans	25,9%	21,7%	24,1%
35-44 ans	21,2%	23,7%	22,2%
45-54 ans	27,0%	34,7%	30,2%
55 ans et plus	11,0%	10,7%	10,9%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,2%	0,0%	0,1%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	8,6%	4,5%	6,9%
Professions intermédiaires	17,5%	23,4%	20,0%
Employés	7,8%	58,5%	29,1%
Ouvriers	65,9%	13,6%	43,9%
C. Industrie manufacturière	24,0%	13,1%	19,4%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	0,0%	0,0%	0,0%
F. Construction	38,2%	4,2%	23,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	11,4%	19,3%	14,8%
H. Transports et entreposage	5,6%	1,8%	4,0%
I. Hébergement et restauration	0,9%	3,9%	2,1%
J. Information et communication	0,6%	0,6%	0,6%
K. Activités financières et d'assurance	0,6%	2,7%	1,5%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	3,5%	3,0%	3,2%
N. Activités de services administratifs et de soutien	3,2%	6,2%	4,5%
O. Administration publique	2,4%	5,0%	3,5%
Q. Santé humaine et action sociale	3,5%	29,7%	14,5%
S. Autres activités de services	0,9%	5,0%	2,6%

Conditions de travail	Hommes n=463	Femmes n=337	Ensemble n=800
- Changement de travail depuis 1 an :			
Non	86,3%	88,6%	87,3%
Oui, raison médicale	1,3%	1,5%	1,4%
Oui, autre raison	10,4%	8,7%	9,7%
Oui, raison non précisée	2,0%	1,2%	1,6%
Travail à temps plein	94,8%	65,9%	82,7%
Travail en journée normale	86,4%	80,1%	83,7%
Coupures de plus de 2 heures	10,9%	29,3%	18,4%
Horaires décalés	17,1%	27,7%	21,4%
Horaires irréguliers ou alternés	19,3%	35,3%	25,9%
Travail de nuit	8,3%	6,8%	7,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	9,1%	3,4%	6,7%
- Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	14,1%	24,9%	18,6%
Rarement	50,3%	44,9%	48,0%
Assez souvent	23,5%	24,3%	23,8%
Très souvent	12,1%	6,0%	9,5%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	53,6%	55,9%	54,6%
Rarement	30,1%	23,7%	27,4%
Assez souvent	12,7%	14,4%	13,5%
Très souvent	3,5%	6,0%	4,6%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	46,4%	40,1%	43,8%
Rarement	34,2%	36,2%	35,0%
Assez souvent	14,7%	19,1%	16,6%
Très souvent	4,7%	4,6%	4,6%
- Difficultés liées à la pression temp. (0 : pas diff, 10 : très diff)			
0	6,3%	6,3%	6,3%
1	4,5%	3,9%	4,3%
2	9,1%	7,2%	8,3%
3	11,4%	12,0%	11,7%
4	9,3%	11,7%	10,3%
5	25,1%	22,5%	24,0%
6	9,9%	8,7%	9,4%
7	11,0%	14,7%	12,5%
8	9,9%	8,1%	9,2%
9	1,5%	3,0%	2,1%
10	1,9%	2,1%	2,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	34,3%	36,5%	35,3%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	43,0%	49,4%	45,7%
Parmi eux : Perturbe le travail	52,4%	58,1%	55,0%
Aspect positif du travail	43,7%	45,9%	44,7%

<b>Appréciation sur le travail</b>	<b>Hommes n=463</b>	<b>Femmes n=337</b>	<b>Ensemble n=800</b>
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	6,7%	7,1%	6,9%
Plutôt non	11,2%	11,6%	11,4%
Plutôt oui	39,5%	42,7%	40,9%
Oui tout à fait	42,5%	38,6%	40,9%
-Travail varié			
Non pas du tout	3,5%	5,3%	4,3%
Plutôt non	11,0%	13,4%	12,0%
Plutôt oui	40,5%	41,2%	40,8%
Oui tout à fait	45,0%	40,1%	42,9%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	7,4%	9,0%	8,1%
Plutôt non	13,2%	19,9%	16,0%
Plutôt oui	39,5%	38,6%	39,1%
Oui tout à fait	39,9%	32,5%	36,8%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,0%	6,3%	4,4%
Plutôt non	11,5%	13,6%	12,4%
Plutôt oui	46,0%	51,8%	48,4%
Oui tout à fait	39,5%	28,3%	34,8%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,1%	2,4%	1,6%
Plutôt non	8,1%	12,2%	9,9%
Plutôt oui	45,0%	55,8%	49,6%
Oui tout à fait	45,8%	29,6%	38,9%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	5,1%	6,1%	5,5%
Plutôt non	13,7%	21,9%	17,1%
Plutôt oui	47,2%	49,5%	48,2%
Oui tout à fait	34,0%	22,5%	29,2%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	37,7%	38,2%	37,9%
Plutôt non	35,9%	37,3%	36,5%
Plutôt oui	24,5%	20,6%	22,8%
Oui tout à fait	1,9%	3,9%	2,8%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	67,2%	59,9%	64,2%
Plutôt non	18,9%	26,5%	22,1%
Plutôt oui	9,1%	9,3%	9,2%
Oui tout à fait	4,8%	4,2%	4,5%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=463	Femmes n=337	Ensemble n=800
Postures contraignantes :			
Non jamais	36,7%	44,0%	39,8%
Oui parfois	37,6%	31,2%	34,9%
Oui souvent	25,7%	24,7%	25,3%
Difficultés			
Pas de postures contraignantes	36,7%	44,0%	39,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	33,3%	33,3%	33,3%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	27,9%	20,5%	24,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	2,2%	2,1%	2,1%
Effort, port de charges lourdes :			
Non jamais	38,8%	53,0%	44,8%
Oui parfois	39,4%	29,5%	35,2%
Oui souvent	21,8%	17,6%	20,0%
Difficultés			
Pas d'effort, port de charges lourdes	38,8%	53,0%	44,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	29,0%	27,7%	28,4%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	30,3%	17,9%	25,0%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible non	2,0%	1,5%	1,8%
Gestes répétitifs :			
Non jamais	35,3%	35,4%	35,3%
Oui parfois	27,1%	24,7%	26,1%
Oui souvent	37,7%	39,9%	38,6%
Difficultés			
Pas de gestes répétitifs	35,3%	35,4%	35,3%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	24,2%	25,9%	24,9%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	39,2%	36,3%	38,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,3%	2,4%	1,8%
Importants déplacements à pieds :			
Non jamais	52,9%	63,3%	57,3%
Oui parfois	21,5%	12,8%	17,8%
Oui souvent	25,6%	23,9%	24,9%
Difficultés			
Pas d'importants déplacements à pieds	52,9%	63,3%	57,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	11,3%	12,5%	11,8%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	34,1%	22,7%	29,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non	1,7%	1,5%	1,6%
Station debout prolongée :			
Non jamais	37,7%	46,5%	41,4%
Oui parfois	16,7%	17,4%	17,0%
Oui souvent	45,6%	36,0%	41,6%
Difficultés			
Pas de station debout prolongée	37,7%	46,5%	41,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	17,6%	20,7%	18,9%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	39,7%	26,1%	34,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	5,0%	6,6%	5,7%

<b>Expositions</b>	<b>Hommes n=463</b>	<b>Femmes n=337</b>	<b>Ensemble n=800</b>
Produits chimiques	27,7%	22,3%	25,4%
Poussières, fumées	61,1%	19,9%	43,8%
Rx ionisants	1,1%	1,5%	1,3%
Vibrations	46,9%	7,4%	30,2%
Gêne sonore	63,8%	27,6%	48,6%
Bruit > 80db	52,1%	12,3%	35,4%
Contrainte visuelle	32,6%	30,6%	31,8%
Conduite routière prolongée	22,5%	7,5%	16,2%
Chaleur intense	15,6%	9,6%	13,1%
Froid intense	12,6%	7,9%	10,6%
Intempéries	33,8%	7,9%	23,0%
Pression psychologique	25,3%	31,6%	27,9%
Agent biologique	6,7%	20,3%	12,4%
Contact avec le public	71,8%	79,9%	75,2%

<b>Formation</b>	<b>Hommes n=463</b>	<b>Femmes n=337</b>	<b>Ensemble n=800</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an :	40,3%	43,9%	41,9%
Parmi eux :			
En rapport avec le travail actuel	92,3%	93,1%	92,7%
En rapport avec le travail futur	17,3%	20,0%	18,5%
Formation d'intérêt général	22,7%	44,5%	32,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	35,2%	25,5%	31,1%

<b>Mode de vie</b>	<b>Hommes n=463</b>	<b>Femmes n=337</b>	<b>Ensemble n=800</b>
Activité sportive régulière	51,3%	48,3%	50,1%
Consommation de tabac	45,3%	35,1%	41,0%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	14,7%	6,6%	11,3%
Consommation de café	87,9%	73,0%	81,6%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	25,6%	13,8%	20,6%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,4%	14,6%	14,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n = 800
	Hommes n = 287	Femmes n = 184	Ensemble n = 471	Hommes n = 176	Femmes n = 153	Ensemble n = 329	
<b>Indice de masse corporelle</b>							
- Normaux ou maigres	52,5%	63,9%	56,8%	37,4%	64,6%	50,0%	54,0%
- Surpoids	34,9%	21,9%	30,0%	42,1%	23,1%	33,3%	31,4%
- Obèses	12,6%	14,2%	13,2%	20,5%	12,2%	16,7%	14,6%
<b>Appareil respiratoire</b>							
Existence d'un problème	3,2%	5,0%	3,9%	10,5%	2,0%	6,5%	5,0%
Plaîntes ou signes cliniques	2,8%	5,0%	3,7%	9,4%	2,0%	5,9%	4,6%
Gêne dans le travail	0,4%	1,1%	0,7%	1,2%	0,7%	0,9%	0,8%
Traitement ou autre soin	2,8%	3,4%	3,0%	6,4%	2,0%	4,3%	3,6%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>							
Existence d'un problème	0,4%	0,6%	0,4%	8,1%	2,7%	5,6%	2,6%
Plaîntes ou signes cliniques	0,4%	0,6%	0,4%	7,0%	2,7%	5,0%	2,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,9%	0,4%
Traitement ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	5,2%	0,7%	3,1%	1,3%
<b>HTA</b>							
Existence d'un problème	3,6%	2,8%	3,3%	20,1%	13,3%	16,9%	8,9%
Plaîntes ou signes cliniques	3,2%	2,8%	3,1%	16,8%	8,7%	12,9%	7,1%
Gêne dans le travail	0,4%	1,1%	0,7%	0,6%	0,0%	0,3%	0,5%
Traitement ou autre soin	1,8%	0,6%	1,3%	14,2%	10,7%	12,5%	5,9%
<b>Lassitude, fatigue</b>							
Existence d'un problème	18,6%	27,1%	21,9%	26,9%	37,6%	31,9%	26,0%
Plaîntes ou signes cliniques	18,6%	25,1%	21,1%	26,3%	37,2%	31,3%	25,3%
Gêne dans le travail	6,8%	12,6%	9,0%	10,5%	17,4%	13,8%	11,0%
Traitement ou autre soin	1,1%	3,5%	2,0%	5,3%	5,4%	5,4%	3,4%
<b>Anxiété, nervosité</b>							
Existence d'un problème	18,9%	21,5%	19,9%	23,7%	32,9%	28,0%	23,2%
Plaîntes ou signes cliniques	18,9%	21,0%	19,7%	22,5%	31,5%	26,7%	22,6%
Gêne dans le travail	6,8%	10,3%	8,1%	7,7%	12,2%	9,8%	8,8%
Traitement ou autre soin	2,1%	3,5%	2,6%	3,6%	9,6%	6,4%	4,2%
<b>Troubles du sommeil</b>							
Existence d'un problème	9,7%	14,1%	11,4%	26,3%	34,7%	30,2%	19,1%
Plaîntes ou signes cliniques	9,0%	13,6%	10,8%	24,4%	32,6%	28,2%	17,9%
Gêne dans le travail	5,0%	6,3%	5,5%	7,7%	9,7%	8,6%	6,8%
Traitement ou autre soin	1,4%	2,9%	2,0%	5,9%	9,1%	7,4%	4,2%
<b>➤ Troubles neuro psychiques</b>							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	4,3%	7,9%	5,7%	8,2%	19,6%	13,5%	8,9%
Plaîntes ou signes cliniques	3,9%	7,3%	5,2%	7,0%	17,0%	11,6%	7,9%
Gêne dans le travail	2,1%	3,4%	2,6%	2,9%	5,4%	4,1%	3,2%
Traitement ou autre soin	0,0%	0,6%	0,2%	0,6%	3,4%	1,9%	0,9%

Etat de santé	<45 ans			>=45 ans			Ensemble n = 800
	Hommes n = 287	Femmes n = 184	Ensemble n = 471	Hommes n = 176	Femmes n = 153	Ensemble n = 329	
<b>Digestif</b>							
Existence d'un problème	3,6%	10,2%	6,2%	11,8%	12,0%	11,9%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	9,7%	5,8%	9,5%	12,0%	10,6%	7,7%
Gêne dans le travail	0,7%	2,3%	1,3%	2,4%	2,8%	2,6%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,8%	2,9%	2,2%	7,7%	6,3%	7,1%	4,2%
<b>Dermatologie</b>							
Existence d'un problème	5,0%	5,2%	5,1%	4,0%	6,7%	5,3%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	5,2%	5,1%	4,0%	6,0%	5,0%	5,0%
Gêne dans le travail	1,4%	0,0%	0,9%	1,2%	0,7%	0,9%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,8%	1,1%	1,5%	1,7%	3,4%	2,5%	1,9%
<b>Troubles de l'audition</b>							
Existence d'un problème	8,3%	1,7%	5,7%	28,9%	6,2%	18,5%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	1,7%	5,7%	28,5%	4,8%	17,7%	10,6%
Gêne dans le travail	0,4%	1,1%	0,7%	7,5%	2,8%	5,3%	2,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,4%	0,6%	0,4%	1,7%	1,4%	1,6%	0,9%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>							
Existence d'un problème	4,6%	5,0%	4,8%	11,0%	14,1%	12,5%	7,9%
Plaintes ou signes cliniques	4,6%	5,0%	4,8%	10,5%	14,1%	12,1%	7,8%
Gêne dans le travail	3,2%	3,4%	3,3%	5,3%	8,9%	6,9%	4,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	1,1%	0,9%	4,1%	6,2%	5,0%	2,6%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>							
Existence d'un problème	2,5%	2,2%	2,4%	7,5%	8,7%	8,1%	4,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	2,2%	2,4%	7,0%	8,1%	7,5%	4,5%
Gêne dans le travail	1,8%	1,7%	1,8%	4,7%	6,1%	5,3%	3,2%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	0,6%	0,7%	2,3%	4,0%	3,1%	1,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>							
Existence d'un problème	2,5%	6,7%	4,1%	8,7%	18,2%	13,1%	7,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	6,7%	4,1%	8,7%	17,6%	12,8%	7,7%
Gêne dans le travail	1,1%	3,9%	2,2%	5,2%	10,2%	7,5%	4,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	2,2%	1,3%	2,3%	7,4%	4,7%	2,7%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b>							
(l'un des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	8,6%	11,9%	9,9%	23,3%	29,7%	26,2%	16,6%
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	11,9%	9,9%	22,8%	29,7%	26,0%	16,5%
Gêne dans le travail	5,0%	8,5%	6,4%	12,9%	18,6%	15,5%	10,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,2%	3,5%	2,7%	7,6%	13,1%	10,1%	5,7%

Etat de santé	<45 ans			>=45 ans			Ensemble n = 800
	Hommes n = 287	Femmes n = 184	Ensemble n = 471	Hommes n = 176	Femmes n = 153	Ensemble n = 329	
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>							
Existence d'un problème	11,3%	6,2%	9,4%	15,8%	16,2%	16,0%	12,1%
Plaintes ou signes cliniques	11,3%	6,2%	9,4%	15,8%	15,5%	15,7%	12,0%
Gêne dans le travail	5,7%	2,3%	4,4%	11,1%	9,7%	10,4%	6,8%
Traitements ou autres soins	2,1%	0,6%	1,5%	7,0%	8,8%	7,9%	4,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>							
Existence d'un problème	4,7%	9,7%	6,6%	8,8%	23,0%	15,4%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	9,7%	6,6%	8,8%	23,0%	15,4%	10,2%
Gêne dans le travail	2,5%	5,7%	3,8%	7,0%	14,2%	10,3%	6,5%
Traitements ou autres soins	0,4%	2,9%	1,3%	2,3%	10,2%	6,0%	3,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>							
Existence d'un problème	15,6%	14,9%	15,4%	21,2%	26,8%	23,8%	18,8%
Plaintes ou signes cliniques	15,0%	14,5%	14,8%	20,7%	25,9%	23,1%	18,2%
Gêne dans le travail	8,9%	9,2%	9,0%	14,7%	18,2%	16,4%	12,0%
Traitements ou autres soins	5,0%	4,1%	4,6%	7,7%	15,8%	11,4%	7,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	19,0%	21,4%	19,9%	26,0%	39,6%	32,4%	25,1%
Plaintes ou signes cliniques	18,4%	20,9%	19,4%	25,6%	38,8%	31,7%	24,5%
Gêne dans le travail	10,8%	12,1%	11,3%	19,5%	24,3%	21,8%	15,6%
Traitements ou autres soins	5,4%	5,9%	5,6%	10,2%	20,1%	14,8%	9,4%

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Employés n = 233	Ouvriers n = 351	Base Evrest n = 800
Répartition hommes / femmes	15,5% / 84,5%	86,9% / 13,1%	57,9% / 42,1%
≤24 ans	14,6%	14,2%	12,5%
25-34 ans	26,6%	23,9%	24,1%
35-44 ans	18,5%	21,7%	22,2%
45-54 ans	29,6%	29,6%	30,2%
55 ans et plus	10,7%	10,5%	10,9%
C. Industrie manufacturière	3,9%	30,8%	19,4%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	0,0%	0,0%	0,0%
F. Construction	3,0%	42,2%	23,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	29,2%	7,1%	14,8%
H. Transports et entreposage	0,9%	8,3%	4,0%
I. Hébergement et restauration	5,2%	0,0%	2,1%
J. Information et communication	0,4%	0,0%	0,6%
K. Activités financières et d'assurance	2,1%	0,0%	1,5%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	3,9%	0,6%	3,2%
N. Activités de services administratifs et de soutien	6,4%	4,3%	4,5%
O. Administration publique	7,7%	0,3%	3,5%
Q. Santé humaine et action sociale	28,8%	2,6%	14,5%
S. Autres activités de services	4,7%	0,3%	2,6%

Conditions de travail	Employés n = 233	Ouvriers n = 351	Base Evrest n = 800
- Changement de travail depuis 1 an :			
Non	84,9%	86,2%	87,3%
Oui, raison médicale	2,6%	0,9%	1,4%
Oui, autre raison	10,8%	11,2%	9,7%
Oui, raison non précisée	1,7%	1,7%	1,6%
Travail à temps plein	67,1%	92,2%	82,7%
Travail en journée normale	81,9%	82,5%	83,7%
Coupures de plus de 2 heures	34,6%	9,9%	18,4%
Horaires décalés	29,5%	18,4%	21,4%
Horaires irréguliers ou alternés	39,8%	20,8%	25,9%
Travail de nuit	4,7%	10,6%	7,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	2,6%	6,1%	6,7%
- Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	27,4%	19,4%	18,6%
Rarement	46,1%	52,3%	48,0%
Assez souvent	19,1%	22,3%	23,8%
Très souvent	7,4%	6,1%	9,5%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	55,0%	60,4%	54,6%
Rarement	24,5%	26,3%	27,4%
Assez souvent	14,4%	11,0%	13,5%
Très souvent	6,1%	2,3%	4,6%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	41,2%	53,5%	43,8%
Rarement	37,3%	30,6%	35,0%
Assez souvent	16,2%	12,6%	16,6%
Très souvent	5,3%	3,2%	4,6%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	7,3%	6,3%	6,3%
1	3,4%	5,4%	4,3%
2	7,3%	10,3%	8,3%
3	13,4%	10,6%	11,7%
4	12,5%	10,3%	10,3%
5	21,6%	26,0%	24,0%
6	8,6%	9,4%	9,4%
7	12,5%	10,0%	12,5%
8	6,9%	8,6%	9,2%
9	3,4%	0,9%	2,1%
10	3,0%	2,3%	2,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	34,5%	31,1%	35,3%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	45,0%	35,3%	45,7%
<i>Parmi eux :</i>			
Perturbe le travail	51,5%	53,4%	55,0%
Aspect positif du travail	48,5%	41,2%	44,7%

<b>Appréciation sur le travail</b>	<b>Employés n = 233</b>	<b>Ouvriers n = 351</b>	<b>Base Evrest n = 800</b>
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	9,0%	9,7%	6,9%
Plutôt non	10,3%	13,4%	11,4%
Plutôt oui	45,1%	40,2%	40,9%
Oui tout à fait	35,6%	36,8%	40,9%
-Travail varié			
Non pas du tout	6,0%	5,4%	4,3%
Plutôt non	15,5%	13,7%	12,0%
Plutôt oui	43,8%	40,2%	40,8%
Oui tout à fait	34,8%	40,7%	42,9%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	9,2%	11,4%	8,1%
Plutôt non	21,8%	13,4%	16,0%
Plutôt oui	38,9%	38,0%	39,1%
Oui tout à fait	30,1%	37,1%	36,8%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	7,0%	4,6%	4,4%
Plutôt non	10,9%	11,4%	12,4%
Plutôt oui	53,0%	45,4%	48,4%
Oui tout à fait	29,1%	38,6%	34,8%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	2,6%	0,9%	1,6%
Plutôt non	13,0%	8,9%	9,9%
Plutôt oui	55,2%	42,5%	49,6%
Oui tout à fait	29,1%	47,7%	38,9%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	6,2%	6,4%	5,5%
Plutôt non	22,2%	14,6%	17,1%
Plutôt oui	49,8%	44,6%	48,2%
Oui tout à fait	21,8%	34,4%	29,2%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	35,8%	39,4%	37,9%
Plutôt non	41,4%	31,1%	36,5%
Plutôt oui	19,0%	26,9%	22,8%
Oui tout à fait	3,9%	2,6%	2,8%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	60,7%	68,8%	64,2%
Plutôt non	27,1%	17,5%	22,1%
Plutôt oui	7,9%	9,5%	9,2%
Oui tout à fait	4,4%	4,3%	4,5%

Charge physique du poste de travail	Employés n = 233	Ouvriers n = 351	Base Evrest n = 800
Postures contraignantes :			
Fréquence			
Non jamais	38,4%	23,4%	39,8%
Oui parfois	35,3%	41,9%	34,9%
Oui souvent	26,3%	34,8%	25,3%
Difficultés			
Pas de postures contraignantes	38,4%	23,4%	39,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	34,9%	43,3%	33,3%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	24,6%	30,8%	24,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	2,2%	2,6%	2,1%
Effort, port de charges lourdes :			
Fréquence			
Non jamais	47,6%	27,1%	44,8%
Oui parfois	31,3%	45,0%	35,2%
Oui souvent	21,0%	28,0%	20,0%
Difficultés			
Pas d'effort, port de charges lourdes	47,6%	27,1%	44,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	29,2%	38,0%	28,4%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	21,0%	34,0%	25,0%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	2,1%	0,9%	1,8%
Gestes répétitifs :			
Fréquence			
Non jamais	29,7%	21,1%	35,3%
Oui parfois	23,7%	32,0%	26,1%
Oui souvent	46,6%	46,9%	38,6%
Difficultés			
Pas de gestes répétitifs	29,7%	21,1%	35,3%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	27,6%	31,1%	24,9%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	40,5%	46,6%	38,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,2%	1,1%	1,8%
Importants déplacements à pieds :			
Fréquence			
Non jamais	60,2%	48,3%	57,3%
Oui parfois	10,8%	25,4%	17,8%
Oui souvent	29,0%	26,3%	24,9%
Difficultés			
Pas d'importants déplacements à pieds	60,2%	48,3%	57,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	13,0%	12,9%	11,8%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	25,1%	37,4%	29,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	1,7%	1,4%	1,6%
Station debout prolongée :			
Fréquence			
Non jamais	42,2%	25,4%	41,4%
Oui parfois	15,7%	19,4%	17,0%
Oui souvent	42,2%	55,1%	41,6%
Difficultés			
Pas de station debout prolongée	42,2%	25,4%	41,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	22,6%	22,0%	18,9%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	28,3%	45,4%	34,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	7,0%	7,1%	5,7%

<b>Expositions</b>	<b>Employés n = 233</b>	<b>Ouvriers n = 351</b>	<b>Base Evrest n = 800</b>
Produits chimiques	22,7%	36,3%	25,4%
Poussières, fumées	21,5%	74,4%	43,8%
Rx ionisants	0,9%	0,9%	1,3%
Vibrations	6,4%	60,5%	30,2%
Gêne sonore	24,2%	77,9%	48,6%
Bruit > 80db	6,1%	64,1%	35,4%
Contrainte visuelle	25,9%	30,2%	31,8%
Conduite routière prolongée	6,5%	20,1%	16,2%
Chaleur intense	12,4%	16,5%	13,1%
Froid intense	9,2%	14,6%	10,6%
Intempéries	9,1%	40,9%	23,0%
Pression psychologique	32,0%	19,8%	27,9%
Agent biologique	20,5%	9,7%	12,4%
Contact avec le public	85,1%	65,2%	75,2%

<b>Formation</b>	<b>Employés n = 233</b>	<b>Ouvriers n = 351</b>	<b>Base Evrest n = 800</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an :	46,1%	35,3%	41,9%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	95,2%	90,2%	92,7%
- En rapport avec le travail futur	19,5%	14,7%	18,5%
- Formation d'intérêt général	43,3%	21,1%	32,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	20,0%	30,1%	31,1%

<b>Mode de vie</b>	<b>Employés n = 233</b>	<b>Ouvriers n = 351</b>	<b>Base Evrest n = 800</b>
Activité sportive régulière	45,5%	45,5%	50,1%
Consommation de tabac	38,6%	47,7%	41,0%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	7,5%	15,8%	11,3%
Consommation de café	73,9%	88,4%	81,6%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	11,5%	25,1%	20,6%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	13,6%	13,0%	14,5%

Etat de santé	Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n = 139	≥ 45 ans n = 94*	Ensemble n = 233	<45 ans n = 210	≥ 45 ans n = 141	Ensemble n = 351	<45 ans n = 471	≥ 45 ans n = 329	Global n = 800
<b>Indice de masse corporelle</b>									
- Normaux ou maigres	68,3%	63,3%	66,2%	51,2%	43,5%	48,1%	56,8%	50,0%	54,0%
- Surpoids	21,4%	26,7%	23,6%	32,5%	37,0%	34,3%	30,0%	33,3%	31,4%
- Obèses	10,3%	10,0%	10,2%	16,3%	19,6%	17,6%	13,2%	16,7%	14,6%
<b>Appareil respiratoire</b>									
Existence d'un problème	2,9%	1,1%	2,2%	4,9%	9,4%	6,7%	3,9%	6,5%	5,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	1,1%	2,2%	4,9%	9,4%	6,7%	3,7%	5,9%	4,6%
Gêne dans le travail	0,7%	0,0%	0,4%	1,0%	0,7%	0,9%	0,7%	0,9%	0,8%
TraITEMENT ou autre soin	2,9%	0,0%	1,8%	2,9%	5,8%	4,1%	3,0%	4,3%	3,6%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>									
Existence d'un problème	0,7%	2,2%	1,3%	0,5%	9,4%	4,1%	0,4%	5,6%	2,6%
Plaintes ou signes cliniques	0,7%	2,2%	1,3%	0,5%	8,6%	3,8%	0,4%	5,0%	2,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	0,9%	0,0%	0,9%	0,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	1,1%	0,4%	0,0%	5,0%	2,0%	0,0%	3,1%	1,3%
<b>HTA</b>									
Existence d'un problème	2,2%	8,8%	4,9%	3,9%	17,0%	9,1%	3,3%	16,9%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	5,5%	3,5%	3,4%	15,6%	8,3%	3,1%	12,9%	7,1%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,7%	0,6%	0,7%	0,3%	0,5%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	7,7%	3,5%	1,5%	12,6%	5,9%	1,3%	12,5%	5,9%
<b>Digestif</b>									
Existence d'un problème	8,2%	12,8%	10,0%	2,5%	10,4%	5,7%	6,2%	11,9%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	7,5%	12,8%	9,6%	2,5%	9,6%	5,4%	5,8%	10,6%	7,7%
Gêne dans le travail	1,5%	2,3%	1,8%	0,5%	2,2%	1,2%	1,3%	2,6%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	2,3%	5,8%	3,7%	1,5%	7,4%	3,9%	2,2%	7,1%	4,2%
<b>Dermatologie</b>									
Existence d'un problème	5,3%	3,3%	4,5%	6,3%	6,5%	6,4%	5,1%	5,3%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,3%	3,3%	4,5%	6,3%	6,5%	6,4%	5,1%	5,0%	5,0%
Gêne dans le travail	0,0%	1,1%	0,5%	1,5%	1,4%	1,5%	0,9%	0,9%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	3,3%	1,8%	2,4%	2,2%	2,3%	1,5%	2,5%	1,9%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n = 139	≥ 45 ans n = 94*	Ensemble n = 233	<45 ans n = 210	≥ 45 ans n = 141	Ensemble n = 351	<45 ans n = 471	≥ 45 ans n = 329	Global n = 800
<b>Lassitude, fatigue</b>									
Existence d'un problème	20,7%	33,0%	25,7%	20,1%	27,7%	23,2%	21,9%	31,9%	26,0%
Plaintes ou signes cliniques	20,0%	32,2%	24,9%	20,1%	27,7%	23,2%	21,1%	31,3%	25,3%
Gêne dans le travail	9,7%	15,4%	12,0%	8,4%	11,7%	9,7%	9,0%	13,8%	11,0%
TraITEMENT ou autre soin	3,0%	5,6%	4,1%	2,0%	4,4%	2,9%	2,0%	5,4%	3,4%
<b>Anxiété, nervosité</b>									
Existence d'un problème	19,4%	28,6%	23,1%	19,1%	20,6%	19,7%	19,9%	28,0%	23,2%
Plaintes ou signes cliniques	19,4%	28,6%	23,1%	19,1%	19,9%	19,4%	19,7%	26,7%	22,6%
Gêne dans le travail	10,7%	11,0%	10,8%	7,4%	7,4%	7,4%	8,1%	9,8%	8,8%
TraITEMENT ou autre soin	2,3%	8,8%	5,0%	1,0%	5,2%	2,7%	2,6%	6,4%	4,2%
<b>Troubles du sommeil</b>									
Existence d'un problème	11,9%	30,0%	19,2%	10,9%	21,5%	15,1%	11,4%	30,2%	19,1%
Plaintes ou signes cliniques	11,9%	29,2%	18,8%	10,4%	20,3%	14,4%	10,8%	28,2%	17,9%
Gêne dans le travail	5,3%	6,7%	5,9%	5,4%	6,8%	6,0%	5,5%	8,6%	6,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	7,9%	4,1%	2,0%	5,3%	3,3%	2,0%	7,4%	4,2%
<b>➤ Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)</b>									
Existence d'un problème	5,9%	15,4%	9,7%	4,4%	7,4%	5,6%	5,7%	13,5%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	15,4%	9,7%	3,9%	6,6%	5,0%	5,2%	11,6%	7,9%
Gêne dans le travail	4,5%	4,4%	4,4%	2,0%	2,2%	2,1%	2,6%	4,1%	3,2%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	4,4%	2,2%	0,0%	0,7%	0,3%	0,2%	1,9%	0,9%
<b>Troubles de l'audition</b>									
Existence d'un problème	0,8%	4,5%	2,3%	9,9%	32,4%	19,1%	5,7%	18,5%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	0,8%	4,5%	2,3%	9,9%	31,4%	18,6%	5,7%	17,7%	10,6%
Gêne dans le travail	0,8%	2,3%	1,4%	0,5%	7,2%	3,2%	0,7%	5,3%	2,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	2,2%	1,2%	0,4%	1,6%	0,9%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Employés			Ouvriers			Base Everest		
	<45 ans n = 139	≥ 45 ans n = 94*	Ensemble n = 233	<45 ans n = 210	≥ 45 ans n = 141	Ensemble n = 351	<45 ans n = 471	≥ 45 ans n = 329	Global n = 800
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>									
Existence d'un problème	5,9%	15,6%	9,8%	5,3%	13,0%	8,4%	4,8%	12,5%	7,9%
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	15,6%	9,8%	5,3%	13,0%	8,4%	4,8%	12,1%	7,8%
Gêne dans le travail	3,7%	10,2%	6,3%	3,9%	6,6%	5,0%	3,3%	6,9%	4,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	5,7%	3,2%	0,5%	5,8%	2,6%	0,9%	5,0%	2,6%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>									
Existence d'un problème	2,2%	10,0%	5,3%	3,0%	7,9%	5,0%	2,4%	8,1%	4,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	8,9%	4,9%	3,0%	7,9%	5,0%	2,4%	7,5%	4,5%
Gêne dans le travail	1,5%	7,9%	4,0%	2,5%	5,8%	3,8%	1,8%	5,3%	3,2%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	4,4%	2,2%	1,0%	3,6%	2,0%	0,7%	3,1%	1,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>									
Existence d'un problème	4,5%	13,5%	8,1%	4,9%	13,7%	8,4%	4,1%	13,1%	7,8%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	12,4%	7,6%	4,9%	13,7%	8,4%	4,1%	12,8%	7,7%
Gêne dans le travail	2,2%	8,0%	4,5%	2,9%	7,2%	4,6%	2,2%	7,5%	4,4%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	7,9%	4,0%	1,5%	3,6%	2,3%	1,3%	4,7%	2,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	9,7%	27,0%	16,6%	11,8%	30,4%	19,3%	9,9%	26,2%	16,6%
Plaintes ou signes cliniques	9,7%	27,0%	16,6%	11,8%	30,4%	19,3%	9,9%	26,0%	16,5%
Gêne dans le travail	6,7%	18,4%	11,3%	7,8%	16,8%	11,4%	6,4%	15,5%	10,1%
TraITEMENT ou autre soin	3,0%	13,8%	7,3%	3,0%	10,9%	6,2%	2,7%	10,1%	5,7%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Employés		Ouvriers			Base Everest			Global n = 800
	<45 ans n = 139	≥ 45 ans n = 94*	Ensemble n = 233	<45 ans n = 210	≥ 45 ans n = 141	Ensemble n = 351	<45 ans n = 471	≥ 45 ans n = 329	
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>									
Existence d'un problème	4,4%	18,0%	9,8%	13,7%	13,9%	13,8%	9,4%	16,0%	12,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,4%	16,9%	9,4%	13,7%	13,9%	13,8%	9,4%	15,7%	12,0%
Gêne dans le travail	1,5%	10,3%	5,0%	7,4%	11,7%	9,1%	4,4%	10,4%	6,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	9,1%	3,6%	2,5%	5,8%	3,8%	1,5%	7,9%	4,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>									
Existence d'un problème	6,8%	20,2%	12,2%	5,4%	16,1%	9,7%	6,6%	15,4%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	20,2%	12,2%	5,4%	16,1%	9,7%	6,6%	15,4%	10,2%
Gêne dans le travail	3,8%	14,6%	8,1%	3,4%	9,5%	5,9%	3,8%	10,3%	6,5%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	10,2%	4,5%	0,0%	4,4%	1,8%	1,3%	6,0%	3,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolumbares</b>									
Existence d'un problème	14,3%	25,8%	18,9%	19,9%	28,5%	23,3%	15,4%	23,8%	18,8%
Plaintes ou signes cliniques	13,6%	25,0%	18,2%	19,1%	28,5%	22,9%	14,8%	23,1%	18,2%
Gêne dans le travail	6,8%	19,1%	11,7%	12,1%	21,2%	15,7%	9,0%	16,4%	12,0%
TraITEMENT ou autre soin	3,8%	13,8%	7,8%	5,3%	14,6%	9,0%	4,6%	11,4%	7,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	18,9%	37,1%	26,2%	23,4%	37,5%	29,0%	19,9%	32,4%	25,1%
Plaintes ou signes cliniques	18,3%	36,4%	25,6%	22,7%	37,5%	28,6%	19,4%	31,7%	24,5%
Gêne dans le travail	9,2%	24,7%	15,5%	14,7%	27,2%	19,7%	11,3%	21,8%	15,6%
TraITEMENT ou autre soin	4,6%	17,6%	9,8%	5,4%	18,5%	10,7%	5,6%	14,8%	9,4%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	F- Construction n = 191	Base Everest n = 800
Répartition hommes / femmes	92,7% / 7,3%	57,9% / 42,1%
≤24 ans	18,8%	12,5%
25-34 ans	30,9%	24,1%
35-44 ans	20,4%	22,2%
45-54 ans	20,9%	30,2%
55 ans et plus	8,9%	10,9%
Cadres	4,7%	6,9%
Intermédiaires	13,6%	20,0%
Employés	3,7%	29,1%
Ouvriers	77,5%	43,9%

<b>Conditions de travail</b>	<b>F- Construction n = 191</b>	<b>Base Everest n = 800</b>
- Changement de travail depuis 1 an :		
Non	85,3%	87,3%
Oui, raison médicale	1,1%	1,4%
Oui, autre raison	10,0%	9,7%
Oui, raison non précisée	3,7%	1,6%
Travail à temps plein	97,4%	82,7%
Travail en journée normale	97,3%	83,7%
Coupures de plus de 2 heures	8,4%	18,4%
Horaires décalés	6,3%	21,4%
Horaires irréguliers ou alternés	7,7%	25,9%
Travail de nuit	0,5%	7,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	4,8%	6,7%
- Dépasser ses horaires normaux		
Jamais	10,1%	18,6%
Rarement	51,6%	48,0%
Assez souvent	28,2%	23,8%
Très souvent	10,1%	9,5%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause		
Jamais	58,7%	54,6%
Rarement	30,2%	27,4%
Assez souvent	9,5%	13,5%
Très souvent	1,6%	4,6%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin		
Jamais	52,2%	43,8%
Rarement	33,3%	35,0%
Assez souvent	12,4%	16,6%
Très souvent	2,2%	4,6%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)		
0	7,9%	6,3%
1	6,8%	4,3%
2	8,9%	8,3%
3	10,5%	11,7%
4	10,5%	10,3%
5	25,7%	24,0%
6	7,3%	9,4%
7	9,4%	12,5%
8	10,5%	9,2%
9	1,0%	2,1%
10	1,6%	2,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	29,8%	35,3%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	35,3%	45,7%
Parmi eux :		
Perturbe le travail	40,3%	55,0%
Aspect positif du travail	50,0%	44,7%

<b>Appréciation sur le travail</b>	<b>F- Construction n = 191</b>	<b>Base Everest n = 800</b>
-Travail permet d'apprendre		
Non pas du tout	2,6%	6,9%
Plutôt non	8,4%	11,4%
Plutôt oui	37,7%	40,9%
Oui tout à fait	51,3%	40,9%
-Travail varié		
Non pas du tout	1,1%	4,3%
Plutôt non	6,3%	12,0%
Plutôt oui	38,4%	40,8%
Oui tout à fait	54,2%	42,9%
-Choix dans la façon de procéder		
Non pas du tout	4,2%	8,1%
Plutôt non	9,9%	16,0%
Plutôt oui	41,4%	39,1%
Oui tout à fait	44,5%	36,8%
-Possibilités suffisantes d'entraide		
Non pas du tout	0,0%	4,4%
Plutôt non	7,3%	12,4%
Plutôt oui	47,1%	48,4%
Oui tout à fait	45,5%	34,8%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité		
Non pas du tout	0,0%	1,6%
Plutôt non	2,6%	9,9%
Plutôt oui	41,3%	49,6%
Oui tout à fait	56,1%	38,9%
-Travail reconnu		
Non pas du tout	3,8%	5,5%
Plutôt non	10,2%	17,1%
Plutôt oui	42,5%	48,2%
Oui tout à fait	43,5%	29,2%
-Faire des choses que l'on désapprouve		
Non pas du tout	35,6%	37,9%
Plutôt non	36,1%	36,5%
Plutôt oui	25,7%	22,8%
Oui tout à fait	2,6%	2,8%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi		
Non pas du tout	68,1%	64,2%
Plutôt non	18,8%	22,1%
Plutôt oui	9,9%	9,2%
Oui tout à fait	3,1%	4,5%

Charge physique du poste de travail	F- Construction n = 191	Base Everest n = 800
Postures contraignantes :		
Fréquence		
Non jamais	29,8%	39,8%
Oui parfois	39,8%	34,9%
Oui souvent	30,4%	25,3%
Difficultés		
Pas de postures contraignantes	29,8%	39,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	43,5%	33,3%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	25,7%	24,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	1,0%	2,1%
Effort, port de charges lourdes :		
Fréquence		
Non jamais	28,9%	44,8%
Oui parfois	40,5%	35,2%
Oui souvent	30,5%	20,0%
Difficultés		
Pas d'effort, port de charges lourdes	28,9%	44,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	42,1%	28,4%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	27,9%	25,0%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	1,1%	1,8%
Gestes répétitifs :		
Fréquence		
Non jamais	29,8%	35,3%
Oui parfois	33,0%	26,1%
Oui souvent	37,2%	38,6%
Difficultés		
Pas de gestes répétitifs	29,8%	35,3%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	29,8%	24,9%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	39,8%	38,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	0,5%	1,8%
Importants déplacements à pieds :		
Fréquence		
Non jamais	58,9%	57,3%
Oui parfois	22,1%	17,8%
Oui souvent	18,9%	24,9%
Difficultés		
Pas d'importants déplacements à pieds	58,9%	57,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	12,6%	11,8%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	28,4%	29,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	0,0%	1,6%
Station debout prolongée :		
Fréquence		
Non jamais	34,7%	41,4%
Oui parfois	15,8%	17,0%
Oui souvent	49,5%	41,6%
Difficultés		
Pas de station debout prolongée	34,7%	41,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	18,4%	18,9%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	42,6%	34,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	4,2%	5,7%

<b>Expositions</b>	<b>F- Construction n = 191</b>	<b>Base Everest n = 800</b>
Produits chimiques	33,2%	25,4%
Poussières, fumées	74,3%	43,8%
Rx ionisants	0,5%	1,3%
Vibrations	68,4%	30,2%
Gêne sonore	72,8%	48,6%
Bruit > 80db	66,3%	35,4%
Contrainte visuelle	26,2%	31,8%
Conduite routière prolongée	23,8%	16,2%
Chaleur intense	13,6%	13,1%
Froid intense	12,6%	10,6%
Intempéries	52,9%	23,0%
Pression psychologique	18,8%	27,9%
Agent biologique	5,8%	12,4%
Contact avec le public	85,8%	75,2%

<b>Formation</b>	<b>F- Construction n = 191</b>	<b>Base Everest n = 800</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an :	39,3%	41,9%
Parmi eux :		
En rapport avec le travail actuel	93,2%	92,7%
En rapport avec le travail futur	20,0%	18,5%
Formation d'intérêt général	15,9%	32,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	33,5%	31,1%

<b>Mode de vie</b>	<b>F- Construction n = 191</b>	<b>Base Everest n = 800</b>
Activité sportive régulière	47,6%	50,1%
Consommation de tabac	51,1%	41,0%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	15,3%	11,3%
Consommation de café	87,9%	81,6%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	24,2%	20,6%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	13,1%	14,5%

Etat de santé	F- Construction			Base Everest		
	<45 ans n = 134	≥ 45 ans n = 57*	Ensemble n = 191	<45 ans n = 471	≥ 45 ans n = 329	Ensemble n = 800
<b>Indice de masse corporelle</b>						
- Normaux ou maigres	50,8%	33,3%	45,5%	56,8%	50,0%	54,0%
- Surpoids	36,2%	42,1%	38,0%	30,0%	33,3%	31,4%
- Obèses	13,1%	24,6%	16,6%	13,2%	16,7%	14,6%
<b>Appareil respiratoire</b>						
Existence d'un problème	3,0%	12,3%	5,8%	3,9%	6,5%	5,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	12,3%	5,8%	3,7%	5,9%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,9%	0,8%
TraITEMENT ou autre soin	3,0%	5,3%	3,7%	3,0%	4,3%	3,6%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>						
Existence d'un problème	0,0%	8,8%	2,7%	0,4%	5,6%	2,6%
Plaintes ou signes cliniques	0,0%	7,0%	2,1%	0,4%	5,0%	2,3%
Gêne dans le travail	0,0%	1,8%	0,5%	0,0%	0,9%	0,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	5,3%	1,6%	0,0%	3,1%	1,3%
<b>HTA</b>						
Existence d'un problème	4,6%	21,8%	9,7%	3,3%	16,9%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	4,6%	18,5%	8,7%	3,1%	12,9%	7,1%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	0,5%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	12,7%	4,9%	1,3%	12,5%	5,9%
<b>Digestif</b>						
Existence d'un problème	2,3%	7,1%	3,8%	6,2%	11,9%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	7,1%	3,2%	5,8%	10,6%	7,7%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	2,6%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	3,6%	2,2%	2,2%	7,1%	4,2%
<b>Dermatologie</b>						
Existence d'un problème	6,9%	7,0%	6,9%	5,1%	5,3%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	7,0%	6,9%	5,1%	5,0%	5,0%
Gêne dans le travail	1,5%	1,8%	1,6%	0,9%	0,9%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	1,8%	1,6%	1,5%	2,5%	1,9%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	F- Construction			Base Everest		
	<45 ans n = 134	≥ 45 ans n = 57*	Ensemble n = 191	<45 ans n = 471	≥ 45 ans n = 329	Ensemble n = 800
<b>Lassitude, fatigue</b>						
Existence d'un problème	16,8%	28,6%	20,3%	21,9%	31,9%	26,0%
Plaintes ou signes cliniques	16,8%	28,6%	20,3%	21,1%	31,3%	25,3%
Gêne dans le travail	3,1%	8,9%	4,8%	9,0%	13,8%	11,0%
Traitements ou autres soins	0,8%	0,0%	0,5%	2,0%	5,4%	3,4%
<b>Anxiété, nervosité</b>						
Existence d'un problème	22,1%	26,8%	23,5%	19,9%	28,0%	23,2%
Plaintes ou signes cliniques	22,1%	26,8%	23,5%	19,7%	26,7%	22,6%
Gêne dans le travail	6,9%	7,1%	7,0%	8,1%	9,8%	8,8%
Traitements ou autres soins	1,5%	1,8%	1,6%	2,6%	6,4%	4,2%
<b>Troubles du sommeil</b>						
Existence d'un problème	9,2%	14,3%	10,8%	11,4%	30,2%	19,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,5%	12,7%	9,8%	10,8%	28,2%	17,9%
Gêne dans le travail	3,1%	7,1%	4,3%	5,5%	8,6%	6,8%
Traitements ou autres soins	1,5%	5,4%	2,7%	2,0%	7,4%	4,2%
<b>➤ Troubles neuro psychiques</b>						
(les 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	6,1%	7,1%	6,4%	5,7%	13,5%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	7,1%	5,9%	5,2%	11,6%	7,9%
Gêne dans le travail	1,5%	1,8%	1,6%	2,6%	4,1%	3,2%
Traitements ou autres soins	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	1,9%	0,9%
<b>Troubles de l'audition</b>						
Existence d'un problème	11,6%	45,6%	22,0%	5,7%	18,5%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	11,6%	44,6%	21,6%	5,7%	17,7%	10,6%
Gêne dans le travail	0,0%	7,0%	2,2%	0,7%	5,3%	2,6%
Traitements ou autres soins	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,6%	0,9%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	F- Construction			Base Everest		
	<45 ans n = 134	≥ 45 ans n = 57*	Ensemble n = 191	<45 ans n = 471	≥ 45 ans n = 329	Ensemble n = 800
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>						
Existence d'un problème						
Plaintes ou signes cliniques	5,3%	12,3%	7,4%	4,8%	12,5%	7,9%
Gêne dans le travail	3,1%	8,8%	4,8%	3,3%	6,9%	4,8%
Traitements ou autre soin	0,8%	7,0%	2,7%	0,9%	5,0%	2,6%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>						
Existence d'un problème						
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	8,8%	3,7%	2,4%	8,1%	4,8%
Gêne dans le travail	0,8%	7,0%	2,7%	1,8%	5,3%	3,2%
Traitements ou autre soin	0,0%	3,5%	1,1%	0,7%	3,1%	1,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>						
Existence d'un problème						
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	10,5%	4,8%	4,1%	13,1%	7,8%
Gêne dans le travail	1,5%	5,3%	2,7%	2,2%	7,5%	4,4%
Traitements ou autre soin	0,8%	3,5%	1,6%	1,3%	4,7%	2,7%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b>						
<i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème						
Plaintes ou signes cliniques	8,5%	26,3%	13,9%	9,9%	26,2%	16,6%
Gêne dans le travail	4,6%	19,3%	9,1%	6,4%	15,5%	10,1%
Traitements ou autre soin	1,5%	14,0%	5,3%	2,7%	10,1%	5,7%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	F- Construction			Base Everest		
	<45 ans n = 134	≥ 45 ans n = 57*	Ensemble n = 191	<45 ans n = 471	≥ 45 ans n = 329	Ensemble n = 800
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>						
Existence d'un problème	9,9%	16,4%	11,8%	9,4%	16,0%	12,1%
plaintes ou signes cliniques	9,9%	16,4%	11,8%	9,4%	15,7%	12,0%
Gêne dans le travail	6,9%	14,5%	9,1%	4,4%	10,4%	6,8%
Traitements ou autre soin	1,5%	3,6%	2,2%	1,5%	7,9%	4,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>						
Existence d'un problème	4,7%	17,9%	8,6%	6,6%	15,4%	10,2%
plaintes ou signes cliniques	4,7%	17,9%	8,6%	6,6%	15,4%	10,2%
Gêne dans le travail	3,1%	12,5%	5,9%	3,8%	10,3%	6,5%
Traitements ou autre soin	0,8%	5,5%	2,2%	1,3%	6,0%	3,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>						
Existence d'un problème	14,4%	30,4%	19,1%	15,4%	23,8%	18,8%
plaintes ou signes cliniques	13,1%	30,4%	18,3%	14,8%	23,1%	18,2%
Gêne dans le travail	6,8%	26,8%	12,8%	9,0%	16,4%	12,0%
Traitements ou autre soin	2,3%	10,7%	4,8%	4,6%	11,4%	7,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème	17,6%	41,1%	24,6%	19,9%	32,4%	25,1%
plaintes ou signes cliniques	16,3%	41,1%	23,8%	19,4%	31,7%	24,5%
Gêne dans le travail	10,1%	33,9%	17,3%	11,3%	21,8%	15,6%
Traitements ou autre soin	3,1%	16,7%	7,1%	5,6%	14,8%	9,4%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence