



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2012-2013

### Région Lorraine

Septembre 2014



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2012-2013 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

## Descriptif de l'échantillon Lorraine

L'exploitation des données de la région Lorraine a porté sur **2 089 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2012 (n=932) et 2013 (n=1157).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Evrest semble être plus proche du champ des salariés du privé (Acoss) que de celui des salariés des secteurs publics et privés (données INSEE) (tableau 1). Les hommes sont sur-représentés dans cet échantillon, ainsi que les professions intermédiaires et l'industrie ; les employés sont sous-représentés, ainsi que le secteur de la construction.

Tableau 1 : Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Lorraine 2012-2013 aux données Insee (DADS 2010) et Acoss (2012).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Lorraine 2012-2013 (n=2089)	Données INSEE 2010 (DADS)	Données ACOSS 2012 %
	%	%	%
<b>Sexe</b>			
Hommes	56,1	51,7	-
Femmes	43,9	48,3	-
<b>Age</b>			
≤ 24 ans	7,9	14,1	-
25-34 ans	26,4	23,7	-
35-44 ans	25,5	24,0	-
45- 54 ans	28,1	25,6	-
55 ans et plus	12,1	12,7	-
<b>Catégorie socioprofessionnelle</b>			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,5	0,7	-
Cadres et prof. intellectuelles supérieures	11,0	11,1	-
Professions intermédiaires	28,6	20,5	-
Employés	29,8	38,4	-
Ouvriers	30,0	29,2	-
<b>Secteur d'activité</b>			
Agriculture	0,0	0,0	0,0
Industrie	26,1	16,5	23,2
Construction	2,8	6,5	8,5
Commerce	16,7	12,7	17,2
Services	54,4	64,3	51,1

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Lorraine 2012-2013 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
<b>Artisans, commerçants et chefs d'entreprises</b>	<b>11</b>	<b>0,5</b>
<b>Cadres et professions intellectuelles supérieures</b>	<b>230</b>	<b>11,0</b>
<b>Professions intermédiaires</b>	<b>598</b>	<b>28,6</b>
<b>Employés</b>	<b>623</b>	<b>29,8</b>
<b>Ouvriers</b>	<b>627</b>	<b>30,0</b>
<b>Total général</b>	<b>2 089</b>	<b>100,0</b>

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 3 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Commerce - réparations d'automobile et de motocycles, Santé humaine et action sociale (tableau 3).

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Lorraine 2012-2013 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
<b>AGRICULTURE</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
<b>INDUSTRIE</b>	<b>546</b>	<b>26,1</b>
B. Industries extractives	5	0,2
<b>C. Industrie manufacturière</b>	<b>382</b>	<b>18,3</b>
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	132	6,3
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	27	1,3
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>58</b>	<b>2,8</b>
F. Construction	58	2,8
<b>COMMERCE</b>	<b>348</b>	<b>16,7</b>
<b>G. Commerce; réparations automobile et de motocycles</b>	<b>348</b>	<b>16,7</b>
<b>SERVICES</b>	<b>1 137</b>	<b>54,4</b>
H. Transports et entreposage	149	7,1
I. Hébergement et restauration	73	3,5
J. Information et communication	49	2,3
K. Activités financières et d'assurance	62	3,0
L. Activités immobilières	19	0,9
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	129	6,2
N. Activités de services administratifs et de soutien	117	5,6
O. Administration publique	105	5,0
P. Enseignement	31	1,5
<b>Q. Santé humaine et action sociale</b>	<b>319</b>	<b>15,3</b>
R. Arts, spectacles et activités récréatives	24	1,1
S. Autres activités de services	58	2,8
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	2	0,1
<b>Total général</b>	<b>2 089</b>	<b>100,0</b>

**Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe**

Description de la population	Hommes n =1172	Femmes n =917	Ensemble n =2089
≤24 ans	7,7%	8,3%	7,9%
25-34 ans	24,9%	28,4%	26,4%
35-44 ans	27,6%	22,7%	25,5%
45-54 ans	28,2%	27,9%	28,1%
55 ans et plus	11,5%	12,8%	12,1%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,9%	0,1%	0,5%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	13,6%	7,7%	11,0%
Professions intermédiaires	29,3%	27,8%	28,6%
Employés	11,9%	52,7%	29,8%
Ouvriers	44,4%	11,7%	30,0%
C. Industrie manufacturière	27,4%	6,7%	18,3%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	8,9%	3,1%	6,3%
F. Construction	4,1%	1,1%	2,8%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	15,3%	18,4%	16,7%
H. Transports et entreposage	10,7%	2,6%	7,1%
I. Hébergement et restauration	2,4%	4,9%	3,5%
J. Information et communication	3,0%	1,5%	2,3%
K. Activités financières et d'assurance	2,0%	4,3%	3,0%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	6,0%	6,4%	6,2%
N. Activités de services administratifs et de soutien	4,9%	6,5%	5,6%
O. Administration publique	3,8%	6,7%	5,0%
Q. Santé humaine et action sociale	5,5%	27,7%	15,3%
S. Autres activités de services	0,9%	5,1%	2,8%

Conditions de travail	Hommes n =1172	Femmes n =917	Ensemble n =2089
<b>- Changement de travail depuis 1 an :</b>			
Non	89,1%	91,0%	89,9%
Oui, raison médicale	0,4%	0,5%	0,5%
Oui, autre raison	10,2%	7,3%	8,9%
Oui, raison non précisée	0,3%	1,2%	0,7%
Travail à temps plein	91,8%	67,8%	81,3%
Travail en journée normale	75,2%	76,8%	75,9%
Coupures de plus de 2 heures	14,6%	19,8%	16,9%
Horaires décalés	34,0%	26,1%	30,6%
Horaires irréguliers ou alternés	31,9%	28,9%	30,6%
Travail de nuit	21,9%	8,4%	16,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	11,2%	2,7%	7,5%
<b>- Dépasser ses horaires normaux</b>			
Jamais	14,8%	19,1%	16,7%
Rarement	44,8%	47,1%	45,8%
Assez souvent	27,4%	25,3%	26,5%
Très souvent	13,0%	8,5%	11,0%
<b>- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause</b>			
Jamais	32,7%	41,1%	36,4%
Rarement	41,1%	36,2%	38,9%
Assez souvent	18,7%	14,6%	16,9%
Très souvent	7,6%	8,2%	7,8%
<b>- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin</b>			
Jamais	28,1%	36,3%	31,7%
Rarement	44,8%	38,7%	42,1%
Assez souvent	21,2%	19,1%	20,3%
Très souvent	6,0%	5,9%	6,0%
<b>- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)</b>			
0	4,0%	4,6%	4,2%
1	4,1%	5,8%	4,9%
2	8,5%	8,8%	8,6%
3	12,6%	12,1%	12,4%
4	9,6%	10,9%	10,2%
5	21,6%	17,6%	19,8%
6	11,0%	13,0%	11,9%
7	13,5%	13,5%	13,5%
8	10,8%	9,9%	10,4%
9	2,8%	2,6%	2,7%
10	1,5%	1,3%	1,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	39,6%	40,3%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	51,6%	51,7%	51,6%
Parmi eux :			
- Perturbe le travail	62,5%	60,7%	61,7%
- Aspect positif du travail	37,0%	41,0%	38,7%

Appréciation sur le travail	Hommes n =1172	Femmes n =917	Ensemble n =2089
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	6,2%	8,5%	7,2%
Plutôt non	14,2%	11,5%	13,0%
Plutôt oui	48,2%	43,7%	46,2%
Oui tout à fait	31,4%	36,3%	33,6%
-Travail varié			
Non pas du tout	5,3%	6,4%	5,8%
Plutôt non	12,7%	13,8%	13,2%
Plutôt oui	47,0%	44,2%	45,8%
Oui tout à fait	34,9%	35,6%	35,2%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	5,6%	8,5%	6,9%
Plutôt non	15,6%	19,3%	17,2%
Plutôt oui	51,3%	43,0%	47,6%
Oui tout à fait	27,5%	29,2%	28,3%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	4,2%	4,9%	4,5%
Plutôt non	12,0%	14,0%	12,9%
Plutôt oui	59,0%	55,7%	57,6%
Oui tout à fait	24,7%	25,5%	25,0%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,3%	1,7%	1,5%
Plutôt non	11,6%	12,7%	12,1%
Plutôt oui	62,6%	58,6%	60,8%
Oui tout à fait	24,4%	27,1%	25,6%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	5,3%	5,6%	5,4%
Plutôt non	17,5%	19,6%	18,4%
Plutôt oui	58,9%	51,8%	55,8%
Oui tout à fait	18,2%	23,1%	20,4%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	23,0%	31,4%	26,7%
Plutôt non	53,8%	51,0%	52,6%
Plutôt oui	20,7%	14,8%	18,1%
Oui tout à fait	2,5%	2,8%	2,6%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	50,9%	55,9%	53,1%
Plutôt non	33,7%	29,8%	32,0%
Plutôt oui	12,0%	11,3%	11,7%
Oui tout à fait	3,4%	3,0%	3,2%

Charge physique du poste de travail	Hommes n =1172	Femmes n =917	Ensemble n =2089
Postures contraignantes :			
Fréquence			
Non jamais	38,8%	43,3%	40,8%
Oui parfois	42,3%	35,7%	39,4%
Oui souvent	18,8%	21,0%	19,8%
Difficultés			
Pas de postures contraignantes	38,8%	43,3%	40,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	26,9%	30,3%	28,4%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	31,2%	22,5%	27,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	3,1%	3,8%	3,4%
Effort, port de charges lourdes :			
Fréquence			
Non jamais	42,8%	49,4%	45,7%
Oui parfois	39,2%	32,1%	36,1%
Oui souvent	17,9%	18,5%	18,2%
Difficultés			
Pas d'effort, port de charges lourdes	42,8%	49,4%	45,7%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	24,8%	26,9%	25,7%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	30,2%	20,1%	25,7%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	2,2%	3,6%	2,8%
Gestes répétitifs :			
Fréquence			
Non jamais	41,2%	31,8%	37,1%
Oui parfois	28,2%	26,7%	27,5%
Oui souvent	30,7%	41,5%	35,4%
Difficultés			
Pas de gestes répétitifs	41,2%	31,8%	37,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	19,3%	22,7%	20,8%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	36,7%	40,6%	38,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,8%	5,0%	3,8%
Importants déplacements à pieds :			
Fréquence			
Non jamais	48,7%	62,7%	54,9%
Oui parfois	25,1%	16,2%	21,2%
Oui souvent	26,2%	21,1%	24,0%
Difficultés			
Pas d'importants déplacements à pieds	48,7%	62,7%	54,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	12,5%	9,8%	11,3%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	35,7%	25,4%	31,2%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	3,1%	2,1%	2,6%
Station debout prolongée :			
Fréquence			
Non jamais	40,5%	43,1%	41,7%
Oui parfois	27,5%	18,0%	23,3%
Oui souvent	32,0%	38,9%	35,0%
Difficultés			
Pas de station debout prolongée	40,5%	43,1%	41,7%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	17,0%	21,4%	18,9%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	37,2%	30,2%	34,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	5,2%	5,3%	5,3%

Expositions	Hommes n =1172	Femmes n =917	Ensemble n =2089
Produits chimiques	28,5%	22,7%	25,9%
Poussières, fumées	44,5%	20,6%	34,0%
Rx ionisants	6,3%	2,5%	4,7%
Vibrations	31,4%	4,1%	19,4%
Gêne sonore	48,9%	24,8%	38,4%
Bruit > 80db	39,3%	8,9%	26,0%
Contrainte visuelle	29,9%	25,5%	28,0%
Conduite routière prolongée	20,9%	6,0%	14,4%
Chaleur intense	20,2%	11,1%	16,2%
Froid intense	18,3%	5,8%	12,8%
Intempéries	25,8%	4,9%	16,6%
Pression psychologique	26,0%	21,8%	24,2%
Agent biologique	6,9%	13,4%	9,8%
Contact avec le public	58,3%	72,9%	64,7%

Formation	Hommes n =1172	Femmes n =917	Ensemble n =2089
A bénéficié d'une formation depuis un an :	54,2%	41,8%	48,7%
Parmi eux :			
- En rapport avec le travail actuel	91,2%	93,7%	92,1%
- En rapport avec le travail futur	12,5%	12,8%	12,6%
- Formation d'intérêt général	48,3%	37,2%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	30,0%	23,5%	27,2%

Mode de vie	Hommes n =1172	Femmes n =917	Ensemble n =2089
Activité sportive régulière	54,6%	48,4%	51,9%
Consommation de tabac	39,3%	33,4%	36,7%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	10,7%	4,4%	8,0%
Consommation de café	82,5%	68,8%	76,5%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	20,6%	12,4%	17,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	18,6%	14,6%	16,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n =2089
	Hommes n =706	Femmes n =544	Ensemble n =1250	Hommes n =466	Femmes n =373	Ensemble n=839	
<b>Indice de masse corporelle</b>							
- Normaux ou maigres	52,0%	67,2%	58,6%	36,4%	56,9%	45,5%	53,4%
- Surpoids	35,2%	20,9%	28,9%	43,4%	27,6%	36,4%	31,9%
- Obeses	12,8%	12,0%	12,4%	20,2%	15,5%	18,1%	14,7%
<b>Appareil respiratoire</b>							
Existence d'un problème	2,6%	2,8%	2,7%	4,8%	4,9%	4,9%	3,5%
Plaîntes ou signes cliniques	2,2%	2,4%	2,3%	4,1%	4,7%	4,4%	3,1%
Gêne dans le travail	0,3%	0,4%	0,3%	1,1%	1,4%	1,2%	0,7%
Traitemennt ou autre soin	1,7%	2,1%	1,9%	2,2%	4,1%	3,0%	2,3%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>							
Existence d'un problème	1,6%	3,2%	2,3%	7,0%	6,4%	6,7%	4,1%
Plaîntes ou signes cliniques	1,3%	2,8%	2,0%	5,0%	5,0%	5,0%	3,2%
Gêne dans le travail	0,6%	1,5%	1,0%	1,3%	1,4%	1,3%	1,1%
Traitemennt ou autre soin	1,2%	1,1%	1,1%	6,1%	5,0%	5,6%	2,9%
<b>HTA</b>							
Existence d'un problème	3,2%	1,5%	2,5%	18,9%	17,5%	18,3%	8,8%
Plaîntes ou signes cliniques	2,6%	1,3%	2,1%	14,8%	9,2%	12,3%	6,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,2%	0,1%	0,4%	0,3%	0,4%	0,2%
Traitemennt ou autre soin	2,0%	0,9%	1,6%	15,3%	15,6%	15,5%	7,1%
<b>Lassitude, fatigue</b>							
Existence d'un problème	19,3%	29,9%	23,9%	20,7%	33,0%	26,2%	24,8%
Plaîntes ou signes cliniques	18,9%	29,9%	23,7%	20,4%	32,8%	25,9%	24,6%
Gêne dans le travail	8,7%	13,5%	10,8%	7,0%	17,7%	11,8%	11,2%
Traitemennt ou autre soin	1,3%	2,5%	1,8%	1,3%	5,0%	3,0%	2,3%
<b>Anxiété, nervosité</b>							
Existence d'un problème	17,2%	23,0%	19,7%	18,1%	27,3%	22,2%	20,7%
Plaîntes ou signes cliniques	16,6%	23,0%	19,4%	17,9%	27,1%	22,0%	20,4%
Gêne dans le travail	8,2%	10,5%	9,2%	8,8%	12,8%	10,6%	9,8%
Traitemennt ou autre soin	2,5%	3,4%	2,9%	2,9%	5,0%	3,8%	3,3%
<b>Troubles du sommeil</b>							
Existence d'un problème	14,2%	18,5%	16,1%	19,5%	26,7%	22,6%	18,7%
Plaîntes ou signes cliniques	13,8%	18,4%	15,8%	19,3%	26,7%	22,5%	18,5%
Gêne dans le travail	6,2%	9,0%	7,4%	7,3%	10,6%	8,8%	8,0%
Traitemennt ou autre soin	1,6%	4,0%	2,6%	3,5%	7,4%	5,2%	3,7%
<b>➤ Troubles neuro psychiques</b>							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	6,1%	9,6%	7,6%	8,1%	15,8%	11,5%	9,1%
Plaîntes ou signes cliniques	5,2%	9,4%	7,0%	7,6%	15,8%	11,2%	8,7%
Gêne dans le travail	2,9%	3,5%	3,2%	2,4%	5,5%	3,8%	3,4%
Traitemennt ou autre soin	0,3%	0,9%	0,6%	0,7%	1,9%	1,2%	0,8%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n = 2089
	Hommes n = 706	Femmes n = 544	Ensemble n = 1250	Hommes n = 466	Femmes n = 373	Ensemble n = 839	
<b>Digestif</b>							
Existence d'un problème	5,7%	10,6%	7,8%	11,6%	9,9%	10,9%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	10,2%	7,6%	11,2%	9,6%	10,5%	8,8%
Gêne dans le travail	1,8%	2,1%	1,9%	2,0%	2,2%	2,1%	2,0%
TraITEMENT ou autre soin	2,8%	3,2%	3,0%	6,8%	5,8%	6,4%	4,3%
<b>Dermatologie</b>							
Existence d'un problème	3,8%	5,6%	4,6%	4,2%	6,1%	5,0%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	5,2%	4,2%	3,9%	5,8%	4,8%	4,4%
Gêne dans le travail	0,3%	0,9%	0,6%	0,7%	1,9%	1,2%	0,8%
TraITEMENT ou autre soin	2,0%	2,4%	2,2%	2,2%	4,7%	3,3%	2,6%
<b>Troubles de l'audition</b>							
Existence d'un problème	3,3%	3,0%	3,2%	16,0%	6,7%	11,9%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	3,0%	3,2%	15,4%	6,4%	11,4%	6,5%
Gêne dans le travail	0,4%	1,5%	0,9%	4,0%	3,9%	3,9%	2,1%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	0,2%	0,5%	1,1%	0,8%	1,0%	0,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>							
Existence d'un problème	6,9%	7,1%	7,0%	13,9%	18,4%	15,9%	10,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	7,1%	7,0%	13,9%	18,4%	15,9%	10,5%
Gêne dans le travail	3,3%	5,2%	4,1%	8,9%	10,7%	9,7%	6,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,3%	2,8%	2,5%	5,7%	8,5%	7,0%	4,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>							
Existence d'un problème	3,3%	2,1%	2,8%	7,0%	9,9%	8,3%	5,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	2,1%	2,6%	7,0%	9,4%	8,0%	4,8%
Gêne dans le travail	1,7%	1,1%	1,5%	3,1%	6,1%	4,4%	2,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,6%	0,4%	0,5%	3,1%	4,4%	3,7%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>							
Existence d'un problème	3,5%	8,2%	5,5%	10,3%	19,0%	14,1%	9,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	8,0%	5,4%	9,8%	18,5%	13,6%	8,7%
Gêne dans le travail	1,4%	5,8%	3,3%	4,4%	13,6%	8,4%	5,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,4%	2,2%	1,2%	3,3%	7,8%	5,3%	2,8%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b> <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	11,6%	15,1%	13,1%	22,1%	31,9%	26,5%	18,5%
Plaintes ou signes cliniques	11,3%	15,1%	13,0%	21,7%	31,9%	26,2%	18,3%
Gêne dans le travail	5,8%	10,5%	7,8%	11,7%	22,2%	16,3%	11,2%
TraITEMENT ou autre soin	3,3%	4,3%	3,8%	8,8%	14,8%	11,5%	6,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n = 2089
	Hommes n = 706	Femmes n = 544	Ensemble n = 1250	Hommes n = 466	Femmes n = 373	Ensemble n=839	
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>							
Existence d'un problème	7,8%	7,4%	7,6%	12,6%	15,9%	14,1%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	7,3%	7,1%	12,6%	15,9%	14,1%	9,9%
Gêne dans le travail	3,3%	4,3%	3,7%	7,6%	9,6%	8,5%	5,7%
Traitements ou autre soin	2,6%	3,4%	2,9%	6,1%	7,0%	6,5%	4,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>							
Existence d'un problème	7,6%	16,8%	11,6%	13,3%	21,7%	17,0%	13,8%
Plaintes ou signes cliniques	7,2%	16,4%	11,2%	12,9%	21,7%	16,8%	13,5%
Gêne dans le travail	3,3%	11,6%	6,9%	8,7%	11,9%	10,1%	8,2%
Traitements ou autre soin	2,7%	6,8%	4,5%	4,4%	10,3%	7,0%	5,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>							
Existence d'un problème	16,6%	19,2%	17,7%	22,8%	21,9%	22,4%	19,6%
Plaintes ou signes cliniques	15,8%	18,7%	17,1%	22,0%	21,6%	21,9%	19,0%
Gêne dans le travail	9,9%	12,3%	10,9%	11,2%	14,6%	12,7%	11,6%
Traitements ou autre soin	5,7%	6,4%	6,0%	8,7%	10,3%	9,4%	7,4%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b> <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	20,8%	27,4%	23,7%	28,9%	30,2%	29,5%	26,0%
Plaintes ou signes cliniques	20,0%	26,9%	23,0%	28,1%	30,2%	29,1%	25,4%
Gêne dans le travail	12,0%	19,0%	15,1%	16,0%	18,5%	17,1%	15,9%
Traitements ou autre soin	7,5%	10,1%	8,6%	11,2%	15,1%	13,0%	10,3%

**Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles**

Description de la population	Cadres n=230	Intermédiaires n=598	Employés n=623	Ouvriers n=627	Base Everest n=2089
Répartition hommes / femmes	69,1%/30,9%	57,4% / 42,6%	22,5%/77,5%	82,9%/17,1%	56,1%/43,9%
≤24 ans	1,7%	5,7%	11,6%	8,9%	7,9%
25-34 ans	26,5%	28,4%	27,4%	23,6%	26,4%
35-44 ans	26,5%	27,1%	22,0%	26,8%	25,5%
45-54 ans	31,3%	27,3%	26,2%	29,7%	28,1%
55 ans et plus	13,9%	11,5%	12,8%	11,0%	12,1%
 C. Industrie manufacturière	12,2%	17,4%	4,3%	35,1%	18,3%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	17,4%	12,7%	1,3%	1,3%	6,3%
F. Construction	1,7%	2,5%	0,5%	5,7%	2,8%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	11,7%	12,5%	25,2%	13,7%	16,7%
H. Transports et entreposage	0,4%	2,7%	2,1%	19,0%	7,1%
I. Hébergement et restauration	0,4%	1,0%	7,5%	3,0%	3,5%
J. Information et communication	10,4%	3,2%	0,8%	0,2%	2,3%
K. Activités financières et d'assurance	5,2%	4,2%	3,9%	0,0%	3,0%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	19,1%	7,9%	4,3%	1,8%	6,2%
N. Activités de services administratifs et de soutien	3,0%	4,0%	5,1%	8,5%	5,6%
O. Administration publique	4,8%	2,8%	7,7%	4,6%	5,0%
Q. Santé humaine et action sociale	6,1%	20,7%	26,3%	2,7%	15,3%
S. Autres activités de services	1,3%	2,3%	5,9%	0,6%	2,8%

Conditions de travail	Cadres n=230	Intermé- diaires n=598	Employés n=623	Ouvriers n=627	BaseEverest n=2089
- Changement de travail depuis 1 an :					
Non	89,1%	92,4%	88,7%	88,8%	89,9%
Oui, raison médicale	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%	0,5%
Oui, autre raison	10,5%	6,5%	9,4%	10,3%	8,9%
Oui, raison non précisée	0,4%	1,0%	1,1%	0,2%	0,7%
Travail à temps plein	89,1%	84,1%	67,3%	89,5%	81,3%
Travail en journée normale	93,8%	78,8%	73,5%	68,4%	75,9%
Coupures de plus de 2 heures	9,9%	12,8%	23,7%	16,1%	16,9%
Horaires décalés	17,7%	24,5%	30,6%	41,3%	30,6%
Horaires irréguliers ou alternés	16,4%	28,1%	32,0%	37,0%	30,6%
Travail de nuit	6,5%	14,9%	8,9%	28,2%	16,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	17,9%	10,2%	0,7%	7,3%	7,5%
- Dépasser ses horaires normaux					
Jamais	1,7%	8,3%	24,0%	23,2%	16,7%
Rarement	24,9%	44,3%	51,2%	50,0%	45,8%
Assez souvent	41,5%	34,3%	19,0%	20,9%	26,5%
Très souvent	31,9%	13,0%	5,8%	5,8%	11,0%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause					
Jamais	17,7%	25,5%	47,9%	42,5%	36,4%
Rarement	46,5%	44,6%	33,2%	37,0%	38,9%
Assez souvent	24,8%	20,2%	11,7%	15,6%	16,9%
Très souvent	11,1%	9,7%	7,3%	4,9%	7,8%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin					
Jamais	9,2%	27,7%	40,1%	36,0%	31,7%
Rarement	48,0%	42,6%	40,6%	41,0%	42,1%
Assez souvent	31,4%	23,1%	15,3%	18,2%	20,3%
Très souvent	11,4%	6,7%	4,0%	4,8%	6,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)					
0	1,7%	3,9%	5,2%	4,5%	4,2%
1	2,6%	4,7%	6,0%	4,4%	4,9%
2	6,1%	7,6%	10,9%	8,4%	8,6%
3	14,8%	11,1%	12,6%	12,6%	12,4%
4	9,6%	11,0%	10,6%	9,2%	10,2%
5	17,0%	17,2%	19,4%	23,8%	19,8%
6	12,7%	11,8%	11,6%	11,8%	11,9%
7	17,5%	15,5%	11,3%	12,5%	13,5%
8	11,8%	12,2%	8,8%	9,4%	10,4%
9	5,7%	3,5%	2,1%	1,3%	2,7%
10	0,4%	1,4%	1,3%	1,9%	1,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	48,0%	44,4%	35,1%	37,0%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	75,4%	59,9%	44,7%	41,2%	51,6%
Parmi eux :					
- Perturbe le travail	68,9%	67,4%	50,2%	61,6%	61,7%
- Aspect positif du travail	43,6%	32,5%	40,5%	41,2%	38,7%

Appréciation sur le travail	Cadres n=230	Intermédiaires n=598	Employés n=623	Ouvriers n=627	Base Everest n=2089
-Travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	0,0%	2,0%	9,7%	12,5%	7,2%
Plutôt non	5,7%	9,6%	13,7%	18,3%	13,0%
Plutôt oui	43,0%	49,2%	44,5%	46,1%	46,2%
Oui tout à fait	51,3%	39,1%	32,1%	23,0%	33,6%
-Travail varié					
Non pas du tout	0,4%	1,0%	7,4%	10,9%	5,8%
Plutôt non	3,1%	10,6%	16,4%	16,2%	13,2%
Plutôt oui	39,0%	48,3%	45,5%	46,2%	45,8%
Oui tout à fait	57,5%	40,0%	30,7%	26,6%	35,2%
-Choix dans la façon de procéder					
Non pas du tout	0,4%	4,2%	8,4%	10,4%	6,9%
Plutôt non	8,3%	16,6%	20,0%	18,1%	17,2%
Plutôt oui	52,0%	50,5%	43,2%	48,1%	47,6%
Oui tout à fait	39,3%	28,7%	28,4%	23,4%	28,3%
-Possibilités suffisantes d'entraide					
Non pas du tout	1,3%	2,0%	6,0%	6,6%	4,5%
Plutôt non	8,7%	14,2%	12,2%	14,1%	12,9%
Plutôt oui	62,4%	57,4%	56,9%	56,3%	57,6%
Oui tout à fait	27,5%	26,4%	24,9%	23,0%	25,0%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité					
Non pas du tout	0,4%	1,4%	1,8%	1,6%	1,5%
Plutôt non	12,7%	14,7%	10,0%	11,5%	12,1%
Plutôt oui	67,5%	61,1%	59,5%	59,5%	60,8%
Oui tout à fait	19,3%	22,8%	28,8%	27,4%	25,6%
-Travail reconnu					
Non pas du tout	0,9%	4,4%	6,5%	7,0%	5,4%
Plutôt non	12,3%	21,0%	16,4%	20,4%	18,4%
Plutôt oui	60,1%	56,9%	54,0%	54,6%	55,8%
Oui tout à fait	26,8%	17,6%	23,1%	18,0%	20,4%
-Faire des choses que l'on désapprouve					
Non pas du tout	18,7%	23,1%	34,2%	25,9%	26,7%
Plutôt non	65,7%	57,5%	48,5%	47,3%	52,6%
Plutôt oui	14,3%	17,6%	14,5%	23,2%	18,1%
Oui tout à fait	1,3%	1,9%	2,8%	3,7%	2,6%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi					
Non pas du tout	58,8%	50,9%	58,6%	47,4%	53,1%
Plutôt non	31,6%	36,2%	28,6%	31,6%	32,0%
Plutôt oui	8,3%	10,9%	10,4%	15,2%	11,7%
Oui tout à fait	1,3%	2,0%	2,4%	5,8%	3,2%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=230	Intermédiaires n=598	Employés n=623	Ouvriers n=627	Base Everest n=2089
Postures contraignantes :					
Fréquence					
Non jamais	73,8%	48,5%	40,6%	21,2%	40,8%
Oui parfois	20,1%	37,9%	37,7%	49,7%	39,4%
Oui souvent	6,1%	13,6%	21,6%	29,2%	19,8%
Difficultés					
Pas de postures contraignantes	73,8%	48,5%	40,6%	21,2%	40,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	11,4%	20,9%	30,5%	40,2%	28,4%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	12,2%	26,8%	25,5%	35,3%	27,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	2,6%	3,9%	3,4%	3,4%	3,4%
Effort, port de charges lourdes :					
Fréquence					
Non jamais	84,2%	51,9%	47,9%	23,2%	45,7%
Oui parfois	12,3%	37,5%	32,7%	47,0%	36,1%
Oui souvent	3,5%	10,6%	19,4%	29,9%	18,2%
Difficultés					
Pas d'effort, port de charges lourdes	84,2%	51,9%	47,9%	23,2%	45,7%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	4,4%	20,3%	25,5%	39,3%	25,7%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	10,1%	24,6%	23,7%	34,5%	25,7%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	1,3%	3,2%	2,9%	3,0%	2,8%
Gestes répétitifs :					
Fréquence					
Non jamais	75,0%	51,3%	27,5%	18,5%	37,1%
Oui parfois	16,2%	26,9%	29,9%	30,0%	27,5%
Oui souvent	8,8%	21,8%	42,6%	51,4%	35,4%
Difficultés					
Pas de gestes répétitifs	75,0%	51,3%	27,5%	18,5%	37,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	4,8%	12,8%	21,5%	33,7%	20,8%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	18,4%	32,1%	46,1%	44,4%	38,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,8%	3,9%	4,9%	3,4%	3,8%
Importants déplacements à pieds :					
Fréquence					
Non jamais	77,7%	57,7%	59,2%	39,0%	54,9%
Oui parfois	14,8%	21,6%	16,0%	28,3%	21,2%
Oui souvent	7,4%	20,6%	24,8%	32,6%	24,0%
Difficultés					
Pas d'importants déplacements à pieds	77,7%	57,7%	59,2%	39,0%	54,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	2,2%	8,4%	11,5%	17,4%	11,3%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	17,5%	31,5%	27,1%	40,2%	31,2%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	2,6%	2,3%	2,3%	3,4%	2,6%
Station debout prolongée :					
Fréquence					
Non jamais	72,4%	49,2%	38,1%	26,6%	41,7%
Oui parfois	21,5%	26,6%	18,3%	25,8%	23,3%
Oui souvent	6,1%	24,1%	43,6%	47,6%	35,0%
Difficultés					
Pas de station debout prolongée	72,4%	49,2%	38,1%	26,6%	41,7%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	5,3%	12,8%	22,6%	26,3%	18,9%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	18,0%	32,4%	34,1%	41,7%	34,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	4,4%	5,6%	5,2%	5,4%	5,3%

Expositions	Cadres n=230	Intermédiaires n=598	Employés n=623	Ouvriers n=627	Base Everest n=2089
Produits chimiques	8,3%	28,1%	22,3%	34,2%	25,9%
Poussières, fumées	10,9%	26,4%	18,9%	64,8%	34,0%
Rx ionisants	8,7%	7,9%	2,1%	2,6%	4,7%
Vibrations	3,1%	16,2%	3,7%	44,2%	19,4%
Gêne sonore	19,3%	39,2%	24,0%	58,7%	38,4%
Bruit > 80db	11,4%	24,0%	7,4%	51,6%	26,0%
Contrainte visuelle	36,4%	30,7%	22,8%	27,4%	28,0%
Conduite routière prolongée	21,4%	16,1%	4,2%	19,8%	14,4%
Chaleur intense	4,8%	12,4%	13,2%	27,2%	16,2%
Froid intense	3,5%	8,6%	8,2%	25,1%	12,8%
Intempéries	7,4%	15,0%	6,4%	31,7%	16,6%
Pression psychologique	30,1%	29,6%	20,0%	20,9%	24,2%
Agent biologique	2,7%	14,8%	11,9%	5,6%	9,8%
Contact avec le public	61,4%	68,6%	78,7%	48,3%	64,7%

Formation	Cadres n=230	Intermédiaires n=598	Employés n=623	Ouvriers n=627	Base Everest n=2089
A bénéficié d'une formation depuis un an :	67,8%	56,6%	41,0%	41,7%	48,7%
Parmi eux :					
- En rapport avec le travail actuel	95,5%	91,4%	93,0%	90,3%	92,1%
- En rapport avec le travail futur	14,5%	10,3%	14,4%	12,6%	12,6%
- Formation d'intérêt général	41,8%	50,7%	37,3%	44,3%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	48,0%	34,6%	20,2%	19,0%	27,2%

Mode de vie	Cadres n=230	Intermédiaires n=598	Employés n=623	Ouvriers n=627	Base Everest n=2089
Activité sportive régulière	66,1%	57,4%	46,7%	46,9%	51,9%
Consommation de tabac	21,0%	31,3%	36,6%	47,7%	36,7%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	3,5%	4,5%	6,2%	14,8%	8,0%
Consommation de café	81,6%	74,2%	68,7%	84,2%	76,5%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	14,9%	16,5%	13,2%	22,0%	17,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	21,5%	18,3%	14,2%	16,4%	16,9%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest		
	<45 ans n=126	≥ 45 ans n=104	Ensemble n=230	<45 ans n=366	≥ 45 ans n=232	Ensemble n=598	<45 ans n=380	≥ 45 ans n=243	Ensemble n=623	<45 ans n=372	≥ 45 ans n=255	Ensemble n=627	<45 ans n=1250	≥ 45 ans n=839	Global n=2089
<b>Indice de masse corporelle</b>															
- Normaux ou maigres	59,2%	50,0%	55,0%	59,3%	43,6%	53,2%	65,5%	53,9%	61,1%	50,8%	37,3%	45,4%	58,6%	45,5%	53,4%
- Surpoids	34,2%	38,2%	36,0%	28,2%	42,3%	33,6%	23,2%	26,3%	24,4%	34,1%	39,8%	36,4%	28,9%	36,4%	31,9%
- Obèses	6,7%	11,8%	9,0%	12,5%	14,1%	13,1%	11,3%	19,7%	14,5%	15,1%	22,8%	18,2%	12,4%	18,1%	14,7%
<b>Appareil respiratoire</b>															
Existence d'un problème	2,4%	1,9%	2,2%	1,9%	3,9%	2,7%	3,2%	5,9%	4,2%	2,7%	6,0%	4,1%	2,7%	4,9%	3,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,4%	1,9%	2,2%	1,7%	3,9%	2,5%	2,9%	5,9%	4,1%	1,9%	4,4%	2,9%	2,3%	4,4%	3,1%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,9%	0,5%	0,3%	1,7%	0,8%	0,3%	1,6%	0,8%	0,3%	1,2%	0,7%
TraITEMENT ou autre soin	2,4%	1,0%	1,8%	1,1%	2,6%	1,7%	2,1%	4,6%	3,1%	2,2%	2,8%	2,4%	1,9%	3,0%	2,3%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>															
Existence d'un problème	1,6%	4,9%	3,1%	1,9%	5,3%	3,2%	2,7%	8,4%	4,9%	2,5%	6,8%	4,2%	2,3%	6,7%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	0,8%	3,9%	2,2%	1,9%	4,4%	2,9%	2,4%	6,3%	3,9%	1,9%	4,4%	2,9%	2,0%	5,0%	3,2%
Gêne dans le travail	0,0%	1,0%	0,4%	0,8%	1,3%	1,0%	1,6%	1,7%	1,6%	0,8%	0,8%	0,8%	1,0%	1,3%	1,1%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	3,9%	2,2%	0,8%	4,0%	2,0%	0,8%	7,2%	3,3%	1,9%	6,0%	3,6%	1,1%	5,6%	2,9%
<b>HTA</b>															
Existence d'un problème	4,2%	13,6%	8,5%	2,0%	21,5%	9,6%	1,1%	17,6%	7,5%	3,8%	18,4%	9,8%	2,5%	18,3%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	8,8%	5,9%	1,7%	18,0%	8,1%	0,8%	9,9%	4,3%	3,3%	11,2%	6,5%	2,1%	12,3%	6,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%	0,3%	0,4%	0,3%	0,0%	0,4%	0,2%	0,1%	0,4%	0,2%
TraITEMENT ou autre soin	2,5%	12,6%	7,2%	1,4%	18,1%	7,9%	0,5%	15,5%	6,3%	2,5%	14,5%	7,4%	1,6%	15,5%	7,1%
<b>Digestif</b>															
Existence d'un problème	8,1%	6,9%	7,6%	8,7%	8,8%	8,7%	9,3%	11,4%	10,1%	5,6%	13,7%	8,9%	7,8%	10,9%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,1%	6,9%	7,6%	8,7%	8,4%	8,6%	8,7%	11,0%	9,6%	5,3%	13,3%	8,6%	7,6%	10,5%	8,8%
Gêne dans le travail	3,3%	0,0%	1,8%	2,0%	1,8%	1,9%	1,1%	3,0%	1,8%	2,2%	2,4%	2,3%	1,9%	2,1%	2,0%
TraITEMENT ou autre soin	4,1%	2,9%	3,6%	3,9%	4,4%	4,1%	2,5%	7,6%	4,5%	2,2%	8,1%	4,6%	3,0%	6,4%	4,3%
<b>Dermatologie</b>															
Existence d'un problème	4,0%	4,9%	4,4%	4,1%	5,7%	4,7%	4,5%	5,1%	4,7%	5,0%	4,4%	4,7%	4,6%	5,0%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	4,9%	4,0%	3,9%	5,3%	4,4%	4,5%	4,7%	4,6%	4,4%	4,4%	4,4%	4,2%	4,8%	4,4%
Gêne dans le travail	0,0%	1,0%	0,4%	0,8%	0,9%	0,9%	0,3%	1,3%	0,7%	0,8%	1,6%	1,1%	0,6%	1,2%	0,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	2,9%	2,2%	1,7%	2,6%	2,0%	2,1%	3,8%	2,8%	3,0%	3,6%	3,3%	2,2%	3,3%	2,6%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest		
	<45 ans n=126	≥ 45 ans n=104	Ensemble n=230	<45 ans n=366	≥ 45 ans n=232	Ensemble n=598	<45 ans n=380	≥ 45 ans n=243	Ensemble n=623	<45 ans n=372	≥ 45 ans n=255	Ensemble n=627	<45 ans n=1250	≥ 45 ans n=839	Global n=2089
<b>Lassitude, fatigue</b>															
Existence d'un problème	22,6%	15,5%	19,4%	25,8%	26,1%	25,9%	25,5%	29,8%	27,2%	21,4%	26,8%	23,6%	23,9%	26,2%	24,8%
Plaintes ou signes cliniques	21,3%	15,5%	18,7%	25,6%	26,1%	25,8%	25,5%	29,5%	27,0%	21,2%	26,2%	23,2%	23,7%	25,9%	24,6%
Être gêné dans le travail	14,6%	6,8%	11,1%	9,1%	12,1%	10,3%	12,1%	17,4%	14,1%	9,9%	7,7%	9,0%	10,8%	11,8%	11,2%
Traitements ou autres soins	3,3%	2,0%	2,7%	1,7%	4,5%	2,7%	1,9%	3,0%	2,3%	1,4%	1,6%	1,5%	1,8%	3,0%	2,3%
<b>Anxiété, nervosité</b>															
Existence d'un problème	24,2%	17,5%	21,1%	18,6%	20,7%	19,4%	20,9%	24,6%	22,3%	18,4%	22,5%	20,0%	19,7%	22,2%	20,7%
Plaintes ou signes cliniques	23,4%	17,5%	20,7%	18,6%	20,7%	19,4%	20,6%	24,3%	22,0%	17,9%	22,1%	19,6%	19,4%	22,0%	20,4%
Être gêné dans le travail	12,1%	5,8%	9,3%	8,6%	10,3%	9,2%	9,4%	12,0%	10,4%	8,8%	10,8%	9,6%	9,2%	10,6%	9,8%
Traitements ou autres soins	4,1%	4,9%	4,4%	2,5%	4,4%	3,3%	3,5%	3,9%	3,7%	2,2%	2,4%	2,3%	2,9%	3,8%	3,3%
<b>Troubles du sommeil</b>															
Existence d'un problème	20,8%	19,4%	20,2%	15,0%	23,0%	18,1%	14,9%	25,4%	19,0%	16,9%	20,6%	18,4%	16,1%	22,6%	18,7%
Plaintes ou signes cliniques	19,4%	19,4%	19,4%	15,0%	22,7%	17,9%	14,6%	25,4%	18,8%	16,6%	20,6%	18,3%	15,8%	22,5%	18,5%
Être gêné dans le travail	9,6%	6,8%	8,3%	7,2%	9,4%	8,0%	6,5%	9,8%	7,8%	7,7%	7,8%	7,8%	7,4%	8,8%	8,0%
Traitements ou autres soins	3,2%	5,8%	4,4%	1,7%	4,5%	2,8%	3,8%	7,7%	5,3%	2,2%	2,9%	2,5%	2,6%	5,2%	3,7%
<b>➤ Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)</b>															
Existence d'un problème	12,9%	7,8%	10,6%	6,9%	11,5%	8,7%	6,5%	14,4%	9,5%	7,7%	10,0%	8,7%	7,6%	11,5%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	9,9%	7,8%	8,9%	6,7%	11,5%	8,5%	6,2%	14,4%	9,4%	7,5%	9,3%	8,2%	7,0%	11,2%	8,7%
Être gêné dans le travail	5,6%	1,9%	3,9%	3,3%	4,4%	3,7%	2,7%	5,1%	3,6%	2,7%	2,4%	2,6%	3,2%	3,8%	3,4%
Traitements ou autres soins	0,8%	1,0%	0,9%	0,8%	1,3%	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,0%	1,2%	0,5%	0,6%	1,2%	0,8%
<b>Troubles de l'audition</b>															
Existence d'un problème	1,6%	6,8%	4,0%	2,2%	15,0%	7,2%	2,4%	8,6%	4,8%	5,5%	14,4%	9,2%	3,2%	11,9%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	1,6%	6,8%	4,0%	2,2%	15,0%	7,2%	2,4%	8,2%	4,6%	5,5%	13,3%	8,7%	3,2%	11,4%	6,5%
Être gêné dans le travail	0,0%	3,9%	1,8%	0,8%	4,9%	2,4%	1,3%	4,7%	2,6%	0,8%	2,4%	1,5%	0,9%	3,9%	2,1%
Traitements ou autres soins	0,0%	1,0%	0,4%	0,6%	0,4%	0,5%	0,5%	0,9%	0,7%	0,6%	1,6%	1,0%	0,5%	1,0%	0,7%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest		
	<45 ans n=126	≥ 45 ans n=104	Ensemble n=230	<45 ans n=366	≥ 45 ans n=232	Ensemble n=598	<45 ans n=380	≥ 45 ans n=243	Ensemble n=623	<45 ans n=372	≥ 45 ans n=255	Ensemble n=627	<45 ans n=1250	≥ 45 ans n=839	Global n=2089
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>															
Existence d'un problème	3,2%	11,7%	7,0%	5,2%	9,6%	6,9%	7,5%	15,5%	10,6%	9,3%	24,0%	15,3%	7,0%	15,9%	10,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	11,7%	7,0%	5,2%	9,6%	6,9%	7,5%	15,5%	10,6%	9,3%	24,0%	15,3%	7,0%	15,9%	10,5%
Gêne dans le travail	0,8%	2,9%	1,8%	3,9%	3,9%	3,9%	5,1%	9,7%	6,9%	4,7%	18,0%	10,1%	4,1%	9,7%	6,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	5,0%	2,7%	2,5%	3,9%	3,0%	3,0%	8,4%	5,1%	2,8%	9,3%	5,4%	2,5%	7,0%	4,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>															
Existence d'un problème	1,6%	2,9%	2,2%	1,9%	8,3%	4,4%	2,7%	9,7%	5,4%	4,1%	9,3%	6,2%	2,8%	8,3%	5,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,6%	2,9%	2,2%	1,9%	7,5%	4,1%	2,7%	9,7%	5,4%	3,6%	9,3%	5,9%	2,6%	8,0%	4,8%
Gêne dans le travail	0,0%	1,0%	0,4%	0,8%	2,7%	1,5%	1,6%	6,4%	3,4%	2,5%	5,6%	3,8%	1,5%	4,4%	2,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	1,9%	0,9%	0,3%	3,1%	1,4%	0,5%	4,3%	2,0%	0,8%	4,4%	2,3%	0,5%	3,7%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>															
Existence d'un problème	3,2%	8,7%	5,7%	5,0%	8,4%	6,3%	7,2%	17,8%	11,3%	5,2%	18,4%	10,6%	5,5%	14,1%	9,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	8,7%	5,7%	4,7%	7,9%	5,9%	7,2%	16,5%	10,8%	5,2%	18,4%	10,6%	5,4%	13,6%	8,7%
Gêne dans le travail	1,6%	4,9%	3,1%	2,2%	4,0%	2,9%	5,9%	10,6%	7,7%	2,5%	12,0%	6,3%	3,3%	8,4%	5,4%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	2,9%	2,2%	1,1%	3,5%	2,0%	2,2%	6,4%	3,8%	0,3%	6,8%	2,9%	1,2%	5,3%	2,8%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	7,3%	16,5%	11,5%	10,8%	16,4%	12,9%	14,7%	30,8%	21,0%	15,7%	36,1%	24,0%	13,1%	26,5%	18,5%
Plaintes ou signes cliniques	7,3%	16,5%	11,5%	10,8%	16,4%	12,9%	14,7%	30,0%	20,7%	15,2%	36,1%	23,7%	13,0%	26,2%	18,3%
Gêne dans le travail	2,4%	5,9%	4,0%	6,1%	7,1%	6,5%	10,7%	19,6%	14,1%	8,6%	26,1%	15,7%	7,8%	16,3%	11,2%
TraITEMENT ou autre soin	2,4%	5,9%	4,0%	3,9%	6,7%	5,0%	4,1%	13,7%	7,8%	3,9%	16,2%	8,9%	3,8%	11,5%	6,9%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest		
	<45 ans n=126	≥ 45 ans n=104	Ensemble n=230	<45 ans n=366	≥ 45 ans n=232	Ensemble n=598	<45 ans n=380	≥ 45 ans n=243	Ensemble n=623	<45 ans n=372	≥ 45 ans n=255	Ensemble n=627	<45 ans n=1250	≥ 45 ans n=839	Global n=2089
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>															
Existence d'un problème	5,7%	9,7%	7,5%	8,5%	11,8%	9,8%	7,2%	17,2%	11,1%	7,7%	15,2%	10,7%	7,6%	14,1%	10,2%
Plaîntes ou signes cliniques	4,9%	9,7%	7,1%	8,0%	11,8%	9,5%	6,7%	17,2%	10,8%	7,1%	15,2%	10,4%	7,1%	14,1%	9,9%
Gêne dans le travail	1,6%	3,9%	2,7%	3,3%	5,7%	4,2%	3,7%	10,5%	6,4%	5,0%	11,2%	7,5%	3,7%	8,5%	5,7%
Traitemennt ou autre soin	1,6%	4,9%	3,1%	3,9%	5,3%	4,4%	2,7%	6,8%	4,3%	2,7%	8,0%	4,9%	2,9%	6,5%	4,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>															
Existence d'un problème	6,5%	9,7%	7,9%	13,5%	15,7%	14,4%	14,2%	20,7%	16,7%	9,0%	17,7%	12,5%	11,6%	17,0%	13,8%
Plaîntes ou signes cliniques	5,6%	9,7%	7,5%	13,2%	15,7%	14,2%	14,0%	20,7%	16,6%	8,5%	17,0%	11,9%	11,2%	16,8%	13,5%
Gêne dans le travail	2,4%	6,8%	4,4%	9,1%	8,8%	9,0%	8,6%	9,3%	8,9%	4,7%	13,3%	8,2%	6,9%	10,1%	8,2%
Traitemennt ou autre soin	1,6%	2,9%	2,2%	5,5%	5,3%	5,4%	5,7%	9,4%	7,1%	3,3%	7,8%	5,1%	4,5%	7,0%	5,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>															
Existence d'un problème	10,7%	18,4%	14,2%	15,8%	19,4%	17,2%	17,5%	21,0%	18,9%	22,0%	27,7%	24,3%	17,7%	22,4%	19,6%
Plaîntes ou signes cliniques	9,8%	18,4%	13,8%	15,5%	18,1%	16,5%	16,8%	21,0%	18,5%	21,0%	27,1%	23,5%	17,1%	21,9%	19,0%
Gêne dans le travail	4,9%	5,8%	5,3%	10,3%	9,8%	10,1%	9,5%	11,8%	10,4%	15,0%	18,5%	16,4%	10,9%	12,7%	11,6%
Traitemennt ou autre soin	4,9%	6,9%	5,8%	5,3%	9,5%	6,9%	5,1%	7,7%	6,1%	7,8%	11,5%	9,3%	6,0%	9,4%	7,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	13,9%	23,3%	18,2%	23,2%	26,0%	24,3%	25,1%	29,1%	26,6%	25,9%	34,9%	29,6%	23,7%	29,5%	26,0%
Plaîntes ou signes cliniques	12,3%	23,3%	17,3%	22,7%	25,6%	23,8%	24,7%	29,1%	26,4%	25,1%	34,0%	28,7%	23,0%	29,1%	25,4%
Gêne dans le travail	5,8%	9,7%	7,6%	15,5%	13,8%	14,8%	15,4%	14,8%	15,2%	17,4%	24,5%	20,3%	15,1%	17,1%	15,9%
Traitemennt ou autre soin	5,0%	7,9%	6,3%	8,3%	11,7%	9,6%	9,1%	12,4%	10,4%	9,5%	15,8%	12,0%	8,6%	13,0%	10,3%

**Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités**

Description de la population	C- Industrie manufacturière n=382	G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles n=348	Q- Santé humaine et action sociale n=319	Base Everest n=2089
Répartition hommes / femmes	84,0% / 16,0%	51,4% / 48,6%	20,4% / 79,6%	56,1% / 43,9%
≤24 ans	6,0%	9,8%	8,5%	7,9%
25-34 ans	27,5%	29,9%	24,8%	26,4%
35-44 ans	26,2%	27,3%	22,9%	25,5%
45-54 ans	28,5%	23,3%	29,8%	28,1%
55 ans et plus	11,8%	9,8%	14,1%	12,1%
Cadres	7,3%	7,8%	4,4%	11,0%
Intermédiaires	27,2%	21,6%	38,9%	28,6%
Employés	7,1%	45,1%	51,4%	29,8%
Ouvriers	57,6%	24,7%	5,3%	30,0%

Conditions de travail	C- Industrie manufacturière n=382	G- Commerce, réparation auto-moto n=348	Q- Santé humaine et action sociale n=319	Base Everest n=2089
- Changement de travail depuis 1 an :				
Non	89,5%	89,9%	92,8%	89,9%
Oui, raison médicale	0,8%	0,6%	0,0%	0,5%
Oui, autre raison	9,4%	9,2%	6,0%	8,9%
Oui, raison non précisée	0,3%	0,3%	1,3%	0,7%
Travail à temps plein	93,4%	78,9%	69,6%	81,3%
Travail en journée normale	63,6%	82,6%	65,9%	75,9%
Coupures de plus de 2 heures	8,5%	17,7%	18,7%	16,9%
Horaires décalés	38,1%	24,8%	38,4%	30,6%
Horaires irréguliers ou alternés	41,7%	28,6%	40,7%	30,6%
Travail de nuit	33,0%	6,0%	19,2%	30,6%
Déplacements professionnels de plus de 24h	7,9%	3,9%	1,9%	7,5%
- Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	19,2%	18,3%	14,8%	16,7%
Rarement	48,0%	49,9%	47,2%	45,8%
Assez souvent	25,6%	23,8%	25,8%	26,5%
Très souvent	7,2%	8,1%	12,3%	11,0%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	35,0%	43,2%	30,5%	36,4%
Rarement	38,2%	38,6%	38,1%	38,9%
Assez souvent	20,1%	11,0%	21,0%	16,9%
Très souvent	6,7%	7,2%	10,5%	7,8%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	33,9%	33,7%	30,4%	31,7%
Rarement	39,5%	42,2%	41,1%	42,1%
Assez souvent	21,2%	18,8%	22,0%	20,3%
Très souvent	5,4%	5,3%	6,5%	6,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	2,9%	6,1%	3,5%	4,2%
1	3,7%	5,5%	3,5%	4,9%
2	7,9%	9,0%	7,3%	8,6%
3	12,1%	12,5%	12,0%	12,4%
4	9,2%	12,2%	9,1%	10,2%
5	20,8%	20,3%	19,9%	19,8%
6	14,7%	9,3%	13,2%	11,9%
7	13,7%	12,2%	14,8%	13,5%
8	11,3%	10,2%	10,4%	10,4%
9	2,1%	2,0%	3,5%	2,7%
10	1,6%	0,6%	2,8%	1,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	43,4%	34,3%	44,8%	39,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	52,9%	53,8%	52,9%	51,6%
Parmi eux :				
- Perturbe le travail	64,1%	51,4%	68,5%	61,7%
- Aspect positif du travail	40,4%	43,9%	32,3%	38,7%

Appréciation sur le travail	C- Industrie manufacturière n=382	G- Commerce, réparation auto-moto n=348	Q- Santé humaine et action sociale n=319	Base Everest n=2089
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	6,9%	6,1%	7,2%	7,2%
Plutôt non	15,0%	15,3%	7,2%	13,0%
Plutôt oui	50,4%	50,0%	40,6%	46,2%
Oui tout à fait	27,7%	28,6%	45,0%	33,6%
-Travail varié				
Non pas du tout	9,3%	4,3%	4,7%	5,8%
Plutôt non	10,8%	15,2%	15,5%	13,2%
Plutôt oui	49,5%	48,9%	40,1%	45,8%
Oui tout à fait	30,4%	31,6%	39,7%	35,2%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	7,2%	7,8%	6,3%	6,9%
Plutôt non	20,4%	14,7%	19,0%	17,2%
Plutôt oui	47,2%	47,1%	49,1%	47,6%
Oui tout à fait	25,2%	30,5%	25,6%	28,3%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	4,8%	3,2%	4,1%	4,5%
Plutôt non	11,7%	11,3%	15,9%	12,9%
Plutôt oui	60,6%	57,5%	55,1%	57,6%
Oui tout à fait	22,9%	28,0%	24,8%	25,0%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	2,2%	0,9%	1,9%	1,5%
Plutôt non	14,8%	11,1%	13,7%	12,1%
Plutôt oui	59,1%	62,1%	63,3%	60,8%
Oui tout à fait	23,9%	25,9%	21,1%	25,6%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	7,3%	4,1%	5,1%	5,4%
Plutôt non	21,3%	17,7%	18,9%	18,4%
Plutôt oui	57,1%	54,7%	54,2%	55,8%
Oui tout à fait	14,3%	23,5%	21,8%	20,4%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	21,3%	29,2%	31,3%	26,7%
Plutôt non	52,9%	51,0%	49,7%	52,6%
Plutôt oui	22,6%	16,9%	16,8%	18,1%
Oui tout à fait	3,2%	2,9%	2,2%	2,6%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	45,7%	50,9%	64,0%	53,1%
Plutôt non	36,2%	33,2%	25,9%	32,0%
Plutôt oui	14,1%	13,6%	8,2%	11,7%
Oui tout à fait	4,0%	2,3%	1,9%	3,2%

Charge physique du poste de travail	C- Industrie manufacturière n=382	G- Commerce, réparation auto-moto n=348	Q- Santé humaine et action sociale n=319	Base Everest n=2089
Postures contraignantes :				
Fréquence				
Non jamais	33,8%	36,3%	26,4%	40,8%
Oui parfois	44,3%	44,8%	42,1%	39,4%
Oui souvent	21,9%	18,9%	31,4%	19,8%
Difficultés				
Pas de postures contraignantes	33,8%	36,3%	26,4%	40,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	32,7%	28,2%	41,2%	28,4%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	31,1%	33,7%	26,4%	27,4%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	2,4%	1,7%	6,0%	3,4%
Effort, port de charges lourdes :				
Fréquence				
Non jamais	38,1%	32,3%	27,4%	45,7%
Oui parfois	44,4%	43,5%	42,5%	36,1%
Oui souvent	17,6%	24,2%	30,2%	18,2%
Difficultés				
Pas d'effort, port de charges lourdes	38,1%	32,3%	27,4%	45,7%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	30,2%	26,2%	42,5%	25,7%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	29,4%	40,3%	23,9%	25,7%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	2,4%	1,2%	6,3%	2,8%
Gestes répétitifs :				
Fréquence				
Non jamais	34,3%	32,2%	25,3%	37,1%
Oui parfois	24,5%	27,5%	34,8%	27,5%
Oui souvent	41,2%	40,3%	39,9%	35,4%
Difficultés				
Pas de gestes répétitifs	34,3%	32,2%	25,3%	37,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	24,5%	19,1%	27,2%	20,8%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	38,3%	47,2%	40,2%	38,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,9%	1,4%	7,3%	3,8%
Importants déplacements à pieds :				
Fréquence				
Non jamais	43,6%	49,1%	43,2%	54,9%
Oui parfois	24,1%	22,7%	24,1%	21,2%
Oui souvent	32,3%	28,2%	32,7%	24,0%
Difficultés				
Pas d'importants déplacements à pieds	43,6%	49,1%	43,2%	54,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	15,7%	11,2%	17,8%	11,3%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	38,8%	37,9%	34,3%	31,2%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,8%	1,7%	4,8%	2,6%
Station debout prolongée :				
Fréquence				
Non jamais	33,9%	33,0%	27,4%	41,7%
Oui parfois	24,1%	20,7%	27,1%	23,3%
Oui souvent	42,1%	46,3%	45,4%	35,0%
Difficultés				
Pas de station debout prolongée	33,9%	33,0%	27,4%	41,7%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	23,5%	17,8%	28,1%	18,9%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	38,1%	45,1%	36,9%	34,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	4,5%	4,0%	7,6%	5,3%

Expositions	C- Industrie manufacturière n=382	G- Commerce, réparation auto-moto n=348	Q- Santé humaine et action sociale n=319	Base Everest n=2089
Produits chimiques	38,0%	19,6%	31,4%	25,9%
Poussières, fumées	58,9%	32,5%	20,6%	34,0%
Rx ionisants	4,2%	0,0%	6,9%	4,7%
Vibrations	35,9%	16,4%	5,4%	19,4%
Gêne sonore	62,5%	30,6%	25,9%	38,4%
Bruit > 80db	59,1%	16,7%	10,4%	26,0%
Contrainte visuelle	31,3%	21,4%	17,4%	28,0%
Conduite routière prolongée	12,9%	12,0%	7,6%	14,4%
Chaleur intense	27,6%	10,1%	14,3%	16,2%
Froid intense	15,8%	16,2%	4,4%	12,8%
Intempéries	17,2%	9,9%	7,3%	16,6%
Pression psychologique	24,7%	18,2%	29,1%	24,2%
Agent biologique	6,3%	0,6%	35,4%	9,8%
Contact avec le public	35,8%	82,2%	87,2%	64,7%

Formation	C- Industrie manufacturière n=382	G- Commerce, réparation auto-moto n=348	Q- Santé humaine et action sociale n=319	Base Everest n=2089
A bénéficié d'une formation depuis un an :	46,4%	44,5%	47,0%	48,7%
Parmi eux :				
- En rapport avec le travail actuel	86,0%	93,8%	98,6%	92,1%
- En rapport avec le travail futur	12,3%	11,3%	14,4%	12,6%
- Formation d'intérêt général	56,4%	39,8%	38,6%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	29,0%	27,1%	31,7%	27,2%

Mode de vie	C- Industrie manufacturière n=382	G- Commerce, réparation auto-moto n=348	Q- Santé humaine et action sociale n=319	Base Everest n=2089
Activité sportive régulière	47,2%	44,9%	56,4%	51,9%
Consommation de tabac	42,8%	35,8%	35,4%	36,7%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	10,4%	7,8%	5,7%	8,0%
Consommation de café	82,6%	75,8%	70,0%	76,5%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	21,4%	16,2%	15,8%	17,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	19,4%	14,7%	17,2%	16,9%

Etat de santé	C- Industrie manufacturière			G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Q- Santé humaine et action sociale			Base Everest		
	<45 ans n=228	≥ 45 ans n=154	Ensemble n=382	<45 ans n=233	≥ 45 ans n=115	Ensemble n=348	<45 ans n=179	≥ 45 ans n=140	Ensemble n=319	<45 ans n=1250	≥ 45 ans n=839	Ensemble n=2089
<b>Indice de masse corporelle</b>												
- Normaux ou maigres	53,9%	34,0%	46,0%	63,0%	44,6%	56,9%	63,4%	56,7%	60,5%	58,6%	45,5%	53,4%
- Surpoids	37,4%	42,4%	39,4%	26,9%	41,1%	31,6%	22,3%	28,4%	24,9%	28,9%	36,4%	31,9%
- Obèses	8,7%	23,6%	14,6%	10,1%	14,3%	11,5%	14,3%	14,9%	14,6%	12,4%	18,1%	14,7%
<b>Appareil respiratoire</b>												
Existence d'un problème	3,5%	5,9%	4,5%	2,2%	6,2%	3,5%	2,8%	5,0%	3,8%	2,7%	4,9%	3,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	4,6%	3,7%	2,2%	6,2%	3,5%	2,8%	5,0%	3,8%	2,3%	4,4%	3,1%
Gêne dans le travail	0,4%	0,7%	0,5%	0,0%	0,9%	0,3%	0,0%	0,7%	0,3%	0,3%	1,2%	0,7%
TraITEMENT ou autre soin	2,7%	2,6%	2,7%	0,9%	3,5%	1,7%	1,7%	4,3%	2,8%	1,9%	3,0%	2,3%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>												
Existence d'un problème	1,8%	9,3%	4,8%	5,2%	1,8%	4,1%	3,4%	6,6%	4,7%	2,3%	6,7%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	7,3%	4,0%	4,3%	1,8%	3,5%	3,4%	5,1%	4,1%	2,0%	5,0%	3,2%
Gêne dans le travail	0,4%	2,0%	1,1%	2,6%	0,0%	1,7%	1,1%	0,7%	0,9%	1,0%	1,3%	1,1%
TraITEMENT ou autre soin	1,3%	7,3%	3,7%	1,7%	1,8%	1,8%	0,6%	4,4%	2,2%	1,1%	5,6%	2,9%
<b>HTA</b>												
Existence d'un problème	2,3%	18,4%	8,8%	3,5%	14,3%	7,0%	1,7%	15,3%	7,6%	2,5%	18,3%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	14,5%	7,0%	3,0%	10,7%	5,6%	0,6%	6,6%	3,2%	2,1%	12,3%	6,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,7%	0,3%	0,4%	0,0%	0,3%	0,0%	0,7%	0,3%	0,1%	0,4%	0,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,8%	15,9%	7,5%	2,2%	12,5%	5,6%	1,1%	13,1%	6,3%	1,6%	15,5%	7,1%
<b>Digestif</b>												
Existence d'un problème	7,6%	14,8%	10,4%	7,9%	12,5%	9,4%	10,2%	12,2%	11,1%	7,8%	10,9%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	14,1%	9,9%	7,4%	11,6%	8,8%	9,7%	12,2%	10,8%	7,6%	10,5%	8,8%
Gêne dans le travail	3,1%	2,0%	2,7%	0,9%	1,8%	1,2%	2,3%	4,3%	3,2%	1,9%	2,1%	2,0%
TraITEMENT ou autre soin	3,1%	8,7%	5,3%	3,5%	8,9%	5,3%	2,3%	8,0%	4,8%	3,0%	6,4%	4,3%
<b>Dermatologie</b>												
Existence d'un problème	6,2%	6,6%	6,4%	1,7%	5,4%	2,9%	6,7%	5,8%	6,3%	4,6%	5,0%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	6,0%	5,3%	1,7%	5,4%	2,9%	6,7%	5,1%	6,0%	4,2%	4,8%	4,4%
Gêne dans le travail	0,4%	1,3%	0,8%	0,9%	1,8%	1,2%	2,2%	0,7%	1,6%	0,6%	1,2%	0,8%
TraITEMENT ou autre soin	4,0%	4,0%	4,0%	0,9%	3,6%	1,7%	2,2%	4,3%	3,2%	2,2%	3,3%	2,6%

Etat de santé	C- Industrie manufacturière			G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Q- Santé humaine et action sociale			Base Evrest		
	<45 ans n=228	≥ 45 ans n=154	Ensemble n=382	<45 ans n=233	≥ 45 ans n=115	Ensemble n=348	<45 ans n=179	≥ 45 ans n=140	Ensemble n=319	<45 ans n=1250	≥ 45 ans n=839	Ensemble n=2089
<b>Lassitude, fatigue</b>												
Existence d'un problème	28,8%	30,7%	29,5%	19,0%	23,2%	20,3%	30,7%	30,2%	30,5%	23,9%	26,2%	24,8%
Plaintes ou signes cliniques	28,4%	30,7%	29,3%	19,0%	23,2%	20,3%	30,7%	29,2%	30,1%	23,7%	25,9%	24,6%
Gêne dans le travail	10,6%	9,5%	10,2%	7,8%	9,9%	8,5%	11,7%	18,2%	14,6%	10,8%	11,8%	11,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,8%	3,4%	2,4%	2,6%	1,9%	2,4%	0,0%	5,8%	2,5%	1,8%	3,0%	2,3%
<b>Anxiété, nervosité</b>												
Existence d'un problème	24,3%	30,2%	26,7%	16,4%	22,1%	18,3%	23,7%	21,2%	22,6%	19,7%	22,2%	20,7%
Plaintes ou signes cliniques	23,1%	29,5%	25,7%	16,4%	22,1%	18,3%	23,2%	20,6%	22,0%	19,4%	22,0%	20,4%
Gêne dans le travail	9,7%	12,1%	10,7%	8,2%	9,8%	8,7%	7,3%	8,1%	7,7%	9,2%	10,6%	9,8%
TraITEMENT ou autre soin	2,3%	5,4%	3,5%	1,7%	4,5%	2,7%	2,8%	5,1%	3,8%	2,9%	3,8%	3,3%
<b>Troubles du sommeil</b>												
Existence d'un problème	16,4%	28,2%	21,1%	11,8%	18,6%	14,0%	15,9%	24,6%	19,7%	16,1%	22,6%	18,7%
Plaintes ou signes cliniques	15,6%	28,2%	20,6%	11,8%	18,6%	14,0%	15,9%	24,6%	19,7%	15,8%	22,5%	18,5%
Gêne dans le travail	8,4%	10,8%	9,4%	3,9%	8,0%	5,3%	7,4%	10,1%	8,6%	7,4%	8,8%	8,0%
TraITEMENT ou autre soin	3,5%	4,7%	4,0%	1,8%	2,8%	2,1%	2,9%	7,2%	4,8%	2,6%	5,2%	3,7%
<b>➤ Troubles neuro psychiques</b> <i>(les 3 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	9,7%	15,3%	12,0%	3,5%	11,5%	6,1%	7,3%	14,6%	10,4%	7,6%	11,5%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,9%	14,7%	11,2%	3,5%	11,5%	6,1%	7,3%	14,0%	10,2%	7,0%	11,2%	8,7%
Gêne dans le travail	4,4%	4,0%	4,3%	0,9%	5,4%	2,3%	2,2%	2,9%	2,5%	3,2%	3,8%	3,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,4%	0,7%	0,5%	0,4%	1,8%	0,9%	0,0%	1,4%	0,6%	0,6%	1,2%	0,8%
<b>Troubles de l'audition</b>												
Existence d'un problème	5,0%	21,2%	11,6%	1,3%	7,1%	3,2%	2,8%	10,3%	6,1%	3,2%	11,9%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	20,7%	11,4%	1,3%	6,2%	2,9%	2,8%	10,3%	6,1%	3,2%	11,4%	6,5%
Gêne dans le travail	0,9%	4,6%	2,4%	0,0%	4,4%	1,5%	2,2%	4,4%	3,2%	0,9%	3,9%	2,1%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	0,7%	0,5%	0,0%	1,8%	0,6%	1,1%	0,0%	0,6%	0,5%	1,0%	0,7%

Etat de santé	C- Industrie manufacturière			G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Q- Santé humaine et action sociale			Base Everest		
	<45 ans n=228	≥ 45 ans n=154	Ensemble n=382	<45 ans n=233	≥ 45 ans n=115	Ensemble n=348	<45 ans n=179	≥ 45 ans n=140	Ensemble n=319	<45 ans n=1250	≥ 45 ans n=839	Ensemble n=2089
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>												
Existence d'un problème	9,3%	21,9%	14,3%	6,5%	18,6%	10,5%	10,6%	15,8%	12,9%	7,0%	15,9%	10,5%
Plaintes ou signes cliniques	9,3%	21,9%	14,3%	6,5%	18,6%	10,5%	10,6%	15,8%	12,9%	7,0%	15,9%	10,5%
Gêne dans le travail	4,4%	15,2%	8,8%	4,8%	13,3%	7,6%	6,1%	7,2%	6,6%	4,1%	9,7%	6,4%
Traitements ou autres soins	1,8%	10,6%	5,3%	2,2%	8,1%	4,1%	3,9%	6,5%	5,1%	2,5%	7,0%	4,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>												
Existence d'un problème	3,6%	12,8%	7,2%	4,3%	8,0%	5,5%	2,8%	10,9%	6,3%	2,8%	8,3%	5,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	12,8%	7,2%	3,9%	8,0%	5,2%	2,8%	9,5%	5,7%	2,6%	8,0%	4,8%
Gêne dans le travail	1,8%	8,7%	4,6%	2,6%	2,7%	2,6%	0,6%	7,4%	3,5%	1,5%	4,4%	2,6%
Traitements ou autres soins	0,9%	6,7%	3,2%	0,9%	3,6%	1,8%	0,6%	4,4%	2,2%	0,5%	3,7%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>												
Existence d'un problème	6,2%	20,0%	11,7%	6,1%	16,1%	9,3%	6,1%	20,4%	12,3%	5,5%	14,1%	9,0%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	18,7%	10,9%	6,1%	16,1%	9,3%	6,1%	19,0%	11,7%	5,4%	13,6%	8,7%
Gêne dans le travail	4,4%	12,8%	7,8%	3,9%	8,9%	5,5%	2,8%	13,3%	7,3%	3,3%	8,4%	5,4%
Traitements ou autres soins	1,3%	8,0%	4,0%	1,7%	8,3%	3,8%	1,1%	7,5%	3,8%	1,2%	5,3%	2,8%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	15,7%	37,6%	24,5%	15,2%	28,6%	19,5%	16,2%	31,2%	22,7%	13,1%	26,5%	18,5%
Plaintes ou signes cliniques	15,7%	36,2%	23,9%	14,7%	28,6%	19,2%	16,2%	31,2%	22,7%	13,0%	26,2%	18,3%
Gêne dans le travail	9,0%	25,7%	15,6%	10,0%	18,0%	12,6%	8,4%	20,6%	13,7%	7,8%	16,3%	11,2%
Traitements ou autres soins	3,2%	18,1%	9,2%	4,4%	14,7%	7,7%	4,5%	13,3%	8,3%	3,8%	11,5%	6,9%

Etat de santé	C- Industrie manufacturière			G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Q- Santé humaine et action sociale			Base Everest		
	<45 ans n=228	≥ 45 ans n=154	Ensemble n=382	<45 ans n=233	≥ 45 ans n=115	Ensemble n=348	<45 ans n=179	≥ 45 ans n=140	Ensemble n=319	<45 ans n=1250	≥ 45 ans n=839	Ensemble n=2089
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>												
Existence d'un problème	8,9%	15,2%	11,4%	6,9%	17,0%	10,2%	11,7%	22,3%	16,4%	7,6%	14,1%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	15,2%	10,1%	6,5%	17,0%	9,9%	11,7%	22,3%	16,4%	7,1%	14,1%	9,9%
Gêne dans le travail	4,9%	7,3%	5,9%	3,0%	13,4%	6,4%	8,4%	10,9%	9,5%	3,7%	8,5%	5,7%
TraITEMENT ou autre soin	3,1%	5,3%	4,0%	1,7%	10,1%	4,4%	4,5%	10,2%	7,0%	2,9%	6,5%	4,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>												
Existence d'un problème	13,3%	17,9%	15,1%	11,7%	19,8%	14,3%	14,5%	23,2%	18,3%	11,6%	17,0%	13,8%
Plaintes ou signes cliniques	11,9%	17,2%	14,1%	11,7%	19,8%	14,3%	14,5%	23,2%	18,3%	11,2%	16,8%	13,5%
Gêne dans le travail	8,8%	12,6%	10,3%	5,6%	9,1%	6,7%	9,5%	12,4%	10,8%	6,9%	10,1%	8,2%
TraITEMENT ou autre soin	6,2%	8,0%	6,9%	4,0%	7,5%	5,1%	5,0%	10,9%	7,6%	4,5%	7,0%	5,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>												
Existence d'un problème	23,2%	21,3%	22,5%	16,5%	26,8%	19,8%	27,0%	30,9%	28,7%	17,7%	22,4%	19,6%
Plaintes ou signes cliniques	21,1%	20,3%	20,8%	16,1%	26,8%	19,6%	26,6%	29,5%	27,8%	17,1%	21,9%	19,0%
Gêne dans le travail	15,7%	12,0%	14,2%	7,8%	13,4%	9,6%	18,0%	19,9%	18,8%	10,9%	12,7%	11,6%
TraITEMENT ou autre soin	9,5%	8,8%	9,2%	3,5%	9,3%	5,4%	10,1%	16,8%	13,0%	6,0%	9,4%	7,4%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>												
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	29,9%	30,0%	29,9%	23,5%	35,7%	27,5%	31,3%	37,0%	33,8%	23,7%	29,5%	26,0%
Plaintes ou signes cliniques	27,7%	28,9%	28,2%	23,1%	35,7%	27,3%	30,9%	36,2%	33,2%	23,0%	29,1%	25,4%
Gêne dans le travail	21,0%	19,3%	20,3%	12,2%	17,0%	13,7%	20,7%	23,0%	21,7%	15,1%	17,1%	15,9%
TraITEMENT ou autre soin	13,0%	13,5%	13,2%	7,2%	14,4%	9,5%	10,7%	20,6%	15,0%	8,6%	13,0%	10,3%