



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2012-2013

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Septembre 2014



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2012-2013 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Provence-Alpes-Côte d'Azur

L'exploitation des données de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a porté sur **4 603 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2012 (n=2378) et 2013 (n=2225).

Au niveau de la région PACA, l'échantillon de salariés ayant participé à Everest, tout du moins concernant les secteurs d'activité, est plus proche du champ des salariés du privé (données Acoss) que de celui des salariés du public et du privé (données DADS, Insee) (tableau 1). Les écarts avec les données Insee, en termes de sexe, d'âge et de catégories socioprofessionnelles sont peu marqués.

Tableau 1 : Comparaison de la répartition de l'échantillon régional PACA 2012-2013 aux données Insee (DADS 2010) et Acoss (2012).

| Caractéristiques générales des salariés | Echantillon PACA 2012-2013 (n=4603) | Données INSEE 2010 (DADS) | Données ACROSS 2012 |
|--|---|---------------------------------|------------------------|
| | % | % | % |
| Sexe | | | |
| Hommes | 53,6 | 51,4 | - |
| Femmes | 46,4 | 48,6 | - |
| Age | | | |
| ≤ 24 ans | 11,6 | 14,7 | - |
| 25-34 ans | 26,3 | 23,9 | - |
| 35-44 ans | 26,3 | 24,6 | - |
| 45- 54 ans | 25,9 | 23,9 | - |
| 55 ans et plus | 9,9 | 12,9 | - |
| Catégorie socioprofessionnelle | | | |
| Artisans, commerçants et chefs d'entreprises | 0,7 | 0,7 | - |
| Cadres et prof. intellectuelles supérieures | 15,3 | 13,2 | - |
| Professions intermédiaires | 23,0 | 19,7 | - |
| Employés | 37,3 | 43,2 | - |
| Ouvriers | 23,7 | 23,2 | - |
| Secteur d'activité | | | |
| Agriculture | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Industrie | 13,3 | 8,4 | 12,0 |
| Construction | 6,2 | 6,5 | 8,6 |
| Commerce | 20,6 | 14,5 | 18,7 |
| Services | 59,8 | 70,5 | 60,7 |

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional PACA 2012-2013 selon les catégories socioprofessionnelles

| Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) | Effectifs | % |
|--|--------------|--------------|
| Agriculteurs | 1 | 0,0 |
| Artisans, commerçants et chefs d'entreprises | 34 | 0,7 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 703 | 15,3 |
| Professions intermédiaires | 1057 | 23,0 |
| Employés | 1716 | 37,3 |
| Ouvriers | 1092 | 23,7 |
| Total général | 4 603 | 100,0 |

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 9 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Construction, Commerce - réparations d'automobile et de motocycles, Transports et entreposage, Hébergement et restauration, Activités financières et d'assurance, Activités spécialisées scientifiques et techniques, Activités de services administratifs et de soutien, Santé humaine et action sociale (tableau 3).

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional PACA 2012-2013 selon les secteurs d'activité

| Activité économique NAF 2008 | Effectifs | % |
|---|-------------|--------------|
| AGRICULTURE | 6 | 0,1 |
| A. Agriculture, sylviculture et pêche | 6 | 0,1 |
| INDUSTRIE | 611 | 13,3 |
| B. Industries extractives | 7 | 0,2 |
| C. Industrie manufacturière | 378 | 8,2 |
| D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné | 172 | 3,7 |
| E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 54 | 1,2 |
| CONSTRUCTION | 287 | 6,2 |
| F. Construction | 287 | 6,2 |
| COMMERCE | 948 | 20,6 |
| G. Commerce; réparations automobile et de motocycles | 948 | 20,6 |
| SERVICES | 2751 | 59,8 |
| H. Transports et entreposage | 248 | 5,4 |
| I. Hébergement et restauration | 356 | 7,7 |
| J. Information et communication | 164 | 3,6 |
| K. Activités financières et d'assurance | 257 | 5,6 |
| L. Activités immobilières | 82 | 1,8 |
| M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 350 | 7,6 |
| N. Activités de services administratifs et de soutien | 305 | 6,6 |
| O. Administration publique | 188 | 4,1 |
| P. Enseignement | 72 | 1,6 |
| Q. Santé humaine et action sociale | 492 | 10,7 |
| R. Arts, spectacles et activités récréatives | 64 | 1,4 |
| S. Autres activités de services | 158 | 3,4 |
| T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 14 | 0,3 |
| U. Activités extra-territoriales | 1 | 0,0 |
| Total général | 4603 | 100,0 |

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

| Description de la population | Hommes n=2469 | Femmes n=2134 | Ensemble n=4603 |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| ≤24 ans | 10,7% | 12,7% | 11,6% |
| 25-34 ans | 27,5% | 24,9% | 26,3% |
| 35-44 ans | 26,1% | 26,5% | 26,3% |
| 45-54 ans | 26,1% | 25,7% | 25,9% |
| 55 ans et plus | 9,6% | 10,3% | 9,9% |
| | | | |
| Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | 1,1% | 0,3% | 0,7% |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 18,1% | 11,9% | 15,3% |
| Professions intermédiaires | 22,4% | 23,6% | 23,0% |
| Employés | 21,3% | 55,8% | 37,3% |
| Ouvriers | 37,1% | 8,3% | 23,7% |
| | | | |
| C. Industrie manufacturière | 10,1% | 6,0% | 8,2% |
| D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné | 5,7% | 1,5% | 3,7% |
| F. Construction | 10,2% | 1,6% | 6,2% |
| G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles | 21,0% | 20,1% | 20,6% |
| H. Transports et entreposage | 7,7% | 2,8% | 5,4% |
| I. Hébergement et restauration | 7,0% | 8,5% | 7,7% |
| J. Information et communication | 4,3% | 2,7% | 3,6% |
| K. Activités financières et d'assurance | 4,6% | 6,7% | 5,6% |
| M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 6,7% | 8,6% | 7,6% |
| N. Activités de services administratifs et de soutien | 6,8% | 6,5% | 6,6% |
| O. Administration publique | 3,0% | 5,3% | 4,1% |
| Q. Santé humaine et action sociale | 4,6% | 17,7% | 10,7% |
| S. Autres activités de services | 1,8% | 5,3% | 3,4% |

| Conditions de travail | Hommes n=2469 | Femmes n=2134 | Ensemble n=4603 |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| - Changement de travail depuis 1 an : | | | |
| Non | 83,2% | 82,4% | 82,8% |
| Oui, raison médicale | 0,8% | 0,7% | 0,7% |
| Oui, autre raison | 14,7% | 15,3% | 15,0% |
| Oui, raison non précisée | 1,3% | 1,6% | 1,4% |
| Travail à temps plein | 90,0% | 70,7% | 81,1% |
| Travail en journée normale | 79,0% | 81,4% | 80,1% |
| Coupures de plus de 2 heures | 18,5% | 20,5% | 19,4% |
| Horaires décalés | 33,4% | 21,3% | 27,9% |
| Horaires irréguliers ou alternés | 25,8% | 25,8% | 25,8% |
| Travail de nuit | 14,0% | 4,5% | 9,7% |
| Déplacements professionnels de plus de 24h | 11,9% | 5,2% | 8,8% |
| - Dépasser ses horaires normaux | | | |
| Jamais | 13,8% | 18,9% | 16,2% |
| Rarement | 41,3% | 46,4% | 43,7% |
| Assez souvent | 29,2% | 25,2% | 27,3% |
| Très souvent | 15,6% | 9,6% | 12,8% |
| - Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause | | | |
| Jamais | 32,5% | 41,0% | 36,4% |
| Rarement | 41,4% | 33,3% | 37,6% |
| Assez souvent | 18,3% | 17,5% | 17,9% |
| Très souvent | 7,8% | 8,2% | 8,0% |
| - Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin | | | |
| Jamais | 32,5% | 35,6% | 34,0% |
| Rarement | 42,7% | 38,9% | 40,9% |
| Assez souvent | 19,0% | 19,5% | 19,2% |
| Très souvent | 5,8% | 6,0% | 5,9% |
| - Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile) | | | |
| 0 | 5,7% | 7,5% | 6,6% |
| 1 | 6,3% | 6,3% | 6,3% |
| 2 | 8,7% | 9,1% | 8,9% |
| 3 | 11,9% | 11,0% | 11,5% |
| 4 | 9,3% | 10,1% | 9,7% |
| 5 | 19,0% | 17,5% | 18,3% |
| 6 | 11,4% | 11,3% | 11,3% |
| 7 | 14,1% | 14,2% | 14,1% |
| 8 | 10,0% | 9,3% | 9,7% |
| 9 | 2,1% | 2,8% | 2,4% |
| 10 | 1,6% | 0,9% | 1,3% |
| Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10) | 39,1% | 38,5% | 38,9% |
| Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue | 51,4% | 53,0% | 52,1% |
| Parmi eux : | | | |
| - Perturbe le travail | 58,2% | 59,3% | 58,7% |
| - Aspect positif du travail | 40,8% | 42,1% | 41,4% |

| Appréciation sur le travail | Hommes n=2469 | Femmes n=2134 | Ensemble n=4603 |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| -Travail permet d'apprendre | | | |
| Non pas du tout | 6,9% | 5,8% | 6,4% |
| Plutôt non | 12,8% | 13,2% | 13,0% |
| Plutôt oui | 45,9% | 45,2% | 45,6% |
| Oui tout à fait | 34,4% | 35,8% | 35,0% |
| -Travail varié | | | |
| Non pas du tout | 5,4% | 5,0% | 5,2% |
| Plutôt non | 14,3% | 15,7% | 14,9% |
| Plutôt oui | 46,8% | 43,9% | 45,5% |
| Oui tout à fait | 33,6% | 35,5% | 34,4% |
| -Choix dans la façon de procéder | | | |
| Non pas du tout | 6,7% | 7,1% | 6,9% |
| Plutôt non | 15,9% | 18,7% | 17,2% |
| Plutôt oui | 47,6% | 45,2% | 46,5% |
| Oui tout à fait | 29,9% | 29,0% | 29,5% |
| -Possibilités suffisantes d'entraide | | | |
| Non pas du tout | 2,9% | 3,8% | 3,3% |
| Plutôt non | 11,4% | 12,0% | 11,7% |
| Plutôt oui | 57,0% | 54,7% | 55,9% |
| Oui tout à fait | 28,7% | 29,5% | 29,1% |
| -Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité | | | |
| Non pas du tout | 2,5% | 2,7% | 2,6% |
| Plutôt non | 10,7% | 12,6% | 11,6% |
| Plutôt oui | 59,0% | 56,9% | 58,0% |
| Oui tout à fait | 27,8% | 27,8% | 27,8% |
| -Travail reconnu | | | |
| Non pas du tout | 5,0% | 6,1% | 5,5% |
| Plutôt non | 14,9% | 16,9% | 15,9% |
| Plutôt oui | 55,9% | 53,5% | 54,8% |
| Oui tout à fait | 24,1% | 23,5% | 23,8% |
| -Faire des choses que l'on désapprouve | | | |
| Non pas du tout | 28,5% | 32,7% | 30,4% |
| Plutôt non | 51,8% | 48,6% | 50,3% |
| Plutôt oui | 16,9% | 15,9% | 16,5% |
| Oui tout à fait | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
| -Travailler avec la peur de perdre son emploi | | | |
| Non pas du tout | 56,4% | 59,7% | 57,9% |
| Plutôt non | 31,1% | 29,1% | 30,2% |
| Plutôt oui | 9,0% | 7,9% | 8,5% |
| Oui tout à fait | 3,5% | 3,3% | 3,4% |

| Charge physique du poste de travail | Hommes n=2469 | Femmes n=2134 | Ensemble n=4603 |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| Postures contraignantes : | | | |
| Non jamais | 42,5% | 46,7% | 44,5% |
| Oui parfois | 39,7% | 36,6% | 38,2% |
| Oui souvent | 17,8% | 16,7% | 17,3% |
| Difficultés | | | |
| Pas de postures contraignantes | 42,5% | 46,7% | 44,5% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible | 26,1% | 24,9% | 25,5% |
| Postures contraignantes, pas difficile ou pénible | 28,1% | 24,5% | 26,4% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p. | 3,3% | 3,9% | 3,6% |
| Effort, port de charges lourdes : | | | |
| Non jamais | 45,8% | 56,7% | 50,9% |
| Oui parfois | 36,6% | 29,8% | 33,4% |
| Oui souvent | 17,6% | 13,5% | 15,7% |
| Difficultés | | | |
| Pas d'effort, port de charges lourdes | 45,8% | 56,7% | 50,9% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible | 22,9% | 21,8% | 22,4% |
| Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible | 27,3% | 17,7% | 22,8% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p. | 4,0% | 3,8% | 3,9% |
| Gestes répétitifs : | | | |
| Non jamais | 39,9% | 36,4% | 38,3% |
| Oui parfois | 27,6% | 27,5% | 27,6% |
| Oui souvent | 32,5% | 36,2% | 34,2% |
| Difficultés | | | |
| Pas de gestes répétitifs | 39,9% | 36,4% | 38,3% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible | 16,0% | 17,2% | 16,6% |
| Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible | 39,2% | 39,9% | 39,5% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé | 4,9% | 6,6% | 5,6% |
| Importants déplacements à pieds : | | | |
| Non jamais | 56,0% | 69,6% | 62,3% |
| Oui parfois | 22,7% | 14,2% | 18,8% |
| Oui souvent | 21,3% | 16,1% | 18,9% |
| Difficultés | | | |
| Pas d'importants déplacements à pieds | 56,0% | 69,6% | 62,3% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible | 10,6% | 8,8% | 9,8% |
| Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible | 30,2% | 19,0% | 25,0% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p. | 3,2% | 2,6% | 2,9% |
| Station debout prolongée : | | | |
| Non jamais | 42,3% | 49,0% | 45,4% |
| Oui parfois | 24,5% | 15,4% | 20,3% |
| Oui souvent | 33,2% | 35,6% | 34,3% |
| Difficultés | | | |
| Pas de station debout prolongée | 42,3% | 49,0% | 45,4% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible | 16,7% | 20,6% | 18,5% |
| Station debout prolongée, pas difficile ou pénible | 35,9% | 25,2% | 31,0% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p. | 5,1% | 5,2% | 5,2% |

| Expositions | Hommes n=2469 | Femmes n=2134 | Ensemble n=4603 |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Produits chimiques | 23,6% | 14,2% | 19,3% |
| Poussières, fumées | 39,6% | 16,6% | 28,9% |
| Rx ionisants | 2,4% | 2,0% | 2,2% |
| Vibrations | 23,4% | 3,6% | 14,2% |
| Gêne sonore | 39,8% | 24,3% | 32,6% |
| Bruit > 80db | 29,8% | 10,0% | 20,7% |
| Contrainte visuelle | 26,0% | 25,2% | 25,6% |
| Conduite routière prolongée | 20,8% | 6,7% | 14,2% |
| Chaleur intense | 20,1% | 10,0% | 15,4% |
| Froid intense | 18,5% | 7,3% | 13,3% |
| Intempéries | 25,5% | 4,3% | 15,7% |
| Pression psychologique | 23,5% | 20,7% | 22,2% |
| Agent biologique | 5,3% | 7,9% | 6,5% |
| Contact avec le public | 65,7% | 73,9% | 69,5% |

| Formation | Hommes n=2469 | Femmes n=2134 | Ensemble n=4603 |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| A bénéficié d'une formation depuis un an : | 44,8% | 44,4% | 44,6% |
| Parmi eux : | | | |
| - En rapport avec le travail actuel | 90,2% | 86,8% | 88,7% |
| - En rapport avec le travail futur | 16,8% | 14,4% | 15,7% |
| - Formation d'intérêt général | 49,3% | 41,7% | 45,9% |
| Rôle de formateur ou tuteur depuis un an | 26,5% | 19,8% | 23,4% |

| Mode de vie | Hommes n=2469 | Femmes n=2134 | Ensemble n=4603 |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| Activité sportive régulière | 57,7% | 53,0% | 55,5% |
| Consommation de tabac | 40,0% | 37,2% | 38,7% |
| Consommation de tabac sup à 15 cig/jour | 11,8% | 5,9% | 9,1% |
| Consommation de café | 82,4% | 70,7% | 77,0% |
| Consommation de café sup à 4 tasses/jour | 14,6% | 10,3% | 12,6% |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 17,8% | 17,0% | 17,5% |

| Etat de santé | <45 ans | | | ≥45 ans | | | Ensemble n=4603 |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Hommes n= 1588 | Femmes n=1367 | Ensemble n=2955 | Hommes n=881 | Femmes n=767 | Ensemble n=1648 | |
| Indice de masse corporelle | | | | | | | |
| - Normaux ou maigres | 62,1% | 76,6% | 68,9% | 45,5% | 66,6% | 55,4% | 64,1% |
| - Surpoids | 28,7% | 15,5% | 22,5% | 38,1% | 23,0% | 31,0% | 25,6% |
| - Obeses | 9,2% | 7,9% | 8,6% | 16,4% | 10,4% | 13,6% | 10,4% |
| Appareil respiratoire | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,6% | 2,2% | 2,4% | 4,7% | 2,4% | 3,7% | 2,9% |
| Plautes ou signes cliniques | 2,6% | 2,1% | 2,4% | 3,6% | 2,4% | 3,0% | 2,6% |
| Gêne dans le travail | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% |
| Traitemen ou autre soin | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 3,0% | 1,7% | 2,4% | 1,8% |
| Appareil cardio vasculaire | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,2% | 1,8% | 1,5% | 4,8% | 4,4% | 4,6% | 2,6% |
| Plautes ou signes cliniques | 1,0% | 1,7% | 1,3% | 4,1% | 3,7% | 3,9% | 2,3% |
| Gêne dans le travail | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 1,9% | 1,3% | 0,7% |
| Traitemen ou autre soin | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 3,1% | 3,3% | 3,2% | 1,5% |
| HTA | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,6% | 1,0% | 1,8% | 13,8% | 11,2% | 12,6% | 5,7% |
| Plautes ou signes cliniques | 2,5% | 0,8% | 1,7% | 11,4% | 10,0% | 10,8% | 5,0% |
| Gêne dans le travail | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 1,3% | 0,7% | 0,3% |
| Traitemen ou autre soin | 1,1% | 0,4% | 0,8% | 8,7% | 9,1% | 8,9% | 3,7% |
| Lassitude, fatigue | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 10,4% | 13,8% | 11,9% | 11,6% | 20,9% | 15,9% | 13,4% |
| Plautes ou signes cliniques | 10,1% | 13,6% | 11,7% | 11,6% | 20,5% | 15,7% | 13,2% |
| Gêne dans le travail | 4,6% | 8,0% | 6,2% | 5,8% | 11,8% | 8,6% | 7,0% |
| Traitemen ou autre soin | 0,7% | 3,0% | 1,8% | 2,4% | 5,3% | 3,8% | 2,5% |
| Anxiété, nervosité | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 8,9% | 12,2% | 10,4% | 10,7% | 19,3% | 14,7% | 12,0% |
| Plautes ou signes cliniques | 8,6% | 11,9% | 10,1% | 10,3% | 19,1% | 14,4% | 11,6% |
| Gêne dans le travail | 3,8% | 6,9% | 5,2% | 5,1% | 10,0% | 7,4% | 6,0% |
| Traitemen ou autre soin | 1,5% | 3,5% | 2,4% | 2,6% | 6,2% | 4,3% | 3,1% |
| Troubles du sommeil | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 9,2% | 11,9% | 10,4% | 13,8% | 19,6% | 16,5% | 12,6% |
| Plautes ou signes cliniques | 8,9% | 11,6% | 10,1% | 13,6% | 18,9% | 16,1% | 12,3% |
| Gêne dans le travail | 3,5% | 5,0% | 4,2% | 4,7% | 7,5% | 6,0% | 4,8% |
| Traitemen ou autre soin | 0,8% | 3,3% | 2,0% | 3,0% | 6,4% | 4,6% | 2,9% |
| ➤ Troubles neuro psychiques <i>(association des 3 signes ci-dessus)</i> | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,3% | 4,3% | 3,2% | 3,2% | 8,0% | 5,4% | 4,0% |
| Plautes ou signes cliniques | 2,0% | 4,1% | 3,0% | 3,0% | 7,5% | 5,1% | 3,7% |
| Gêne dans le travail | 0,8% | 2,2% | 1,5% | 2,0% | 3,7% | 2,8% | 1,9% |
| Traitemen ou autre soin | 0,1% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 2,3% | 1,4% | 0,9% |

| Etat de santé | <45 ans | | | ≥45 ans | | | Ensemble n=4603 |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Hommes n= 1588 | Femmes n=1367 | Ensemble n=2955 | Hommes n=881 | Femmes n=767 | Ensemble n=1648 | |
| Digestif | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 3,2% | 5,4% | 4,2% | 6,0% | 7,6% | 6,7% | 5,1% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 3,1% | 5,3% | 4,1% | 5,5% | 7,3% | 6,4% | 4,9% |
| Gêne dans le travail | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,8% | 1,2% | 1,0% |
| Traitemennt ou autre soin | 1,7% | 1,8% | 1,8% | 2,9% | 4,8% | 3,8% | 2,5% |
| Dermatologie | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,9% | 4,1% | 3,5% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,4% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 2,7% | 4,0% | 3,3% | 3,0% | 3,3% | 3,2% | 3,3% |
| Gêne dans le travail | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 1,2% | 0,7% | 0,7% |
| Traitemennt ou autre soin | 1,2% | 2,4% | 1,7% | 1,9% | 2,4% | 2,1% | 1,9% |
| Troubles de l'audition | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,5% | 1,3% | 2,0% | 8,8% | 4,1% | 6,6% | 3,6% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 2,3% | 1,1% | 1,8% | 8,5% | 3,8% | 6,3% | 3,4% |
| Gêne dans le travail | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 2,7% | 1,9% | 2,3% | 1,1% |
| Traitemennt ou autre soin | 0,2% | 0,5% | 0,3% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% |
| Troubles ostéoarticulaires de l'épaule | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,2% | 4,3% | 4,2% | 7,7% | 11,3% | 9,4% | 6,1% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 3,9% | 4,3% | 4,1% | 7,6% | 10,9% | 9,1% | 5,9% |
| Gêne dans le travail | 2,1% | 2,6% | 2,4% | 4,1% | 8,2% | 6,0% | 3,7% |
| Traitemennt ou autre soin | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 3,0% | 6,4% | 4,6% | 2,4% |
| Troubles ostéoarticulaires du coude | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 3,9% | 4,4% | 4,2% | 2,6% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 3,7% | 4,3% | 4,0% | 2,4% |
| Gêne dans le travail | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 2,2% | 3,5% | 2,8% | 1,8% |
| Traitemennt ou autre soin | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 1,7% | 2,7% | 2,2% | 1,2% |
| Troubles ostéoarticulaires du poignet | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,7% | 4,1% | 3,4% | 4,6% | 8,3% | 6,3% | 4,4% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 2,5% | 4,0% | 3,2% | 4,3% | 8,0% | 6,0% | 4,2% |
| Gêne dans le travail | 1,7% | 2,4% | 2,0% | 2,8% | 5,6% | 4,1% | 2,8% |
| Traitemennt ou autre soin | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 2,0% | 4,2% | 3,0% | 1,8% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus) | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 7,3% | 7,9% | 7,6% | 13,0% | 17,8% | 15,2% | 10,3% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 6,9% | 7,9% | 7,4% | 12,7% | 17,3% | 14,8% | 10,0% |
| Gêne dans le travail | 4,3% | 4,7% | 4,5% | 7,2% | 12,7% | 9,8% | 6,4% |
| Traitemennt ou autre soin | 2,1% | 2,8% | 2,4% | 5,5% | 10,0% | 7,6% | 4,3% |

| Etat de santé | <45 ans | | | ≥45 ans | | | Ensemble n=4603 |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Hommes n= 1588 | Femmes n=1367 | Ensemble n=2955 | Hommes n=881 | Femmes n=767 | Ensemble n=1648 | |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 6,2% | 5,2% | 5,7% | 11,3% | 9,1% | 10,3% | 7,4% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 6,1% | 5,1% | 5,6% | 10,9% | 9,1% | 10,1% | 7,2% |
| Gêne dans le travail | 3,3% | 2,5% | 2,9% | 6,0% | 5,5% | 5,8% | 3,9% |
| Traitemennt ou autre soin | 2,8% | 2,0% | 2,4% | 5,4% | 4,6% | 5,0% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,3% | 8,2% | 6,1% | 6,1% | 12,6% | 9,1% | 7,2% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 4,2% | 7,9% | 6,0% | 5,9% | 12,3% | 8,9% | 7,0% |
| Gêne dans le travail | 2,6% | 4,8% | 3,7% | 3,1% | 9,0% | 5,9% | 4,4% |
| Traitemennt ou autre soin | 1,7% | 3,6% | 2,6% | 2,9% | 6,5% | 4,6% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolumbaires | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 14,0% | 13,8% | 13,9% | 18,4% | 20,0% | 19,2% | 15,8% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 13,5% | 13,0% | 13,3% | 17,9% | 19,6% | 18,7% | 15,2% |
| Gêne dans le travail | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 11,7% | 13,8% | 12,7% | 9,7% |
| Traitemennt ou autre soin | 4,0% | 5,0% | 4,4% | 9,0% | 10,4% | 9,6% | 6,3% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i> | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 16,5% | 18,9% | 17,6% | 21,0% | 26,6% | 23,6% | 19,8% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 16,0% | 18,1% | 17,0% | 20,5% | 26,2% | 23,2% | 19,2% |
| Gêne dans le travail | 9,5% | 11,1% | 10,2% | 13,0% | 18,8% | 15,7% | 12,2% |
| Traitemennt ou autre soin | 5,0% | 7,7% | 6,3% | 10,4% | 13,4% | 11,8% | 8,2% |

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

| Description de la population | Cadres n=703 | Intermédiaires n=1057 | Employés n=1716 | Ouvriers n=1092 | Base Everest n=4603 |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Répartition hommes / femmes | 63,7% / 36,3% | 52,3% / 47,7% | 30,6% / 69,4% | 83,8% / 16,2% | 53,6% / 46,4% |
| ≤24 ans | 2,3% | 6,6% | 17,4% | 13,6% | 11,6% |
| 25-34 ans | 28,2% | 28,4% | 24,8% | 26,0% | 26,3% |
| 35-44 ans | 32,1% | 27,9% | 24,2% | 24,1% | 26,3% |
| 45-54 ans | 26,6% | 27,4% | 24,1% | 26,2% | 25,9% |
| 55 ans et plus | 10,8% | 9,6% | 9,5% | 10,2% | 9,9% |
| C. Industrie manufacturière | 9,4% | 9,2% | 3,4% | 14,4% | 8,2% |
| D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné | 7,8% | 7,9% | 0,4% | 2,5% | 3,7% |
| F. Construction | 1,4% | 3,8% | 2,5% | 17,5% | 6,2% |
| G. Commerce ; réparations automobiles et de motocycles | 9,7% | 17,9% | 28,0% | 18,4% | 20,6% |
| H. Transports et entreposage | 2,8% | 1,5% | 2,8% | 14,9% | 5,4% |
| I. Hébergement et restauration | 2,4% | 4,1% | 13,0% | 6,3% | 7,7% |
| J. Information et communication | 15,8% | 2,6% | 1,2% | 0,5% | 3,6% |
| K. Activités financières et d'assurance | 9,5% | 9,0% | 5,2% | 0,4% | 5,6% |
| M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 18,9% | 7,3% | 6,5% | 2,4% | 7,6% |
| N. Activités de services admin. et de soutien | 3,7% | 3,4% | 7,1% | 11,0% | 6,6% |
| O. Administration publique | 4,0% | 3,7% | 5,8% | 2,0% | 4,1% |
| Q. Santé humaine et action sociale | 3,8% | 16,1% | 14,6% | 3,6% | 10,7% |
| S. Autres activités de services | 2,4% | 3,8% | 4,8% | 1,4% | 3,4% |

| Conditions de travail | Cadres n=703 | Intermédiaires n=1057 | Employés n=1716 | Ouvriers n=1092 | Base Everest n=4603 |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| - Changement de travail depuis 1 an : | | | | | |
| Non | 85,7% | 84,6% | 80,7% | 82,6% | 82,8% |
| Oui, raison médicale | 0,3% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 0,7% |
| Oui, autre raison | 12,8% | 13,8% | 16,7% | 14,9% | 15,0% |
| Oui, raison non précisée | 1,1% | 1,0% | 1,6% | 1,8% | 1,4% |
| Travail à temps plein | 90,2% | 85,5% | 71,1% | 86,0% | 81,1% |
| Travail en journée normale | 89,1% | 83,2% | 78,4% | 73,7% | 80,1% |
| Coupures de plus de 2 heures | 14,4% | 14,0% | 23,5% | 21,8% | 19,4% |
| Horaires décalés | 20,1% | 24,9% | 27,2% | 36,5% | 27,9% |
| Horaires irréguliers ou alternés | 15,5% | 25,3% | 29,1% | 27,9% | 25,8% |
| Travail de nuit | 2,9% | 8,4% | 9,0% | 16,4% | 9,7% |
| Déplacements professionnels de plus de 24h | 26,1% | 10,5% | 1,5% | 6,8% | 8,8% |
| - Dépasser ses horaires normaux | | | | | |
| Jamais | 3,9% | 10,1% | 22,7% | 20,0% | 16,2% |
| Rarement | 29,9% | 42,6% | 48,3% | 47,3% | 43,7% |
| Assez souvent | 38,8% | 30,9% | 22,3% | 24,5% | 27,3% |
| Très souvent | 27,5% | 16,4% | 6,6% | 8,3% | 12,8% |
| - Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause | | | | | |
| Jamais | 18,2% | 28,0% | 46,0% | 42,0% | 36,4% |
| Rarement | 45,0% | 40,1% | 33,4% | 37,1% | 37,6% |
| Assez souvent | 25,7% | 23,4% | 13,7% | 14,3% | 17,9% |
| Très souvent | 11,1% | 8,5% | 6,9% | 6,6% | 8,0% |
| - Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin | | | | | |
| Jamais | 15,7% | 24,6% | 41,0% | 43,8% | 34,0% |
| Rarement | 45,4% | 44,6% | 38,2% | 38,6% | 40,9% |
| Assez souvent | 29,3% | 24,2% | 15,6% | 13,8% | 19,2% |
| Très souvent | 9,7% | 6,6% | 5,2% | 3,8% | 5,9% |
| - Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile) | | | | | |
| 0 | 1,9% | 4,2% | 9,4% | 7,4% | 6,6% |
| 1 | 3,7% | 5,1% | 6,8% | 8,1% | 6,3% |
| 2 | 8,6% | 9,3% | 9,1% | 8,4% | 8,9% |
| 3 | 9,3% | 10,9% | 12,6% | 11,6% | 11,5% |
| 4 | 9,7% | 8,8% | 10,4% | 9,3% | 9,7% |
| 5 | 17,0% | 18,6% | 17,1% | 20,9% | 18,3% |
| 6 | 14,6% | 11,7% | 9,9% | 11,0% | 11,3% |
| 7 | 20,3% | 16,5% | 12,3% | 10,9% | 14,1% |
| 8 | 11,7% | 11,1% | 8,1% | 9,3% | 9,7% |
| 9 | 2,4% | 2,8% | 2,5% | 2,1% | 2,4% |
| 10 | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,0% | 1,3% |
| Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10) | 49,8% | 42,9% | 34,6% | 34,3% | 38,9% |
| Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue | 72,0% | 60,5% | 47,8% | 37,4% | 52,1% |
| Parmi eux : | | | | | |
| - Perturbe le travail | 66,8% | 63,3% | 52,4% | 54,2% | 58,7% |
| - Aspect positif du travail | 36,7% | 39,1% | 46,2% | 39,6% | 41,4% |

| Appréciation sur le travail | Cadres n=703 | Intermédiaires n=1057 | Employés n=1716 | Ouvriers n=1092 | Base Everest n=4603 |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| -Travail permet d'apprendre | | | | | |
| Non pas du tout | 1,0% | 2,4% | 6,4% | 14,0% | 6,4% |
| Plutôt non | 8,0% | 8,8% | 14,9% | 17,7% | 13,0% |
| Plutôt oui | 46,5% | 48,7% | 46,4% | 40,9% | 45,6% |
| Oui tout à fait | 44,5% | 40,1% | 32,3% | 27,5% | 35,0% |
| -Travail varié | | | | | |
| Non pas du tout | 1,3% | 1,9% | 5,8% | 10,1% | 5,2% |
| Plutôt non | 7,3% | 10,0% | 18,5% | 19,5% | 14,9% |
| Plutôt oui | 45,8% | 47,5% | 44,7% | 45,0% | 45,5% |
| Oui tout à fait | 45,6% | 40,7% | 30,9% | 25,4% | 34,4% |
| -Choix dans la façon de procéder | | | | | |
| Non pas du tout | 2,6% | 3,9% | 9,0% | 9,4% | 6,9% |
| Plutôt non | 11,7% | 17,5% | 19,5% | 17,4% | 17,2% |
| Plutôt oui | 51,0% | 47,4% | 44,7% | 46,6% | 46,5% |
| Oui tout à fait | 34,7% | 31,2% | 26,9% | 26,5% | 29,5% |
| -Possibilités suffisantes d'entraide | | | | | |
| Non pas du tout | 1,7% | 1,9% | 3,9% | 4,9% | 3,3% |
| Plutôt non | 15,0% | 11,5% | 10,5% | 11,6% | 11,7% |
| Plutôt oui | 56,3% | 57,4% | 54,5% | 57,2% | 55,9% |
| Oui tout à fait | 26,9% | 29,1% | 31,1% | 26,2% | 29,1% |
| -Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité | | | | | |
| Non pas du tout | 1,2% | 2,2% | 2,4% | 4,2% | 2,6% |
| Plutôt non | 15,8% | 13,6% | 11,1% | 8,1% | 11,6% |
| Plutôt oui | 62,8% | 60,8% | 56,2% | 55,5% | 58,0% |
| Oui tout à fait | 20,2% | 23,3% | 30,4% | 32,2% | 27,8% |
| -Travail reconnu | | | | | |
| Non pas du tout | 2,9% | 4,3% | 6,6% | 6,9% | 5,5% |
| Plutôt non | 14,8% | 18,0% | 15,7% | 15,2% | 15,9% |
| Plutôt oui | 60,1% | 54,9% | 53,8% | 53,0% | 54,8% |
| Oui tout à fait | 22,3% | 22,8% | 23,9% | 25,0% | 23,8% |
| -Faire des choses que l'on désapprouve | | | | | |
| Non pas du tout | 25,6% | 24,4% | 35,1% | 31,6% | 30,4% |
| Plutôt non | 58,8% | 55,6% | 45,7% | 47,0% | 50,3% |
| Plutôt oui | 13,4% | 17,5% | 16,2% | 18,3% | 16,5% |
| Oui tout à fait | 2,3% | 2,5% | 2,9% | 3,2% | 2,8% |
| -Travailler avec la peur de perdre son emploi | | | | | |
| Non pas du tout | 52,2% | 57,2% | 60,5% | 58,0% | 57,9% |
| Plutôt non | 36,5% | 31,8% | 27,6% | 28,9% | 30,2% |
| Plutôt oui | 8,9% | 8,6% | 7,8% | 9,2% | 8,5% |
| Oui tout à fait | 2,3% | 2,5% | 4,2% | 3,9% | 3,4% |

| Charge physique du poste de travail | Cadres n=703 | Intermédiaires n=1057 | Employés n=1716 | Ouvriers n=1092 | Base Everest n=4603 |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Postures contraignantes : | | | | | |
| Fréquence | | | | | |
| Non jamais | 73,0% | 49,1% | 43,8% | 21,9% | 44,5% |
| Oui parfois | 22,5% | 38,0% | 38,3% | 48,8% | 38,2% |
| Oui souvent | 4,4% | 12,9% | 17,9% | 29,3% | 17,3% |
| Difficultés | | | | | |
| Pas de postures contraignantes | 73,0% | 49,1% | 43,8% | 21,9% | 44,5% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible | 9,4% | 22,6% | 26,7% | 37,4% | 25,5% |
| Postures contraignantes, pas difficile ou pénible | 15,8% | 24,6% | 25,6% | 36,2% | 26,4% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé | 1,7% | 3,7% | 3,9% | 4,4% | 3,6% |
| Effort, port de charges lourdes : | | | | | |
| Fréquence | | | | | |
| Non jamais | 84,3% | 57,3% | 50,4% | 23,5% | 50,9% |
| Oui parfois | 13,6% | 33,7% | 33,1% | 46,4% | 33,4% |
| Oui souvent | 2,1% | 9,0% | 16,5% | 30,0% | 15,7% |
| Difficultés | | | | | |
| Pas d'effort, port de charges lourdes | 84,3% | 57,3% | 50,4% | 23,5% | 50,9% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible | 4,7% | 18,0% | 23,7% | 36,4% | 22,4% |
| Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible | 9,0% | 21,4% | 21,9% | 34,6% | 22,8% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p. | 2,0% | 3,3% | 4,0% | 5,5% | 3,9% |
| Gestes répétitifs : | | | | | |
| Fréquence | | | | | |
| Non jamais | 70,4% | 52,6% | 30,4% | 15,1% | 38,3% |
| Oui parfois | 19,1% | 26,1% | 28,1% | 33,9% | 27,6% |
| Oui souvent | 10,4% | 21,3% | 41,5% | 51,1% | 34,2% |
| Difficultés | | | | | |
| Pas de gestes répétitifs | 70,4% | 52,6% | 30,4% | 15,1% | 38,3% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible | 4,1% | 11,0% | 18,6% | 27,1% | 16,6% |
| Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible | 22,3% | 32,0% | 44,6% | 50,4% | 39,5% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé | 3,1% | 4,4% | 6,4% | 7,4% | 5,6% |
| Importants déplacements à pieds : | | | | | |
| Fréquence | | | | | |
| Non jamais | 81,9% | 63,0% | 62,9% | 47,4% | 62,3% |
| Oui parfois | 13,8% | 20,0% | 15,9% | 25,6% | 18,8% |
| Oui souvent | 4,3% | 17,0% | 21,2% | 27,0% | 18,9% |
| Difficultés | | | | | |
| Pas d'importants déplacements à pieds | 81,9% | 63,0% | 62,9% | 47,4% | 62,3% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible | 3,2% | 8,7% | 10,1% | 14,9% | 9,8% |
| Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible | 12,8% | 24,9% | 24,2% | 34,7% | 25,0% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p. | 2,1% | 3,4% | 2,8% | 3,0% | 2,9% |
| Station debout prolongée : | | | | | |
| Fréquence | | | | | |
| Non jamais | 79,5% | 50,0% | 40,2% | 26,5% | 45,4% |
| Oui parfois | 14,3% | 24,9% | 17,6% | 24,0% | 20,3% |
| Oui souvent | 6,2% | 25,2% | 42,2% | 49,5% | 34,3% |
| Difficultés | | | | | |
| Pas de station debout prolongée | 79,5% | 50,0% | 40,2% | 26,5% | 45,4% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible | 4,5% | 15,5% | 22,0% | 25,3% | 18,5% |
| Station debout prolongée, pas difficile ou pénible | 14,0% | 30,1% | 32,0% | 41,3% | 31,0% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé | 2,0% | 4,4% | 5,8% | 6,9% | 5,2% |

| Expositions | Cadres n=703 | Intermédiaires n=1057 | Employés n=1716 | Ouvriers n=1092 | Base Everest n=4603 |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produits chimiques | 7,6% | 18,7% | 15,0% | 34,2% | 19,3% |
| Poussières, fumées | 9,0% | 22,7% | 20,3% | 61,5% | 28,9% |
| Rx ionisants | 2,6% | 3,3% | 1,7% | 2,0% | 2,2% |
| Vibrations | 3,4% | 9,1% | 4,5% | 41,9% | 14,2% |
| Gêne sonore | 19,2% | 31,1% | 25,0% | 55,5% | 32,6% |
| Bruit > 80db | 7,6% | 17,4% | 11,1% | 48,0% | 20,7% |
| Contrainte visuelle | 31,2% | 30,0% | 22,6% | 22,7% | 25,6% |
| Conduite routière prolongée | 16,4% | 19,9% | 5,1% | 21,6% | 14,2% |
| Chaleur intense | 4,8% | 12,6% | 11,8% | 31,0% | 15,4% |
| Froid intense | 3,8% | 9,7% | 9,4% | 29,2% | 13,3% |
| Intempéries | 5,4% | 13,5% | 7,4% | 37,5% | 15,7% |
| Pression psychologique | 25,3% | 28,3% | 19,3% | 18,8% | 22,2% |
| Agent biologique | 2,6% | 9,2% | 6,6% | 6,4% | 6,5% |
| Contact avec le public | 50,4% | 75,0% | 79,8% | 59,6% | 69,5% |

| Formation | Cadres n=703 | Intermédiaires n=1057 | Employés n=1716 | Ouvriers n=1092 | Base Everest n=4603 |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| A bénéficié d'une formation depuis un an : | 55,8% | 53,5% | 41,7% | 32,9% | 44,6% |
| Parmi eux : | | | | | |
| - En rapport avec le travail actuel | 92,9% | 91,3% | 85,2% | 86,3% | 88,7% |
| - En rapport avec le travail futur | 12,9% | 13,3% | 17,4% | 18,8% | 15,7% |
| - Formation d'intérêt général | 47,2% | 47,4% | 41,6% | 49,8% | 45,9% |
| Rôle de formateur ou tuteur depuis un an | 36,1% | 32,0% | 15,9% | 17,5% | 23,4% |

| Mode de vie | Cadres n=703 | Intermédiaires n=1057 | Employés n=1716 | Ouvriers n=1092 | Base Everest n=4603 |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Activité sportive régulière | 60,5% | 60,6% | 53,8% | 49,6% | 55,5% |
| Consommation de tabac | 24,3% | 37,0% | 40,3% | 47,5% | 38,7% |
| Consommation de tabac sup à 15 cig/jour | 5,2% | 6,9% | 8,9% | 14,0% | 9,1% |
| Consommation de café | 80,0% | 78,4% | 72,6% | 80,8% | 77,0% |
| Consommation de café sup à 4 tasses/jour | 11,1% | 11,7% | 12,1% | 15,3% | 12,6% |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 23,3% | 21,5% | 14,3% | 15,0% | 17,5% |

Rapport Evrest 2012-2013 – Région PACA

| Etat de santé | Cadres | | | Intermédiaires | | | Employés | | | Ouvriers | | | Base Evrest | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | <45 ans n=440 | ≥ 45 ans n=263 | Ensemble n=703 | <45 ans n=665 | ≥ 45 ans n=392 | Ensemble n=1057 | <45 ans n=1140 | ≥ 45 ans n=576 | Ensemble n=1716 | <45 ans n=695 | ≥ 45 ans n=397 | Ensemble n=1092 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Global n=4603 |
| Indice de masse corporelle | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Normaux ou maigres | 70,6% | 50,2% | 63,2% | 68,5% | 54,9% | 63,5% | 72,9% | 64,4% | 70,0% | 61,8% | 46,7% | 56,3% | 68,9% | 55,4% | 64,1% |
| - Surpoids | 22,5% | 38,1% | 28,2% | 23,1% | 32,4% | 26,5% | 18,8% | 25,3% | 21,0% | 27,9% | 32,6% | 29,7% | 22,5% | 31,0% | 25,6% |
| - Obeses | 6,9% | 11,7% | 8,7% | 8,4% | 12,6% | 10,0% | 8,3% | 10,4% | 9,0% | 10,3% | 20,6% | 14,1% | 8,6% | 13,6% | 10,4% |
| Appareil respiratoire | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 0,9% | 3,4% | 1,9% | 3,2% | 3,9% | 3,5% | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 5,1% | 3,5% | 2,4% | 3,7% | 2,9% |
| Plaintes ou signes cliniques | 0,9% | 3,1% | 1,7% | 3,2% | 3,1% | 3,2% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,5% | 4,1% | 3,1% | 2,4% | 3,0% | 2,6% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 1,5% | 0,6% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Traitement ou autre soin | 0,5% | 2,7% | 1,3% | 2,3% | 2,4% | 2,3% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 0,9% | 3,6% | 1,9% | 1,4% | 2,4% | 1,8% |
| Appareil cardio vasculaire | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 0,9% | 6,5% | 3,0% | 2,2% | 3,1% | 2,5% | 1,6% | 4,6% | 2,6% | 0,9% | 4,4% | 2,1% | 1,5% | 4,6% | 2,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 0,9% | 6,2% | 2,9% | 2,2% | 2,9% | 2,4% | 1,4% | 3,6% | 2,1% | 0,7% | 3,9% | 1,9% | 1,3% | 3,9% | 2,3% |
| Gêne dans le travail | 0,2% | 1,9% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,3% | 2,1% | 0,9% | 0,4% | 1,3% | 0,7% |
| Traitement ou autre soin | 0,2% | 5,4% | 2,2% | 0,6% | 2,1% | 1,2% | 0,7% | 3,0% | 1,5% | 0,4% | 2,8% | 1,3% | 0,6% | 3,2% | 1,5% |
| HTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,6% | 12,0% | 5,5% | 3,4% | 12,9% | 6,9% | 1,1% | 11,7% | 4,7% | 1,8% | 13,9% | 6,2% | 1,8% | 12,6% | 5,7% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,6% | 8,9% | 4,4% | 3,4% | 11,1% | 6,2% | 0,8% | 9,9% | 3,9% | 1,6% | 12,9% | 5,7% | 1,7% | 10,8% | 5,0% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 0,0% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 0,7% | 0,3% | 0,0% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 0,7% | 0,3% |
| Traitement ou autre soin | 0,7% | 9,3% | 3,9% | 1,4% | 9,8% | 4,5% | 0,5% | 8,4% | 3,2% | 0,6% | 8,5% | 3,5% | 0,8% | 8,9% | 3,7% |
| Digestif | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 5,2% | 7,3% | 6,0% | 4,7% | 9,2% | 6,4% | 4,5% | 7,4% | 5,5% | 2,5% | 3,2% | 2,8% | 4,2% | 6,7% | 5,1% |
| Plaintes ou signes cliniques | 5,2% | 6,6% | 5,7% | 4,5% | 9,0% | 6,2% | 4,4% | 7,2% | 5,3% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 4,1% | 6,4% | 4,9% |
| Gêne dans le travail | 0,9% | 0,0% | 0,6% | 1,2% | 2,1% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 1,2% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 1,0% |
| Traitement ou autre soin | 2,1% | 3,5% | 2,6% | 2,2% | 5,0% | 3,2% | 1,7% | 4,2% | 2,5% | 1,2% | 2,4% | 1,6% | 1,8% | 3,8% | 2,5% |
| Dermatologie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,0% | 2,3% | 3,3% | 2,5% | 3,1% | 2,7% | 4,5% | 3,0% | 4,0% | 2,4% | 4,6% | 3,2% | 3,5% | 3,3% | 3,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 3,7% | 2,3% | 3,2% | 2,3% | 2,9% | 2,5% | 4,3% | 3,0% | 3,9% | 2,2% | 4,4% | 3,0% | 3,3% | 3,2% | 3,3% |
| Gêne dans le travail | 0,2% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,5% | 1,0% | 0,3% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Traitement ou autre soin | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 2,2% | 2,1% | 2,2% | 0,7% | 2,6% | 1,4% | 1,7% | 2,1% | 1,9% |

| Etat de santé | Cadres | | | Intermédiaires | | | Employés | | | Ouvriers | | | Base Evrest | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | <45 ans n=440 | ≥ 45 ans n=263 | Ensemble n=703 | <45 ans n=665 | ≥ 45 ans n=392 | Ensemble n=1057 | <45 ans n=1140 | ≥ 45 ans n=576 | Ensemble n=1716 | <45 ans n=695 | ≥ 45 ans n=397 | Ensemble n=1092 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Global n=4603 |
| Lassitude, fatigue | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 10,0% | 16,9% | 12,6% | 13,1% | 17,3% | 14,7% | 13,7% | 18,9% | 15,4% | 8,8% | 10,0% | 9,2% | 11,9% | 15,9% | 13,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 9,6% | 16,9% | 12,4% | 12,9% | 17,3% | 14,5% | 13,4% | 18,7% | 15,2% | 8,8% | 9,5% | 9,1% | 11,7% | 15,7% | 13,2% |
| Gêne dans le travail | 5,2% | 8,2% | 6,3% | 6,6% | 9,5% | 7,7% | 7,5% | 10,7% | 8,6% | 4,3% | 5,4% | 4,7% | 6,2% | 8,6% | 7,0% |
| Traitement ou autre soin | 0,7% | 3,6% | 1,8% | 1,7% | 3,4% | 2,3% | 3,0% | 5,7% | 3,9% | 0,6% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 3,8% | 2,5% |
| Anxiété, nervosité | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 8,6% | 15,8% | 11,3% | 12,0% | 18,0% | 14,2% | 11,8% | 16,7% | 13,5% | 7,4% | 8,2% | 7,7% | 10,4% | 14,7% | 12,0% |
| Plaintes ou signes cliniques | 8,2% | 15,8% | 11,0% | 11,7% | 17,8% | 13,9% | 11,4% | 16,3% | 13,1% | 7,4% | 7,5% | 7,4% | 10,1% | 14,4% | 11,6% |
| Gêne dans le travail | 4,0% | 7,4% | 5,3% | 6,8% | 10,3% | 8,1% | 6,3% | 8,1% | 6,9% | 2,8% | 3,9% | 3,2% | 5,2% | 7,4% | 6,0% |
| Traitement ou autre soin | 1,9% | 3,9% | 2,7% | 2,0% | 3,7% | 2,6% | 3,2% | 6,5% | 4,3% | 1,9% | 1,8% | 1,9% | 2,4% | 4,3% | 3,1% |
| Troubles du sommeil | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 8,7% | 19,1% | 12,6% | 11,8% | 19,5% | 14,6% | 12,3% | 17,4% | 14,0% | 7,3% | 11,0% | 8,7% | 10,4% | 16,5% | 12,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 8,5% | 18,4% | 12,2% | 11,3% | 18,9% | 14,1% | 11,9% | 17,0% | 13,6% | 7,2% | 10,8% | 8,5% | 10,1% | 16,1% | 12,3% |
| Gêne dans le travail | 3,3% | 7,0% | 4,7% | 5,5% | 7,1% | 6,1% | 4,7% | 7,0% | 5,5% | 2,8% | 3,1% | 2,9% | 4,2% | 6,0% | 4,8% |
| Traitement ou autre soin | 0,5% | 5,5% | 2,4% | 2,9% | 3,9% | 3,3% | 2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,0% | 2,8% | 1,7% | 2,0% | 4,6% | 2,9% |
| ➤ Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,1% | 6,5% | 3,8% | 3,4% | 7,0% | 4,7% | 4,7% | 6,0% | 5,2% | 1,5% | 2,6% | 1,9% | 3,2% | 5,4% | 4,0% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,6% | 5,8% | 3,2% | 3,2% | 6,5% | 4,4% | 4,4% | 5,9% | 4,9% | 1,3% | 2,3% | 1,7% | 3,0% | 5,1% | 3,7% |
| Gêne dans le travail | 1,2% | 3,5% | 2,0% | 1,5% | 3,4% | 2,2% | 2,0% | 3,0% | 2,3% | 0,7% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 2,8% | 1,9% |
| Traitement ou autre soin | 0,2% | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 2,5% | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 1,4% | 0,9% |
| Troubles de l'audition | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 0,9% | 4,3% | 2,2% | 1,5% | 7,9% | 3,9% | 1,6% | 5,0% | 2,8% | 3,3% | 9,6% | 5,6% | 2,0% | 6,6% | 3,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 0,7% | 3,9% | 1,9% | 1,5% | 7,9% | 3,9% | 1,4% | 4,5% | 2,4% | 3,3% | 9,1% | 5,4% | 1,8% | 6,3% | 3,4% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 1,9% | 0,7% | 0,9% | 2,9% | 1,7% | 0,4% | 2,0% | 0,9% | 0,6% | 2,6% | 1,3% | 0,5% | 2,3% | 1,1% |
| Traitement ou autre soin | 0,0% | 0,4% | 0,1% | 0,5% | 1,6% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | 0,5% |

| Etat de santé | Cadres | | | Intermédiaires | | | Employés | | | Ouvriers | | | Base Evrest | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | <45 ans n=440 | ≥ 45 ans n=263 | Ensemble n=703 | <45 ans n=665 | ≥ 45 ans n=392 | Ensemble n=1057 | <45 ans n=1140 | ≥ 45 ans n=576 | Ensemble n=1716 | <45 ans n=695 | ≥ 45 ans n=397 | Ensemble n=1092 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Global n=4603 |
| Troubles ostéoarticulaires de l'épaule | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,4% | 7,3% | 3,6% | 3,4% | 9,4% | 5,6% | 4,6% | 9,9% | 6,4% | 6,3% | 10,5% | 7,8% | 4,2% | 9,4% | 6,1% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,4% | 7,3% | 3,6% | 3,2% | 8,9% | 5,3% | 4,4% | 9,5% | 6,1% | 6,1% | 10,5% | 7,7% | 4,1% | 9,1% | 5,9% |
| Gêne dans le travail | 0,2% | 3,5% | 1,5% | 1,7% | 5,5% | 3,1% | 2,7% | 6,9% | 4,1% | 3,7% | 7,2% | 4,9% | 2,4% | 6,0% | 3,7% |
| Traitement ou autre soin | 0,2% | 4,2% | 1,7% | 1,2% | 4,2% | 2,3% | 1,3% | 5,3% | 2,6% | 1,5% | 4,4% | 2,5% | 1,1% | 4,6% | 2,4% |
| Troubles ostéoarticulaires du coude | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,4% | 3,1% | 2,0% | 1,5% | 4,7% | 2,7% | 1,9% | 4,1% | 2,6% | 1,5% | 4,3% | 2,5% | 1,7% | 4,2% | 2,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,2% | 3,1% | 1,9% | 1,5% | 4,7% | 2,7% | 1,8% | 3,9% | 2,5% | 1,5% | 4,1% | 2,4% | 1,6% | 4,0% | 2,4% |
| Gêne dans le travail | 0,5% | 1,6% | 0,9% | 1,2% | 3,1% | 1,9% | 1,3% | 3,0% | 1,9% | 1,2% | 3,1% | 1,9% | 1,2% | 2,8% | 1,8% |
| Traitement ou autre soin | 0,5% | 1,2% | 0,7% | 0,6% | 2,1% | 1,2% | 0,7% | 2,3% | 1,3% | 0,9% | 2,6% | 1,5% | 0,7% | 2,2% | 1,2% |
| Troubles ostéoarticulaires du poignet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,8% | 4,6% | 3,5% | 2,6% | 5,0% | 3,5% | 3,8% | 7,7% | 5,1% | 3,7% | 6,9% | 4,8% | 3,4% | 6,3% | 4,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 2,6% | 4,6% | 3,4% | 2,6% | 5,0% | 3,5% | 3,6% | 7,3% | 4,8% | 3,5% | 6,4% | 4,6% | 3,2% | 6,0% | 4,2% |
| Gêne dans le travail | 0,7% | 2,3% | 1,3% | 1,5% | 3,7% | 2,3% | 2,3% | 4,8% | 3,2% | 2,8% | 4,9% | 3,5% | 2,0% | 4,1% | 2,8% |
| Traitement ou autre soin | 0,7% | 1,9% | 1,2% | 1,2% | 2,1% | 1,6% | 1,1% | 3,4% | 1,9% | 1,5% | 3,8% | 2,3% | 1,1% | 3,0% | 1,8% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,5% | 11,6% | 7,2% | 6,6% | 15,2% | 9,8% | 7,7% | 16,2% | 10,6% | 10,2% | 16,8% | 12,6% | 7,6% | 15,2% | 10,3% |
| Plaintes ou signes cliniques | 4,5% | 11,6% | 7,2% | 6,5% | 14,7% | 9,5% | 7,5% | 15,7% | 10,2% | 10,0% | 16,5% | 12,3% | 7,4% | 14,8% | 10,0% |
| Gêne dans le travail | 0,9% | 5,5% | 2,6% | 3,5% | 9,3% | 5,7% | 4,9% | 11,1% | 7,0% | 7,0% | 11,7% | 8,7% | 4,5% | 9,8% | 6,4% |
| Traitement ou autre soin | 1,4% | 5,5% | 3,0% | 2,3% | 6,3% | 3,8% | 2,3% | 8,8% | 4,5% | 3,4% | 8,5% | 5,2% | 2,4% | 7,6% | 4,3% |

| Etat de santé | Cadres | | | Intermédiaires | | | Employés | | | Ouvriers | | | Base Evrest | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | <45 ans n=440 | ≥ 45 ans n=263 | Ensemble n=703 | <45 ans n=665 | ≥ 45 ans n=392 | Ensemble n=1057 | <45 ans n=1140 | ≥ 45 ans n=576 | Ensemble n=1716 | <45 ans n=695 | ≥ 45 ans n=397 | Ensemble n=1092 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Global n=4603 |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 5,1% | 10,8% | 7,3% | 6,3% | 10,8% | 7,9% | 5,6% | 9,2% | 6,8% | 5,9% | 11,3% | 7,8% | 5,7% | 10,3% | 7,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 4,9% | 10,4% | 7,0% | 6,3% | 10,5% | 7,8% | 5,5% | 8,9% | 6,6% | 5,9% | 11,3% | 7,8% | 5,6% | 10,1% | 7,2% |
| Gêne dans le travail | 1,6% | 4,7% | 2,8% | 3,1% | 4,7% | 3,7% | 2,4% | 5,0% | 3,3% | 4,4% | 8,7% | 6,0% | 2,9% | 5,8% | 3,9% |
| Traitement ou autre soin | 2,3% | 6,2% | 3,8% | 2,9% | 3,9% | 3,3% | 2,2% | 5,0% | 3,1% | 2,5% | 5,4% | 3,5% | 2,4% | 5,0% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 6,5% | 9,7% | 7,7% | 6,7% | 9,4% | 7,7% | 6,9% | 9,7% | 7,9% | 4,0% | 7,7% | 5,3% | 6,1% | 9,1% | 7,2% |
| Plaintes ou signes cliniques | 6,3% | 9,7% | 7,6% | 6,6% | 9,4% | 7,6% | 6,9% | 9,2% | 7,7% | 3,8% | 7,5% | 5,1% | 6,0% | 8,9% | 7,0% |
| Gêne dans le travail | 2,8% | 5,1% | 3,7% | 3,8% | 5,5% | 4,5% | 4,3% | 7,3% | 5,3% | 3,1% | 4,9% | 3,8% | 3,7% | 5,9% | 4,4% |
| Traitement ou autre soin | 4,0% | 3,9% | 4,0% | 2,8% | 4,7% | 3,5% | 2,6% | 5,5% | 3,6% | 1,5% | 3,4% | 2,2% | 2,6% | 4,6% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 9,1% | 19,0% | 12,8% | 15,6% | 17,0% | 16,1% | 14,0% | 18,9% | 15,7% | 14,9% | 22,7% | 17,8% | 13,9% | 19,2% | 15,8% |
| Plaintes ou signes cliniques | 8,6% | 19,0% | 12,5% | 14,9% | 17,0% | 15,7% | 13,6% | 18,2% | 15,1% | 14,1% | 21,8% | 16,9% | 13,3% | 18,7% | 15,2% |
| Gêne dans le travail | 3,5% | 10,5% | 6,1% | 9,6% | 10,3% | 9,8% | 7,7% | 12,7% | 9,4% | 10,0% | 16,9% | 12,5% | 8,0% | 12,7% | 9,7% |
| Traitement ou autre soin | 4,0% | 7,5% | 5,3% | 4,4% | 7,7% | 5,6% | 4,4% | 11,2% | 6,7% | 4,8% | 11,2% | 7,1% | 4,4% | 9,6% | 6,3% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 13,6% | 25,3% | 18,0% | 19,8% | 21,7% | 20,5% | 18,3% | 23,6% | 20,1% | 16,7% | 25,5% | 19,9% | 17,6% | 23,6% | 19,8% |
| Plaintes ou signes cliniques | 13,1% | 25,3% | 17,7% | 19,1% | 21,7% | 20,1% | 17,9% | 22,8% | 19,5% | 15,9% | 24,5% | 19,1% | 17,0% | 23,2% | 19,2% |
| Gêne dans le travail | 5,6% | 13,8% | 8,7% | 12,0% | 13,0% | 12,3% | 10,3% | 16,8% | 12,5% | 11,5% | 18,8% | 14,2% | 10,2% | 15,7% | 12,2% |
| Traitement ou autre soin | 6,9% | 10,0% | 8,0% | 6,1% | 9,5% | 7,4% | 6,5% | 13,7% | 8,9% | 5,7% | 12,6% | 8,2% | 6,3% | 11,8% | 8,2% |

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

| Description de la population | C- Industrie manufacturière n=378 | F- Construction n=287 | G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles n=948 | Base Everest n=4603 |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|
| Répartition hommes / femmes | 65,9% / 34,1% | 87,8% / 12,2% | 54,7% / 45,3% | 53,6% / 46,4% |
| ≤24 ans | 8,5% | 15,7% | 15,8% | 11,6% |
| 25-34 ans | 24,3% | 29,6% | 27,8% | 26,3% |
| 35-44 ans | 27,5% | 23,3% | 25,4% | 26,3% |
| 45-54 ans | 29,1% | 23,3% | 23,5% | 25,9% |
| 55 ans et plus | 10,6% | 8,0% | 7,4% | 9,9% |
| Cadres | 17,5% | 3,5% | 7,2% | 15,3% |
| Intermédiaires | 25,7% | 13,9% | 19,9% | 23,0% |
| Employés | 15,3% | 15,0% | 50,7% | 37,3% |
| Ouvriers | 41,5% | 66,6% | 21,2% | 23,7% |

| Conditions de travail | C- Industrie manufacturière n=378 | F- Construction n=287 | G- Commerce, réparation auto/ moto n=948 | Base Everest n=4603 |
|---|--|-----------------------------|--|------------------------|
| - Changement de travail depuis 1 an : | | | | |
| Non | 89,1% | 87,4% | 82,8% | 82,8% |
| Oui, raison médicale | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 0,7% |
| Oui, autre raison | 9,3% | 10,9% | 14,7% | 15,0% |
| Oui, raison non précisée | 0,5% | 1,1% | 1,5% | 1,4% |
| Travail à temps plein | 93,0% | 91,9% | 80,4% | 81,1% |
| Travail en journée normale | 74,9% | 90,9% | 80,0% | 80,1% |
| Coupures de plus de 2 heures | 12,1% | 10,9% | 22,9% | 19,4% |
| Horaires décalés | 34,5% | 18,4% | 29,2% | 27,9% |
| Horaires irréguliers ou alternés | 31,1% | 16,0% | 28,8% | 25,8% |
| Travail de nuit | 18,8% | 5,8% | 5,0% | 25,8% |
| Déplacements professionnels de plus de 24h | 11,7% | 11,5% | 6,0% | 8,8% |
| - Dépasser ses horaires normaux | | | | |
| Jamais | 16,4% | 15,2% | 18,4% | 16,2% |
| Rarement | 39,7% | 46,5% | 45,9% | 43,7% |
| Assez souvent | 31,0% | 25,9% | 24,0% | 27,3% |
| Très souvent | 13,0% | 12,4% | 11,7% | 12,8% |
| - Sauter ou écouter un repas, ne pas prendre de pause | | | | |
| Jamais | 31,8% | 38,4% | 41,6% | 36,4% |
| Rarement | 43,5% | 42,6% | 33,6% | 37,6% |
| Assez souvent | 17,0% | 14,1% | 17,1% | 17,9% |
| Très souvent | 7,7% | 4,9% | 7,8% | 8,0% |
| - Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin | | | | |
| Jamais | 27,3% | 36,7% | 34,9% | 34,0% |
| Rarement | 42,8% | 42,1% | 41,4% | 40,9% |
| Assez souvent | 24,3% | 17,3% | 17,8% | 19,2% |
| Très souvent | 5,6% | 4,0% | 5,9% | 5,9% |
| - Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile) | | | | |
| 0 | 4,3% | 9,1% | 6,6% | 6,6% |
| 1 | 6,4% | 5,3% | 6,3% | 6,3% |
| 2 | 8,8% | 7,0% | 8,3% | 8,9% |
| 3 | 11,5% | 13,0% | 12,5% | 11,5% |
| 4 | 9,4% | 10,5% | 9,9% | 9,7% |
| 5 | 16,6% | 22,1% | 17,7% | 18,3% |
| 6 | 13,4% | 13,0% | 11,5% | 11,3% |
| 7 | 17,9% | 10,2% | 12,3% | 14,1% |
| 8 | 8,6% | 8,4% | 9,6% | 9,7% |
| 9 | 1,9% | 0,7% | 3,4% | 2,4% |
| 10 | 1,3% | 0,7% | 1,8% | 1,3% |
| Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10) | 43,0% | 33,0% | 38,6% | 38,9% |
| Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue | 58,9% | 45,8% | 54,1% | 52,1% |
| Parmi eux : | | | | |
| - Perturbe le travail | 62,2% | 48,4% | 54,0% | 58,7% |
| - Aspect positif du travail | 40,4% | 43,0% | 44,8% | 41,4% |

| Appréciation sur le travail | C- Industrie manufacturière n=378 | F- Construction n=287 | G- Commerce, réparation auto/ moto n=948 | Base Everest n=4603 |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------|
| -Travail permet d'apprendre | | | | |
| Non pas du tout | 6,6% | 3,5% | 6,8% | 6,4% |
| Plutôt non | 12,7% | 12,6% | 15,8% | 13,0% |
| Plutôt oui | 52,0% | 46,3% | 47,1% | 45,6% |
| Oui tout à fait | 28,6% | 37,5% | 30,3% | 35,0% |
| -Travail varié | | | | |
| Non pas du tout | 4,0% | 1,1% | 6,6% | 5,2% |
| Plutôt non | 16,0% | 10,9% | 17,2% | 14,9% |
| Plutôt oui | 45,1% | 50,7% | 44,7% | 45,5% |
| Oui tout à fait | 34,9% | 37,3% | 31,5% | 34,4% |
| -Choix dans la façon de procéder | | | | |
| Non pas du tout | 5,8% | 3,9% | 8,3% | 6,9% |
| Plutôt non | 19,9% | 16,8% | 17,8% | 17,2% |
| Plutôt oui | 48,5% | 48,4% | 44,4% | 46,5% |
| Oui tout à fait | 25,7% | 30,9% | 29,5% | 29,5% |
| -Possibilités suffisantes d'entraide | | | | |
| Non pas du tout | 2,1% | 3,5% | 2,9% | 3,3% |
| Plutôt non | 9,9% | 9,2% | 12,5% | 11,7% |
| Plutôt oui | 60,6% | 56,9% | 55,1% | 55,9% |
| Oui tout à fait | 27,3% | 30,4% | 29,6% | 29,1% |
| -Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité | | | | |
| Non pas du tout | 1,9% | 3,2% | 2,9% | 2,6% |
| Plutôt non | 10,4% | 5,7% | 9,8% | 11,6% |
| Plutôt oui | 62,1% | 50,9% | 57,5% | 58,0% |
| Oui tout à fait | 25,5% | 40,1% | 29,7% | 27,8% |
| -Travail reconnu | | | | |
| Non pas du tout | 5,4% | 2,9% | 5,9% | 5,5% |
| Plutôt non | 18,5% | 9,8% | 15,3% | 15,9% |
| Plutôt oui | 53,1% | 58,2% | 54,1% | 54,8% |
| Oui tout à fait | 23,1% | 29,1% | 24,7% | 23,8% |
| -Faire des choses que l'on désapprouve | | | | |
| Non pas du tout | 23,1% | 32,9% | 31,3% | 30,4% |
| Plutôt non | 59,3% | 51,8% | 48,1% | 50,3% |
| Plutôt oui | 15,7% | 14,3% | 17,3% | 16,5% |
| Oui tout à fait | 1,9% | 1,1% | 3,3% | 2,8% |
| -Travailler avec la peur de perdre son emploi | | | | |
| Non pas du tout | 50,5% | 64,0% | 56,9% | 57,9% |
| Plutôt non | 35,9% | 26,1% | 29,8% | 30,2% |
| Plutôt oui | 10,1% | 8,5% | 9,6% | 8,5% |
| Oui tout à fait | 3,5% | 1,4% | 3,8% | 3,4% |

| Charge physique du poste de travail | C- Industrie manufacturière n=378 | F- Construction n=287 | G- Commerce, réparation auto/ moto n=948 | Base Everest n=4603 |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------|
| Postures contraignantes : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 39,2% | 28,4% | 34,3% | 44,5% |
| Oui parfois | 42,6% | 44,2% | 44,5% | 38,2% |
| Oui souvent | 18,3% | 27,4% | 21,2% | 17,3% |
| Difficultés | | | | |
| Pas de postures contraignantes | 39,2% | 28,4% | 34,3% | 44,5% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible | 28,8% | 38,6% | 30,1% | 25,5% |
| Postures contraignantes, pas difficile ou pénible | 27,5% | 30,2% | 31,9% | 26,4% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p. | 4,5% | 2,8% | 3,7% | 3,6% |
| Effort, port de charges lourdes : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 46,4% | 29,1% | 34,2% | 50,9% |
| Oui parfois | 39,7% | 40,6% | 41,3% | 33,4% |
| Oui souvent | 13,9% | 30,2% | 24,5% | 15,7% |
| Difficultés | | | | |
| Pas d'effort, port de charges lourdes | 46,4% | 29,1% | 34,2% | 50,9% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible | 24,5% | 35,3% | 32,2% | 22,4% |
| Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible | 25,9% | 29,5% | 29,5% | 22,8% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p. | 3,2% | 6,1% | 4,1% | 3,9% |
| Gestes répétitifs : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 41,8% | 25,4% | 30,6% | 38,3% |
| Oui parfois | 26,1% | 38,0% | 29,4% | 27,6% |
| Oui souvent | 32,2% | 36,6% | 39,9% | 34,2% |
| Difficultés | | | | |
| Pas de gestes répétitifs | 41,8% | 25,4% | 30,6% | 38,3% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible | 22,1% | 24,6% | 19,6% | 16,6% |
| Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible | 33,0% | 44,4% | 43,5% | 39,5% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé | 3,2% | 5,6% | 6,2% | 5,6% |
| Importants déplacements à pieds : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 55,7% | 50,4% | 52,0% | 62,3% |
| Oui parfois | 22,3% | 28,4% | 22,1% | 18,8% |
| Oui souvent | 22,0% | 21,3% | 25,9% | 18,9% |
| Difficultés | | | | |
| Pas d'importants déplacements à pieds | 55,7% | 50,4% | 52,0% | 62,3% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible | 12,7% | 13,1% | 13,3% | 9,8% |
| Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible | 30,2% | 33,7% | 30,8% | 25,0% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p. | 1,3% | 2,8% | 3,9% | 2,9% |
| Station debout prolongée : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 42,0% | 34,0% | 28,6% | 45,4% |
| Oui parfois | 21,8% | 29,1% | 23,8% | 20,3% |
| Oui souvent | 36,2% | 36,8% | 47,6% | 34,3% |
| Difficultés | | | | |
| Pas de station debout prolongée | 42,0% | 34,0% | 28,6% | 45,4% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible | 22,6% | 16,8% | 24,8% | 18,5% |
| Station debout prolongée, pas difficile ou pénible | 31,9% | 42,5% | 40,6% | 31,0% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p. | 3,5% | 6,7% | 5,9% | 5,2% |

| Expositions | C- Industrie manufacturière n=378 | F- Construction n=287 | G- Commerce, réparation auto/ moto n=948 | Base Everest n=4603 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|
| Produits chimiques | 32,0% | 30,0% | 16,4% | 19,3% |
| Poussières, fumées | 44,5% | 70,2% | 32,2% | 28,9% |
| Rx ionisants | 5,1% | 1,8% | 1,0% | 2,2% |
| Vibrations | 22,9% | 53,3% | 11,2% | 14,2% |
| Gêne sonore | 52,4% | 65,2% | 29,7% | 32,6% |
| Bruit > 80db | 38,1% | 60,8% | 18,0% | 20,7% |
| Contrainte visuelle | 27,3% | 25,4% | 19,8% | 25,6% |
| Conduite routière prolongée | 12,6% | 23,6% | 12,7% | 14,2% |
| Chaleur intense | 24,7% | 32,7% | 11,7% | 15,4% |
| Froid intense | 17,5% | 31,8% | 17,1% | 13,3% |
| Intempéries | 18,3% | 47,0% | 10,0% | 15,7% |
| Pression psychologique | 23,1% | 15,3% | 21,0% | 22,2% |
| Agent biologique | 6,8% | 1,8% | 3,5% | 6,5% |
| Contact avec le public | 45,3% | 63,4% | 83,7% | 69,5% |

| Formation | C- Industrie manufacturière n=378 | F- Construction n=287 | G- Commerce, réparation auto/ moto n=948 | Base Everest n=4603 |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------|
| A bénéficié d'une formation depuis un an : | 47,7% | 31,4% | 43,1% | 44,6% |
| Parmi eux : | | | | |
| - En rapport avec le travail actuel | 87,2% | 88,2% | 86,9% | 88,7% |
| - En rapport avec le travail futur | 16,5% | 18,1% | 12,9% | 15,7% |
| - Formation d'intérêt général | 59,6% | 52,7% | 44,6% | 45,9% |
| Rôle de formateur ou tuteur depuis un an | 31,1% | 18,7% | 22,1% | 23,4% |

| Mode de vie | C- Industrie manufacturière n=378 | F- Construction n=287 | G- Commerce, réparation auto/ moto n=948 | Base Everest n=4603 |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------|
| Activité sportive régulière | 57,5% | 53,5% | 51,6% | 55,5% |
| Consommation de tabac | 34,0% | 43,3% | 41,2% | 38,7% |
| Consommation de tabac sup à 15 cig/jour | 7,8% | 13,4% | 9,2% | 9,1% |
| Consommation de café | 81,4% | 81,4% | 75,9% | 77,0% |
| Consommation de café sup à 4 tasses/jour | 14,9% | 9,1% | 12,8% | 12,6% |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 18,9% | 18,1% | 15,3% | 17,5% |

| Etat de santé | C- Industrie manufacturière | | | F- Construction | | | G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | | | Base Evrest | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=228 | ≥ 45 ans n=150 | Ensemble n=378 | <45 ans n=197 | ≥ 45 ans n=90* | Ensemble n=287 | <45 ans n=655 | ≥ 45 ans n=293 | Ensemble n=948 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Indice de masse corporelle | | | | | | | | | | | | |
| - Normaux ou maigres | 68,1% | 53,6% | 62,4% | 64,2% | 42,7% | 57,7% | 70,1% | 56,7% | 65,9% | 68,9% | 55,4% | 64,1% |
| - Surpoids | 23,1% | 33,6% | 27,2% | 29,5% | 43,9% | 33,8% | 21,7% | 29,9% | 24,2% | 22,5% | 31,0% | 25,6% |
| - Obèses | 8,8% | 12,9% | 10,4% | 6,3% | 13,4% | 8,5% | 8,3% | 13,4% | 9,9% | 8,6% | 13,6% | 10,4% |
| Appareil respiratoire | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 3,1% | 2,7% | 3,0% | 3,1% | 1,1% | 2,5% | 3,1% | 4,8% | 3,7% | 2,4% | 3,7% | 2,9% |
| Plaintes ou signes cliniques | 3,1% | 2,1% | 2,7% | 3,1% | 1,1% | 2,5% | 3,0% | 3,1% | 3,0% | 2,4% | 3,0% | 2,6% |
| Gêne dans le travail | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 2,0% | 3,5% | 2,5% | 1,4% | 2,4% | 1,8% |
| Appareil cardio vasculaire | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 0,0% | 2,7% | 1,1% | 0,5% | 5,7% | 2,1% | 1,2% | 4,2% | 2,1% | 1,5% | 4,6% | 2,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 0,0% | 2,7% | 1,1% | 0,0% | 5,7% | 1,8% | 1,2% | 3,5% | 1,9% | 1,3% | 3,9% | 2,3% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 1,7% | 0,8% | 0,4% | 1,3% | 0,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,0% | 2,7% | 1,1% | 0,5% | 3,4% | 1,4% | 0,5% | 3,5% | 1,4% | 0,6% | 3,2% | 1,5% |
| HTA | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,8% | 12,2% | 6,0% | 3,1% | 7,0% | 4,3% | 1,6% | 12,5% | 5,0% | 1,8% | 12,6% | 5,7% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,4% | 11,6% | 5,4% | 2,6% | 7,0% | 4,0% | 1,6% | 9,4% | 4,0% | 1,7% | 10,8% | 5,0% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,7% | 0,3% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,4% | 6,8% | 3,5% | 1,0% | 5,9% | 2,5% | 0,8% | 10,1% | 3,7% | 0,8% | 8,9% | 3,7% |
| Digestif | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,1% | 5,6% | 4,7% | 2,1% | 3,5% | 2,5% | 4,3% | 8,5% | 5,6% | 4,2% | 6,7% | 5,1% |
| Plaintes ou signes cliniques | 4,1% | 4,9% | 4,4% | 2,1% | 3,5% | 2,5% | 4,0% | 7,8% | 5,1% | 4,1% | 6,4% | 4,9% |
| Gêne dans le travail | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 0,5% | 2,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,4% | 2,8% | 1,9% | 0,5% | 2,3% | 1,1% | 1,4% | 6,0% | 2,8% | 1,8% | 3,8% | 2,5% |
| Dermatologie | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 5,0% | 2,0% | 3,8% | 1,6% | 0,0% | 1,1% | 5,2% | 2,1% | 4,2% | 3,5% | 3,3% | 3,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 4,5% | 2,0% | 3,5% | 1,6% | 0,0% | 1,1% | 5,2% | 2,1% | 4,2% | 3,3% | 3,2% | 3,3% |
| Gêne dans le travail | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 0,5% | 0,0% | 0,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 0,0% | 0,4% | 3,3% | 1,4% | 2,7% | 1,7% | 2,1% | 1,9% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Evrest 2012-2013 – Région PACA

| Etat de santé | C- Industrie manufacturière | | | F- Construction | | | G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | | | Base Evrest | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=228 | ≥ 45 ans n=150 | Ensemble n=378 | <45 ans n=197 | ≥ 45 ans n=90* | Ensemble n=287 | <45 ans n=655 | ≥ 45 ans n=293 | Ensemble n=948 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Lassitude, fatigue | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 12,1% | 16,4% | 13,8% | 8,8% | 10,0% | 9,2% | 14,3% | 17,0% | 15,1% | 11,9% | 15,9% | 13,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 12,1% | 16,4% | 13,8% | 8,8% | 10,0% | 9,2% | 14,0% | 17,0% | 14,9% | 11,7% | 15,7% | 13,2% |
| Gêne dans le travail | 3,7% | 6,9% | 5,0% | 4,7% | 4,4% | 4,6% | 7,0% | 9,1% | 7,7% | 6,2% | 8,6% | 7,0% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,3% | 3,5% | 2,8% | 1,6% | 2,2% | 1,8% | 2,2% | 3,5% | 2,6% | 1,8% | 3,8% | 2,5% |
| Anxiété, nervosité | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 8,5% | 13,0% | 10,3% | 6,2% | 8,9% | 7,1% | 11,7% | 16,7% | 13,3% | 10,4% | 14,7% | 12,0% |
| Plaintes ou signes cliniques | 8,5% | 12,4% | 10,1% | 6,2% | 8,9% | 7,1% | 11,3% | 16,0% | 12,8% | 10,1% | 14,4% | 11,6% |
| Gêne dans le travail | 3,2% | 5,6% | 4,1% | 1,6% | 4,4% | 2,5% | 5,8% | 7,7% | 6,4% | 5,2% | 7,4% | 6,0% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,3% | 2,8% | 2,5% | 0,5% | 3,3% | 1,4% | 3,0% | 3,2% | 3,0% | 2,4% | 4,3% | 3,1% |
| Troubles du sommeil | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 11,7% | 12,4% | 12,0% | 5,1% | 13,5% | 7,7% | 9,5% | 15,4% | 11,4% | 10,4% | 16,5% | 12,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 11,7% | 12,4% | 12,0% | 5,1% | 13,5% | 7,7% | 9,1% | 14,7% | 10,8% | 10,1% | 16,1% | 12,3% |
| Gêne dans le travail | 3,6% | 5,5% | 4,4% | 3,1% | 6,8% | 4,2% | 3,3% | 4,6% | 3,7% | 4,2% | 6,0% | 4,8% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,7% | 2,8% | 2,7% | 0,5% | 3,4% | 1,4% | 1,4% | 3,5% | 2,1% | 2,0% | 4,6% | 2,9% |
| ➤ Troubles neuro psychiques <i>(les 3 signes ci-dessus)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,0% | 3,4% | 3,8% | 0,5% | 3,3% | 1,4% | 3,1% | 6,3% | 4,1% | 3,2% | 5,4% | 4,0% |
| Plaintes ou signes cliniques | 4,0% | 3,4% | 3,8% | 0,5% | 3,3% | 1,4% | 2,8% | 5,6% | 3,7% | 3,0% | 5,1% | 3,7% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 2,0% | 0,8% | 0,5% | 2,2% | 1,1% | 1,2% | 2,5% | 1,6% | 1,5% | 2,8% | 1,9% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 0,9% |
| Troubles de l'audition | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,3% | 8,9% | 4,9% | 3,7% | 13,8% | 6,9% | 2,1% | 5,6% | 3,2% | 2,0% | 6,6% | 3,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,8% | 8,9% | 4,6% | 3,7% | 12,8% | 6,6% | 1,7% | 5,6% | 3,0% | 1,8% | 6,3% | 3,4% |
| Gêne dans le travail | 0,5% | 1,4% | 0,8% | 0,5% | 5,8% | 2,2% | 0,2% | 1,4% | 0,5% | 0,5% | 2,3% | 1,1% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 0,5% | 2,3% | 1,1% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 0,3% | 0,8% | 0,5% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé | C- Industrie manufacturière | | | F- Construction | | | G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | | | Base Everest | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=228 | ≥ 45 ans n=150 | Ensemble n=378 | <45 ans n=197 | ≥ 45 ans n=90* | Ensemble n=287 | <45 ans n=655 | ≥ 45 ans n=293 | Ensemble n=948 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Troubles ostéoarticulaires de l'épaule | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 5,8% | 10,2% | 7,5% | 4,6% | 12,4% | 7,1% | 4,0% | 11,5% | 6,3% | 4,2% | 9,4% | 6,1% |
| Plaintes ou signes cliniques | 5,8% | 10,2% | 7,5% | 4,1% | 12,4% | 6,7% | 4,0% | 11,5% | 6,3% | 4,1% | 9,1% | 5,9% |
| Gêne dans le travail | 4,0% | 6,8% | 5,1% | 3,1% | 6,8% | 4,3% | 1,4% | 8,0% | 3,4% | 2,4% | 6,0% | 3,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,9% | 5,4% | 2,7% | 2,1% | 3,4% | 2,5% | 0,8% | 5,6% | 2,3% | 1,1% | 4,6% | 2,4% |
| Troubles ostéoarticulaires du coude | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,7% | 1,4% | 2,2% | 1,5% | 6,8% | 3,2% | 1,6% | 5,2% | 2,7% | 1,7% | 4,2% | 2,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 2,2% | 1,4% | 1,9% | 1,5% | 6,8% | 3,2% | 1,6% | 5,2% | 2,7% | 1,6% | 4,0% | 2,4% |
| Gêne dans le travail | 2,2% | 1,4% | 1,9% | 1,0% | 3,4% | 1,8% | 1,1% | 4,2% | 2,0% | 1,2% | 2,8% | 1,8% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,0% | 2,3% | 0,7% | 0,5% | 2,1% | 1,0% | 0,7% | 2,2% | 1,2% |
| Troubles ostéoarticulaires du poignet | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 5,8% | 8,2% | 6,8% | 3,1% | 9,1% | 5,0% | 4,5% | 7,3% | 5,4% | 3,4% | 6,3% | 4,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 5,4% | 7,6% | 6,2% | 3,1% | 9,1% | 5,0% | 4,4% | 7,3% | 5,3% | 3,2% | 6,0% | 4,2% |
| Gêne dans le travail | 4,0% | 4,1% | 4,1% | 2,1% | 5,7% | 3,2% | 2,8% | 6,2% | 3,9% | 2,0% | 4,1% | 2,8% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,2% | 2,7% | 2,4% | 0,5% | 2,3% | 1,1% | 1,2% | 3,1% | 1,8% | 1,1% | 3,0% | 1,8% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus) | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 11,6% | 17,0% | 13,7% | 8,2% | 18,0% | 11,3% | 8,6% | 17,8% | 11,4% | 7,6% | 15,2% | 10,3% |
| Plaintes ou signes cliniques | 11,6% | 16,4% | 13,5% | 7,8% | 18,0% | 11,0% | 8,4% | 17,8% | 11,3% | 7,4% | 14,8% | 10,0% |
| Gêne dans le travail | 8,6% | 10,3% | 9,2% | 5,7% | 10,3% | 7,1% | 4,4% | 13,6% | 7,2% | 4,5% | 9,8% | 6,4% |
| TraITEMENT ou autre soin | 3,1% | 7,5% | 4,9% | 2,6% | 5,7% | 3,6% | 2,4% | 9,1% | 4,4% | 2,4% | 7,6% | 4,3% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé | C- Industrie manufacturière | | | F- Construction | | | G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | | | Base Everest | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=228 | ≥ 45 ans n=150 | Ensemble n=378 | <45 ans n=197 | ≥ 45 ans n=90* | Ensemble n=287 | <45 ans n=655 | ≥ 45 ans n=293 | Ensemble n=948 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 5,4% | 13,7% | 8,7% | 10,3% | 13,6% | 11,3% | 6,1% | 8,7% | 6,9% | 5,7% | 10,3% | 7,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 4,9% | 13,7% | 8,4% | 10,3% | 13,6% | 11,3% | 6,1% | 8,3% | 6,8% | 5,6% | 10,1% | 7,2% |
| Gêne dans le travail | 2,7% | 6,2% | 4,1% | 7,2% | 11,4% | 8,5% | 3,1% | 6,2% | 4,1% | 2,9% | 5,8% | 3,9% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,7% | 5,5% | 3,8% | 3,1% | 9,2% | 5,0% | 2,8% | 4,9% | 3,5% | 2,4% | 5,0% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 9,0% | 9,5% | 9,2% | 4,1% | 9,3% | 5,7% | 6,1% | 11,1% | 7,7% | 6,1% | 9,1% | 7,2% |
| Plaintes ou signes cliniques | 8,5% | 9,5% | 8,9% | 4,1% | 9,3% | 5,7% | 6,1% | 10,8% | 7,5% | 6,0% | 8,9% | 7,0% |
| Gêne dans le travail | 5,4% | 4,1% | 4,9% | 4,1% | 7,0% | 5,0% | 4,2% | 7,0% | 5,1% | 3,7% | 5,9% | 4,4% |
| TraITEMENT ou autre soin | 3,2% | 4,1% | 3,6% | 1,5% | 2,3% | 1,8% | 2,5% | 6,6% | 3,8% | 2,6% | 4,6% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 17,6% | 15,2% | 16,6% | 15,2% | 29,1% | 19,5% | 16,8% | 22,6% | 18,6% | 13,9% | 19,2% | 15,8% |
| Plaintes ou signes cliniques | 16,3% | 15,2% | 15,8% | 14,7% | 29,1% | 19,2% | 16,2% | 21,7% | 17,9% | 13,3% | 18,7% | 15,2% |
| Gêne dans le travail | 8,8% | 6,3% | 7,8% | 11,5% | 23,5% | 15,2% | 10,6% | 12,9% | 11,3% | 8,0% | 12,7% | 9,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 5,6% | 7,0% | 6,1% | 5,2% | 10,6% | 6,9% | 4,1% | 10,5% | 6,1% | 4,4% | 9,6% | 6,3% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus) | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 22,6% | 21,4% | 22,1% | 17,3% | 31,8% | 21,7% | 20,1% | 28,5% | 22,7% | 17,6% | 23,6% | 19,8% |
| Plaintes ou signes cliniques | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 16,8% | 31,8% | 21,5% | 19,6% | 27,6% | 22,1% | 17,0% | 23,2% | 19,2% |
| Gêne dans le travail | 12,1% | 9,8% | 11,2% | 13,6% | 25,0% | 17,1% | 12,7% | 16,1% | 13,8% | 10,2% | 15,7% | 12,2% |
| TraITEMENT ou autre soin | 7,5% | 9,9% | 8,5% | 6,3% | 11,9% | 8,0% | 5,7% | 13,8% | 8,2% | 6,3% | 11,8% | 8,2% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Description de la population | H- Transports et entreposage n=248 | I- Hébergement et restauration n=356 | K- Activités financières et d'assurance n=257 | Base Everest n=4603 |
|------------------------------|---|---|---|------------------------|
| Répartition hommes / femmes | 76,2% / 23,8% | 48,9% / 51,1% | 44,0% / 56,0% | 53,6% / 46,4% |
| ≤24 ans | 5,6% | 29,5% | 6,6% | 11,6% |
| 25-34 ans | 21,8% | 30,1% | 26,8% | 26,3% |
| 35-44 ans | 31,5% | 18,0% | 26,5% | 26,3% |
| 45-54 ans | 31,5% | 16,0% | 27,2% | 25,9% |
| 55 ans et plus | 9,7% | 6,5% | 12,8% | 9,9% |
| Cadres | 8,1% | 4,8% | 26,1% | 15,3% |
| Intermédiaires | 6,5% | 12,1% | 37,0% | 23,0% |
| Employés | 19,4% | 62,6% | 35,0% | 37,3% |
| Ouvriers | 65,7% | 19,4% | 1,6% | 23,7% |

| Conditions de travail | H- Transports et entreposage n=248 | I- Hébergement et restauration n=356 | K- Activités financières et d'assurance n=257 | Base Everest n=4603 |
|--|---|---|---|------------------------|
| - Changement de travail depuis 1 an : | | | | |
| Non | 85,5% | 70,6% | 84,8% | 82,8% |
| Oui, raison médicale | 0,0% | 1,4% | 0,8% | 0,7% |
| Oui, autre raison | 13,7% | 26,6% | 13,3% | 15,0% |
| Oui, raison non précisée | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,4% |
| Travail à temps plein | 84,9% | 73,2% | 87,8% | 81,1% |
| Travail en journée normale | 69,8% | 62,3% | 93,9% | 80,1% |
| Coupures de plus de 2 heures | 23,4% | 44,8% | 7,4% | 19,4% |
| Horaires décalés | 47,2% | 51,5% | 10,9% | 27,9% |
| Horaires irréguliers ou alternés | 35,1% | 39,2% | 9,6% | 25,8% |
| Travail de nuit | 24,8% | 14,4% | 1,3% | 25,8% |
| Déplacements professionnels de plus de 24h | 11,2% | 2,1% | 6,9% | 8,8% |
| - Dépasser ses horaires normaux | | | | |
| Jamais | 17,6% | 17,0% | 10,5% | 16,2% |
| Rarement | 41,2% | 45,0% | 45,1% | 43,7% |
| Assez souvent | 30,2% | 25,5% | 26,5% | 27,3% |
| Très souvent | 11,0% | 12,5% | 17,9% | 12,8% |
| - Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause | | | | |
| Jamais | 33,7% | 38,3% | 31,2% | 36,4% |
| Rarement | 41,1% | 35,7% | 43,8% | 37,6% |
| Assez souvent | 17,9% | 16,6% | 18,4% | 17,9% |
| Très souvent | 7,3% | 9,4% | 6,6% | 8,0% |
| - Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin | | | | |
| Jamais | 43,8% | 46,1% | 20,9% | 34,0% |
| Rarement | 37,5% | 38,0% | 42,5% | 40,9% |
| Assez souvent | 14,6% | 11,9% | 28,0% | 19,2% |
| Très souvent | 4,2% | 4,1% | 8,7% | 5,9% |
| - Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile) | | | | |
| 0 | 8,2% | 7,1% | 2,7% | 6,6% |
| 1 | 10,2% | 7,1% | 5,5% | 6,3% |
| 2 | 8,6% | 8,3% | 8,6% | 8,9% |
| 3 | 9,8% | 10,9% | 7,8% | 11,5% |
| 4 | 9,4% | 8,3% | 9,0% | 9,7% |
| 5 | 19,3% | 20,6% | 13,3% | 18,3% |
| 6 | 10,2% | 8,6% | 14,5% | 11,3% |
| 7 | 10,2% | 13,4% | 20,8% | 14,1% |
| 8 | 10,2% | 10,6% | 12,5% | 9,7% |
| 9 | 2,5% | 2,0% | 4,7% | 2,4% |
| 10 | 1,2% | 3,1% | 0,4% | 1,3% |
| Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10) | 34,4% | 37,7% | 52,9% | 38,9% |
| Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue | 30,4% | 45,9% | 66,9% | 52,1% |
| Parmi eux : | | | | |
| - Perturbe le travail | 52,0% | 42,7% | 71,2% | 58,7% |
| - Aspect positif du travail | 49,3% | 50,6% | 28,4% | 41,4% |

| Appréciation sur le travail | H- Transports et entreposage n=248 | I- Hébergement et restauration n=356 | K- Activités financières et d'assurance n=257 | Base Everest n=4603 |
|--|--|--|---|------------------------|
| -Travail permet d'apprendre | | | | |
| Non pas du tout | 10,9% | 8,5% | 2,3% | 6,4% |
| Plutôt non | 20,6% | 15,3% | 8,6% | 13,0% |
| Plutôt oui | 43,1% | 44,1% | 47,3% | 45,6% |
| Oui tout à fait | 25,4% | 32,2% | 41,8% | 35,0% |
| -Travail varié | | | | |
| Non pas du tout | 8,6% | 6,5% | 3,1% | 5,2% |
| Plutôt non | 18,4% | 14,6% | 12,1% | 14,9% |
| Plutôt oui | 45,9% | 46,6% | 49,8% | 45,5% |
| Oui tout à fait | 27,0% | 32,3% | 35,0% | 34,4% |
| -Choix dans la façon de procéder | | | | |
| Non pas du tout | 12,8% | 9,3% | 7,5% | 6,9% |
| Plutôt non | 19,0% | 20,6% | 27,8% | 17,2% |
| Plutôt oui | 44,2% | 41,8% | 43,5% | 46,5% |
| Oui tout à fait | 24,0% | 28,2% | 21,2% | 29,5% |
| -Possibilités suffisantes d'entraide | | | | |
| Non pas du tout | 4,1% | 3,4% | 3,5% | 3,3% |
| Plutôt non | 13,0% | 9,1% | 14,1% | 11,7% |
| Plutôt oui | 61,0% | 51,6% | 57,3% | 55,9% |
| Oui tout à fait | 22,0% | 35,9% | 25,1% | 29,1% |
| -Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité | | | | |
| Non pas du tout | 3,3% | 1,5% | 2,0% | 2,6% |
| Plutôt non | 12,9% | 7,0% | 18,1% | 11,6% |
| Plutôt oui | 64,2% | 58,1% | 59,8% | 58,0% |
| Oui tout à fait | 19,6% | 33,4% | 20,1% | 27,8% |
| -Travail reconnu | | | | |
| Non pas du tout | 7,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% |
| Plutôt non | 22,7% | 9,9% | 18,1% | 15,9% |
| Plutôt oui | 49,6% | 54,3% | 58,3% | 54,8% |
| Oui tout à fait | 20,7% | 29,3% | 18,1% | 23,8% |
| -Faire des choses que l'on désapprouve | | | | |
| Non pas du tout | 33,3% | 38,7% | 21,0% | 30,4% |
| Plutôt non | 50,0% | 41,3% | 55,6% | 50,3% |
| Plutôt oui | 15,9% | 13,7% | 20,2% | 16,5% |
| Oui tout à fait | 0,8% | 6,3% | 3,2% | 2,8% |
| -Travailler avec la peur de perdre son emploi | | | | |
| Non pas du tout | 56,5% | 70,8% | 48,2% | 57,9% |
| Plutôt non | 31,3% | 18,5% | 39,6% | 30,2% |
| Plutôt oui | 7,7% | 6,7% | 9,4% | 8,5% |
| Oui tout à fait | 4,5% | 3,9% | 2,7% | 3,4% |

| Charge physique du poste de travail | H- Transports et entreposage n=248 | I- Hébergement et restauration n=356 | K- Activités financières et d'assurance n=257 | Base Everest n=4603 |
|--|--|--|---|------------------------|
| Postures contraignantes : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 42,7% | 38,9% | 70,2% | 44,5% |
| Oui parfois | 37,9% | 46,3% | 19,2% | 38,2% |
| Oui souvent | 19,4% | 14,8% | 10,6% | 17,3% |
| Difficultés | | | | |
| Pas de postures contraignantes | 42,7% | 38,9% | 70,2% | 44,5% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible | 24,6% | 25,9% | 16,5% | 25,5% |
| Postures contraignantes, pas difficile ou pénible | 27,4% | 31,5% | 10,6% | 26,4% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p. | 5,2% | 3,7% | 2,7% | 3,6% |
| Effort, port de charges lourdes : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 48,2% | 35,6% | 87,8% | 50,9% |
| Oui parfois | 36,0% | 48,1% | 9,0% | 33,4% |
| Oui souvent | 15,8% | 16,2% | 3,1% | 15,7% |
| Difficultés | | | | |
| Pas d'effort, port de charges lourdes | 48,2% | 35,6% | 87,8% | 50,9% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible | 19,0% | 23,6% | 6,7% | 22,4% |
| Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible | 26,7% | 33,3% | 5,1% | 22,8% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p. | 6,1% | 7,4% | 0,4% | 3,9% |
| Gestes répétitifs : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 30,0% | 20,4% | 57,8% | 38,3% |
| Oui parfois | 30,4% | 29,0% | 25,8% | 27,6% |
| Oui souvent | 39,7% | 50,6% | 16,4% | 34,2% |
| Difficultés | | | | |
| Pas de gestes répétitifs | 30,0% | 20,4% | 57,8% | 38,3% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible | 17,0% | 19,5% | 7,0% | 16,6% |
| Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible | 45,7% | 54,3% | 31,6% | 39,5% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé | 7,3% | 5,7% | 3,5% | 5,6% |
| Importants déplacements à pieds : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 67,8% | 51,6% | 87,5% | 62,3% |
| Oui parfois | 18,8% | 14,9% | 7,8% | 18,8% |
| Oui souvent | 13,5% | 33,5% | 4,7% | 18,9% |
| Difficultés | | | | |
| Pas d'importants déplacements à pieds | 67,8% | 51,6% | 87,5% | 62,3% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible | 4,5% | 14,6% | 3,1% | 9,8% |
| Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible | 23,7% | 30,9% | 8,6% | 25,0% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p. | 4,1% | 2,9% | 0,8% | 2,9% |
| Station debout prolongée : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 57,7% | 13,9% | 86,9% | 45,4% |
| Oui parfois | 21,1% | 15,6% | 9,6% | 20,3% |
| Oui souvent | 21,1% | 70,5% | 3,6% | 34,3% |
| Difficultés | | | | |
| Pas de station debout prolongée | 57,7% | 13,9% | 86,9% | 45,4% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible | 13,8% | 33,5% | 4,4% | 18,5% |
| Station debout prolongée, pas difficile ou pénible | 22,8% | 46,3% | 7,2% | 31,0% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p. | 5,7% | 6,2% | 1,6% | 5,2% |

| Expositions | H- Transports et entreposage n=248 | I- Hébergement et restauration n=356 | K- Activités financières et d'assurance n=257 | Base Everest n=4603 |
|-----------------------------|--|--|---|------------------------|
| Produits chimiques | 13,8% | 26,3% | 2,7% | 19,3% |
| Poussières, fumées | 32,5% | 26,2% | 11,0% | 28,9% |
| Rx ionisants | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 2,2% |
| Vibrations | 36,6% | 4,6% | 2,8% | 14,2% |
| Gêne sonore | 42,2% | 29,1% | 15,3% | 32,6% |
| Bruit > 80db | 29,7% | 12,0% | 5,6% | 20,7% |
| Contrainte visuelle | 35,8% | 9,7% | 41,4% | 25,6% |
| Conduite routière prolongée | 34,4% | 2,9% | 9,6% | 14,2% |
| Chaleur intense | 13,4% | 28,7% | 2,8% | 15,4% |
| Froid intense | 25,1% | 11,2% | 2,0% | 13,3% |
| Intempéries | 43,1% | 6,9% | 2,8% | 15,7% |
| Pression psychologique | 25,2% | 17,8% | 29,2% | 22,2% |
| Agent biologique | 3,3% | 3,8% | 0,8% | 6,5% |
| Contact avec le public | 68,7% | 79,4% | 65,5% | 69,5% |

| Formation | H- Transports et entreposage n=248 | I- Hébergement et restauration n=356 | K- Activités financières et d'assurance n=257 | Base Everest n=4603 |
|--|--|--|---|------------------------|
| A bénéficié d'une formation depuis un an : | 35,5% | 31,9% | 63,1% | 44,6% |
| Parmi eux : | | | | |
| - En rapport avec le travail actuel | 91,9% | 76,6% | 90,4% | 88,7% |
| - En rapport avec le travail futur | 12,2% | 20,0% | 16,2% | 15,7% |
| - Formation d'intérêt général | 44,2% | 43,0% | 52,9% | 45,9% |
| Rôle de formateur ou tuteur depuis un an | 16,2% | 22,1% | 23,9% | 23,4% |

| Mode de vie | H- Transports et entreposage n=248 | I- Hébergement et restauration n=356 | K- Activités financières et d'assurance n=257 | Base Everest n=4603 |
|--|--|--|---|------------------------|
| Activité sportive régulière | 53,6% | 49,0% | 58,6% | 55,5% |
| Consommation de tabac | 43,3% | 56,7% | 29,6% | 38,7% |
| Consommation de tabac sup à 15 cig/jour | 11,0% | 14,0% | 4,3% | 9,1% |
| Consommation de café | 84,2% | 74,4% | 76,8% | 77,0% |
| Consommation de café sup à 4 tasses/jour | 14,1% | 16,9% | 9,2% | 12,6% |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 14,2% | 9,2% | 24,0% | 17,5% |

Rapport Evrest 2012-2013 – Région PACA

| Etat de santé | H- Transports et entreposage | | | I- Hébergement et restauration | | | K- Activités financières et d'assurance | | | Base Evrest | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=146 | ≥ 45 ans n=102 | Ensemble n=248 | <45 ans n=276 | ≥ 45 ans n=80* | Ensemble n=356 | <45 ans n=154 | ≥ 45 ans n=103 | Ensemble n=257 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Indice de masse corporelle | | | | | | | | | | | | |
| - Normaux ou maigres | 61,9% | 49,0% | 56,5% | 71,5% | 70,5% | 71,3% | 75,5% | 57,9% | 68,6% | 68,9% | 55,4% | 64,1% |
| - Surpoids | 28,8% | 31,6% | 30,0% | 19,2% | 20,5% | 19,5% | 16,3% | 31,6% | 22,3% | 22,5% | 31,0% | 25,6% |
| - Obeses | 9,4% | 19,4% | 13,5% | 9,2% | 9,0% | 9,2% | 8,2% | 10,5% | 9,1% | 8,6% | 13,6% | 10,4% |
| Appareil respiratoire | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 0,7% | 2,0% | 1,2% | 2,2% | 5,1% | 2,9% | 2,0% | 4,9% | 3,1% | 2,4% | 3,7% | 2,9% |
| Plaintes ou signes cliniques | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,9% | 5,1% | 2,6% | 2,0% | 3,9% | 2,8% | 2,4% | 3,0% | 2,6% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 0,0% | 2,9% | 1,2% | 1,4% | 2,4% | 1,8% |
| Appareil cardio vasculaire | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 0,7% | 4,1% | 2,1% | 1,1% | 5,1% | 2,0% | 2,6% | 6,8% | 4,3% | 1,5% | 4,6% | 2,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 0,0% | 3,1% | 1,3% | 1,1% | 5,1% | 2,0% | 2,6% | 6,8% | 4,3% | 1,3% | 3,9% | 2,3% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 1,3% | 0,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 3,8% | 1,7% | 0,7% | 3,9% | 2,0% | 0,6% | 3,2% | 1,5% |
| HTA | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,4% | 6,1% | 3,3% | 0,7% | 6,4% | 2,0% | 2,0% | 15,7% | 7,6% | 1,8% | 12,6% | 5,7% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,4% | 4,0% | 2,5% | 0,7% | 5,1% | 1,7% | 2,0% | 14,7% | 7,2% | 1,7% | 10,8% | 5,0% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 0,4% | 0,0% | 0,7% | 0,3% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,0% | 2,0% | 0,8% | 0,0% | 5,1% | 1,2% | 0,0% | 13,7% | 5,6% | 0,8% | 8,9% | 3,7% |
| Digestif | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,8% | 10,3% | 5,8% | 4,5% | 1,3% | 3,8% | 2,7% | 13,7% | 7,2% | 4,2% | 6,7% | 5,1% |
| Plaintes ou signes cliniques | 2,8% | 9,4% | 5,4% | 4,5% | 1,3% | 3,8% | 2,7% | 13,7% | 7,2% | 4,1% | 6,4% | 4,9% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 0,0% | 0,9% | 1,4% | 2,0% | 1,6% | 0,9% | 1,2% | 1,0% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,4% | 4,3% | 2,5% | 1,9% | 1,3% | 1,8% | 1,4% | 5,9% | 3,2% | 1,8% | 3,8% | 2,5% |
| Dermatologie | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,4% | 6,1% | 3,3% | 4,2% | 2,6% | 3,8% | 4,7% | 2,9% | 4,0% | 3,5% | 3,3% | 3,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 0,7% | 6,1% | 2,9% | 3,8% | 2,6% | 3,5% | 4,7% | 2,9% | 4,0% | 3,3% | 3,2% | 3,3% |
| Gêne dans le travail | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,4% | 3,0% | 2,1% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 2,0% | 2,9% | 2,4% | 1,7% | 2,1% | 1,9% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé | H- Transports et entreposage | | | I- Hébergement et restauration | | | K- Activités financières et d'assurance | | | Base Evrest | | |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=146 | ≥ 45 ans n=102 | Ensemble n=248 | <45 ans n=276 | ≥ 45 ans n=80* | Ensemble n=356 | <45 ans n=154 | ≥ 45 ans n=103 | Ensemble n=257 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Lassitude, fatigue | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 12,0% | 7,1% | 10,0% | 12,6% | 13,0% | 12,7% | 13,9% | 21,4% | 16,9% | 11,9% | 15,9% | 13,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 12,0% | 7,1% | 10,0% | 12,6% | 11,8% | 12,4% | 13,9% | 21,4% | 16,9% | 11,7% | 15,7% | 13,2% |
| Gêne dans le travail | 5,1% | 4,0% | 4,6% | 7,1% | 7,8% | 7,3% | 9,9% | 14,0% | 11,6% | 6,2% | 8,6% | 7,0% |
| Traitements ou autres soins | 0,7% | 2,0% | 1,3% | 1,9% | 2,6% | 2,0% | 3,3% | 8,0% | 5,2% | 1,8% | 3,8% | 2,5% |
| Anxiété, nervosité | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 9,2% | 12,1% | 10,4% | 10,7% | 16,7% | 12,1% | 13,9% | 23,3% | 17,7% | 10,4% | 14,7% | 12,0% |
| Plaintes ou signes cliniques | 9,2% | 11,1% | 10,0% | 10,7% | 16,7% | 12,1% | 13,9% | 23,3% | 17,7% | 10,1% | 14,4% | 11,6% |
| Gêne dans le travail | 5,0% | 5,1% | 5,0% | 4,5% | 9,1% | 5,5% | 7,9% | 12,0% | 9,6% | 5,2% | 7,4% | 6,0% |
| Traitements ou autres soins | 2,9% | 4,0% | 3,3% | 1,9% | 6,5% | 2,9% | 4,0% | 8,9% | 6,0% | 2,4% | 4,3% | 3,1% |
| Troubles du sommeil | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 15,5% | 10,1% | 13,3% | 9,8% | 11,7% | 10,2% | 16,1% | 27,7% | 20,8% | 10,4% | 16,5% | 12,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 14,9% | 10,1% | 12,9% | 9,8% | 11,7% | 10,2% | 16,1% | 27,0% | 20,5% | 10,1% | 16,1% | 12,3% |
| Gêne dans le travail | 7,0% | 1,0% | 4,6% | 3,4% | 3,9% | 3,5% | 6,7% | 12,0% | 8,8% | 4,2% | 6,0% | 4,8% |
| Traitements ou autres soins | 2,8% | 2,0% | 2,5% | 1,9% | 5,2% | 2,6% | 4,1% | 9,2% | 6,1% | 2,0% | 4,6% | 2,9% |
| ➤ Troubles neuro psychiques <i>(les 3 signes ci-dessus)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,2% | 3,0% | 3,7% | 3,3% | 2,6% | 3,2% | 4,0% | 11,7% | 7,1% | 3,2% | 5,4% | 4,0% |
| Plaintes ou signes cliniques | 3,5% | 3,0% | 3,3% | 3,3% | 2,6% | 3,2% | 4,0% | 10,8% | 6,7% | 3,0% | 5,1% | 3,7% |
| Gêne dans le travail | 2,1% | 1,0% | 1,7% | 1,9% | 1,3% | 1,7% | 3,3% | 7,9% | 5,2% | 1,5% | 2,8% | 1,9% |
| Traitements ou autres soins | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 5,0% | 2,8% | 0,6% | 1,4% | 0,9% |
| Troubles de l'audition | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,4% | 6,1% | 3,4% | 3,4% | 3,9% | 3,5% | 0,7% | 2,0% | 1,2% | 2,0% | 6,6% | 3,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,4% | 5,2% | 3,0% | 3,4% | 2,6% | 3,2% | 0,7% | 2,0% | 1,2% | 1,8% | 6,3% | 3,4% |
| Gêne dans le travail | 0,7% | 2,0% | 1,3% | 1,9% | 1,3% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 2,3% | 1,1% |
| Traitements ou autres soins | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 0,5% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé | H- Transports et entreposage | | | I- Hébergement et restauration | | | K- Activités financières et d'assurance | | | Base Everest | | |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=146 | ≥ 45 ans n=102 | Ensemble n=248 | <45 ans n=276 | ≥ 45 ans n=80* | Ensemble n=356 | <45 ans n=154 | ≥ 45 ans n=103 | Ensemble n=257 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Troubles ostéoarticulaires de l'épaule | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 8,5% | 7,0% | 7,9% | 3,7% | 19,0% | 7,2% | 1,3% | 6,8% | 3,5% | 4,2% | 9,4% | 6,1% |
| Plaintes ou signes cliniques | 7,8% | 7,0% | 7,5% | 3,7% | 17,7% | 6,9% | 1,3% | 6,8% | 3,5% | 4,1% | 9,1% | 5,9% |
| Gêne dans le travail | 5,7% | 4,0% | 5,0% | 2,6% | 12,8% | 4,9% | 0,7% | 4,9% | 2,4% | 2,4% | 6,0% | 3,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,4% | 2,0% | 1,7% | 1,5% | 6,3% | 2,6% | 0,7% | 3,9% | 2,0% | 1,1% | 4,6% | 2,4% |
| Troubles ostéoarticulaires du coude | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,1% | 1,0% | 1,7% | 0,7% | 3,9% | 1,4% | 0,7% | 2,0% | 1,2% | 1,7% | 4,2% | 2,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 2,1% | 1,0% | 1,7% | 0,7% | 3,9% | 1,4% | 0,7% | 2,0% | 1,2% | 1,6% | 4,0% | 2,4% |
| Gêne dans le travail | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 3,9% | 1,2% | 0,7% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | 2,8% | 1,8% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,7% | 0,0% | 0,4% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 2,0% | 1,2% | 0,7% | 2,2% | 1,2% |
| Troubles ostéoarticulaires du poignet | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,4% | 3,1% | 2,1% | 2,2% | 10,4% | 4,0% | 2,0% | 4,9% | 3,2% | 3,4% | 6,3% | 4,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 0,7% | 3,1% | 1,7% | 2,2% | 10,4% | 4,0% | 2,0% | 4,9% | 3,2% | 3,2% | 6,0% | 4,2% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 1,0% | 0,4% | 1,5% | 10,4% | 3,5% | 1,3% | 2,9% | 2,0% | 2,0% | 4,1% | 2,8% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,7% | 2,0% | 1,2% | 1,5% | 6,5% | 2,6% | 1,3% | 2,0% | 1,6% | 1,1% | 3,0% | 1,8% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur | | | | | | | | | | | | |
| <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 11,3% | 10,2% | 10,8% | 5,2% | 27,3% | 10,1% | 2,7% | 10,9% | 6,0% | 7,6% | 15,2% | 10,3% |
| Plaintes ou signes cliniques | 9,9% | 10,2% | 10,0% | 5,2% | 26,0% | 9,9% | 2,7% | 10,9% | 6,0% | 7,4% | 14,8% | 10,0% |
| Gêne dans le travail | 6,4% | 5,1% | 5,9% | 4,1% | 22,4% | 8,1% | 2,0% | 7,0% | 4,0% | 4,5% | 9,8% | 6,4% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,8% | 4,1% | 3,3% | 2,2% | 14,3% | 4,9% | 2,0% | 5,0% | 3,2% | 2,4% | 7,6% | 4,3% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé | H- Transports et entreposage | | | I- Hébergement et restauration | | | K- Activités financières et d'assurance | | | Base Everest | | |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=146 | ≥ 45 ans n=102 | Ensemble n=248 | <45 ans n=276 | ≥ 45 ans n=80* | Ensemble n=356 | <45 ans n=154 | ≥ 45 ans n=103 | Ensemble n=257 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 3,5% | 11,1% | 6,6% | 6,3% | 11,5% | 7,5% | 4,0% | 8,8% | 6,0% | 5,7% | 10,3% | 7,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 3,5% | 11,1% | 6,6% | 6,3% | 11,5% | 7,5% | 4,0% | 8,8% | 6,0% | 5,6% | 10,1% | 7,2% |
| Gêne dans le travail | 0,7% | 5,1% | 2,5% | 3,7% | 5,1% | 4,1% | 0,7% | 2,9% | 1,6% | 2,9% | 5,8% | 3,9% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,4% | 5,1% | 2,9% | 2,6% | 5,2% | 3,2% | 1,3% | 3,9% | 2,4% | 2,4% | 5,0% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 6,3% | 7,1% | 6,6% | 3,0% | 5,1% | 3,5% | 10,0% | 10,7% | 10,3% | 6,1% | 9,1% | 7,2% |
| Plaintes ou signes cliniques | 5,6% | 6,2% | 5,8% | 3,0% | 5,1% | 3,5% | 10,0% | 10,7% | 10,3% | 6,0% | 8,9% | 7,0% |
| Gêne dans le travail | 2,8% | 3,1% | 2,9% | 2,3% | 1,3% | 2,0% | 6,0% | 6,9% | 6,4% | 3,7% | 5,9% | 4,4% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,8% | 3,1% | 2,9% | 1,1% | 2,5% | 1,5% | 6,0% | 8,8% | 7,1% | 2,6% | 4,6% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 7,0% | 16,2% | 10,7% | 13,0% | 20,5% | 14,7% | 9,5% | 23,5% | 15,2% | 13,9% | 19,2% | 15,8% |
| Plaintes ou signes cliniques | 5,6% | 14,4% | 9,2% | 12,6% | 20,5% | 14,4% | 9,5% | 22,8% | 14,9% | 13,3% | 18,7% | 15,2% |
| Gêne dans le travail | 4,2% | 9,3% | 6,3% | 7,5% | 14,1% | 9,0% | 4,1% | 12,0% | 7,3% | 8,0% | 12,7% | 9,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,1% | 8,2% | 4,6% | 4,1% | 12,8% | 6,1% | 3,4% | 11,9% | 6,8% | 4,4% | 9,6% | 6,3% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 11,9% | 19,4% | 14,9% | 14,6% | 21,8% | 16,2% | 18,2% | 27,5% | 22,0% | 17,6% | 23,6% | 19,8% |
| Plaintes ou signes cliniques | 10,6% | 17,7% | 13,4% | 14,2% | 21,8% | 15,9% | 18,2% | 26,7% | 21,7% | 17,0% | 23,2% | 19,2% |
| Gêne dans le travail | 7,0% | 11,5% | 8,8% | 8,7% | 14,1% | 10,0% | 8,8% | 15,0% | 11,3% | 10,2% | 15,7% | 12,2% |
| TraITEMENT ou autre soin | 5,0% | 9,3% | 6,7% | 4,9% | 12,8% | 6,7% | 9,5% | 14,9% | 11,6% | 6,3% | 11,8% | 8,2% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Description de la population | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=350 | N- Activités de services administratifs et de soutien n=305 | Q- Santé humaine et action sociale n=492 | Base Everest n=4603 |
|------------------------------|---|--|---|------------------------|
| Répartition hommes / femmes | 47,4% / 52,6% | 54,8% / 45,2% | 23,2% / 76,8% | 53,6% / 46,4% |
| ≤24 ans | 7,7% | 12,8% | 7,1% | 11,6% |
| 25-34 ans | 33,1% | 25,2% | 23,6% | 26,3% |
| 35-44 ans | 30,0% | 23,9% | 24,8% | 26,3% |
| 45-54 ans | 21,4% | 26,2% | 31,5% | 25,9% |
| 55 ans et plus | 7,7% | 11,8% | 13,0% | 9,9% |
| Cadres | 38,0% | 8,5% | 5,5% | 15,3% |
| Intermédiaires | 22,0% | 11,8% | 34,6% | 23,0% |
| Employés | 31,7% | 39,7% | 51,0% | 37,3% |
| Ouvriers | 7,4% | 39,3% | 7,9% | 23,7% |

| Conditions de travail | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=350 | N- Activités de services administratifs et de soutien n=305 | Q- Santé humaine et action sociale n=492 | Base Everest n=4603 |
|---|---|--|---|------------------------|
| - Changement de travail depuis 1 an : | | | | |
| Non | 83,7% | 74,8% | 85,9% | 82,8% |
| Oui, raison médicale | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,7% |
| Oui, autre raison | 14,9% | 22,2% | 12,3% | 15,0% |
| Oui, raison non précisée | 1,1% | 2,6% | 1,6% | 1,4% |
| Travail à temps plein | 79,2% | 76,4% | 70,5% | 81,1% |
| Travail en journée normale | 91,5% | 73,7% | 76,7% | 80,1% |
| Coupures de plus de 2 heures | 19,1% | 22,3% | 13,9% | 19,4% |
| Horaires décalés | 14,7% | 33,9% | 30,1% | 27,9% |
| Horaires irréguliers ou alternés | 18,4% | 26,5% | 34,7% | 25,8% |
| Travail de nuit | 4,7% | 12,8% | 13,5% | 25,8% |
| Déplacements professionnels de plus de 24h | 16,1% | 8,0% | 4,1% | 8,8% |
| - Dépasser ses horaires normaux | | | | |
| Jamais | 7,8% | 21,1% | 16,8% | 16,2% |
| Rarement | 39,6% | 40,6% | 48,6% | 43,7% |
| Assez souvent | 38,7% | 28,5% | 23,6% | 27,3% |
| Très souvent | 13,9% | 9,7% | 11,1% | 12,8% |
| - Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause | | | | |
| Jamais | 28,0% | 45,3% | 33,5% | 36,4% |
| Rarement | 40,1% | 28,9% | 34,0% | 37,6% |
| Assez souvent | 23,9% | 17,4% | 19,5% | 17,9% |
| Très souvent | 8,1% | 8,4% | 13,0% | 8,0% |
| - Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin | | | | |
| Jamais | 24,5% | 44,0% | 31,5% | 34,0% |
| Rarement | 47,5% | 33,2% | 37,6% | 40,9% |
| Assez souvent | 21,3% | 16,8% | 22,8% | 19,2% |
| Très souvent | 6,7% | 6,0% | 8,1% | 5,9% |
| - Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile) | | | | |
| 0 | 3,8% | 7,7% | 6,5% | 6,6% |
| 1 | 4,6% | 6,7% | 5,6% | 6,3% |
| 2 | 11,3% | 7,7% | 6,9% | 8,9% |
| 3 | 7,8% | 12,0% | 11,7% | 11,5% |
| 4 | 9,5% | 9,7% | 10,2% | 9,7% |
| 5 | 19,1% | 22,3% | 17,9% | 18,3% |
| 6 | 15,6% | 9,7% | 10,8% | 11,3% |
| 7 | 16,5% | 11,7% | 13,3% | 14,1% |
| 8 | 9,8% | 8,3% | 12,3% | 9,7% |
| 9 | 0,6% | 3,0% | 4,0% | 2,4% |
| 10 | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 1,3% |
| Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10) | 43,9% | 34,0% | 41,2% | 38,9% |
| Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue | 62,9% | 44,5% | 49,8% | 52,1% |
| Parmi eux : | | | | |
| - Perturbe le travail | 66,1% | 52,0% | 65,5% | 58,7% |
| - Aspect positif du travail | 39,0% | 44,3% | 35,6% | 41,4% |

| Appréciation sur le travail | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=350 | N- Activités de services administratifs et de soutien n=305 | Q- Santé Humaine et action sociale n=492 | Base Everest n=4603 |
|--|---|--|---|------------------------|
| -Travail permet d'apprendre | | | | |
| Non pas du tout | 1,7% | 16,7% | 4,3% | 6,4% |
| Plutôt non | 9,7% | 17,0% | 11,3% | 13,0% |
| Plutôt oui | 41,8% | 39,3% | 45,5% | 45,6% |
| Oui tout à fait | 46,7% | 27,0% | 38,9% | 35,0% |
| -Travail varié | | | | |
| Non pas du tout | 2,0% | 13,7% | 4,9% | 5,2% |
| Plutôt non | 11,4% | 22,3% | 17,9% | 14,9% |
| Plutôt oui | 45,4% | 39,3% | 42,1% | 45,5% |
| Oui tout à fait | 41,1% | 24,7% | 35,1% | 34,4% |
| -Choix dans la façon de procéder | | | | |
| Non pas du tout | 3,4% | 14,3% | 5,0% | 6,9% |
| Plutôt non | 12,1% | 14,7% | 18,0% | 17,2% |
| Plutôt oui | 47,4% | 42,3% | 51,9% | 46,5% |
| Oui tout à fait | 37,1% | 28,7% | 25,2% | 29,5% |
| -Possibilités suffisantes d'entraide | | | | |
| Non pas du tout | 2,6% | 5,5% | 3,7% | 3,3% |
| Plutôt non | 12,7% | 14,4% | 14,1% | 11,7% |
| Plutôt oui | 50,6% | 52,7% | 59,8% | 55,9% |
| Oui tout à fait | 34,1% | 27,4% | 22,4% | 29,1% |
| -Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité | | | | |
| Non pas du tout | 1,5% | 4,5% | 3,2% | 2,6% |
| Plutôt non | 9,0% | 14,1% | 15,5% | 11,6% |
| Plutôt oui | 57,0% | 55,3% | 59,0% | 58,0% |
| Oui tout à fait | 32,5% | 26,1% | 22,3% | 27,8% |
| -Travail reconnu | | | | |
| Non pas du tout | 2,7% | 6,1% | 6,9% | 5,5% |
| Plutôt non | 14,7% | 17,1% | 19,3% | 15,9% |
| Plutôt oui | 62,8% | 50,5% | 53,2% | 54,8% |
| Oui tout à fait | 19,8% | 26,3% | 20,6% | 23,8% |
| -Faire des choses que l'on désapprouve | | | | |
| Non pas du tout | 30,4% | 37,5% | 27,0% | 30,4% |
| Plutôt non | 55,3% | 39,2% | 49,9% | 50,3% |
| Plutôt oui | 13,8% | 19,9% | 19,6% | 16,5% |
| Oui tout à fait | 0,6% | 3,4% | 3,5% | 2,8% |
| -Travailler avec la peur de perdre son emploi | | | | |
| Non pas du tout | 54,9% | 51,0% | 59,7% | 57,9% |
| Plutôt non | 33,6% | 32,7% | 27,3% | 30,2% |
| Plutôt oui | 8,9% | 10,7% | 8,1% | 8,5% |
| Oui tout à fait | 2,6% | 5,7% | 5,0% | 3,4% |

| Charge physique du poste de travail | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=350 | N- Activités de services administratifs et de soutien n=305 | Q- Santé Humaine et action sociale n=492 | Base Everest n=4603 |
|--|---|--|---|------------------------|
| Postures contraignantes : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 64,9% | 41,6% | 28,0% | 44,5% |
| Oui parfois | 27,9% | 38,6% | 45,8% | 38,2% |
| Oui souvent | 7,2% | 19,8% | 26,2% | 17,3% |
| Difficultés | | | | |
| Pas de postures contraignantes | 64,9% | 41,6% | 28,0% | 44,5% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible | 12,9% | 23,5% | 37,4% | 25,5% |
| Postures contraignantes, pas difficile ou pénible | 20,1% | 30,9% | 30,5% | 26,4% |
| Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p. | 2,0% | 4,0% | 4,1% | 3,6% |
| Effort, port de charges lourdes : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 74,0% | 52,7% | 37,2% | 50,9% |
| Oui parfois | 20,2% | 32,7% | 38,7% | 33,4% |
| Oui souvent | 5,8% | 14,7% | 24,1% | 15,7% |
| Difficultés | | | | |
| Pas d'effort, port de charges lourdes | 74,0% | 52,7% | 37,2% | 50,9% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible | 10,4% | 19,0% | 34,8% | 22,4% |
| Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible | 14,7% | 24,7% | 23,1% | 22,8% |
| Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p. | 0,9% | 3,7% | 4,9% | 3,9% |
| Gestes répétitifs : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 50,6% | 36,9% | 31,6% | 38,3% |
| Oui parfois | 24,4% | 23,2% | 26,1% | 27,6% |
| Oui souvent | 25,0% | 39,9% | 42,3% | 34,2% |
| Difficultés | | | | |
| Pas de gestes répétitifs | 50,6% | 36,9% | 31,6% | 38,3% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible | 7,8% | 17,8% | 21,8% | 16,6% |
| Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible | 35,9% | 38,3% | 40,2% | 39,5% |
| Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé | 5,7% | 7,0% | 6,4% | 5,6% |
| Importants déplacements à pieds : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 78,2% | 59,7% | 53,8% | 62,3% |
| Oui parfois | 13,1% | 22,0% | 20,1% | 18,8% |
| Oui souvent | 8,7% | 18,3% | 26,1% | 18,9% |
| Difficultés | | | | |
| Pas d'importants déplacements à pieds | 78,2% | 59,7% | 53,8% | 62,3% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible | 4,7% | 8,0% | 14,5% | 9,8% |
| Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible | 13,7% | 28,3% | 28,4% | 25,0% |
| Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p. | 3,5% | 4,0% | 3,3% | 2,9% |
| Station debout prolongée : | | | | |
| Fréquence | | | | |
| Non jamais | 75,2% | 42,5% | 36,4% | 45,4% |
| Oui parfois | 13,5% | 18,9% | 20,2% | 20,3% |
| Oui souvent | 11,2% | 38,5% | 43,4% | 34,3% |
| Difficultés | | | | |
| Pas de station debout prolongée | 75,2% | 42,5% | 36,4% | 45,4% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible | 5,2% | 15,9% | 27,9% | 18,5% |
| Station debout prolongée, pas difficile ou pénible | 17,0% | 33,9% | 30,4% | 31,0% |
| Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p. | 2,6% | 7,6% | 5,4% | 5,2% |

| Expositions | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=350 | N- Activités de services administratifs et de soutien n=305 | Q- Santé Humaine et action sociale n=492 | Base Everest n=4603 |
|-----------------------------|---|--|---|------------------------|
| Produits chimiques | 13,8% | 21,3% | 25,1% | 19,3% |
| Poussières, fumées | 12,2% | 36,0% | 18,2% | 28,9% |
| Rx ionisants | 4,6% | 0,7% | 5,7% | 2,2% |
| Vibrations | 4,9% | 18,8% | 6,4% | 14,2% |
| Gêne sonore | 19,9% | 36,4% | 27,0% | 32,6% |
| Bruit > 80db | 8,2% | 23,2% | 11,6% | 20,7% |
| Contrainte visuelle | 31,4% | 27,0% | 20,4% | 25,6% |
| Conduite routière prolongée | 13,5% | 13,8% | 12,0% | 14,2% |
| Chaleur intense | 9,6% | 14,5% | 13,7% | 15,4% |
| Froid intense | 6,4% | 13,6% | 6,3% | 13,3% |
| Intempéries | 7,8% | 21,2% | 9,2% | 15,7% |
| Pression psychologique | 20,2% | 20,2% | 31,1% | 22,2% |
| Agent biologique | 4,3% | 5,4% | 28,0% | 6,5% |
| Contact avec le public | 54,2% | 59,6% | 87,6% | 69,5% |

| Formation | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=350 | N- Activités de services administratifs et de soutien n=305 | Q- Santé Humaine et action sociale n=492 | Base Everest n=4603 |
|--|---|--|---|------------------------|
| A bénéficié d'une formation depuis un an : | 55,1% | 35,5% | 46,4% | 44,6% |
| Parmi eux : | | | | |
| - En rapport avec le travail actuel | 92,4% | 88,9% | 91,7% | 88,7% |
| - En rapport avec le travail futur | 18,2% | 17,0% | 14,6% | 15,7% |
| - Formation d'intérêt général | 40,7% | 36,2% | 46,9% | 45,9% |
| Rôle de formateur ou tuteur depuis un an | 24,3% | 16,2% | 27,4% | 23,4% |

| Mode de vie | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=350 | N- Activités de services administratifs et de soutien n=305 | Q- Santé Humaine et action sociale n=492 | Base Everest n=4603 |
|--|---|--|---|------------------------|
| Activité sportive régulière | 62,3% | 47,3% | 56,6% | 55,5% |
| Consommation de tabac | 28,9% | 43,1% | 39,0% | 38,7% |
| Consommation de tabac sup à 15 cig/jour | 5,0% | 11,9% | 7,6% | 9,1% |
| Consommation de café | 76,0% | 73,2% | 74,6% | 77,0% |
| Consommation de café sup à 4 tasses/jour | 10,1% | 14,4% | 14,3% | 12,6% |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 20,2% | 18,2% | 20,5% | 17,5% |

Rapport Evrest 2012-2013 – Région PACA

| Etat de santé | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques | | | N- Activités de services administratifs et de soutien | | | Q- Santé humaine et action sociale | | | Base Evrest | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=248 | ≥ 45 ans n=102 | Ensemble n=350 | <45 ans n=189 | ≥ 45 ans n=116 | Ensemble n=305 | <45 ans n=273 | ≥ 45 ans n=219 | Ensemble n=492 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Indice de masse corporelle | | | | | | | | | | | | |
| - Normaux ou maigres | 70,8% | 61,5% | 68,1% | 68,8% | 56,5% | 64,1% | 67,2% | 58,7% | 63,4% | 68,9% | 55,4% | 64,1% |
| - Surpoids | 21,0% | 29,2% | 23,4% | 22,2% | 24,1% | 22,9% | 24,3% | 26,0% | 25,1% | 22,5% | 31,0% | 25,6% |
| - Obèses | 8,2% | 9,4% | 8,5% | 9,1% | 19,4% | 13,0% | 8,5% | 15,4% | 11,6% | 8,6% | 13,6% | 10,4% |
| Appareil respiratoire | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,2% | 0,0% | 0,9% | 2,7% | 1,7% | 2,3% | 1,1% | 5,3% | 2,9% | 2,4% | 3,7% | 2,9% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,2% | 0,0% | 0,9% | 2,7% | 1,7% | 2,3% | 1,1% | 4,8% | 2,7% | 2,4% | 3,0% | 2,6% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 0,7% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,8% | 0,0% | 0,6% | 1,6% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 3,3% | 1,9% | 1,4% | 2,4% | 1,8% |
| Appareil cardio vasculaire | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 0,8% | 4,9% | 2,0% | 1,6% | 4,4% | 2,6% | 2,6% | 6,2% | 4,2% | 1,5% | 4,6% | 2,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 0,8% | 2,9% | 1,4% | 1,1% | 2,6% | 1,7% | 2,6% | 6,2% | 4,2% | 1,3% | 3,9% | 2,3% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 2,9% | 2,1% | 0,4% | 1,3% | 0,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,4% | 4,9% | 1,7% | 1,1% | 3,5% | 2,0% | 1,1% | 4,3% | 2,5% | 0,6% | 3,2% | 1,5% |
| HTA | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,2% | 12,7% | 4,7% | 1,1% | 10,4% | 4,6% | 2,6% | 13,8% | 7,5% | 1,8% | 12,6% | 5,7% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,2% | 9,8% | 3,8% | 1,1% | 9,6% | 4,3% | 2,3% | 12,9% | 6,9% | 1,7% | 10,8% | 5,0% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 2,0% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 1,0% | 0,4% | 0,0% | 0,7% | 0,3% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,0% | 9,9% | 2,9% | 1,1% | 6,1% | 3,0% | 0,7% | 9,0% | 4,4% | 0,8% | 8,9% | 3,7% |
| Digestif | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 3,7% | 5,9% | 4,4% | 3,3% | 0,9% | 2,3% | 6,0% | 4,8% | 5,5% | 4,2% | 6,7% | 5,1% |
| Plaintes ou signes cliniques | 3,3% | 5,9% | 4,1% | 3,3% | 0,9% | 2,3% | 6,0% | 4,3% | 5,3% | 4,1% | 6,4% | 4,9% |
| Gêne dans le travail | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 1,2% | 1,0% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,1% | 2,9% | 2,3% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 2,7% | 2,9% | 2,8% | 1,8% | 3,8% | 2,5% |
| Dermatologie | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,6% | 5,0% | 2,6% | 1,6% | 7,0% | 3,7% | 2,6% | 3,3% | 2,9% | 3,5% | 3,3% | 3,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,2% | 4,0% | 2,0% | 1,6% | 7,0% | 3,7% | 2,6% | 2,9% | 2,7% | 3,3% | 3,2% | 3,3% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 3,5% | 1,7% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,8% | 3,0% | 1,4% | 0,5% | 3,5% | 1,7% | 0,7% | 2,4% | 1,5% | 1,7% | 2,1% | 1,9% |

| Etat de santé | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques | | | N- Activités de services administratifs et de soutien | | | Q- Santé humaine et action sociale | | | Base Evrest | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=248 | ≥ 45 ans n=102 | Ensemble n=350 | <45 ans n=189 | ≥ 45 ans n=116 | Ensemble n=305 | <45 ans n=273 | ≥ 45 ans n=219 | Ensemble n=492 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Lassitude, fatigue | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 11,0% | 18,6% | 13,3% | 9,0% | 10,4% | 9,6% | 16,1% | 19,9% | 17,8% | 11,9% | 15,9% | 13,4% |
| Plaintes ou signes cliniques | 9,8% | 17,6% | 12,1% | 9,0% | 10,4% | 9,6% | 16,1% | 19,9% | 17,8% | 11,7% | 15,7% | 13,2% |
| Gêne dans le travail | 7,0% | 7,9% | 7,3% | 4,8% | 5,2% | 5,0% | 10,6% | 14,2% | 12,2% | 6,2% | 8,6% | 7,0% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,7% | 5,1% | 2,7% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 3,4% | 5,3% | 4,2% | 1,8% | 3,8% | 2,5% |
| Anxiété, nervosité | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 9,8% | 11,9% | 10,4% | 9,6% | 5,2% | 7,9% | 13,1% | 18,6% | 15,5% | 10,4% | 14,7% | 12,0% |
| Plaintes ou signes cliniques | 8,2% | 11,9% | 9,3% | 9,6% | 5,2% | 7,9% | 13,1% | 18,6% | 15,5% | 10,1% | 14,4% | 11,6% |
| Gêne dans le travail | 5,7% | 5,0% | 5,5% | 4,3% | 1,8% | 3,3% | 8,6% | 12,0% | 10,1% | 5,2% | 7,4% | 6,0% |
| TraITEMENT ou autre soin | 2,5% | 2,0% | 2,3% | 1,6% | 2,6% | 2,0% | 3,4% | 8,7% | 5,7% | 2,4% | 4,3% | 3,1% |
| Troubles du sommeil | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 10,8% | 16,8% | 12,6% | 11,8% | 7,8% | 10,3% | 12,3% | 19,4% | 15,4% | 10,4% | 16,5% | 12,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 10,0% | 16,8% | 12,0% | 11,8% | 7,8% | 10,3% | 11,6% | 19,4% | 15,0% | 10,1% | 16,1% | 12,3% |
| Gêne dans le travail | 3,7% | 5,0% | 4,1% | 5,9% | 1,7% | 4,3% | 5,6% | 9,5% | 7,3% | 4,2% | 6,0% | 4,8% |
| TraITEMENT ou autre soin | 1,3% | 5,0% | 2,4% | 1,1% | 3,5% | 2,0% | 4,1% | 5,8% | 4,9% | 2,0% | 4,6% | 2,9% |
| ➤ Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus) | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,1% | 2,9% | 3,7% | 3,7% | 3,5% | 3,6% | 4,8% | 6,2% | 5,4% | 3,2% | 5,4% | 4,0% |
| Plaintes ou signes cliniques | 2,5% | 2,9% | 2,6% | 3,7% | 3,5% | 3,6% | 4,8% | 6,2% | 5,4% | 3,0% | 5,1% | 3,7% |
| Gêne dans le travail | 1,2% | 2,9% | 1,7% | 1,1% | 1,7% | 1,3% | 3,0% | 4,3% | 3,6% | 1,5% | 2,8% | 1,9% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,0% | 0,9% | 0,3% | 0,7% | 2,4% | 1,5% | 0,6% | 1,4% | 0,9% |
| Troubles de l'audition | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,6% | 5,9% | 2,9% | 1,1% | 6,2% | 3,0% | 1,1% | 2,9% | 1,9% | 2,0% | 6,6% | 3,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,2% | 5,9% | 2,6% | 1,1% | 5,4% | 2,7% | 0,8% | 2,9% | 1,7% | 1,8% | 6,3% | 3,4% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 3,9% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 2,3% | 1,1% |
| TraITEMENT ou autre soin | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,8% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,8% | 0,5% |

| Etat de santé | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques | | | N- Activités de services administratifs et de soutien | | | Q- Santé humaine et action sociale | | | Base Everest | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=248 | ≥ 45 ans n=102 | Ensemble n=350 | <45 ans n=189 | ≥ 45 ans n=116 | Ensemble n=305 | <45 ans n=273 | ≥ 45 ans n=219 | Ensemble n=492 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Troubles ostéoarticulaires de l'épaule | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,1% | 9,8% | 5,8% | 3,2% | 9,6% | 5,6% | 3,3% | 9,5% | 6,1% | 4,2% | 9,4% | 6,1% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 3,7% | 8,8% | 5,2% | 3,2% | 9,6% | 5,6% | 3,3% | 9,1% | 5,9% | 4,1% | 9,1% | 5,9% |
| Gêne dans le travail | 1,2% | 3,9% | 2,0% | 1,1% | 7,8% | 3,6% | 3,0% | 6,2% | 4,4% | 2,4% | 6,0% | 3,7% |
| Traitemennt ou autre soin | 1,2% | 6,9% | 2,9% | 1,1% | 5,2% | 2,6% | 1,1% | 5,7% | 3,1% | 1,1% | 4,6% | 2,4% |
| Troubles ostéoarticulaires du coude | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,6% | 2,9% | 2,0% | 2,1% | 6,1% | 3,6% | 2,6% | 3,3% | 2,9% | 1,7% | 4,2% | 2,6% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 1,2% | 2,9% | 1,7% | 2,1% | 6,1% | 3,6% | 2,6% | 3,3% | 2,9% | 1,6% | 4,0% | 2,4% |
| Gêne dans le travail | 1,2% | 2,0% | 1,4% | 2,1% | 3,5% | 2,6% | 2,2% | 3,3% | 2,7% | 1,2% | 2,8% | 1,8% |
| Traitemennt ou autre soin | 1,2% | 2,9% | 1,7% | 1,1% | 4,4% | 2,3% | 1,1% | 1,9% | 1,5% | 0,7% | 2,2% | 1,2% |
| Troubles ostéoarticulaires du poignet | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,9% | 5,0% | 3,5% | 2,7% | 3,5% | 3,0% | 3,7% | 6,2% | 4,8% | 3,4% | 6,3% | 4,4% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 2,4% | 5,0% | 3,2% | 2,7% | 3,5% | 3,0% | 3,7% | 5,7% | 4,6% | 3,2% | 6,0% | 4,2% |
| Gêne dans le travail | 0,4% | 2,0% | 0,9% | 2,1% | 0,9% | 1,7% | 2,2% | 3,8% | 2,9% | 2,0% | 4,1% | 2,8% |
| Traitemennt ou autre soin | 1,2% | 3,0% | 1,7% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 2,9% | 1,7% | 1,1% | 3,0% | 1,8% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 7,0% | 14,9% | 9,3% | 6,4% | 13,9% | 9,2% | 6,3% | 16,7% | 10,9% | 7,6% | 15,2% | 10,3% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 6,6% | 13,9% | 8,7% | 6,4% | 13,9% | 9,2% | 6,3% | 15,9% | 10,5% | 7,4% | 14,8% | 10,0% |
| Gêne dans le travail | 2,1% | 6,9% | 3,5% | 3,7% | 9,6% | 6,0% | 5,2% | 11,5% | 8,0% | 4,5% | 9,8% | 6,4% |
| Traitemennt ou autre soin | 2,9% | 10,0% | 5,0% | 2,7% | 7,9% | 4,6% | 2,2% | 9,2% | 5,3% | 2,4% | 7,6% | 4,3% |

| Etat de santé | M- Activités spécialisées, scientifiques et techniques | | | N- Activités de services administratifs et de soutien | | | Q- Santé humaine et action sociale | | | Base Everest | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <45 ans n=248 | ≥ 45 ans n=102 | Ensemble n=350 | <45 ans n=189 | ≥ 45 ans n=116 | Ensemble n=305 | <45 ans n=273 | ≥ 45 ans n=219 | Ensemble n=492 | <45 ans n=2955 | ≥ 45 ans n=1648 | Ensemble n=4603 |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 4,1% | 5,9% | 4,6% | 4,3% | 12,3% | 7,3% | 6,4% | 5,8% | 6,1% | 5,7% | 10,3% | 7,4% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 3,7% | 5,9% | 4,3% | 4,3% | 12,3% | 7,3% | 6,4% | 5,3% | 5,9% | 5,6% | 10,1% | 7,2% |
| Gêne dans le travail | 1,2% | 2,9% | 1,7% | 2,7% | 4,4% | 3,3% | 3,0% | 3,8% | 3,4% | 2,9% | 5,8% | 3,9% |
| Traitemennt ou autre soin | 2,0% | 4,0% | 2,6% | 2,1% | 3,5% | 2,7% | 2,6% | 2,4% | 2,5% | 2,4% | 5,0% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 5,7% | 8,9% | 6,6% | 7,5% | 3,5% | 6,0% | 5,6% | 10,5% | 7,7% | 6,1% | 9,1% | 7,2% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 5,3% | 8,9% | 6,4% | 7,5% | 3,5% | 6,0% | 5,6% | 10,5% | 7,7% | 6,0% | 8,9% | 7,0% |
| Gêne dans le travail | 2,4% | 5,0% | 3,2% | 4,8% | 2,6% | 4,0% | 3,0% | 8,6% | 5,5% | 3,7% | 5,9% | 4,4% |
| Traitemennt ou autre soin | 1,6% | 3,0% | 2,0% | 3,2% | 2,6% | 3,0% | 1,9% | 4,8% | 3,1% | 2,6% | 4,6% | 3,3% |
| Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 10,3% | 16,7% | 12,2% | 12,9% | 21,1% | 16,0% | 17,9% | 17,1% | 17,6% | 13,9% | 19,2% | 15,8% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 9,5% | 16,7% | 11,6% | 12,4% | 21,1% | 15,7% | 17,3% | 16,2% | 16,8% | 13,3% | 18,7% | 15,2% |
| Gêne dans le travail | 3,7% | 8,9% | 5,2% | 7,6% | 14,9% | 10,4% | 11,9% | 14,8% | 13,2% | 8,0% | 12,7% | 9,7% |
| Traitemennt ou autre soin | 4,2% | 6,9% | 5,0% | 5,4% | 11,5% | 7,7% | 6,4% | 10,1% | 8,0% | 4,4% | 9,6% | 6,3% |
| ➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus) | | | | | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 13,6% | 20,8% | 15,7% | 17,8% | 21,1% | 19,1% | 19,8% | 23,8% | 21,5% | 17,6% | 23,6% | 19,8% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 12,4% | 20,8% | 14,9% | 17,4% | 21,1% | 18,8% | 19,2% | 22,9% | 20,8% | 17,0% | 23,2% | 19,2% |
| Gêne dans le travail | 5,4% | 10,0% | 6,7% | 10,3% | 14,9% | 12,1% | 12,7% | 20,2% | 16,0% | 10,2% | 15,7% | 12,2% |
| Traitemennt ou autre soin | 5,5% | 8,1% | 6,2% | 8,2% | 11,5% | 9,4% | 7,1% | 12,6% | 9,5% | 6,3% | 11,8% | 8,2% |

