



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2012-2013

Région Pays de la Loire

Septembre 2014



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2012-2013 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Pays de la Loire

L'exploitation des données de la région Pays de la Loire a porté sur **2 297 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2012 (n=1168) et 2013 (n=1129).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Everest est plus proche du champ des salariés de l'Acoss (secteur privé) que de celui des salariés des DADS (comprenant les secteurs publics et privés), tout du moins en ce qui concerne les secteurs d'activité représentés (tableau 1). Par rapport aux données INSEE, les femmes sont sous-représentées, les employés et les salariés du secteur des Services. Une grande prudence s'impose donc dans l'utilisation de ces chiffres.

Tableau 1 : Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Pays de la Loire 2012-2013 aux données Insee (DADS 2010) et Acoss (2012).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Pays de la Loire 2012-2013 (n=2297)	Données INSEE 2010 (DADS)	Données ACOSS 2012
	%	%	%
Sexe			
Hommes	60,6	51,3	-
Femmes	39,4	48,7	-
Age			
≤ 24 ans	10,5	14,8	-
25-34 ans	26,4	23,8	-
35-44 ans	28,3	25,7	-
45- 54 ans	25,4	24,6	-
55 ans et plus	9,3	11,1	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,6	0,5	-
Cadres et prof. intellectuelles supérieures	14,9	11,5	-
Professions intermédiaires	21,7	19,4	-
Employés	27,7	36,2	-
Ouvriers	35,1	32,4	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,1	0,0
Industrie	25,5	17,8	24,2
Construction	10,7	7,3	9,5
Commerce	17,9	13,5	16,4
Services	45,8	61,3	49,9

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Pays de la Loire selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	14	0,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures	342	14,9
Professions intermédiaires	498	21,7
Employés	636	27,7
Ouvriers	807	35,1
Total général	2297	100,0

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 3 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Construction, Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles (tableau 3).

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Pays de la Loire 2012-2013 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF rev. 1 2003 : 20 sections	Effectifs	%
AGRICULTURE	1	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	1	0,0
INDUSTRIE	586	25,5
B. Industries extractives	5	0,2
C. Industrie manufacturière	506	22,0
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	59	2,6
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	16	0,7
CONSTRUCTION	246	10,7
F. Construction	246	10,7
COMMERCE	411	17,9
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	411	17,9
SERVICES	1053	45,8
H. Transports et entreposage	146	6,4
I. Hébergement et restauration	106	4,6
J. Information et communication	106	4,6
K. Activités financières et d'assurance	66	2,9
L. Activités immobilières	10	0,4
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	135	5,9
N. Activités de services administratifs et de soutien	163	7,1
O. Administration publique	36	1,6
P. Enseignement	34	1,5
Q. Santé humaine et action sociale	176	7,7
R. Arts, spectacles et activités récréatives	14	0,6
S. Autres activités de services	60	2,6
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs	1	0,0
Total général	2297	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n = 1392	Femmes n = 905	Ensemble n = 2297
≤24 ans	10,6%	10,4%	10,5%
25-34 ans	25,5%	27,8%	26,4%
35-44 ans	28,2%	28,5%	28,3%
45-54 ans	26,6%	23,6%	25,4%
55 ans et plus	9,1%	9,6%	9,3%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,9%	0,1%	0,6%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	17,5%	10,8%	14,9%
Professions intermédiaires	22,5%	20,4%	21,7%
Employés	11,9%	52,0%	27,7%
Ouvriers	47,2%	16,6%	35,1%
C. Industrie manufacturière	26,5%	15,1%	22,0%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	3,4%	1,3%	2,6%
F. Construction	15,2%	3,9%	10,7%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	15,2%	22,1%	17,9%
H. Transports et entreposage	7,0%	5,4%	6,4%
I. Hébergement et restauration	4,1%	5,4%	4,6%
J. Information et communication	5,5%	3,2%	4,6%
K. Activités financières et d'assurance	1,9%	4,4%	2,9%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	5,5%	6,5%	5,9%
N. Activités de services administratifs et de soutien	7,5%	6,5%	7,1%
O. Administration publique	1,1%	2,2%	1,6%
Q. Santé humaine et action sociale	2,7%	15,2%	7,7%
S. Autres activités de services	1,3%	4,6%	2,6%

Conditions de travail	Hommes n = 1392	Femmes n = 905	Ensemble n = 2297
- Changement de travail depuis 1 an :			
Non	85,9%	82,6%	84,6%
Oui, raison médicale	0,6%	0,9%	0,7%
Oui, autre raison	12,5%	15,3%	13,6%
Oui, raison non précisée	0,9%	1,2%	1,0%
Travail à temps plein	93,6%	65,3%	82,5%
Travail en journée normale	77,2%	74,4%	76,1%
Coupures de plus de 2 heures	14,1%	19,4%	16,2%
Horaires décalés	26,3%	26,2%	26,3%
Horaires irréguliers ou alternés	22,4%	23,0%	22,6%
Travail de nuit	12,9%	7,3%	10,6%
Déplacements professionnels de plus de 24h	14,9%	3,9%	10,6%
- Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	18,2%	24,2%	20,6%
Rarement	41,9%	40,2%	41,2%
Assez souvent	26,9%	24,8%	26,1%
Très souvent	13,0%	10,8%	12,1%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	45,3%	48,5%	46,5%
Rarement	36,7%	30,2%	34,1%
Assez souvent	14,3%	14,3%	14,3%
Très souvent	3,8%	7,0%	5,0%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	34,6%	38,4%	36,1%
Rarement	41,5%	39,0%	40,5%
Assez souvent	19,7%	17,1%	18,7%
Très souvent	4,2%	5,5%	4,7%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	3,0%	6,0%	4,2%
1	3,8%	3,8%	3,8%
2	10,8%	10,0%	10,5%
3	14,5%	13,1%	14,0%
4	12,3%	13,3%	12,7%
5	20,5%	18,4%	19,7%
6	12,8%	13,4%	13,1%
7	13,1%	11,2%	12,4%
8	7,2%	8,1%	7,6%
9	1,6%	1,4%	1,5%
10	0,4%	1,1%	0,7%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	35,1%	35,3%	35,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	46,8%	52,3%	49,0%
Parmi eux :			
- Perturbe le travail	53,4%	55,8%	54,4%
- Aspect positif du travail	48,3%	43,5%	46,2%

Appréciation sur le travail	Hommes n = 1392	Femmes n = 905	Ensemble n = 2297
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	5,2%	6,9%	5,8%
Plutôt non	11,9%	12,6%	12,2%
Plutôt oui	45,5%	43,5%	44,7%
Oui tout à fait	37,4%	37,1%	37,3%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,5%	4,7%	4,5%
Plutôt non	12,2%	13,4%	12,6%
Plutôt oui	43,8%	39,3%	42,0%
Oui tout à fait	39,6%	42,6%	40,8%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	6,5%	10,7%	8,1%
Plutôt non	14,8%	17,5%	15,9%
Plutôt oui	44,8%	42,1%	43,7%
Oui tout à fait	33,9%	29,7%	32,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	2,2%	4,1%	3,0%
Plutôt non	9,9%	11,9%	10,7%
Plutôt oui	52,1%	52,1%	52,1%
Oui tout à fait	35,8%	31,8%	34,2%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,1%	2,0%	1,4%
Plutôt non	8,6%	10,9%	9,5%
Plutôt oui	55,5%	56,7%	56,0%
Oui tout à fait	34,8%	30,4%	33,0%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	3,8%	5,7%	4,5%
Plutôt non	15,9%	15,6%	15,8%
Plutôt oui	52,6%	53,8%	53,1%
Oui tout à fait	27,7%	24,9%	26,6%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	30,2%	35,4%	32,2%
Plutôt non	49,8%	46,7%	48,6%
Plutôt oui	17,7%	14,5%	16,4%
Oui tout à fait	2,4%	3,4%	2,8%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	63,6%	62,1%	63,0%
Plutôt non	26,7%	26,6%	26,7%
Plutôt oui	8,2%	8,5%	8,3%
Oui tout à fait	1,5%	2,8%	2,0%

Charge physique du poste de travail	Hommes n = 1392	Femmes n = 905	Ensemble n = 2297
Postures contraignantes :			
Fréquence			
Non jamais	42,8%	50,4%	45,8%
Oui parfois	38,3%	27,4%	34,0%
Oui souvent	18,9%	22,1%	20,2%
Difficultés			
Pas de postures contraignantes	42,8%	50,4%	45,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	24,8%	26,9%	25,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	31,4%	22,1%	27,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	1,0%	0,6%	0,8%
Effort, port de charges lourdes :			
Fréquence			
Non jamais	45,9%	55,6%	49,8%
Oui parfois	36,7%	27,7%	33,1%
Oui souvent	17,3%	16,7%	17,1%
Difficultés			
Pas d'effort, port de charges lourdes	45,9%	55,6%	49,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	24,2%	24,1%	24,2%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	28,4%	19,3%	24,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	1,4%	1,0%	1,2%
Gestes répétitifs :			
Fréquence			
Non jamais	43,5%	39,1%	41,8%
Oui parfois	23,5%	20,8%	22,5%
Oui souvent	33,0%	40,0%	35,8%
Difficultés			
Pas de gestes répétitifs	43,5%	39,1%	41,8%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	17,0%	20,2%	18,3%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	37,8%	39,5%	38,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,7%	1,2%	1,5%
Importants déplacements à pieds :			
Fréquence			
Non jamais	58,1%	70,7%	63,1%
Oui parfois	19,0%	10,7%	15,7%
Oui souvent	22,9%	18,6%	21,2%
Difficultés			
Pas d'importants déplacements à pieds	58,1%	70,7%	63,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	10,3%	9,0%	9,8%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	30,4%	19,9%	26,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	1,2%	0,4%	0,9%
Station debout prolongée :			
Fréquence			
Non jamais	40,8%	50,2%	44,5%
Oui parfois	20,6%	13,4%	17,8%
Oui souvent	38,6%	36,4%	37,7%
Difficultés			
Pas de station debout prolongée	40,8%	50,2%	44,5%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	14,9%	16,9%	15,7%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	40,7%	30,2%	36,6%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	3,5%	2,8%	3,2%

Expositions	Hommes n = 1392	Femmes n = 905	Ensemble n = 2297
Produits chimiques	29,2%	17,2%	24,4%
Poussières, fumées	44,9%	15,3%	33,2%
Rx ionisants	1,5%	0,9%	1,2%
Vibrations	32,2%	5,5%	21,7%
Gêne sonore	49,7%	26,5%	40,6%
Bruit > 80db	37,8%	8,8%	26,3%
Contrainte visuelle	30,4%	30,6%	30,5%
Conduite routière prolongée	23,1%	6,8%	16,7%
Chaleur intense	15,7%	8,2%	12,8%
Froid intense	12,1%	6,0%	9,7%
Intempéries	20,8%	5,1%	14,6%
Pression psychologique	21,2%	19,1%	20,4%
Agent biologique	4,7%	13,5%	8,2%
Contact avec le public	57,8%	68,0%	61,8%

Formation	Hommes n = 1392	Femmes n = 905	Ensemble n = 2297
A bénéficié d'une formation depuis un an :	47,1%	43,5%	45,7%
Parmi eux :			
- En rapport avec le travail actuel	90,1%	88,1%	89,3%
- En rapport avec le travail futur	17,2%	18,2%	17,6%
- Formation d'intérêt général	35,4%	32,0%	34,1%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	31,9%	26,9%	29,9%

Mode de vie	Hommes n = 1392	Femmes n = 905	Ensemble n = 2297
Activité sportive régulière	53,3%	50,3%	52,1%
Consommation de tabac	37,7%	32,3%	35,6%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	8,2%	4,6%	6,8%
Consommation de café	84,3%	70,4%	78,9%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	16,2%	10,7%	14,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,8%	16,6%	17,4%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n = 2297
	Hommes n = 895	Femmes n = 604	Ensemble n = 1499	Hommes n = 497	Femmes n = 301	Ensemble n = 798	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	63,2%	72,9%	67,1%	45,5%	63,1%	52,2%	62,0%
- Surpoids	29,1%	19,7%	25,3%	40,2%	24,9%	34,3%	28,4%
- Obesés	7,8%	7,4%	7,6%	14,4%	11,9%	13,4%	9,6%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	2,6%	4,5%	3,4%	3,9%	3,0%	3,6%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	4,5%	3,4%	3,7%	2,7%	3,3%	3,3%
Gêne dans le travail	0,4%	0,7%	0,5%	1,0%	0,3%	0,8%	0,6%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	2,7%	1,9%	2,2%	2,3%	2,3%	2,1%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	0,9%	2,0%	1,3%	7,6%	8,8%	8,0%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	0,9%	2,0%	1,3%	7,4%	8,1%	7,7%	3,5%
Gêne dans le travail	0,5%	1,0%	0,7%	1,4%	1,7%	1,5%	1,0%
TraITEMENT ou autre soin	0,3%	0,5%	0,4%	4,7%	6,4%	5,4%	2,1%
HTA							
Existence d'un problème	2,9%	1,9%	2,4%	16,2%	13,7%	15,3%	6,9%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	1,3%	1,7%	13,3%	11,7%	12,7%	5,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,7%	0,6%	0,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,7%	1,0%	1,4%	10,3%	8,9%	9,8%	4,3%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	17,9%	30,0%	22,7%	19,8%	32,8%	24,7%	23,4%
Plaintes ou signes cliniques	17,5%	29,8%	22,5%	19,8%	32,8%	24,7%	23,3%
Gêne dans le travail	8,0%	14,2%	10,5%	8,6%	16,1%	11,4%	10,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	3,3%	2,0%	2,2%	4,0%	2,9%	2,3%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	14,9%	25,0%	19,0%	18,6%	29,4%	22,7%	20,2%
Plaintes ou signes cliniques	14,7%	24,4%	18,6%	18,6%	29,2%	22,6%	20,0%
Gêne dans le travail	6,1%	10,2%	7,7%	8,8%	14,2%	10,8%	8,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	2,5%	2,0%	3,1%	7,1%	4,6%	2,9%
Troubles du sommeil							
Existence d'un problème	11,5%	19,6%	14,8%	17,4%	30,1%	22,2%	17,3%
Plaintes ou signes cliniques	11,4%	19,5%	14,6%	17,0%	29,5%	21,8%	17,1%
Gêne dans le travail	4,6%	9,2%	6,5%	6,8%	14,4%	9,7%	7,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	3,2%	1,8%	3,9%	8,8%	5,7%	3,2%
➤ Troubles neuro psychiques							
(association des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	4,7%	9,2%	6,5%	5,9%	13,0%	8,6%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,6%	8,7%	6,2%	5,9%	13,0%	8,6%	7,1%
Gêne dans le travail	1,5%	3,2%	2,1%	2,6%	6,4%	4,1%	2,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,4%	0,8%	0,6%	0,2%	1,7%	0,8%	0,7%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n = 2297
	Hommes n = 895	Femmes n = 604	Ensemble n = 1499	Hommes n = 497	Femmes n = 301	Ensemble n = 798	
Digestif							
Existence d'un problème	5,0%	6,9%	5,8%	6,2%	9,5%	7,5%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	6,8%	5,6%	5,8%	8,9%	7,0%	6,1%
Gêne dans le travail	0,7%	2,4%	1,4%	0,6%	2,7%	1,4%	1,4%
Traitements ou autre soin	1,7%	2,9%	2,2%	3,1%	4,1%	3,5%	2,6%
Dermatologie							
Existence d'un problème	6,0%	8,3%	6,9%	4,3%	4,7%	4,5%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,0%	8,3%	6,9%	3,9%	4,7%	4,2%	6,0%
Gêne dans le travail	0,6%	1,7%	1,0%	0,4%	2,0%	1,0%	1,0%
Traitements ou autre soin	3,2%	4,7%	3,8%	2,7%	2,7%	2,7%	3,4%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	4,7%	1,9%	3,6%	19,3%	6,8%	14,6%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	1,9%	3,6%	18,4%	6,5%	13,9%	7,1%
Gêne dans le travail	0,6%	0,7%	0,6%	4,5%	2,7%	3,8%	1,7%
Traitements ou autre soin	0,5%	0,0%	0,3%	2,1%	1,0%	1,7%	0,8%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	6,2%	7,6%	6,8%	13,2%	21,7%	16,5%	10,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	7,6%	6,8%	13,0%	21,7%	16,3%	10,1%
Gêne dans le travail	3,3%	4,3%	3,7%	8,0%	17,1%	11,4%	6,4%
Traitements ou autre soin	1,1%	2,5%	1,7%	3,7%	7,7%	5,2%	2,9%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	2,7%	2,5%	2,6%	7,0%	10,4%	8,3%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	2,5%	2,6%	6,6%	10,1%	7,9%	4,4%
Gêne dans le travail	1,7%	1,7%	1,7%	3,7%	8,1%	5,4%	3,0%
Traitements ou autre soin	0,8%	1,3%	1,0%	1,9%	4,7%	2,9%	1,7%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	5,2%	7,7%	6,2%	8,6%	16,1%	11,4%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	7,3%	6,0%	8,2%	15,4%	10,9%	7,7%
Gêne dans le travail	3,7%	4,5%	4,0%	4,9%	11,1%	7,3%	5,2%
Traitements ou autre soin	0,8%	1,3%	1,0%	1,2%	4,7%	2,6%	1,5%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	11,7%	14,6%	12,8%	21,1%	34,1%	26,1%	17,4%
Plaintes ou signes cliniques	11,7%	14,4%	12,8%	20,7%	34,1%	25,8%	17,3%
Gêne dans le travail	6,9%	8,7%	7,6%	12,2%	24,9%	17,1%	10,9%
Traitements ou autre soin	2,3%	3,4%	2,7%	5,2%	12,2%	7,8%	4,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Ensemble n = 2297
	Hommes n = 895	Femmes n = 604	Ensemble n = 1499	Hommes n = 497	Femmes n = 301	Ensemble n = 798	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	6,6%	8,3%	7,3%	11,8%	13,4%	12,4%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	8,3%	7,3%	11,4%	13,0%	12,0%	8,9%
Gêne dans le travail	2,8%	4,2%	3,4%	6,5%	9,7%	7,7%	4,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	2,2%	1,8%	3,9%	6,0%	4,7%	2,8%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	6,9%	12,5%	9,2%	11,3%	18,5%	14,0%	10,8%
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	12,5%	9,2%	10,9%	17,8%	13,5%	10,7%
Gêne dans le travail	4,0%	6,3%	4,9%	6,0%	11,7%	8,2%	6,0%
TraITEMENT ou autre soin	2,0%	4,3%	3,0%	2,7%	7,7%	4,6%	3,5%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolumbaires							
Existence d'un problème	18,2%	20,4%	19,1%	24,7%	22,6%	23,9%	20,8%
Plaintes ou signes cliniques	17,9%	19,9%	18,7%	23,5%	22,2%	23,0%	20,2%
Gêne dans le travail	9,3%	10,2%	9,7%	13,2%	14,5%	13,7%	11,1%
TraITEMENT ou autre soin	6,0%	7,0%	6,4%	9,6%	11,1%	10,2%	7,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	21,9%	27,1%	24,0%	30,0%	33,0%	31,1%	26,4%
Plaintes ou signes cliniques	21,6%	26,8%	23,7%	29,3%	32,7%	30,6%	26,1%
Gêne dans le travail	11,2%	14,1%	12,4%	16,2%	21,3%	18,2%	14,4%
TraITEMENT ou autre soin	7,2%	8,6%	7,8%	11,0%	15,9%	12,9%	9,5%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=342	Intermédiaires n=498	Employés n=636	Ouvriers n=807	Base Evrest n=2297
Répartition hommes / femmes	71,3% / 28,7%	62,9% / 37,1%	25,9% / 74,1%	81,4% / 18,6%	60,6% / 39,4%
≤24 ans	2,6%	7,2%	17,6%	10,5%	10,5%
25-34 ans	27,2%	28,3%	26,7%	24,9%	26,4%
35-44 ans	38,6%	33,5%	23,1%	25,0%	28,3%
45-54 ans	22,5%	23,5%	23,4%	29,4%	25,4%
55 ans et plus	9,1%	7,4%	9,1%	10,2%	9,3%
C. Industrie manufacturière	16,1%	17,9%	7,4%	38,5%	22,0%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	5,3%	6,2%	0,8%	0,6%	2,6%
F. Construction	5,8%	11,0%	2,7%	19,0%	10,7%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	12,3%	16,5%	31,3%	10,7%	17,9%
H. Transports et entreposage	2,6%	1,2%	9,3%	8,9%	6,4%
I. Hébergement et restauration	2,3%	2,0%	10,1%	2,9%	4,6%
J. Information et communication	18,4%	6,8%	1,3%	0,0%	4,6%
K. Activités financières et d'assurance	5,6%	5,4%	2,8%	0,0%	2,9%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	15,8%	9,0%	4,2%	1,0%	5,9%
N. Activités de services administratifs et de soutien	3,2%	3,4%	4,1%	13,4%	7,1%
O. Administration publique	3,8%	1,2%	2,0%	0,5%	1,6%
Q. Santé humaine et action sociale	1,8%	8,6%	16,4%	2,9%	7,7%
S. Autres activités de services	2,0%	3,4%	5,0%	0,4%	2,6%

Conditions de travail	Cadres n=342	Intermédiaires n=498	Employés n=636	Ouvriers n=807	Base Evrest n=2297
- Changement de travail depuis 1 an :					
Non	85,1%	85,2%	81,8%	86,1%	84,6%
Oui, raison médicale	0,3%	0,8%	1,1%	0,6%	0,7%
Oui, autre raison	13,2%	12,8%	15,5%	12,9%	13,6%
Oui, raison non précisée	1,5%	1,2%	1,6%	0,4%	1,0%
Travail à temps plein	91,2%	88,4%	66,3%	87,6%	82,5%
Travail en journée normale	92,6%	86,0%	70,7%	66,8%	76,1%
Coupures de plus de 2 heures	11,1%	16,3%	21,0%	14,5%	16,2%
Horaires décalés	15,1%	20,2%	30,6%	31,8%	26,3%
Horaires irréguliers ou alternés	11,5%	17,7%	26,7%	27,3%	22,6%
Travail de nuit	2,1%	6,4%	10,1%	17,5%	10,6%
Déplacements professionnels de plus de 24h	30,7%	11,5%	1,8%	7,6%	10,6%
- Dépasser ses horaires normaux					
Jamais	3,8%	11,2%	23,1%	31,7%	20,6%
Rarement	29,4%	37,9%	46,1%	44,9%	41,2%
Assez souvent	38,8%	31,2%	24,4%	18,5%	26,1%
Très souvent	27,9%	19,7%	6,3%	4,9%	12,1%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause					
Jamais	25,4%	34,8%	52,2%	58,4%	46,5%
Rarement	44,5%	41,5%	29,7%	28,5%	34,1%
Assez souvent	24,5%	17,0%	12,5%	9,8%	14,3%
Très souvent	5,6%	6,7%	5,7%	3,2%	5,0%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin					
Jamais	17,6%	26,1%	41,2%	45,9%	36,1%
Rarement	49,4%	42,0%	38,3%	37,5%	40,5%
Assez souvent	25,3%	24,9%	16,0%	14,2%	18,7%
Très souvent	7,7%	6,9%	4,5%	2,4%	4,7%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)					
0	1,8%	3,8%	6,3%	3,7%	4,2%
1	1,8%	3,2%	4,6%	4,4%	3,8%
2	7,9%	8,9%	11,1%	12,3%	10,5%
3	15,9%	14,8%	13,0%	13,5%	14,0%
4	12,1%	12,6%	12,8%	12,8%	12,7%
5	19,4%	16,4%	17,1%	24,1%	19,7%
6	15,0%	13,4%	13,1%	11,7%	13,1%
7	14,4%	15,4%	10,7%	11,1%	12,4%
8	8,8%	8,7%	9,5%	4,5%	7,6%
9	2,4%	1,6%	0,9%	1,6%	1,5%
10	0,6%	1,2%	0,9%	0,2%	0,7%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	41,2%	40,3%	35,2%	29,2%	35,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	69,3%	56,5%	49,6%	34,7%	49,0%
Parmi eux :					
- Perturbe le travail	55,8%	59,5%	54,4%	48,1%	54,4%
- Aspect positif du travail	50,6%	41,3%	47,0%	45,2%	46,2%

Appréciation sur le travail	Cadres n=342	Intermédiaires n=498	Employés n=636	Ouvriers n=807	Base Evrest n=2297
-Travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	0,6%	1,8%	6,6%	10,0%	5,8%
Plutôt non	6,7%	6,8%	14,7%	15,8%	12,2%
Plutôt oui	39,2%	48,7%	47,9%	42,6%	44,7%
Oui tout à fait	53,5%	42,7%	30,8%	31,6%	37,3%
-Travail varié					
Non pas du tout	0,6%	0,8%	4,4%	8,6%	4,5%
Plutôt non	6,2%	7,9%	17,0%	15,1%	12,6%
Plutôt oui	38,1%	42,7%	42,9%	43,2%	42,0%
Oui tout à fait	55,1%	48,6%	35,7%	33,1%	40,8%
-Choix dans la façon de procéder					
Non pas du tout	2,0%	3,0%	12,2%	10,8%	8,1%
Plutôt non	9,4%	14,3%	21,2%	15,8%	15,9%
Plutôt oui	48,2%	45,6%	41,0%	43,5%	43,7%
Oui tout à fait	40,4%	37,1%	25,5%	29,9%	32,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide					
Non pas du tout	2,6%	2,4%	3,2%	3,4%	3,0%
Plutôt non	6,7%	11,1%	12,1%	11,1%	10,7%
Plutôt oui	57,8%	52,6%	51,6%	49,9%	52,1%
Oui tout à fait	32,8%	33,8%	33,2%	35,7%	34,2%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité					
Non pas du tout	0,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,4%
Plutôt non	8,2%	13,2%	10,8%	7,0%	9,5%
Plutôt oui	65,5%	54,9%	55,0%	54,0%	56,0%
Oui tout à fait	25,7%	30,3%	32,6%	37,4%	33,0%
-Travail reconnu					
Non pas du tout	1,8%	4,3%	4,6%	5,9%	4,5%
Plutôt non	9,4%	14,2%	18,0%	18,1%	15,8%
Plutôt oui	59,2%	55,9%	51,0%	51,1%	53,1%
Oui tout à fait	29,6%	25,7%	26,4%	24,9%	26,6%
-Faire des choses que l'on désapprouve					
Non pas du tout	27,5%	27,5%	37,8%	33,2%	32,2%
Plutôt non	55,6%	52,4%	44,9%	45,9%	48,6%
Plutôt oui	15,8%	17,6%	14,2%	17,5%	16,4%
Oui tout à fait	1,2%	2,4%	3,2%	3,4%	2,8%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi					
Non pas du tout	62,5%	59,3%	64,9%	64,0%	63,0%
Plutôt non	30,7%	28,5%	25,8%	24,3%	26,7%
Plutôt oui	5,6%	9,7%	7,3%	9,7%	8,3%
Oui tout à fait	1,2%	2,4%	2,1%	2,0%	2,0%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=342	Intermédiaires n=498	Employés n=636	Ouvriers n=807	Base Evrest n=2297
Postures contraignantes :					
Fréquence					
Non jamais	78,6%	58,6%	45,0%	23,9%	45,8%
Oui parfois	17,9%	26,3%	31,7%	47,8%	34,0%
Oui souvent	3,5%	15,1%	23,3%	28,3%	20,2%
Difficultés					
Pas de postures contraignantes	78,6%	58,6%	45,0%	23,9%	45,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	6,7%	16,7%	27,4%	38,2%	25,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	13,8%	23,9%	26,9%	36,8%	27,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	0,9%	0,8%	0,6%	1,0%	0,8%
Effort, port de charges lourdes :					
Fréquence					
Non jamais	85,0%	66,6%	48,0%	25,3%	49,8%
Oui parfois	12,9%	25,1%	31,1%	48,6%	33,1%
Oui souvent	2,1%	8,3%	20,9%	26,2%	17,1%
Difficultés					
Pas d'effort, port de charges lourdes	85,0%	66,6%	48,0%	25,3%	49,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	5,6%	13,2%	26,4%	37,7%	24,2%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	9,1%	19,6%	23,9%	35,4%	24,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,3%	0,6%	1,7%	1,6%	1,2%
Gestes répétitifs :					
Fréquence					
Non jamais	75,9%	61,1%	35,1%	20,1%	41,8%
Oui parfois	12,9%	17,3%	23,4%	29,0%	22,5%
Oui souvent	11,2%	21,6%	41,5%	50,9%	35,8%
Difficultés					
Pas de gestes répétitifs	75,9%	61,1%	35,1%	20,1%	41,8%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	3,2%	8,5%	22,9%	27,4%	18,3%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	20,6%	28,6%	41,1%	50,1%	38,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	0,3%	1,8%	0,9%	2,4%	1,5%
Importants déplacements à pieds :					
Fréquence					
Non jamais	82,6%	72,5%	64,1%	47,8%	63,1%
Oui parfois	9,7%	11,7%	13,6%	22,5%	15,7%
Oui souvent	7,6%	15,8%	22,3%	29,7%	21,2%
Difficultés					
Pas d'importants déplacements à pieds	82,6%	72,5%	64,1%	47,8%	63,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	2,1%	5,3%	10,6%	15,3%	9,8%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	14,1%	21,3%	24,8%	35,8%	26,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,2%	1,0%	0,5%	1,1%	0,9%
Station debout prolongée :					
Fréquence					
Non jamais	76,2%	60,5%	41,5%	23,0%	44,5%
Oui parfois	14,1%	19,2%	13,9%	21,7%	17,8%
Oui souvent	9,7%	20,4%	44,6%	55,3%	37,7%
Difficultés					
Pas de station debout prolongée	76,2%	60,5%	41,5%	23,0%	44,5%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	4,4%	10,1%	19,1%	21,5%	15,7%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	18,2%	27,8%	35,3%	51,1%	36,6%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	1,2%	1,6%	4,1%	4,5%	3,2%

Expositions	Cadres n=342	Intermédiaires n=498	Employés n=636	Ouvriers n=807	Base Evrest n=2297
Produits chimiques	9,1%	20,5%	15,7%	40,5%	24,4%
Poussières, fumées	8,5%	23,7%	14,5%	64,5%	33,2%
Rx ionisants	2,1%	2,2%	0,6%	0,8%	1,2%
Vibrations	4,4%	12,1%	3,9%	49,1%	21,7%
Gêne sonore	20,3%	36,2%	24,3%	65,0%	40,6%
Bruit > 80db	9,7%	20,6%	7,0%	52,4%	26,3%
Contrainte visuelle	42,4%	35,5%	28,7%	23,5%	30,5%
Conduite routière prolongée	24,6%	22,0%	6,2%	17,8%	16,7%
Chaleur intense	3,8%	10,3%	8,9%	21,0%	12,8%
Froid intense	3,2%	6,1%	7,3%	16,6%	9,7%
Intempéries	4,7%	12,1%	6,2%	27,3%	14,6%
Pression psychologique	27,6%	26,0%	17,4%	15,9%	20,4%
Agent biologique	3,3%	7,6%	15,2%	5,4%	8,2%
Contact avec le public	62,1%	68,1%	78,6%	44,2%	61,8%

Formation	Cadres n=342	Intermédiaires n=498	Employés n=636	Ouvriers n=807	Base Evrest n=2297
A bénéficié d'une formation depuis un an :	58,4%	51,2%	43,0%	39,1%	45,7%
Parmi eux :					
- En rapport avec le travail actuel	90,8%	90,9%	87,0%	89,3%	89,3%
- En rapport avec le travail futur	16,3%	17,1%	16,2%	19,9%	17,6%
- Formation d'intérêt général	35,8%	33,1%	32,2%	35,4%	34,1%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	43,1%	36,0%	26,5%	22,4%	29,9%

Mode de vie	Cadres n=342	Intermédiaires n=498	Employés n=636	Ouvriers n=807	Base Evrest n=2297
Activité sportive régulière	61,1%	58,7%	52,5%	43,7%	52,1%
Consommation de tabac	26,3%	31,8%	36,6%	41,1%	35,6%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	3,2%	6,3%	5,4%	9,6%	6,8%
Consommation de café	78,9%	79,8%	71,5%	83,9%	78,9%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	10,7%	13,9%	11,8%	17,0%	14,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	23,8%	23,1%	13,6%	13,9%	17,4%

Rapport Evrest 2012-2013 – Région Pays de la Loire

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest		
	<45 ans n =234	≥ 45 ans n =108	Ensemble n =342	<45 ans n =344	≥ 45 ans n =154	Ensemble n =498	<45 ans n =429	≥ 45 ans n =207	Ensemble n =636	<45 ans n =488	≥ 45 ans n =319	Ensemble n =807	<45 ans n =1499	≥ 45 ans n =798	Global n =2297
Indice de masse corporelle															
- Normaux ou maigres	72,7%	49,5%	65,5%	65,3%	55,2%	62,3%	71,9%	66,3%	70,1%	61,3%	43,6%	54,3%	67,1%	52,2%	62,0%
- Surpoids	22,1%	39,0%	27,4%	26,6%	35,7%	29,4%	20,5%	26,8%	22,6%	30,1%	36,3%	32,6%	25,3%	34,3%	28,4%
- Obeses	5,2%	11,4%	7,1%	8,1%	9,1%	8,4%	7,5%	6,8%	7,3%	8,6%	20,1%	13,2%	7,6%	13,4%	9,6%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	3,4%	1,9%	2,9%	2,0%	4,0%	2,6%	4,7%	2,9%	4,1%	3,1%	4,5%	3,6%	3,4%	3,6%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	0,9%	2,6%	2,0%	3,3%	2,4%	4,7%	2,9%	4,1%	3,1%	4,5%	3,6%	3,4%	3,3%	3,3%
Gêne dans le travail	0,4%	0,0%	0,3%	0,3%	0,7%	0,4%	1,2%	0,0%	0,8%	0,2%	1,6%	0,8%	0,5%	0,8%	0,6%
Traitement ou autre soin	2,1%	0,9%	1,8%	1,2%	2,0%	1,4%	2,8%	1,9%	2,5%	1,7%	3,2%	2,3%	1,9%	2,3%	2,1%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	3,0%	7,5%	4,4%	0,6%	8,1%	2,9%	1,9%	9,2%	4,3%	0,6%	7,7%	3,4%	1,3%	8,0%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	6,5%	4,1%	0,6%	8,1%	2,9%	1,9%	8,3%	3,9%	0,6%	7,7%	3,4%	1,3%	7,7%	3,5%
Gêne dans le travail	1,7%	0,9%	1,5%	0,3%	0,7%	0,4%	0,7%	1,5%	0,9%	0,4%	2,3%	1,1%	0,7%	1,5%	1,0%
Traitement ou autre soin	1,7%	2,8%	2,1%	0,0%	5,4%	1,6%	0,5%	5,9%	2,2%	0,0%	6,1%	2,4%	0,4%	5,4%	2,1%
HTA															
Existence d'un problème	3,0%	14,0%	6,5%	2,7%	10,1%	4,9%	1,7%	13,7%	5,6%	2,7%	18,8%	9,1%	2,4%	15,3%	6,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	12,1%	5,3%	2,1%	7,4%	3,7%	1,4%	11,8%	4,8%	1,5%	15,6%	7,0%	1,7%	12,7%	5,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,3%	0,0%	0,6%	0,2%
Traitement ou autre soin	1,7%	5,6%	2,9%	1,5%	7,4%	3,3%	0,9%	9,8%	3,8%	1,7%	12,0%	5,7%	1,4%	9,8%	4,3%
Digestif															
Existence d'un problème	3,0%	6,5%	4,1%	4,5%	8,7%	5,8%	7,6%	11,4%	8,8%	5,9%	4,8%	5,5%	5,8%	7,5%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	5,7%	3,8%	4,5%	7,4%	5,4%	7,1%	11,0%	8,4%	5,7%	4,8%	5,4%	5,6%	7,0%	6,1%
Gêne dans le travail	0,4%	0,9%	0,6%	0,9%	1,4%	1,0%	1,2%	2,5%	1,6%	2,3%	1,0%	1,8%	1,4%	1,4%	1,4%
Traitement ou autre soin	1,3%	3,7%	2,1%	0,3%	4,0%	1,5%	2,9%	5,0%	3,5%	3,2%	2,3%	2,8%	2,2%	3,5%	2,6%
Dermatologie															
Existence d'un problème	8,2%	4,6%	7,0%	5,6%	8,7%	6,5%	8,2%	4,4%	7,0%	6,0%	2,6%	4,7%	6,9%	4,5%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	4,6%	7,0%	5,6%	8,0%	6,3%	8,2%	4,4%	7,0%	6,0%	2,2%	4,5%	6,9%	4,2%	6,0%
Gêne dans le travail	0,9%	0,0%	0,6%	0,3%	2,0%	0,8%	0,9%	2,0%	1,3%	1,7%	0,3%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%
Traitement ou autre soin	5,6%	4,6%	5,3%	2,3%	3,4%	2,7%	5,4%	2,9%	4,6%	2,3%	1,6%	2,0%	3,8%	2,7%	3,4%

Rapport Evrest 2012-2013 – Région Pays de la Loire

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest		
	<45 ans n =234	≥ 45 ans n =108	Ensemble n =342	<45 ans n =344	≥ 45 ans n =154	Ensemble n =498	<45 ans n =429	≥ 45 ans n =207	Ensemble n =636	<45 ans n =488	≥ 45 ans n =319	Ensemble n =807	<45 ans n =1499	≥ 45 ans n =798	Global n =2297
Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	21,8%	25,9%	23,1%	21,7%	27,2%	23,4%	27,8%	30,9%	28,8%	19,0%	19,5%	19,2%	22,7%	24,7%	23,4%
Plaintes ou signes cliniques	21,4%	25,9%	22,8%	21,7%	27,2%	23,4%	27,8%	30,9%	28,8%	18,6%	19,5%	18,9%	22,5%	24,7%	23,3%
Gêne dans le travail	11,2%	10,3%	10,9%	10,0%	8,6%	9,6%	12,6%	15,9%	13,7%	8,7%	10,3%	9,3%	10,5%	11,4%	10,8%
Traitement ou autre soin	1,7%	2,8%	2,1%	3,2%	2,6%	3,0%	1,2%	3,4%	1,9%	2,1%	2,9%	2,4%	2,0%	2,9%	2,3%
Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	18,8%	25,0%	20,8%	19,1%	23,3%	20,4%	22,0%	27,8%	23,9%	16,0%	18,3%	16,9%	19,0%	22,7%	20,2%
Plaintes ou signes cliniques	18,5%	24,3%	20,3%	18,8%	23,3%	20,2%	21,4%	27,8%	23,5%	15,8%	18,3%	16,8%	18,6%	22,6%	20,0%
Gêne dans le travail	9,4%	13,9%	10,8%	8,2%	11,3%	9,2%	8,0%	12,2%	9,4%	6,4%	8,7%	7,3%	7,7%	10,8%	8,8%
Traitement ou autre soin	2,1%	6,5%	3,5%	1,8%	8,1%	3,7%	2,4%	4,4%	3,0%	1,5%	2,6%	1,9%	2,0%	4,6%	2,9%
Troubles du sommeil															
Existence d'un problème	18,5%	20,6%	19,1%	12,0%	19,9%	14,4%	18,2%	29,0%	21,7%	11,6%	19,5%	14,7%	14,8%	22,2%	17,3%
Plaintes ou signes cliniques	17,7%	19,8%	18,3%	12,0%	19,3%	14,3%	18,2%	29,0%	21,7%	11,6%	18,9%	14,5%	14,6%	21,8%	17,1%
Gêne dans le travail	6,5%	7,5%	6,8%	5,6%	7,9%	6,3%	8,0%	14,1%	10,0%	5,6%	8,3%	6,7%	6,5%	9,7%	7,6%
Traitement ou autre soin	1,3%	4,7%	2,4%	2,9%	6,0%	3,9%	2,6%	6,9%	4,0%	0,6%	5,4%	2,5%	1,8%	5,7%	3,2%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	6,0%	8,4%	6,7%	6,7%	6,0%	6,5%	8,2%	15,0%	10,4%	4,8%	5,7%	5,1%	6,5%	8,6%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	8,4%	6,5%	6,7%	6,0%	6,5%	7,8%	15,0%	10,1%	4,5%	5,7%	5,0%	6,2%	8,6%	7,1%
Gêne dans le travail	1,3%	2,8%	1,8%	2,3%	2,6%	2,4%	3,0%	6,3%	4,1%	1,7%	3,5%	2,4%	2,1%	4,1%	2,8%
Traitement ou autre soin	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,0%	0,6%	0,7%	1,5%	0,9%	0,2%	0,6%	0,4%	0,6%	0,8%	0,7%
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	1,7%	13,1%	5,3%	3,8%	12,0%	6,3%	2,4%	5,4%	3,3%	5,0%	22,4%	11,9%	3,6%	14,6%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	11,4%	4,7%	3,8%	10,7%	5,9%	2,4%	4,9%	3,2%	5,0%	22,2%	11,8%	3,6%	13,9%	7,1%
Gêne dans le travail	0,0%	2,8%	0,9%	0,9%	2,7%	1,4%	0,5%	2,5%	1,1%	0,8%	5,4%	2,7%	0,6%	3,8%	1,7%
Traitement ou autre soin	0,0%	0,9%	0,3%	0,3%	0,7%	0,4%	0,5%	1,0%	0,6%	0,2%	2,6%	1,1%	0,3%	1,7%	0,8%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest		
	<45 ans n =234	≥ 45 ans n =108	Ensemble n =342	<45 ans n =344	≥ 45 ans n =154	Ensemble n =498	<45 ans n =429	≥ 45 ans n =207	Ensemble n =636	<45 ans n =488	≥ 45 ans n =319	Ensemble n =807	<45 ans n =1499	≥ 45 ans n =798	Global n =2297
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule															
Existence d'un problème	4,3%	4,6%	4,4%	5,8%	16,6%	9,1%	6,8%	20,8%	11,3%	8,7%	18,2%	12,5%	6,8%	16,5%	10,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	4,6%	4,4%	5,8%	15,9%	8,9%	6,8%	20,8%	11,3%	8,7%	18,2%	12,5%	6,8%	16,3%	10,1%
Gêne dans le travail	0,9%	3,7%	1,8%	2,0%	9,3%	4,3%	3,3%	15,9%	7,4%	6,7%	12,5%	8,9%	3,7%	11,4%	6,4%
Traitement ou autre soin	1,7%	0,9%	1,5%	2,0%	4,0%	2,6%	1,4%	7,2%	3,3%	1,7%	6,1%	3,4%	1,7%	5,2%	2,9%
Troubles ostéoarticulaires du coude															
Existence d'un problème	1,3%	2,8%	1,8%	2,3%	6,7%	3,7%	1,6%	11,2%	4,8%	4,4%	9,0%	6,2%	2,6%	8,3%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,3%	2,8%	1,8%	2,3%	6,0%	3,5%	1,6%	10,3%	4,4%	4,2%	9,0%	6,1%	2,6%	7,9%	4,4%
Gêne dans le travail	0,4%	0,9%	0,6%	1,5%	4,7%	2,5%	0,9%	6,9%	2,9%	3,1%	6,4%	4,4%	1,7%	5,4%	3,0%
Traitement ou autre soin	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%	0,7%	4,9%	2,1%	1,5%	3,5%	2,3%	1,0%	2,9%	1,7%
Troubles ostéoarticulaires du poignet															
Existence d'un problème	3,0%	5,6%	3,8%	4,4%	9,3%	5,9%	6,1%	12,6%	8,2%	9,1%	14,1%	11,1%	6,2%	11,4%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	5,6%	3,8%	4,4%	8,6%	5,7%	5,9%	11,6%	7,7%	8,7%	13,8%	10,7%	6,0%	10,9%	7,7%
Gêne dans le travail	0,9%	1,9%	1,2%	3,2%	6,7%	4,3%	3,3%	9,2%	5,2%	6,9%	8,4%	7,5%	4,0%	7,3%	5,2%
Traitement ou autre soin	0,0%	0,9%	0,3%	1,8%	2,0%	1,8%	0,9%	3,4%	1,7%	1,0%	2,9%	1,8%	1,0%	2,6%	1,5%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	8,6%	11,1%	9,4%	10,3%	24,2%	14,5%	11,8%	30,4%	17,9%	17,7%	29,8%	22,5%	12,8%	26,1%	17,4%
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	11,1%	9,4%	10,3%	23,5%	14,3%	11,8%	30,0%	17,7%	17,5%	29,8%	22,4%	12,8%	25,8%	17,3%
Gêne dans le travail	2,2%	5,6%	3,2%	5,0%	14,2%	7,8%	6,6%	22,1%	11,6%	13,2%	19,7%	15,7%	7,6%	17,1%	10,9%
Traitement ou autre soin	2,6%	2,8%	2,6%	2,9%	4,7%	3,5%	1,7%	10,8%	4,6%	3,6%	9,4%	5,8%	2,7%	7,8%	4,5%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest		
	<45 ans n =234	≥ 45 ans n =108	Ensemble n =342	<45 ans n =344	≥ 45 ans n =154	Ensemble n =498	<45 ans n =429	≥ 45 ans n =207	Ensemble n =636	<45 ans n =488	≥ 45 ans n =319	Ensemble n =807	<45 ans n =1499	≥ 45 ans n =798	Global n =2297
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	7,7%	5,6%	7,0%	5,3%	14,7%	8,1%	7,2%	12,1%	8,8%	8,7%	14,0%	10,8%	7,3%	12,4%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,7%	5,6%	7,0%	5,3%	14,0%	7,9%	7,2%	11,1%	8,5%	8,7%	14,0%	10,8%	7,3%	12,0%	8,9%
Gêne dans le travail	1,7%	0,9%	1,5%	2,3%	6,7%	3,7%	3,5%	7,8%	4,9%	4,8%	10,8%	7,2%	3,4%	7,7%	4,9%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	0,0%	1,8%	2,0%	6,0%	3,3%	1,2%	3,4%	1,9%	1,9%	6,7%	3,8%	1,8%	4,7%	2,8%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	8,5%	9,5%	8,8%	8,2%	18,0%	11,2%	10,8%	19,0%	13,5%	8,7%	10,2%	9,3%	9,2%	14,0%	10,8%
Plaintes ou signes cliniques	8,5%	9,5%	8,8%	8,2%	16,7%	10,8%	10,8%	18,0%	13,2%	8,7%	10,2%	9,3%	9,2%	13,5%	10,7%
Gêne dans le travail	5,6%	5,7%	5,6%	4,7%	9,5%	6,1%	4,2%	12,3%	6,8%	5,4%	6,1%	5,7%	4,9%	8,2%	6,0%
TraITEMENT ou autre soin	4,3%	1,9%	3,6%	2,1%	7,4%	3,7%	3,1%	7,4%	4,5%	2,9%	2,6%	2,8%	3,0%	4,6%	3,5%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolumbaires															
Existence d'un problème	19,0%	27,8%	21,8%	17,3%	22,7%	18,9%	19,0%	22,9%	20,3%	20,5%	24,0%	21,8%	19,1%	23,9%	20,8%
Plaintes ou signes cliniques	18,6%	25,5%	20,8%	17,3%	21,3%	18,5%	18,2%	22,9%	19,7%	20,3%	23,1%	21,4%	18,7%	23,0%	20,2%
Gêne dans le travail	6,1%	11,3%	7,7%	8,8%	10,1%	9,2%	9,6%	15,6%	11,6%	12,1%	15,1%	13,3%	9,7%	13,7%	11,1%
TraITEMENT ou autre soin	7,0%	13,9%	9,2%	6,7%	10,1%	7,8%	5,2%	11,7%	7,3%	6,9%	8,3%	7,5%	6,4%	10,2%	7,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis															
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>															
Existence d'un problème	23,3%	32,4%	26,1%	22,9%	30,9%	25,3%	24,5%	32,8%	27,2%	24,7%	29,7%	26,7%	24,0%	31,1%	26,4%
Plaintes ou signes cliniques	22,9%	31,7%	25,7%	22,9%	29,5%	24,9%	23,9%	32,8%	26,8%	24,5%	29,2%	26,4%	23,7%	30,6%	26,1%
Gêne dans le travail	10,0%	14,4%	11,3%	11,4%	15,0%	12,5%	11,8%	22,1%	15,1%	14,9%	18,6%	16,4%	12,4%	18,2%	14,4%
TraITEMENT ou autre soin	9,1%	15,2%	11,0%	7,6%	13,5%	9,4%	6,0%	16,3%	9,3%	8,6%	10,0%	9,2%	7,8%	12,9%	9,5%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C- Industrie manufacturière n = 506	F- Construction n = 246	G- Commerce, réparation d'auto-moto n = 411	Base Everest n = 2297
Répartition hommes / femmes	72,9% / 27,1%	85,8% / 14,2%	51,3% / 48,7%	60,6% / 39,4%
≤24 ans	5,5%	8,1%	16,8%	10,5%
25-34 ans	21,3%	30,9%	26,3%	26,4%
35-44 ans	34,0%	24,0%	26,0%	28,3%
45-54 ans	27,5%	28,0%	21,2%	25,4%
55 ans et plus	11,7%	8,9%	9,7%	9,3%
Cadres	10,9%	8,1%	10,2%	14,9%
Intermédiaires	17,6%	22,4%	20,0%	21,7%
Employés	9,3%	6,9%	48,4%	27,7%
Ouvriers	61,5%	62,2%	20,9%	35,1%

Conditions de travail	C- Industrie manufacturière n = 506	F- Construction n = 246	G- Commerce, réparation d'auto-moto n = 411	Base Everest n = 2297
- Changement de travail depuis 1 an :				
Non	89,5%	91,8%	83,6%	84,6%
Oui, raison médicale	1,2%	0,0%	0,5%	0,7%
Oui, autre raison	8,9%	6,9%	14,4%	13,6%
Oui, raison non précisée	0,4%	1,2%	1,5%	1,0%
Travail à temps plein	90,0%	93,4%	82,1%	82,5%
Travail en journée normale	68,2%	98,3%	80,2%	76,1%
Coupures de plus de 2 heures	8,4%	13,9%	17,0%	16,2%
Horaires décalés	26,8%	10,4%	26,9%	26,3%
Horaires irréguliers ou alternés	25,3%	10,3%	22,1%	22,6%
Travail de nuit	14,5%	6,3%	4,8%	22,6%
Déplacements professionnels de plus de 24h	10,1%	13,4%	9,1%	10,6%
- Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	31,6%	11,8%	16,6%	20,6%
Rarement	37,0%	48,4%	47,7%	41,2%
Assez souvent	21,5%	29,7%	23,7%	26,1%
Très souvent	9,9%	10,2%	12,0%	12,1%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	59,0%	36,7%	50,7%	46,5%
Rarement	28,6%	45,7%	30,9%	34,1%
Assez souvent	9,3%	13,5%	12,7%	14,3%
Très souvent	3,0%	4,1%	5,6%	5,0%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	38,3%	33,3%	40,8%	36,1%
Rarement	39,7%	44,7%	38,1%	40,5%
Assez souvent	17,2%	19,1%	16,4%	18,7%
Très souvent	4,8%	2,8%	4,6%	4,7%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	3,8%	0,8%	5,6%	4,2%
1	3,2%	6,2%	3,4%	3,8%
2	11,3%	11,2%	12,2%	10,5%
3	11,5%	18,6%	15,1%	14,0%
4	14,9%	12,8%	10,9%	12,7%
5	23,0%	19,4%	18,7%	19,7%
6	12,7%	9,1%	14,1%	13,1%
7	12,5%	13,2%	8,3%	12,4%
8	6,0%	6,2%	9,0%	7,6%
9	0,8%	1,7%	1,7%	1,5%
10	0,4%	0,8%	1,0%	0,7%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	32,3%	31,0%	34,1%	35,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	51,4%	38,5%	53,9%	49,0%
Parmi eux :				
- Perturbe le travail	56,0%	52,8%	46,8%	54,4%
- Aspect positif du travail	44,8%	54,4%	51,6%	46,2%

Appréciation sur le travail	C- Industrie manufacturière n = 506	F- Construction n = 246	G- Commerce, réparation d'auto-moto n = 411	Base Everest n = 2297
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	7,1%	1,6%	5,9%	5,8%
Plutôt non	15,2%	4,9%	14,9%	12,2%
Plutôt oui	44,4%	49,2%	42,4%	44,7%
Oui tout à fait	33,3%	44,3%	36,8%	37,3%
-Travail varié				
Non pas du tout	5,5%	2,4%	3,4%	4,5%
Plutôt non	13,5%	8,5%	12,9%	12,6%
Plutôt oui	42,6%	41,1%	42,6%	42,0%
Oui tout à fait	38,4%	48,0%	41,1%	40,8%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	8,3%	2,8%	8,0%	8,1%
Plutôt non	14,9%	7,3%	15,1%	15,9%
Plutôt oui	42,8%	51,2%	41,8%	43,7%
Oui tout à fait	34,1%	38,6%	35,0%	32,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	2,4%	1,6%	1,7%	3,0%
Plutôt non	12,4%	7,8%	11,5%	10,7%
Plutôt oui	51,2%	53,3%	48,9%	52,1%
Oui tout à fait	34,1%	37,3%	37,9%	34,2%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	1,6%	0,4%	1,2%	1,4%
Plutôt non	9,0%	3,3%	8,3%	9,5%
Plutôt oui	58,1%	54,5%	50,1%	56,0%
Oui tout à fait	31,3%	41,9%	40,3%	33,0%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	5,6%	0,8%	3,2%	4,5%
Plutôt non	17,1%	15,1%	18,2%	15,8%
Plutôt oui	56,3%	52,2%	47,8%	53,1%
Oui tout à fait	21,1%	31,8%	30,8%	26,6%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	32,6%	24,8%	37,3%	32,2%
Plutôt non	48,8%	55,3%	44,6%	48,6%
Plutôt oui	16,8%	17,1%	15,4%	16,4%
Oui tout à fait	1,8%	2,8%	2,7%	2,8%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	63,1%	69,1%	63,6%	63,0%
Plutôt non	26,7%	25,5%	27,4%	26,7%
Plutôt oui	9,0%	4,9%	6,6%	8,3%
Oui tout à fait	1,2%	0,4%	2,4%	2,0%

Charge physique du poste de travail	C- Industrie manufacturière n = 506	F- Construction n = 246	G- Commerce, Réparation d'auto-moto n = 411	Base Everest n = 2297
Postures contraignantes :				
Fréquence				
Non jamais	38,5%	32,1%	44,3%	45,8%
Oui parfois	39,1%	47,6%	31,4%	34,0%
Oui souvent	22,3%	20,3%	24,3%	20,2%
Difficultés				
Pas de postures contraignantes	38,5%	32,1%	44,3%	45,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	31,0%	33,7%	24,8%	25,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	29,8%	32,5%	30,2%	27,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	0,6%	1,6%	0,7%	0,8%
Effort, port de charges lourdes :				
Fréquence				
Non jamais	44,8%	34,1%	42,4%	49,8%
Oui parfois	37,8%	39,4%	34,3%	33,1%
Oui souvent	17,5%	26,4%	23,3%	17,1%
Difficultés				
Pas d'effort, port de charges lourdes	44,8%	34,1%	42,4%	49,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	26,3%	33,3%	26,2%	24,2%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	27,3%	30,5%	30,1%	24,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	1,6%	2,0%	1,2%	1,2%
Gestes répétitifs :				
Fréquence				
Non jamais	33,5%	38,6%	42,1%	41,8%
Oui parfois	23,6%	28,9%	20,8%	22,5%
Oui souvent	42,9%	32,5%	37,2%	35,8%
Difficultés				
Pas de gestes répétitifs	33,5%	38,6%	42,1%	41,8%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	24,2%	16,7%	18,6%	18,3%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	40,1%	41,1%	38,1%	38,4%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,2%	3,7%	1,2%	1,5%
Importants déplacements à pieds :				
Fréquence				
Non jamais	52,6%	57,7%	61,5%	63,1%
Oui parfois	18,3%	26,4%	16,6%	15,7%
Oui souvent	29,2%	15,9%	22,0%	21,2%
Difficultés				
Pas d'importants déplacements à pieds	52,6%	57,7%	61,5%	63,1%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	13,9%	8,5%	11,0%	9,8%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	32,5%	30,9%	27,3%	26,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,0%	2,8%	0,2%	0,9%
Station debout prolongée :				
Fréquence				
Non jamais	34,8%	40,6%	38,0%	44,5%
Oui parfois	16,2%	27,5%	17,1%	17,8%
Oui souvent	49,0%	32,0%	44,9%	37,7%
Difficultés				
Pas de station debout prolongée	34,8%	40,6%	38,0%	44,5%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	20,4%	11,1%	17,3%	15,7%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	40,9%	43,0%	41,5%	36,6%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	4,0%	5,3%	3,2%	3,2%

Expositions	C- Industrie manufacturière n = 506	F- Construction n = 246	G- Commerce, réparation d'auto-moto n = 411	Base Everest n = 2297
Produits chimiques	36,2%	28,3%	15,1%	24,4%
Poussières, fumées	50,2%	63,3%	23,2%	33,2%
Rx ionisants	1,0%	1,3%	0,7%	1,2%
Vibrations	35,1%	50,0%	11,9%	21,7%
Gêne sonore	62,1%	59,8%	26,9%	40,6%
Bruit > 80db	53,3%	46,7%	11,0%	26,3%
Contrainte visuelle	30,8%	13,2%	25,4%	30,5%
Conduite routière prolongée	11,7%	27,0%	15,6%	16,7%
Chaleur intense	19,3%	18,9%	4,9%	12,8%
Froid intense	9,6%	15,6%	10,8%	9,7%
Intempéries	10,8%	41,8%	6,4%	14,6%
Pression psychologique	20,8%	17,1%	16,7%	20,4%
Agent biologique	3,2%	1,7%	3,5%	8,2%
Contact avec le public	34,1%	64,6%	80,7%	61,8%

Formation	C- Industrie manufacturière n = 506	F- Construction n = 246	G- Commerce, réparation d'auto-moto n = 411	Base Everest n = 2297
A bénéficié d'une formation depuis un an :	43,1%	39,4%	43,0%	45,7%
Parmi eux :				
- En rapport avec le travail actuel	88,3%	92,5%	88,6%	89,3%
- En rapport avec le travail futur	18,6%	15,7%	17,5%	17,6%
- Formation d'intérêt général	40,2%	40,7%	33,1%	34,1%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	32,6%	22,9%	33,1%	29,9%

Mode de vie	C- Industrie manufacturière n = 506	F- Construction n = 246	G- Commerce, réparation d'auto-moto n = 411	Base Everest n = 2297
Activité sportive régulière	51,5%	41,9%	50,0%	52,1%
Consommation de tabac	34,7%	38,4%	40,1%	35,6%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	6,6%	11,8%	4,9%	6,8%
Consommation de café	83,6%	82,4%	74,0%	78,9%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	15,6%	12,3%	11,2%	14,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	13,1%	26,9%	18,0%	17,4%

Rapport Everest 2012-2013 – Région Pays de la Loire

Etat de santé	C- Industrie manufacturière			F- Construction			G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Base Everest		
	<45 ans n=308	≥ 45 ans n=198	Ensemble n=506	<45 ans n=155	≥ 45 ans n=91*	Ensemble n=246	<45 ans n=284	≥ 45 ans n=127	Ensemble n=411	<45 ans n=1499	≥ 45 ans n=798	Ensemble n=2297
Indice de masse corporelle												
- Normaux ou maigres	62,5%	46,8%	56,5%	59,7%	40,2%	52,3%	68,9%	58,2%	65,7%	67,1%	52,2%	62,0%
- Surpoids	29,1%	38,3%	32,6%	30,6%	43,9%	35,6%	24,6%	28,7%	25,9%	25,3%	34,3%	28,4%
- Obèses	8,4%	14,9%	10,9%	9,7%	15,9%	12,0%	6,4%	13,1%	8,5%	7,6%	13,4%	9,6%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	3,6%	4,1%	3,8%	2,6%	6,7%	4,1%	2,5%	1,6%	2,2%	3,4%	3,6%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	3,6%	3,6%	2,6%	6,7%	4,1%	2,5%	1,6%	2,2%	3,4%	3,3%	3,3%
Gêne dans le travail	0,3%	1,0%	0,6%	0,0%	3,4%	1,2%	0,4%	0,0%	0,2%	0,5%	0,8%	0,6%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	3,1%	2,2%	0,6%	4,5%	2,0%	1,4%	0,0%	1,0%	1,9%	2,3%	2,1%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	0,3%	7,2%	3,0%	1,9%	9,2%	4,5%	1,1%	9,5%	3,7%	1,3%	8,0%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	0,3%	7,2%	3,0%	1,9%	9,2%	4,5%	1,1%	8,7%	3,4%	1,3%	7,7%	3,5%
Gêne dans le travail	0,0%	2,1%	0,8%	1,3%	3,4%	2,1%	0,4%	0,8%	0,5%	0,7%	1,5%	1,0%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	5,2%	2,0%	0,6%	4,6%	2,1%	0,4%	7,1%	2,4%	0,4%	5,4%	2,1%
HTA												
Existence d'un problème	2,4%	15,7%	7,6%	3,3%	21,6%	10,1%	1,1%	15,9%	5,7%	2,4%	15,3%	6,9%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	12,6%	6,0%	2,0%	19,3%	8,4%	0,7%	13,5%	4,7%	1,7%	12,7%	5,5%
Gêne dans le travail	0,0%	1,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,2%	0,0%	0,6%	0,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	10,5%	4,7%	2,0%	9,1%	4,6%	1,1%	11,1%	4,2%	1,4%	9,8%	4,3%
Digestif												
Existence d'un problème	5,0%	9,3%	6,7%	4,7%	2,2%	3,8%	3,9%	9,8%	5,7%	5,8%	7,5%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	8,3%	6,3%	4,7%	2,2%	3,8%	3,9%	8,3%	5,2%	5,6%	7,0%	6,1%
Gêne dans le travail	2,3%	1,6%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	2,5%	2,0%	1,4%	1,4%	1,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,7%	6,7%	4,3%	2,7%	1,1%	2,1%	1,8%	5,7%	3,0%	2,2%	3,5%	2,6%
Dermatologie												
Existence d'un problème	7,6%	3,1%	5,8%	5,8%	2,2%	4,5%	6,4%	4,8%	5,9%	6,9%	4,5%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,6%	3,1%	5,8%	5,8%	2,2%	4,5%	6,4%	4,0%	5,6%	6,9%	4,2%	6,0%
Gêne dans le travail	0,7%	1,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,6%	0,7%	1,0%	1,0%	1,0%
TraITEMENT ou autre soin	4,0%	2,1%	3,2%	2,6%	1,1%	2,1%	3,5%	2,4%	3,2%	3,8%	2,7%	3,4%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C- Industrie manufacturière			F- Construction			G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Base Everest		
	<45 ans n=308	≥ 45 ans n=198	Ensemble n=506	<45 ans n=155	≥ 45 ans n=91*	Ensemble n=246	<45 ans n=284	≥ 45 ans n=127	Ensemble n=411	<45 ans n=1499	≥ 45 ans n=798	Ensemble n=2297
Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	23,5%	25,3%	24,2%	10,3%	12,4%	11,1%	24,8%	27,6%	25,7%	22,7%	24,7%	23,4%
Plaintes ou signes cliniques	23,5%	25,3%	24,2%	10,3%	12,4%	11,1%	24,2%	27,6%	25,2%	22,5%	24,7%	23,3%
Gêne dans le travail	11,1%	12,4%	11,6%	2,6%	3,4%	2,9%	10,6%	11,0%	10,8%	10,5%	11,4%	10,8%
TraITEMENT ou autre soin	3,6%	3,6%	3,6%	1,3%	1,1%	1,2%	0,7%	3,2%	1,5%	2,0%	2,9%	2,3%
Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	19,0%	25,1%	21,4%	11,0%	13,6%	11,9%	19,1%	27,8%	21,8%	19,0%	22,7%	20,2%
Plaintes ou signes cliniques	19,0%	25,1%	21,4%	11,0%	13,6%	11,9%	18,5%	27,8%	21,4%	18,6%	22,6%	20,0%
Gêne dans le travail	6,2%	14,4%	9,4%	4,5%	2,3%	3,7%	6,7%	11,1%	8,1%	7,7%	10,8%	8,8%
TraITEMENT ou autre soin	2,3%	4,6%	3,2%	2,6%	1,1%	2,1%	1,1%	6,4%	2,7%	2,0%	4,6%	2,9%
Troubles du sommeil												
Existence d'un problème	14,5%	27,2%	19,4%	6,5%	6,7%	6,6%	12,4%	25,4%	16,4%	14,8%	22,2%	17,3%
Plaintes ou signes cliniques	14,5%	26,3%	19,1%	6,5%	6,7%	6,6%	12,4%	25,4%	16,4%	14,6%	21,8%	17,1%
Gêne dans le travail	6,9%	12,8%	9,2%	3,2%	1,1%	2,5%	4,6%	9,5%	6,1%	6,5%	9,7%	7,6%
TraITEMENT ou autre soin	2,0%	6,2%	3,6%	0,6%	2,2%	1,2%	1,8%	6,3%	3,2%	1,8%	5,7%	3,2%
➤ Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	6,2%	5,6%	6,0%	2,6%	2,2%	2,5%	5,3%	12,7%	7,6%	6,5%	8,6%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	5,6%	6,0%	2,6%	2,2%	2,5%	5,0%	12,7%	7,4%	6,2%	8,6%	7,1%
Gêne dans le travail	1,0%	4,6%	2,4%	1,9%	0,0%	1,2%	2,1%	5,5%	3,2%	2,1%	4,1%	2,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	0,5%	0,8%	0,6%	0,0%	0,4%	0,4%	1,6%	0,7%	0,6%	0,8%	0,7%
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	4,6%	21,4%	11,1%	5,2%	29,2%	13,9%	1,8%	7,1%	3,5%	3,6%	14,6%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	4,6%	20,5%	10,7%	5,2%	29,2%	13,9%	1,8%	6,3%	3,2%	3,6%	13,9%	7,1%
Gêne dans le travail	1,3%	6,2%	3,2%	0,0%	4,5%	1,6%	0,0%	2,4%	0,7%	0,6%	3,8%	1,7%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	2,6%	1,0%	1,3%	2,2%	1,6%	0,0%	0,8%	0,2%	0,3%	1,7%	0,8%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C- Industrie manufacturière			F- Construction			G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Base Everest		
	<45 ans n=308	≥ 45 ans n=198	Ensemble n=506	<45 ans n=155	≥ 45 ans n=91*	Ensemble n=246	<45 ans n=284	≥ 45 ans n=127	Ensemble n=411	<45 ans n=1499	≥ 45 ans n=798	Ensemble n=2297
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Existence d'un problème	9,5%	19,0%	13,2%	5,8%	12,4%	8,2%	5,7%	12,6%	7,8%	6,8%	16,5%	10,1%
Plaintes ou signes cliniques	9,5%	19,0%	13,2%	5,8%	12,4%	8,2%	5,7%	11,8%	7,6%	6,8%	16,3%	10,1%
Gêne dans le travail	5,6%	12,8%	8,4%	3,2%	4,5%	3,7%	3,2%	9,5%	5,1%	3,7%	11,4%	6,4%
Traitements ou autre soin	2,0%	7,2%	4,0%	1,3%	3,4%	2,0%	1,4%	4,8%	2,4%	1,7%	5,2%	2,9%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Existence d'un problème	4,0%	11,5%	6,9%	2,6%	3,4%	2,9%	1,8%	6,3%	3,2%	2,6%	8,3%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	11,5%	6,9%	2,6%	3,4%	2,9%	1,8%	4,8%	2,7%	2,6%	7,9%	4,4%
Gêne dans le travail	2,3%	7,8%	4,4%	1,3%	2,2%	1,6%	1,1%	3,2%	1,7%	1,7%	5,4%	3,0%
Traitements ou autre soin	2,0%	4,2%	2,8%	0,6%	1,1%	0,8%	0,7%	2,4%	1,2%	1,0%	2,9%	1,7%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Existence d'un problème	9,2%	15,4%	11,6%	5,2%	7,9%	6,2%	4,6%	8,7%	5,9%	6,2%	11,4%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	9,2%	15,4%	11,6%	5,2%	7,9%	6,2%	4,3%	7,1%	5,1%	6,0%	10,9%	7,7%
Gêne dans le travail	6,6%	10,8%	8,2%	3,2%	2,2%	2,9%	2,8%	4,8%	3,4%	4,0%	7,3%	5,2%
Traitements ou autre soin	1,7%	4,1%	2,6%	0,6%	0,0%	0,4%	0,7%	1,6%	1,0%	1,0%	2,6%	1,5%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	18,5%	30,9%	23,3%	11,0%	18,0%	13,6%	10,0%	18,9%	12,8%	12,8%	26,1%	17,4%
Plaintes ou signes cliniques	18,5%	30,9%	23,3%	11,0%	18,0%	13,6%	10,0%	18,1%	12,6%	12,8%	25,8%	17,3%
Gêne dans le travail	11,0%	20,6%	14,7%	5,8%	6,7%	6,2%	5,7%	13,5%	8,1%	7,6%	17,1%	10,9%
Traitements ou autre soin	4,0%	10,4%	6,5%	2,6%	4,5%	3,3%	1,8%	6,3%	3,2%	2,7%	7,8%	4,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C- Industrie manufacturière			F- Construction			G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Base Everest		
	<45 ans n=308	≥ 45 ans n=198	Ensemble n=506	<45 ans n=155	≥ 45 ans n=91*	Ensemble n=246	<45 ans n=284	≥ 45 ans n=127	Ensemble n=411	<45 ans n=1499	≥ 45 ans n=798	Ensemble n=2297
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	9,9%	14,9%	11,8%	3,9%	7,9%	5,3%	8,1%	12,6%	9,5%	7,3%	12,4%	9,1%
Plaintes ou signes cliniques	9,9%	14,9%	11,8%	3,9%	7,9%	5,3%	8,1%	11,0%	9,0%	7,3%	12,0%	8,9%
Gêne dans le travail	4,3%	11,3%	7,0%	1,9%	3,4%	2,5%	4,2%	7,1%	5,1%	3,4%	7,7%	4,9%
Traitements ou autre soin	2,3%	6,2%	3,8%	0,6%	5,6%	2,5%	1,8%	5,6%	2,9%	1,8%	4,7%	2,8%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	11,2%	11,8%	11,4%	4,5%	6,8%	5,3%	8,8%	11,9%	9,8%	9,2%	14,0%	10,8%
Plaintes ou signes cliniques	11,2%	11,8%	11,4%	4,5%	6,8%	5,3%	8,8%	10,3%	9,3%	9,2%	13,5%	10,7%
Gêne dans le travail	5,9%	6,2%	6,0%	1,3%	3,4%	2,1%	4,9%	8,8%	6,1%	4,9%	8,2%	6,0%
Traitements ou autre soin	4,3%	2,1%	3,4%	0,0%	2,3%	0,8%	3,2%	5,6%	3,9%	3,0%	4,6%	3,5%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolumbaires												
Existence d'un problème	22,4%	27,3%	24,3%	17,0%	20,5%	18,3%	15,9%	20,6%	17,4%	19,1%	23,9%	20,8%
Plaintes ou signes cliniques	22,2%	26,4%	23,8%	17,0%	20,5%	18,3%	15,6%	19,8%	16,9%	18,7%	23,0%	20,2%
Gêne dans le travail	12,3%	15,0%	13,3%	6,5%	9,1%	7,5%	9,5%	14,4%	11,0%	9,7%	13,7%	11,1%
Traitements ou autre soin	7,0%	11,9%	8,9%	7,2%	6,8%	7,1%	5,7%	12,0%	7,6%	6,4%	10,2%	7,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	28,9%	35,2%	31,4%	19,6%	22,7%	20,7%	20,8%	26,4%	22,5%	24,0%	31,1%	26,4%
Plaintes ou signes cliniques	28,7%	34,4%	30,9%	19,6%	22,7%	20,7%	20,6%	25,6%	22,1%	23,7%	30,6%	26,1%
Gêne dans le travail	15,7%	19,8%	17,3%	6,5%	10,2%	7,9%	12,0%	19,4%	14,3%	12,4%	18,2%	14,4%
Traitements ou autre soin	9,1%	13,0%	10,6%	7,2%	8,0%	7,5%	7,1%	14,5%	9,4%	7,8%	12,9%	9,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

