



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport descriptif région Nord – Pas-de-Calais 2012-2013

Juillet 2014



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2012-2013 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Nord – Pas de Calais

L'exploitation des données de la région Nord-Pas de Calais a porté sur **2 142 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2012 (n=1 069) et 2013 (n=1 073).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Evrest semble plus proche du champ des salariés du privé seul (données Acoss) que du champ des salariés des DADS, comprenant les secteurs publics et privés, tout du moins en ce qui concerne la répartition par secteur d'activité (tableau 1). Comparativement au champ des salariés des DADS, les hommes sont surreprésentés, ainsi que les professions intermédiaires et les ouvriers, au détriment des employés. Comparativement au champ des salariés de l'Acoss, concernant les secteurs d'activité, l'industrie est surreprésentée, au détriment des services.

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 4 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Construction, Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles, et Santé humaine et action sociale (tableau 3).

Etant donné la représentativité discutable de l'échantillon Nord – Pas de Calais, il est conseillé de se référer aux chiffres fournis pour les comparaisons entre catégories socioprofessionnelles ou secteurs d'activité, plutôt qu'aux descriptifs bruts réalisés sur l'échantillon dans son ensemble.

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Nord-Pas de Calais 2012-2013 aux données Insee (DADS 2010) et ACOSS (2012).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon	Données INSEE 2010	Données ACOSS
	Nord-Pas de Calais	(DADS)	2012
	2012-2013 (n=2 142)	%	%
Sexe			
Hommes	59,5	53,5	-
Femmes	40,5	46,5	-
Age			
≤ 24 ans	7,9	13,3	-
25-34 ans	28,7	25,8	-
35-44 ans	28,3	25,6	-
45- 54 ans	25,3	24,0	-
55 ans et plus	9,9	11,3	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Salariés de leur entreprise	0,7	0,7	-
Chef d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures	14,2	12,3	-
Professions intermédiaires	25,4	20,1	-
Employés	27,2	37,4	-
Ouvriers	32,5	29,5	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,9	0,1	0,1%
Industrie	28,8	15,0	20,1%
Construction	7,7	6,4	8,2%
Commerce	15,7	13,5	17,9%
Services	46,9	65,1	53,7%

- : informations non disponibles

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Nord-Pas de Calais 2012-2013 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	14	0,7
Cadres et professions intellectuelles supérieures	304	14,2
Professions intermédiaires	545	25,4
Employés	582	27,2
Ouvriers	697	32,5
Total général	2 142	100,0

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Nord-Pas de Calais 2012-2013 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	20	0,9
A. Agriculture, sylviculture et pêche	20	0,9
INDUSTRIE	617	28,8
B. Industries extractives	1	0,0
C. Industrie manufacturière	477	22,3
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	103	4,8
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	36	1,7
CONSTRUCTION	164	7,7
F. Construction	164	7,7
COMMERCE	336	15,7
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	336	15,7
SERVICES	1005	46,9
H. Transports et entreposage	86	4,0
I. Hébergement et restauration	48	2,2
J. Information et communication	58	2,7
K. Activités financières et d'assurance	74	3,5
L. Activités immobilières	31	1,4
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	122	5,7
N. Activités de services administratifs et de soutien	102	4,8
O. Administration publique	120	5,6
P. Enseignement	44	2,1
Q. Santé humaine et action sociale	232	10,8
R. Arts, spectacles et activités récréatives	16	0,7
S. Autres activités de services	72	3,4
Total général	2 142	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=1274	Femmes n=868	Ensemble n=2142
≤24 ans	7,8%	8,1%	7,9%
25-34 ans	27,5%	30,4%	28,7%
35-44 ans	28,3%	28,3%	28,3%
45-54 ans	25,8%	24,4%	25,3%
55 ans et plus	10,6%	8,8%	9,9%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,9%	0,3%	0,7%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	14,6%	13,6%	14,2%
Professions intermédiaires	25,6%	25,2%	25,4%
Employés	11,1%	50,7%	27,2%
Ouvriers	47,8%	10,1%	32,5%
C. Industrie manufacturière	30,1%	10,8%	22,3%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	6,5%	2,3%	4,8%
F. Construction	12,5%	0,6%	7,7%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	14,4%	17,6%	15,7%
H. Transports et entreposage	4,9%	2,6%	4,0%
I. Hébergement et restauration	1,8%	2,9%	2,2%
J. Information et communication	3,5%	1,5%	2,7%
K. Activités financières et d'assurance	2,5%	4,8%	3,5%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	4,9%	6,9%	5,7%
N. Activités de services administratifs et de soutien	4,9%	4,6%	4,8%
O. Administration publique	2,5%	10,1%	5,6%
Q. Santé humaine et action sociale	3,8%	21,1%	10,8%
S. Autres activités de services	1,2%	6,6%	3,4%

Conditions de travail	Hommes n=1274	Femmes n=868	Ensemble n=2142
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	89,5%	87,3%	88,6%
Oui, raison médicale	0,3%	0,5%	0,4%
Oui, autre raison	9,6%	10,8%	10,0%
Oui, raison non précisée	0,6%	1,5%	1,0%
Travail à temps plein	91,8%	72,3%	83,9%
Travail en journée normale	76,6%	80,1%	78,0%
Coupures de plus de 2 heures	13,5%	13,5%	13,5%
Horaires décalés	30,7%	18,3%	25,7%
Horaires irréguliers ou alternés	28,6%	20,2%	25,3%
Travail de nuit	20,2%	4,3%	13,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	10,6%	4,0%	7,9%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	17,4%	21,0%	18,9%
Rarement	42,5%	42,9%	42,7%
Assez souvent	27,0%	27,2%	27,1%
Très souvent	13,1%	8,8%	11,4%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	38,0%	46,0%	41,3%
Rarement	41,0%	32,4%	37,5%
Assez souvent	15,6%	15,3%	15,5%
Très souvent	5,4%	6,3%	5,8%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	36,9%	34,9%	36,1%
Rarement	41,8%	40,4%	41,2%
Assez souvent	16,6%	19,2%	17,7%
Très souvent	4,6%	5,5%	5,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	5,6%	5,2%	5,4%
1	5,0%	4,9%	5,0%
2	8,1%	8,8%	8,4%
3	13,6%	12,2%	13,0%
4	8,4%	11,2%	9,5%
5	23,0%	21,1%	22,3%
6	11,0%	11,3%	11,1%
7	13,1%	14,1%	13,5%
8	8,4%	8,6%	8,5%
9	2,7%	2,0%	2,4%
10	1,1%	0,7%	0,9%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	36,3%	36,6%	36,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	49,5%	51,7%	50,4%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	54,5%	59,6%	56,6%
- Aspect positif du travail	44,8%	45,6%	45,1%

Appréciations sur le travail	Hommes n=1274	Femmes n=868	Ensemble n=2142
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	5,4%	7,3%	6,1%
Plutôt non	10,1%	10,9%	10,4%
Plutôt oui	45,8%	41,9%	44,2%
Oui tout à fait	38,8%	40,0%	39,3%
-Travail varié			
Non pas du tout	5,1%	4,3%	4,8%
Plutôt non	11,2%	11,3%	11,2%
Plutôt oui	43,7%	41,8%	42,9%
Oui tout à fait	40,0%	42,5%	41,1%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	7,9%	9,1%	8,4%
Plutôt non	15,5%	15,7%	15,6%
Plutôt oui	41,6%	41,0%	41,3%
Oui tout à fait	35,0%	34,3%	34,7%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	2,8%	4,0%	3,3%
Plutôt non	10,8%	12,6%	11,5%
Plutôt oui	55,4%	53,6%	54,6%
Oui tout à fait	31,0%	29,9%	30,6%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,1%	2,0%	1,5%
Plutôt non	10,6%	11,5%	11,0%
Plutôt oui	57,3%	61,3%	59,0%
Oui tout à fait	31,0%	25,2%	28,6%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	5,3%	5,7%	5,5%
Plutôt non	15,9%	16,5%	16,1%
Plutôt oui	52,8%	55,1%	53,7%
Oui tout à fait	26,0%	22,8%	24,7%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	26,9%	33,8%	29,7%
Plutôt non	48,2%	45,7%	47,2%
Plutôt oui	21,2%	17,8%	19,8%
Oui tout à fait	3,7%	2,7%	3,3%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	53,6%	59,5%	56,0%
Plutôt non	32,6%	26,7%	30,2%
Plutôt oui	10,4%	10,5%	10,4%
Oui tout à fait	3,5%	3,3%	3,4%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=1274	Femmes n=868	Ensemble n=2142
Postures contraignantes :			
Fréquence			
Non jamais	42,8%	57,9%	48,9%
Oui parfois	39,6%	27,2%	34,6%
Oui souvent	17,6%	14,8%	16,5%
Difficulté			
Pas de postures contraignantes	42,8%	57,9%	48,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	26,6%	22,4%	24,9%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	26,8%	16,7%	22,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	3,9%	3,0%	3,5%
Effort, Port de charges lourdes :			
Fréquence			
Non jamais	46,2%	64,6%	53,6%
Oui parfois	38,3%	24,9%	32,9%
Oui souvent	15,5%	10,4%	13,5%
Difficulté			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	46,2%	64,6%	53,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	23,2%	18,4%	21,3%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	27,3%	14,7%	22,2%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	3,4%	2,2%	2,9%
Gestes répétitifs :			
Fréquence			
Non jamais	42,4%	45,6%	43,7%
Oui parfois	28,3%	22,3%	25,9%
Oui souvent	29,3%	32,2%	30,5%
Difficulté			
Pas de gestes répétitifs	42,4%	45,6%	43,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	17,3%	13,9%	15,9%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	35,9%	35,1%	35,5%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	4,4%	5,5%	4,8%
Importants déplacements à pieds :			
Fréquence			
Non jamais	50,7%	73,6%	60,0%
Oui parfois	23,0%	11,1%	18,2%
Oui souvent	26,2%	15,3%	21,8%
Difficulté			
Pas d'importants déplacements à pieds	50,7%	73,6%	60,0%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	12,3%	6,5%	9,9%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	32,9%	16,6%	26,3%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	4,1%	3,4%	3,8%
Station debout prolongée :			
Fréquence			
Non jamais	40,2%	59,9%	48,2%
Oui parfois	25,0%	13,9%	20,5%
Oui souvent	34,8%	26,2%	31,3%
Difficulté			
Pas de station debout prolongée	40,2%	59,9%	48,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	16,8%	13,4%	15,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	36,8%	21,3%	30,5%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	6,2%	5,3%	5,9%

Expositions	Hommes n=1274	Femmes n=868	Ensemble n=2142
Produits chimiques	31,8%	15,9%	25,3%
Poussières, fumées	50,2%	16,0%	36,3%
Rx ionisants	6,6%	0,9%	4,3%
Vibrations	33,0%	2,4%	20,6%
Gêne sonore	53,2%	24,4%	41,5%
Bruit > 80db	40,7%	4,9%	26,3%
Contrainte visuelle	32,9%	34,1%	33,4%
Conduite routière prolongée	18,9%	5,8%	13,6%
Chaleur intense	19,7%	6,7%	14,4%
Froid intense	17,3%	5,2%	12,4%
Intempéries	25,1%	3,7%	16,4%
Pression psychologique	23,7%	23,8%	23,7%
Agent biologique	7,4%	12,1%	9,3%
Contact avec le public	53,6%	66,0%	58,6%

Formation	Hommes n=1274	Femmes n=868	Ensemble n=2142
A bénéficié d'une formation depuis un an	50,6%	48,3%	49,6%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	91,6%	92,9%	92,1%
- En rapport avec le travail futur	15,5%	14,9%	15,3%
- Formation d'intérêt général	43,2%	35,5%	40,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	26,7%	26,0%	26,4%

Mode de vie	Hommes n=1274	Femmes n=868	Ensemble n=2142
Activité sportive régulière	51,6%	45,2%	49,0%
Consommation de tabac	38,1%	29,7%	34,7%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	10,9%	4,6%	8,4%
Consommation de café	84,3%	74,6%	80,4%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	22,9%	14,4%	19,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	15,2%	16,3%	15,7%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2142
	Hommes n=810	Femmes n=580	Ensemble n=1390	Hommes n=464	Femmes n=288	Ensemble n=752	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	54,8%	66,2%	59,5%	30,5%	51,3%	38,5%	52,1%
- Surpoids	32,7%	20,0%	27,5%	45,7%	25,8%	38,1%	31,2%
- Obèses	12,5%	13,8%	13,0%	23,8%	22,9%	23,4%	16,7%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	5,6%	6,4%	6,0%	5,8%	4,2%	5,2%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	6,2%	5,6%	5,1%	4,2%	4,8%	5,3%
Gêne dans le travail	1,0%	1,2%	1,1%	0,9%	2,1%	1,4%	1,2%
TraITEMENT ou autre soin	2,3%	3,6%	2,8%	3,8%	2,8%	3,4%	3,0%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	2,6%	2,8%	2,7%	8,4%	7,4%	8,0%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	2,7%	2,5%	6,4%	6,4%	6,4%	3,9%
Gêne dans le travail	0,6%	0,4%	0,5%	2,9%	1,4%	2,3%	1,2%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	1,1%	1,0%	6,6%	4,6%	5,9%	2,7%
HTA							
Existence d'un problème	3,7%	2,3%	3,2%	18,5%	14,8%	17,1%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	2,0%	2,5%	12,3%	10,4%	11,5%	5,7%
Gêne dans le travail	0,4%	0,4%	0,4%	1,4%	0,4%	1,0%	0,6%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	1,3%	1,7%	14,3%	11,7%	13,3%	5,8%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	20,0%	29,6%	24,0%	21,1%	33,3%	25,8%	24,6%
Plaintes ou signes cliniques	19,8%	29,6%	23,9%	20,8%	32,6%	25,4%	24,4%
Gêne dans le travail	8,8%	11,0%	9,7%	7,2%	15,8%	10,5%	10,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	5,1%	2,7%	1,1%	7,9%	3,7%	3,1%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	16,6%	23,9%	19,6%	18,7%	29,9%	23,0%	20,8%
Plaintes ou signes cliniques	16,3%	23,4%	19,3%	18,1%	28,9%	22,3%	20,3%
Gêne dans le travail	6,5%	11,9%	8,7%	8,4%	13,7%	10,4%	9,3%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	6,5%	3,5%	2,5%	10,0%	5,4%	4,2%
Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	14,8%	20,3%	17,1%	22,0%	35,0%	27,0%	20,6%
Plaintes ou signes cliniques	14,3%	19,7%	16,5%	21,3%	34,1%	26,1%	19,9%
Gêne dans le travail	6,7%	8,1%	7,3%	7,8%	11,1%	9,1%	7,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	3,3%	2,0%	4,0%	12,1%	7,1%	3,8%
➤ Troubles neuro psychiques							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	6,4%	10,0%	7,9%	7,8%	14,8%	10,4%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	6,3%	9,5%	7,6%	7,1%	14,1%	9,8%	8,4%
Gêne dans le travail	2,9%	4,1%	3,4%	2,2%	5,0%	3,3%	3,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,4%	1,2%	0,7%	0,2%	4,3%	1,8%	1,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2142
	Hommes n=810	Femmes n=580	Ensemble n=1390	Hommes n=464	Femmes n=288	Ensemble n=752	
Digestif							
Existence d'un problème	7,5%	8,3%	7,9%	8,6%	7,6%	8,3%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	7,0%	7,8%	7,3%	8,6%	7,3%	8,1%	7,6%
Gêne dans le travail	1,4%	1,5%	1,5%	1,8%	2,2%	2,0%	1,6%
TraITEMENT ou autre soin	3,7%	3,2%	3,4%	5,0%	4,0%	4,6%	3,9%
Dermatologie							
Existence d'un problème	6,6%	8,6%	7,5%	6,0%	6,4%	6,1%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	6,5%	8,1%	7,2%	5,7%	5,7%	5,7%	6,7%
Gêne dans le travail	0,9%	1,6%	1,2%	0,2%	1,4%	0,7%	1,0%
TraITEMENT ou autre soin	3,5%	5,6%	4,3%	4,2%	3,2%	3,8%	4,2%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	4,7%	2,7%	3,8%	12,4%	7,9%	10,7%	6,3%
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	2,3%	3,5%	11,8%	7,9%	10,3%	5,9%
Gêne dans le travail	1,0%	0,9%	1,0%	3,8%	2,5%	3,3%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	1,1%	0,9%	1,8%	1,1%	1,5%	1,1%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	6,4%	7,7%	6,9%	8,2%	15,6%	11,0%	8,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	7,3%	6,6%	8,2%	14,9%	10,8%	8,1%
Gêne dans le travail	3,3%	4,8%	4,0%	3,8%	9,3%	5,9%	4,6%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	2,9%	2,1%	2,2%	5,4%	3,4%	2,6%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	2,6%	3,2%	2,8%	3,8%	5,7%	4,5%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	3,0%	2,8%	3,3%	5,3%	4,1%	3,2%
Gêne dans le travail	1,8%	2,0%	1,9%	1,3%	3,2%	2,1%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	0,4%	1,8%	1,0%	0,9%	2,5%	1,5%	1,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	5,8%	7,2%	6,4%	7,3%	14,9%	10,2%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	6,8%	6,2%	7,3%	14,5%	10,1%	7,6%
Gêne dans le travail	2,7%	4,5%	3,5%	3,8%	9,0%	5,8%	4,3%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	3,1%	1,7%	0,2%	3,9%	1,6%	1,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	12,2%	12,5%	12,4%	16,1%	26,3%	20,0%	15,1%
Plaintes ou signes cliniques	12,0%	12,1%	12,0%	16,1%	25,6%	19,8%	14,8%
Gêne dans le travail	6,5%	7,8%	7,0%	7,6%	15,9%	10,8%	8,3%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	5,2%	3,7%	2,9%	8,3%	5,0%	4,2%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2142
	Hommes n=810	Femmes n=580	Ensemble n=1390	Hommes n=464	Femmes n=288	Ensemble n=752	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	6,5%	9,3%	7,7%	18,7%	15,1%	17,3%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,5%	9,2%	7,6%	18,5%	14,7%	17,1%	11,0%
Gêne dans le travail	2,9%	3,6%	3,2%	10,0%	7,9%	9,2%	5,3%
Traitements ou autres soins	2,0%	3,2%	2,5%	6,6%	6,1%	6,4%	3,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	4,6%	12,2%	7,8%	7,9%	21,8%	13,2%	9,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,6%	12,0%	7,7%	7,7%	21,4%	13,0%	9,6%
Gêne dans le travail	2,2%	7,7%	4,5%	4,4%	10,4%	6,7%	5,3%
Traitements ou autres soins	1,4%	4,3%	2,6%	2,9%	6,5%	4,3%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	15,6%	16,9%	16,2%	19,9%	23,6%	21,3%	18,0%
Plaintes ou signes cliniques	15,3%	16,4%	15,7%	19,1%	23,6%	20,8%	17,5%
Gêne dans le travail	8,3%	8,7%	8,5%	12,6%	12,6%	12,6%	9,9%
Traitements ou autres soins	4,0%	6,2%	4,9%	7,0%	7,2%	7,1%	5,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	17,7%	22,7%	19,8%	23,7%	35,7%	28,3%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	17,5%	22,2%	19,5%	22,9%	35,7%	27,9%	22,4%
Gêne dans le travail	9,6%	12,9%	11,0%	14,4%	19,0%	16,1%	12,8%
Traitements ou autres soins	4,6%	8,0%	6,0%	8,3%	11,4%	9,5%	7,2%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=304	Intermédiaires n=545	Employés n=582	Ouvriers n=697	Base Evrest région n=2142
Répartition homme/femme	61,2% / 38,8%	59,8% / 40,2%	24,4% / 75,6%	87,4% / 12,6%	59,5% / 40,5%
≤24 ans	3,6%	5,1%	10,3%	10,0%	7,9%
25-34 ans	29,9%	31,4%	29,9%	25,3%	28,7%
35-44 ans	32,6%	29,7%	24,7%	28,3%	28,3%
45-54 ans	22,7%	23,9%	25,9%	26,5%	25,3%
55 ans et plus	11,2%	9,9%	9,1%	9,9%	9,9%
C. Industrie manufacturière	17,8%	20,6%	4,5%	40,2%	22,3%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	5,6%	12,8%	1,4%	1,1%	4,8%
F. Construction	3,3%	5,5%	0,9%	16,9%	7,7%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	17,4%	14,3%	18,4%	13,8%	15,7%
H. Transports et entreposage	2,0%	2,6%	2,4%	7,5%	4,0%
I. Hébergement et restauration	1,0%	0,9%	4,6%	1,9%	2,2%
J. Information et communication	9,9%	3,1%	1,7%	0,1%	2,7%
K. Activités financières et d'assurance	7,9%	5,5%	3,4%	0,0%	3,5%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	17,4%	6,6%	4,5%	0,6%	5,7%
N. Activités de services administratifs et de soutien	1,6%	3,1%	6,7%	5,9%	4,8%
O. Administration publique	6,2%	5,5%	11,7%	0,4%	5,6%
Q. Santé humaine et action sociale	3,6%	11,4%	24,6%	2,2%	10,8%
S. Autres activités de services	1,3%	2,2%	8,6%	0,7%	3,4%

Conditions de travail	Cadres n=304	Intermédiaires n=545	Employés n=582	Ouvriers n=697	Base Evrest région n=2142
-Changement de travail depuis 1an :					
Non	86,1%	89,5%	87,8%	89,7%	88,6%
Oui, raison médicale	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%
Oui, autre raison	12,3%	9,6%	10,5%	9,0%	10,0%
Oui, raison non précisée	1,3%	0,6%	1,4%	0,9%	1,0%
Travail à temps plein	87,7%	89,6%	72,0%	87,4%	83,9%
Travail en journée normale	94,4%	82,9%	74,9%	69,2%	78,0%
Coupures de plus de 2 heures	12,4%	12,2%	15,4%	13,7%	13,5%
Horaires décalés	11,0%	24,4%	24,7%	34,5%	25,7%
Horaires irréguliers ou alternés	9,9%	23,0%	25,9%	33,6%	25,3%
Travail de nuit	3,2%	13,6%	8,8%	23,3%	13,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	21,6%	8,5%	1,8%	6,2%	7,9%
-Dépasser ses horaires normaux					
Jamais	4,6%	11,6%	23,1%	27,6%	18,9%
Rarement	26,7%	40,7%	48,2%	47,2%	42,7%
Assez souvent	41,9%	33,7%	22,3%	19,3%	27,1%
Très souvent	26,7%	14,0%	6,4%	5,8%	11,4%
-Sauter ou écourter un repas, pas de pause					
Jamais	21,8%	32,8%	49,2%	50,1%	41,3%
Rarement	46,2%	41,5%	31,3%	35,4%	37,5%
Assez souvent	23,8%	18,5%	14,4%	10,2%	15,5%
Très souvent	8,3%	7,2%	5,0%	4,2%	5,8%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin					
Jamais	19,2%	27,0%	40,9%	47,5%	36,1%
Rarement	44,4%	47,8%	37,6%	37,2%	41,2%
Assez souvent	30,1%	19,4%	16,6%	11,8%	17,7%
Très souvent	6,3%	5,7%	4,9%	3,6%	5,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)					
0	2,6%	3,0%	7,2%	7,3%	5,4%
1	2,6%	4,3%	5,3%	6,1%	5,0%
2	6,9%	7,0%	9,8%	9,1%	8,4%
3	12,5%	12,2%	12,3%	14,1%	13,0%
4	9,6%	9,2%	10,0%	9,5%	9,5%
5	21,1%	24,2%	20,0%	23,3%	22,3%
6	11,6%	12,9%	11,6%	9,1%	11,1%
7	20,1%	14,2%	13,0%	10,5%	13,5%
8	9,9%	9,1%	8,6%	7,2%	8,5%
9	2,3%	3,1%	1,9%	2,2%	2,4%
10	0,7%	0,7%	0,5%	1,6%	0,9%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	44,6%	40,1%	35,6%	30,6%	36,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	68,4%	57,9%	48,4%	37,7%	50,4%
<i>Parmi eux :</i>					
- Perturbe le travail	56,4%	58,0%	57,3%	55,6%	56,6%
- Aspect positif du travail	52,3%	41,9%	45,3%	43,5%	45,1%

Appréciations sur le travail	Cadres n=304	Intermédiaires n=545	Employés n=582	Ouvriers n=697	Base Evrest région n=2142
-Travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	2,3%	2,4%	7,4%	9,8%	6,1%
Plutôt non	3,0%	7,9%	13,5%	13,2%	10,4%
Plutôt oui	38,8%	46,4%	44,6%	44,7%	44,2%
Oui tout à fait	55,9%	43,3%	34,5%	32,2%	39,3%
-Travail varié					
Non pas du tout	1,0%	1,3%	5,5%	8,6%	4,8%
Plutôt non	5,0%	8,1%	13,9%	14,2%	11,2%
Plutôt oui	34,0%	44,5%	44,6%	44,4%	42,9%
Oui tout à fait	60,1%	46,1%	36,0%	32,8%	41,1%
-Choix dans la façon de procéder					
Non pas du tout	1,0%	5,9%	11,6%	10,9%	8,4%
Plutôt non	7,6%	16,0%	17,2%	17,4%	15,6%
Plutôt oui	39,4%	42,9%	39,7%	42,7%	41,3%
Oui tout à fait	52,0%	35,2%	31,5%	28,9%	34,7%
-Possibilités suffisantes d'entraide					
Non pas du tout	1,0%	2,4%	4,0%	4,5%	3,3%
Plutôt non	12,2%	10,0%	13,2%	10,7%	11,5%
Plutôt oui	54,1%	55,9%	51,2%	57,0%	54,6%
Oui tout à fait	32,7%	31,7%	31,6%	27,8%	30,6%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité					
Non pas du tout	0,7%	1,7%	1,9%	1,3%	1,5%
Plutôt non	12,6%	11,5%	11,2%	9,7%	11,0%
Plutôt oui	61,3%	62,0%	59,2%	55,4%	59,0%
Oui tout à fait	25,5%	24,8%	27,7%	33,6%	28,6%
-Travail reconnu					
Non pas du tout	3,3%	5,4%	4,9%	7,1%	5,5%
Plutôt non	10,2%	16,9%	18,4%	16,5%	16,1%
Plutôt oui	57,1%	55,8%	53,0%	51,4%	53,7%
Oui tout à fait	29,4%	21,9%	23,7%	25,0%	24,7%
-Faire des choses que l'on désapprouve					
Non pas du tout	27,9%	22,9%	36,3%	30,7%	29,7%
Plutôt non	54,5%	53,3%	42,0%	43,6%	47,2%
Plutôt oui	15,5%	20,6%	19,1%	21,3%	19,8%
Oui tout à fait	2,0%	3,2%	2,6%	4,4%	3,3%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi					
Non pas du tout	57,8%	56,3%	60,7%	51,1%	56,0%
Plutôt non	32,7%	33,5%	26,3%	29,4%	30,2%
Plutôt oui	7,5%	8,5%	9,9%	13,8%	10,4%
Oui tout à fait	2,0%	1,7%	3,1%	5,6%	3,4%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=304	Intermédiaires n=545	Employés n=582	Ouvriers n=697	Base Evrest région n=2142
Postures contraignantes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	78,0%	59,7%	54,1%	22,6%	48,9%
Oui parfois	16,8%	31,2%	28,9%	50,3%	34,6%
Oui souvent	5,3%	9,0%	17,0%	27,1%	16,5%
<i>Difficulté</i>					
Pas de postures contraignantes	78,0%	59,7%	54,1%	22,6%	48,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	9,9%	17,3%	22,2%	40,1%	24,9%
Postures contraignantes, pas diff. ou pénible	9,9%	20,2%	21,0%	32,0%	22,7%
Postures contraignantes, diff. ou pénible n.p.	2,3%	2,8%	2,8%	5,3%	3,5%
Effort, Port de charges lourdes :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	88,4%	64,1%	58,3%	25,7%	53,6%
Oui parfois	9,6%	30,0%	26,8%	50,8%	32,9%
Oui souvent	2,0%	5,9%	14,9%	23,5%	13,5%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'effort, port de charges lourdes	88,4%	64,1%	58,3%	25,7%	53,6%
Effort, port de charges lourdes, diff. ou pénible	3,3%	14,2%	21,8%	34,6%	21,3%
Effort, port de charges lourdes, pas diff/pénible	7,6%	19,2%	18,0%	34,8%	22,2%
Effort, port de charges lourdes, diff/pénible n.p.	0,7%	2,6%	1,9%	4,9%	2,9%
Gestes répétitifs :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	77,2%	56,3%	39,8%	21,5%	43,7%
Oui parfois	15,8%	24,6%	24,8%	32,6%	25,9%
Oui souvent	6,9%	19,1%	35,4%	46,0%	30,5%
<i>Difficulté</i>					
Pas de gestes répétitifs	77,2%	56,3%	39,8%	21,5%	43,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	3,6%	7,0%	16,1%	28,4%	15,9%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	16,5%	32,0%	38,4%	44,8%	35,5%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible n.p.	2,6%	4,6%	5,7%	5,3%	4,8%
Importants déplacements à pieds :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	83,9%	65,2%	69,4%	37,3%	60,0%
Oui parfois	12,2%	17,9%	11,7%	26,5%	18,2%
Oui souvent	3,9%	16,8%	18,8%	36,3%	21,8%
<i>Difficulté</i>					
Pas d'importants déplacements à pieds	83,9%	65,2%	69,4%	37,3%	60,0%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible	2,6%	7,4%	6,7%	18,0%	9,9%
Importants dépl. à pieds, pas difficile ou pénible	11,5%	23,5%	20,0%	40,3%	26,3%
Importants dépl. à pieds, diff. ou pénible n.p.	2,0%	3,9%	3,8%	4,5%	3,8%
Station debout prolongée :					
<i>Fréquence</i>					
Non jamais	79,9%	59,1%	54,1%	20,2%	48,2%
Oui parfois	13,2%	24,3%	14,0%	26,4%	20,5%
Oui souvent	6,9%	16,6%	32,0%	53,4%	31,3%
<i>Difficulté</i>					
Pas de station debout prolongée	79,9%	59,1%	54,1%	20,2%	48,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	3,9%	11,0%	15,7%	24,0%	15,4%
Station debout prolongée, pas diff. ou pénible	12,5%	24,9%	24,4%	48,5%	30,5%
Station debout prolongée, diff. ou pénible n.p.	3,6%	5,0%	5,9%	7,4%	5,9%

Expositions	Cadres n=304	Intermédiaires n=545	Employés n=582	Ouvriers n=697	Base Evrest région n=2142
Produits chimiques	8,9%	24,1%	19,1%	39,0%	25,3%
Poussières, fumées	11,9%	25,0%	18,2%	71,7%	36,3%
Rx ionisants	2,7%	10,2%	1,2%	3,0%	4,3%
Vibrations	4,7%	15,0%	3,7%	46,5%	20,6%
Gêne sonore	21,3%	40,7%	22,7%	67,2%	41,5%
Bruit > 80db	7,6%	23,8%	5,7%	53,7%	26,3%
Contrainte visuelle	43,0%	36,5%	36,4%	24,6%	33,4%
Conduite routière prolongée	21,3%	17,0%	4,5%	14,9%	13,6%
Chaleur intense	3,3%	12,9%	8,4%	25,4%	14,4%
Froid intense	4,3%	8,3%	7,3%	23,6%	12,4%
Intempéries	8,0%	12,8%	6,8%	31,0%	16,4%
Pression psychologique	27,1%	26,8%	24,6%	19,0%	23,7%
Agent biologique	1,3%	8,8%	14,4%	9,0%	9,3%
Contact avec le public	56,9%	60,9%	73,8%	44,8%	58,6%

Formation	Cadres n=304	Intermédiaires n=545	Employés n=582	Ouvriers n=697	Base Evrest région n=2142
A bénéficié d'une formation depuis un an	55,4%	60,9%	48,1%	39,3%	49,6%
<i>Parmi eux :</i>					
- En rapport avec le travail actuel	94,5%	92,0%	94,1%	88,3%	92,1%
- En rapport avec le travail futur	17,6%	13,1%	14,0%	17,3%	15,3%
- Formation d'intérêt général	42,1%	45,8%	31,3%	41,5%	40,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	39,1%	34,3%	24,3%	16,1%	26,4%

Mode de vie	Cadres n=304	Intermédiaires n=545	Employés n=582	Ouvriers n=697	Base Evrest région n=2142
Activité sportive régulière	59,8%	52,6%	43,8%	45,6%	49,0%
Consommation de tabac	25,6%	30,0%	36,0%	41,4%	34,7%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	7,6%	5,6%	7,0%	11,9%	8,4%
Consommation de café	78,3%	79,7%	76,4%	85,1%	80,4%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	16,0%	17,5%	17,6%	24,4%	19,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	20,8%	18,7%	15,1%	11,7%	15,7%

Rapport Everest 2012-2013 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=201	≥45 ans n=103	Ensemble n=304	<45 ans n=361	≥45 ans n=184	Ensemble n=545	<45 ans n=378	≥45 ans n=204	Ensemble n=582	<45 ans n=443	≥45 ans n=254	Ensemble n=697	<45 ans n=1390	≥45 ans n=752	Global n=2142
Indice de masse corporelle															
- Normaux / maigres	65,6%	35,4%	55,7%	60,2%	37,5%	52,4%	61,3%	43,6%	55,1%	54,7%	35,7%	47,7%	59,5%	38,5%	52,1%
- Surpoids	27,2%	47,9%	34,0%	28,0%	35,8%	30,7%	23,5%	34,4%	27,3%	31,0%	38,9%	33,9%	27,5%	38,1%	31,2%
- Obèses	7,2%	16,7%	10,3%	11,8%	26,7%	16,9%	15,2%	22,1%	17,6%	14,3%	25,4%	18,4%	13,0%	23,4%	16,7%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	5,2%	6,0%	5,4%	6,3%	3,3%	5,3%	6,0%	5,6%	5,9%	5,8%	6,0%	5,9%	6,0%	5,2%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	6,0%	5,4%	6,3%	2,7%	5,1%	5,5%	5,6%	5,5%	5,1%	5,2%	5,2%	5,6%	4,8%	5,3%
Gêne dans le travail	0,5%	0,0%	0,3%	1,7%	0,5%	1,3%	0,5%	1,5%	0,9%	1,4%	2,4%	1,8%	1,1%	1,4%	1,2%
Traitements ou autre soin	2,1%	5,0%	3,1%	3,5%	2,2%	3,0%	3,6%	2,6%	3,2%	2,1%	4,4%	3,0%	2,8%	3,4%	3,0%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	3,6%	8,9%	5,4%	1,7%	8,8%	4,2%	3,0%	3,5%	3,2%	2,6%	10,8%	5,7%	2,7%	8,0%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	5,9%	4,1%	1,7%	7,1%	3,6%	2,7%	2,5%	2,7%	2,4%	9,2%	4,9%	2,5%	6,4%	3,9%
Gêne dans le travail	2,1%	3,0%	2,4%	0,3%	1,7%	0,8%	0,3%	0,5%	0,4%	0,2%	4,0%	1,6%	0,5%	2,3%	1,2%
Traitements ou autre soin	1,0%	6,9%	3,1%	0,6%	6,6%	2,6%	1,1%	2,0%	1,4%	1,2%	8,1%	3,7%	1,0%	5,9%	2,7%
HTA															
Existence d'un problème	4,2%	18,0%	8,9%	2,6%	18,2%	8,0%	2,7%	16,2%	7,5%	3,3%	16,9%	8,3%	3,2%	17,1%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,7%	12,1%	6,6%	1,7%	11,2%	5,0%	2,5%	11,8%	5,7%	2,6%	11,7%	5,9%	2,5%	11,5%	5,7%
Gêne dans le travail	0,5%	1,0%	0,7%	0,3%	0,0%	0,2%	0,5%	1,0%	0,7%	0,2%	1,7%	0,8%	0,4%	1,0%	0,6%
Traitements ou autre soin	2,1%	13,0%	5,8%	1,7%	14,4%	6,1%	1,4%	13,8%	5,7%	1,7%	12,4%	5,6%	1,7%	13,3%	5,8%
Digestif															
Existence d'un problème	4,2%	14,1%	7,6%	9,1%	2,2%	6,8%	8,1%	8,9%	8,4%	8,3%	10,0%	8,9%	7,9%	8,3%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,7%	14,1%	7,3%	8,8%	2,2%	6,6%	7,6%	8,4%	7,9%	7,6%	10,0%	8,5%	7,3%	8,1%	7,6%
Gêne dans le travail	0,0%	4,0%	1,4%	1,2%	0,0%	0,8%	2,0%	2,6%	2,2%	1,9%	2,1%	2,0%	1,5%	2,0%	1,6%
Traitements ou autre soin	1,1%	8,1%	3,5%	4,7%	0,6%	3,3%	4,0%	5,3%	4,4%	3,1%	5,8%	4,1%	3,4%	4,6%	3,9%
Dermatologie															
Existence d'un problème	8,7%	5,0%	7,4%	7,6%	7,7%	7,6%	9,0%	4,6%	7,5%	5,6%	6,8%	6,0%	7,5%	6,1%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	5,0%	7,1%	7,6%	6,6%	7,2%	8,5%	4,1%	7,0%	5,4%	6,8%	5,9%	7,2%	5,7%	6,7%
Gêne dans le travail	0,5%	0,0%	0,3%	0,6%	1,1%	0,8%	2,5%	0,5%	1,8%	0,9%	0,8%	0,9%	1,2%	0,7%	1,0%
Traitements ou autre soin	3,6%	2,0%	3,0%	3,2%	6,0%	4,2%	6,3%	1,5%	4,6%	4,0%	4,8%	4,3%	4,3%	3,8%	4,2%

Rapport Everest 2012-2013 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=201	≥45 ans n=103	Ensemble n=304	<45 ans n=361	≥45 ans n=184	Ensemble n=545	<45 ans n=378	≥45 ans n=204	Ensemble n=582	<45 ans n=443	≥45 ans n=254	Ensemble n=697	<45 ans n=1390	≥45 ans n=752	Global n=2142
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	1,5%	8,9%	4,1%	4,7%	9,5%	6,4%	2,5%	5,7%	3,6%	5,4%	16,5%	9,5%	3,8%	10,7%	6,3%
plaintes ou signes cliniques	1,5%	8,9%	4,1%	4,7%	9,5%	6,4%	1,9%	5,7%	3,2%	4,7%	15,4%	8,6%	3,5%	10,3%	5,9%
Gêne dans le travail	0,0%	1,0%	0,3%	1,5%	3,9%	2,3%	0,3%	2,1%	0,9%	1,7%	4,8%	2,8%	1,0%	3,3%	1,8%
Traitements ou autre soin	0,0%	2,0%	0,7%	1,2%	2,2%	1,5%	0,8%	0,5%	0,7%	1,2%	1,6%	1,3%	0,9%	1,5%	1,1%
Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	22,7%	23,8%	23,1%	24,1%	29,7%	26,0%	27,7%	28,6%	28,0%	21,5%	21,8%	21,6%	24,0%	25,8%	24,6%
plaintes ou signes cliniques	22,7%	23,8%	23,1%	23,8%	29,1%	25,7%	27,7%	27,6%	27,6%	21,4%	21,8%	21,5%	23,9%	25,4%	24,4%
Gêne dans le travail	8,3%	10,9%	9,2%	11,7%	8,3%	10,5%	11,6%	14,9%	12,7%	7,3%	8,6%	7,8%	9,7%	10,5%	10,0%
Traitements ou autre soin	2,6%	2,0%	2,4%	3,2%	3,3%	3,3%	3,9%	8,3%	5,4%	1,4%	1,2%	1,3%	2,7%	3,7%	3,1%
Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	14,9%	21,8%	17,3%	22,0%	24,9%	23,0%	22,9%	30,4%	25,5%	16,9%	16,9%	16,9%	19,6%	23,0%	20,8%
plaintes ou signes cliniques	14,9%	19,8%	16,6%	21,2%	23,3%	21,9%	22,6%	30,1%	25,2%	16,6%	16,9%	16,7%	19,3%	22,3%	20,3%
Gêne dans le travail	7,3%	7,1%	7,2%	11,7%	11,2%	11,5%	11,3%	13,0%	11,9%	4,7%	9,4%	6,4%	8,7%	10,4%	9,3%
Traitements ou autre soin	2,6%	2,0%	2,4%	3,5%	5,6%	4,2%	6,0%	10,4%	7,6%	1,9%	2,8%	2,2%	3,5%	5,4%	4,2%
Troubles du sommeil															
Existence d'un problème	12,8%	24,8%	16,9%	17,9%	25,7%	20,6%	19,9%	35,9%	25,5%	16,2%	22,2%	18,4%	17,1%	27,0%	20,6%
plaintes ou signes cliniques	12,8%	23,8%	16,6%	16,6%	25,1%	19,5%	19,4%	34,6%	24,7%	16,0%	21,9%	18,2%	16,5%	26,1%	19,9%
Gêne dans le travail	6,2%	8,0%	6,8%	7,8%	10,1%	8,6%	8,9%	10,6%	9,5%	6,1%	7,8%	6,7%	7,3%	9,1%	7,9%
Traitements ou autre soin	0,5%	5,0%	2,0%	1,8%	6,7%	3,5%	3,9%	13,7%	7,3%	1,2%	2,9%	1,8%	2,0%	7,1%	3,8%
➤ Troubles neuro-psychiques <i>(les 3 signes ci-dessus)</i>															
Existence d'un problème	5,7%	8,9%	6,8%	9,0%	14,0%	10,7%	11,0%	12,4%	11,5%	5,6%	7,2%	6,2%	7,9%	10,4%	8,8%
plaintes ou signes cliniques	5,7%	6,9%	6,1%	8,4%	13,4%	10,1%	10,5%	11,9%	11,0%	5,6%	6,9%	6,1%	7,6%	9,8%	8,4%
Gêne dans le travail	4,1%	2,0%	3,4%	4,3%	4,4%	4,4%	4,4%	4,6%	4,5%	1,6%	2,0%	1,8%	3,4%	3,3%	3,4%
Traitements ou autre soin	0,0%	1,0%	0,3%	0,3%	1,7%	0,8%	1,6%	3,7%	2,3%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	1,8%	1,1%

Rapport Everest 2012-2013 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=201	≥45 ans n=103	Ensemble n=304	<45 ans n=361	≥45 ans n=184	Ensemble n=545	<45 ans n=378	≥45 ans n=204	Ensemble n=582	<45 ans n=443	≥45 ans n=254	Ensemble n=697	<45 ans n=1390	≥45 ans n=752	Global n=2142
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule															
Existence d'un problème	5,6%	7,0%	6,1%	4,9%	6,6%	5,5%	6,8%	15,2%	9,7%	9,2%	12,9%	10,5%	6,9%	11,0%	8,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	7,0%	5,8%	4,3%	6,6%	5,1%	6,5%	14,2%	9,2%	9,2%	12,9%	10,5%	6,6%	10,8%	8,1%
Gêne dans le travail	2,6%	5,0%	3,4%	2,3%	1,7%	2,1%	4,4%	8,2%	5,7%	5,4%	7,7%	6,2%	4,0%	5,9%	4,6%
TraITEMENT ou autre soin	3,1%	1,0%	2,4%	1,5%	1,7%	1,5%	1,6%	5,6%	3,0%	2,6%	4,0%	3,1%	2,1%	3,4%	2,6%
Troubles ostéoarticulaires du coude															
Existence d'un problème	3,1%	4,0%	3,4%	2,3%	2,2%	2,3%	2,2%	4,6%	3,0%	3,7%	6,0%	4,6%	2,8%	4,5%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	4,0%	3,4%	2,3%	2,2%	2,3%	1,9%	4,1%	2,7%	3,7%	5,2%	4,3%	2,8%	4,1%	3,2%
Gêne dans le travail	2,1%	3,0%	2,4%	1,2%	1,1%	1,1%	1,4%	1,5%	1,4%	2,8%	2,8%	2,8%	1,9%	2,1%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	3,0%	2,0%	1,4%	0,6%	1,1%	0,5%	1,5%	0,9%	0,7%	1,6%	1,0%	1,0%	1,5%	1,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet															
Existence d'un problème	4,6%	3,0%	4,1%	4,1%	6,1%	4,8%	7,1%	14,1%	9,6%	8,5%	13,3%	10,2%	6,4%	10,2%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,6%	3,0%	4,1%	4,1%	6,1%	4,8%	6,6%	13,6%	9,1%	8,5%	13,3%	10,2%	6,2%	10,1%	7,6%
Gêne dans le travail	2,0%	3,0%	2,4%	2,3%	1,1%	1,9%	4,1%	8,6%	5,7%	4,5%	8,1%	5,8%	3,5%	5,8%	4,3%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	1,0%	1,4%	1,2%	0,0%	0,8%	2,5%	3,6%	2,9%	1,7%	1,6%	1,6%	1,7%	1,6%	1,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	8,2%	11,1%	9,2%	8,7%	12,3%	9,9%	11,5%	26,4%	16,7%	18,0%	24,1%	20,2%	12,4%	20,0%	15,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	11,1%	8,9%	8,1%	12,3%	9,6%	11,0%	25,4%	16,0%	18,0%	24,1%	20,2%	12,0%	19,8%	14,8%
Gêne dans le travail	3,1%	8,1%	4,8%	4,1%	4,0%	4,0%	7,4%	14,3%	9,8%	10,7%	14,2%	12,0%	7,0%	10,8%	8,3%
TraITEMENT ou autre soin	3,1%	3,0%	3,1%	2,6%	2,3%	2,5%	3,9%	8,7%	5,6%	4,8%	4,9%	4,8%	3,7%	5,0%	4,2%

Rapport Everest 2012-2013 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=201	≥45 ans n=103	Ensemble n=304	<45 ans n=361	≥45 ans n=184	Ensemble n=545	<45 ans n=378	≥45 ans n=204	Ensemble n=582	<45 ans n=443	≥45 ans n=254	Ensemble n=697	<45 ans n=1390	≥45 ans n=752	Global n=2142
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	8,2%	18,8%	11,8%	5,8%	14,9%	8,9%	8,5%	14,9%	10,7%	8,2%	20,4%	12,7%	7,7%	17,3%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	18,8%	11,8%	5,8%	14,9%	8,9%	8,3%	14,4%	10,4%	8,2%	20,0%	12,6%	7,6%	17,1%	11,0%
Gêne dans le travail	1,5%	6,9%	3,4%	2,3%	6,1%	3,6%	4,7%	8,2%	5,9%	3,5%	13,3%	7,1%	3,2%	9,2%	5,3%
Traitements ou autre soin	4,1%	3,0%	3,7%	1,7%	6,1%	3,2%	3,6%	4,6%	3,9%	1,6%	9,2%	4,4%	2,5%	6,4%	3,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	9,2%	8,9%	9,1%	7,2%	8,9%	7,8%	10,1%	19,9%	13,5%	5,7%	12,8%	8,3%	7,8%	13,2%	9,7%
Plaintes ou signes cliniques	8,7%	8,9%	8,8%	7,2%	8,9%	7,8%	10,1%	19,4%	13,3%	5,7%	12,4%	8,2%	7,7%	13,0%	9,6%
Gêne dans le travail	4,6%	5,0%	4,7%	4,7%	3,4%	4,2%	6,6%	9,2%	7,5%	2,6%	7,6%	4,5%	4,5%	6,7%	5,3%
Traitements ou autre soin	3,6%	3,0%	3,4%	3,2%	1,7%	2,7%	2,7%	5,7%	3,8%	1,7%	5,2%	3,0%	2,6%	4,3%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolumbaires															
Existence d'un problème	14,9%	15,3%	15,0%	13,3%	16,8%	14,5%	16,6%	23,5%	19,0%	18,9%	25,8%	21,4%	16,2%	21,3%	18,0%
Plaintes ou signes cliniques	14,4%	15,3%	14,7%	12,8%	16,2%	14,0%	16,3%	23,5%	18,8%	18,4%	24,8%	20,8%	15,7%	20,8%	17,5%
Gêne dans le travail	5,7%	9,2%	6,8%	6,0%	7,9%	6,6%	9,3%	11,9%	10,2%	11,1%	18,3%	13,8%	8,5%	12,6%	9,9%
Traitements ou autre soin	7,3%	4,1%	6,2%	3,3%	5,0%	3,9%	5,5%	6,7%	5,9%	4,8%	10,2%	6,8%	4,9%	7,1%	5,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis															
(l'un des 2 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	20,5%	17,3%	19,5%	16,9%	21,8%	18,6%	21,0%	36,7%	26,5%	21,1%	31,0%	24,8%	19,8%	28,3%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	20,0%	17,3%	19,1%	16,4%	21,2%	18,1%	20,8%	36,7%	26,3%	20,9%	30,1%	24,3%	19,5%	27,9%	22,4%
Gêne dans le travail	8,8%	10,2%	9,2%	8,7%	10,2%	9,2%	12,6%	18,7%	14,7%	12,6%	20,7%	15,6%	11,0%	16,1%	12,8%
Traitements ou autre soin	9,3%	5,1%	7,9%	5,1%	6,2%	5,5%	6,3%	10,9%	7,9%	5,0%	12,3%	7,7%	6,0%	9,5%	7,2%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C- Industrie manufacturière n =477	G- Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles n =336	Q- Santé humaine et action sociale n =232	Base Everest n =2142
Répartition homme/femme	80,3% / 19,7%	54,5% / 45,5%	21,1% / 78,9%	59,5% / 40,5%
≤24 ans	5,0%	11,0%	6,5%	7,9%
25-34 ans	21,6%	30,7%	28,9%	28,7%
35-44 ans	31,7%	26,5%	26,7%	28,3%
45-54 ans	27,5%	25,0%	27,6%	25,3%
55 ans et plus	14,3%	6,8%	10,3%	9,9%
Cadres	11,3%	15,8%	4,7%	14,2%
Intermédiaires	23,5%	23,2%	26,7%	25,4%
Employés	5,5%	31,8%	61,6%	27,2%
Ouvriers	58,7%	28,6%	6,5%	32,5%

Conditions de travail	C- Industrie manufacturière n =477	G- Commerce, réparation auto/moto n =336	Q- Santé humaine et action sociale n =232	Base Evrest n =2142
- Changement de travail depuis 1 an :				
Non	90,0%	87,2%	92,6%	88,6%
Oui, raison médicale	0,4%	0,6%	0,4%	0,4%
Oui, autre raison	8,5%	11,6%	5,7%	10,0%
Oui, raison non précisée	1,1%	0,6%	1,3%	1,0%
Travail à temps plein	92,5%	83,1%	68,6%	83,9%
Travail en journée normale	66,9%	84,3%	66,0%	78,0%
Coupures de plus de 2 heures	10,1%	15,0%	16,8%	13,5%
Horaires décalés	34,2%	19,5%	32,8%	25,7%
Horaires irréguliers ou alternés	35,6%	20,2%	38,0%	25,3%
Travail de nuit	29,9%	3,0%	14,7%	25,3%
Déplacements professionnels de plus de 24h	8,7%	9,3%	0,9%	7,9%
- Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	24,9%	11,5%	18,4%	18,9%
Rarement	44,6%	42,6%	45,2%	42,7%
Assez souvent	21,8%	31,4%	29,4%	27,1%
Très souvent	8,7%	14,5%	7,0%	11,4%
- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	40,3%	45,8%	36,7%	41,3%
Rarement	38,0%	36,5%	34,1%	37,5%
Assez souvent	14,8%	14,4%	18,6%	15,5%
Très souvent	7,0%	3,3%	10,6%	5,8%
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	35,1%	35,3%	29,4%	36,1%
Rarement	42,4%	42,6%	38,6%	41,2%
Assez souvent	18,2%	16,6%	24,1%	17,7%
Très souvent	4,3%	5,4%	7,9%	5,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	5,2%	4,8%	3,5%	5,4%
1	5,4%	5,4%	5,7%	5,0%
2	7,3%	10,5%	10,5%	8,4%
3	11,4%	12,6%	8,7%	13,0%
4	10,9%	9,6%	10,0%	9,5%
5	22,5%	21,9%	21,4%	22,3%
6	11,4%	12,9%	12,2%	11,1%
7	12,7%	11,7%	14,4%	13,5%
8	9,7%	7,2%	9,6%	8,5%
9	1,9%	2,4%	3,5%	2,4%
10	1,7%	0,9%	0,4%	0,9%
Difficultés liées à la pression temp. (>5/10)	37,3%	35,1%	40,2%	36,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	52,9%	57,4%	49,6%	50,4%
<i>Parmi eux :</i>				
Perturbe le travail	56,5%	48,3%	71,6%	56,6%
Aspect positif du travail	45,7%	55,6%	34,0%	45,1%

Appréciation sur le travail	C- Industrie manufacturière n =477	G- Commerce, réparation auto/moto n =336	Q- Santé humaine et action sociale n =232	Base Evrest n =2142
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	8,0%	8,6%	4,8%	6,1%
Plutôt non	12,8%	8,3%	10,9%	10,4%
Plutôt oui	45,1%	42,6%	49,1%	44,2%
Oui tout à fait	34,1%	40,5%	35,2%	39,3%
-Travail varié				
Non pas du tout	5,5%	4,5%	4,3%	4,8%
Plutôt non	12,8%	10,7%	13,9%	11,2%
Plutôt oui	43,7%	43,9%	43,0%	42,9%
Oui tout à fait	38,0%	40,9%	38,7%	41,1%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	7,8%	8,6%	7,0%	8,4%
Plutôt non	13,4%	13,4%	19,2%	15,6%
Plutôt oui	45,0%	37,5%	45,4%	41,3%
Oui tout à fait	33,8%	40,5%	28,4%	34,7%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	3,0%	2,4%	3,9%	3,3%
Plutôt non	10,6%	10,8%	12,6%	11,5%
Plutôt oui	59,6%	54,4%	53,9%	54,6%
Oui tout à fait	26,8%	32,4%	29,6%	30,6%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	1,7%	1,5%	0,9%	1,5%
Plutôt non	9,7%	8,9%	17,7%	11,0%
Plutôt oui	61,9%	58,1%	58,4%	59,0%
Oui tout à fait	26,7%	31,5%	23,0%	28,6%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	7,2%	6,0%	2,6%	5,5%
Plutôt non	18,7%	12,5%	19,9%	16,1%
Plutôt oui	51,5%	54,8%	55,4%	53,7%
Oui tout à fait	22,6%	26,8%	22,1%	24,7%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	25,4%	32,0%	38,1%	29,7%
Plutôt non	50,4%	43,1%	38,9%	47,2%
Plutôt oui	20,7%	22,8%	19,0%	19,8%
Oui tout à fait	3,4%	2,2%	4,0%	3,3%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	49,7%	52,5%	63,1%	56,0%
Plutôt non	34,3%	34,2%	23,6%	30,2%
Plutôt oui	11,1%	10,9%	11,6%	10,4%
Oui tout à fait	5,0%	2,5%	1,8%	3,4%

Charge physique du poste de travail	C- Industrie manufacturière n =477	G- Commerce, réparation auto/moto n =336	Q- Santé humaine et action sociale n =232	Base Evrest n =2142
Postures contraignantes :				
Non jamais	39,3%	44,6%	41,5%	48,9%
Oui parfois	44,5%	35,3%	39,3%	34,6%
Oui souvent	16,2%	20,1%	19,2%	16,5%
Difficultés				
Pas de postures contraignantes	39,3%	44,6%	41,5%	48,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	29,6%	27,2%	29,7%	24,9%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	26,9%	24,6%	24,9%	22,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	4,2%	3,6%	3,9%	3,5%
Effort, port de charges lourdes :				
Non jamais	45,6%	42,8%	40,2%	53,6%
Oui parfois	41,8%	40,1%	37,6%	32,9%
Oui souvent	12,6%	17,1%	22,3%	13,5%
Difficultés				
Pas d'effort, port de charges lourdes	45,6%	42,8%	40,2%	53,6%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	22,9%	24,9%	31,4%	21,3%
Effort, port de charges lourdes, pas diff/pénible	27,7%	29,0%	25,3%	22,2%
Effort, port de charges lourdes, diff/pénible n.p.	3,8%	3,3%	3,1%	2,9%
Gestes répétitifs :				
Non jamais	39,6%	41,1%	40,4%	43,7%
Oui parfois	28,0%	24,3%	24,6%	25,9%
Oui souvent	32,4%	34,5%	35,1%	30,5%
Difficultés				
Pas de gestes répétitifs	39,6%	41,1%	40,4%	43,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	21,7%	16,8%	15,8%	15,9%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	35,4%	36,0%	38,6%	35,5%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	3,4%	6,0%	5,3%	4,8%
Importants déplacements à pieds :				
Non jamais	45,3%	60,5%	58,3%	60,0%
Oui parfois	23,8%	17,7%	17,8%	18,2%
Oui souvent	30,9%	21,9%	23,9%	21,8%
Difficultés				
Pas d'importants déplacements à pieds	45,3%	60,5%	58,3%	60,0%
Importants déplacements à pieds, diff/pénible	15,6%	9,3%	10,4%	9,9%
Importants déplacements à pieds, pas diff/pénible	34,5%	25,7%	27,4%	26,3%
Importants déplacements à pieds, diff/pénible n.p.	4,6%	4,5%	3,9%	3,8%
Station debout prolongée :				
Non jamais	34,5%	44,2%	40,9%	48,2%
Oui parfois	27,4%	14,9%	20,4%	20,5%
Oui souvent	38,1%	40,9%	38,7%	31,3%
Difficultés				
Pas de station debout prolongée	34,5%	44,2%	40,9%	48,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	20,6%	18,8%	18,3%	15,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	37,5%	30,4%	32,2%	30,5%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	7,4%	6,6%	8,7%	5,9%

Expositions	C- Industrie manufacturière n =477	G- Commerce, réparation auto/moto n =336	Q- Santé humaine et action sociale n =232	Base Evrest n =2142
Produits chimiques	41,7%	18,2%	25,8%	25,3%
Poussières, fumées	55,8%	31,4%	20,4%	36,3%
Rx ionisants	4,5%	2,1%	3,1%	4,3%
Vibrations	28,8%	15,1%	4,8%	20,6%
Gêne sonore	58,8%	35,6%	26,3%	41,5%
Bruit > 80db	50,9%	15,7%	8,0%	26,3%
Contrainte visuelle	33,4%	27,0%	23,2%	33,4%
Conduite routière prolongée	11,3%	14,0%	9,6%	13,6%
Chaleur intense	21,4%	8,5%	7,8%	14,4%
Froid intense	12,2%	14,8%	3,9%	12,4%
Intempéries	15,8%	7,6%	8,7%	16,4%
Pression psychologique	23,8%	21,1%	36,8%	23,7%
Agent biologique	7,6%	2,4%	37,6%	9,3%
Contact avec le public	33,6%	62,0%	90,8%	58,6%

Formation	C- Industrie manufacturière n =477	G- Commerce, réparation auto/moto n =336	Q- Santé humaine et action sociale n =232	Base Evrest n =2142
A bénéficié d'une formation depuis un an :	49,2%	49,7%	52,2%	49,6%
Parmi eux :				
En rapport avec le travail actuel	86,7%	91,4%	94,1%	92,1%
En rapport avec le travail futur	13,5%	16,9%	14,4%	15,3%
Formation d'intérêt général	50,7%	46,2%	33,7%	40,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	26,8%	26,7%	31,7%	26,4%

Mode de vie	C- Industrie manufacturière n =477	G- Commerce, réparation auto/moto n =336	Q- Santé humaine et action sociale n =232	Base Evrest n =2142
Activité sportive régulière	50,1%	48,1%	43,8%	49,0%
Consommation de tabac	34,7%	35,8%	36,1%	34,7%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	8,9%	7,5%	4,8%	8,4%
Consommation de café	85,9%	78,2%	78,7%	80,4%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	20,3%	19,4%	16,0%	19,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	12,4%	16,4%	13,0%	15,7%

Rapport Everest 2012-2013 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n = 278	≥ 45 ans n = 199	Ensemble n = 477	<45 ans n = 229	≥ 45 ans n = 107	Ensemble n = 336	<45 ans n = 144	≥ 45 ans n = 88*	Ensemble n = 232	<45 ans n = 1390	≥ 45 ans n = 752	Ensemble n = 2142
Indice de masse corporelle												
- Normaux ou maigres	56,9%	39,7%	49,7%	62,6%	30,7%	52,4%	70,3%	44,2%	60,3%	59,5%	38,5%	52,1%
- Surpoids	29,4%	36,0%	32,2%	23,4%	40,6%	28,9%	18,8%	32,6%	24,1%	27,5%	38,1%	31,2%
- Obèses	13,7%	24,3%	18,2%	14,0%	28,7%	18,7%	10,9%	23,3%	15,6%	13,0%	23,4%	16,7%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	4,9%	2,6%	3,9%	4,6%	7,8%	5,6%	9,4%	6,8%	8,4%	6,0%	5,2%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,1%	2,6%	3,5%	4,6%	7,8%	5,6%	9,4%	6,8%	8,4%	5,6%	4,8%	5,3%
Gêne dans le travail	1,1%	0,5%	0,9%	1,8%	1,9%	1,9%	2,9%	4,5%	3,5%	1,1%	1,4%	1,2%
Traitement ou autre soin	1,9%	1,5%	1,7%	1,8%	5,8%	3,1%	5,8%	3,5%	4,9%	2,8%	3,4%	3,0%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	2,3%	6,6%	4,1%	1,8%	8,7%	4,1%	3,6%	10,2%	6,2%	2,7%	8,0%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	5,1%	3,5%	1,8%	6,8%	3,4%	3,6%	9,1%	5,7%	2,5%	6,4%	3,9%
Gêne dans le travail	0,4%	1,5%	0,9%	0,9%	2,0%	1,3%	0,0%	2,3%	0,9%	0,5%	2,3%	1,2%
Traitement ou autre soin	0,4%	4,6%	2,2%	1,4%	7,8%	3,4%	2,2%	4,6%	3,1%	1,0%	5,9%	2,7%
HTA												
Existence d'un problème	4,9%	20,2%	11,4%	1,9%	18,6%	7,0%	3,6%	10,2%	6,2%	3,2%	17,1%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	12,0%	7,0%	1,9%	13,5%	5,4%	3,6%	5,8%	4,5%	2,5%	11,5%	5,7%
Gêne dans le travail	0,4%	1,1%	0,7%	0,0%	1,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,0%	0,6%
Traitement ou autre soin	2,7%	15,6%	8,1%	0,9%	14,6%	5,1%	2,2%	5,7%	3,6%	1,7%	13,3%	5,8%
Digestif												
Existence d'un problème	10,6%	11,5%	11,0%	5,2%	7,1%	5,8%	11,2%	8,1%	10,0%	7,9%	8,3%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	9,5%	11,5%	10,3%	5,2%	6,1%	5,5%	9,8%	8,1%	9,1%	7,3%	8,1%	7,6%
Gêne dans le travail	2,7%	1,6%	2,2%	0,5%	3,0%	1,3%	3,8%	2,3%	3,2%	1,5%	2,0%	1,6%
Traitement ou autre soin	5,3%	5,3%	5,3%	2,4%	4,0%	2,9%	6,0%	5,9%	6,0%	3,4%	4,6%	3,9%
Dermatologie												
Existence d'un problème	4,9%	5,6%	5,2%	9,7%	4,9%	8,1%	9,5%	12,5%	10,7%	7,5%	6,1%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	4,6%	4,6%	9,2%	4,9%	7,8%	8,8%	11,4%	9,8%	7,2%	5,7%	6,7%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%	1,0%	2,2%	2,2%	3,4%	2,7%	1,2%	0,7%	1,0%
Traitement ou autre soin	3,0%	3,6%	3,3%	6,9%	2,0%	5,3%	5,8%	6,8%	6,2%	4,3%	3,8%	4,2%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Everest 2012-2013 – Région Nord – Pas de Calais

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n = 278	≥ 45 ans n = 199	Ensemble n = 477	<45 ans n = 229	≥ 45 ans n = 107	Ensemble n = 336	<45 ans n = 144	≥ 45 ans n = 88*	Ensemble n = 232	<45 ans n = 1390	≥ 45 ans n = 752	Ensemble n = 2142
Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	24,8%	27,2%	25,8%	19,8%	18,8%	19,5%	29,7%	27,3%	28,8%	24,0%	25,8%	24,6%
Plaintes ou signes cliniques	24,8%	27,2%	25,8%	19,8%	18,8%	19,5%	29,7%	27,3%	28,8%	23,9%	25,4%	24,4%
Gêne dans le travail	11,4%	8,9%	10,3%	7,0%	9,0%	7,6%	13,8%	12,5%	13,3%	9,7%	10,5%	10,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	1,6%	1,5%	1,9%	2,0%	1,9%	3,6%	4,6%	4,0%	2,7%	3,7%	3,1%
Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	19,1%	20,2%	19,6%	16,0%	20,4%	17,4%	22,5%	25,6%	23,7%	19,6%	23,0%	20,8%
Plaintes ou signes cliniques	19,1%	19,2%	19,1%	15,5%	19,6%	16,8%	22,5%	24,7%	23,3%	19,3%	22,3%	20,3%
Gêne dans le travail	9,1%	9,5%	9,3%	8,8%	5,9%	7,9%	10,2%	11,8%	10,8%	8,7%	10,4%	9,3%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	3,2%	2,0%	3,7%	5,9%	4,4%	2,9%	5,9%	4,1%	3,5%	5,4%	4,2%
Troubles du sommeil												
Existence d'un problème	18,4%	26,0%	21,6%	12,6%	24,2%	16,2%	20,9%	25,3%	22,6%	17,1%	27,0%	20,6%
Plaintes ou signes cliniques	18,4%	25,5%	21,4%	12,6%	22,7%	15,7%	20,3%	24,1%	21,8%	16,5%	26,1%	19,9%
Gêne dans le travail	8,7%	7,4%	8,2%	4,2%	4,2%	4,2%	6,5%	9,2%	7,6%	7,3%	9,1%	7,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	4,8%	2,7%	1,4%	7,1%	3,2%	5,0%	9,3%	6,7%	2,0%	7,1%	3,8%
➤ Troubles neuro psychiques												
(les 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	8,2%	8,3%	8,3%	3,7%	7,9%	5,0%	10,1%	11,6%	10,7%	7,9%	10,4%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	7,3%	7,8%	3,7%	7,9%	5,0%	9,5%	11,6%	10,3%	7,6%	9,8%	8,4%
Gêne dans le travail	3,7%	3,1%	3,5%	1,4%	1,9%	1,6%	4,3%	3,4%	4,0%	3,4%	3,3%	3,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,4%	1,0%	0,7%	0,9%	1,0%	0,9%	0,7%	2,3%	1,3%	0,7%	1,8%	1,1%
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	3,4%	16,4%	8,9%	2,8%	6,7%	4,1%	4,4%	4,7%	4,5%	3,8%	10,7%	6,3%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	15,5%	8,5%	1,9%	6,7%	3,5%	3,7%	4,7%	4,1%	3,5%	10,3%	5,9%
Gêne dans le travail	0,8%	3,1%	1,7%	0,9%	4,8%	2,2%	2,2%	1,2%	1,8%	1,0%	3,3%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,4%	2,1%	1,1%	1,4%	1,9%	1,6%	2,9%	0,0%	1,8%	0,9%	1,5%	1,1%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n = 278	≥ 45 ans n = 199	Ensemble n = 477	<45 ans n = 229	≥ 45 ans n = 107	Ensemble n = 336	<45 ans n = 144	≥ 45 ans n = 88*	Ensemble n = 232	<45 ans n = 1390	≥ 45 ans n = 752	Ensemble n = 2142
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Existence d'un problème	9,4%	11,3%	10,2%	5,5%	11,5%	7,5%	7,2%	9,1%	8,0%	6,9%	11,0%	8,4%
Plaintes ou signes cliniques	9,4%	11,3%	10,2%	5,1%	11,5%	7,2%	7,2%	9,1%	8,0%	6,6%	10,8%	8,1%
Gêne dans le travail	5,6%	5,7%	5,7%	3,7%	4,8%	4,1%	4,3%	5,7%	4,9%	4,0%	5,9%	4,6%
TraITEMENT ou autre soin	3,0%	4,1%	3,5%	0,5%	2,9%	1,3%	3,6%	2,3%	3,1%	2,1%	3,4%	2,6%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Existence d'un problème	3,4%	5,1%	4,1%	3,2%	5,9%	4,1%	2,2%	5,7%	3,5%	2,8%	4,5%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	4,6%	3,9%	3,2%	5,9%	4,1%	2,2%	5,7%	3,5%	2,8%	4,1%	3,2%
Gêne dans le travail	2,2%	3,1%	2,6%	1,4%	2,0%	1,6%	2,2%	3,4%	2,7%	1,9%	2,1%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	2,6%	1,7%	0,9%	1,0%	0,9%	2,2%	2,3%	2,2%	1,0%	1,5%	1,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Existence d'un problème	6,4%	11,9%	8,7%	6,0%	9,6%	7,2%	8,8%	14,8%	11,1%	6,4%	10,2%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	11,3%	8,5%	6,0%	9,6%	7,2%	8,1%	14,8%	10,7%	6,2%	10,1%	7,6%
Gêne dans le travail	3,8%	9,9%	6,4%	2,3%	4,8%	3,1%	4,4%	9,2%	6,2%	3,5%	5,8%	4,3%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	3,1%	2,0%	1,4%	1,0%	1,2%	4,4%	2,3%	3,6%	1,7%	1,6%	1,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	15,2%	20,7%	17,5%	10,1%	20,2%	13,4%	12,4%	22,7%	16,4%	12,4%	20,0%	15,1%
Plaintes ou signes cliniques	15,2%	20,7%	17,5%	9,7%	20,2%	13,1%	11,8%	22,7%	16,1%	12,0%	19,8%	14,8%
Gêne dans le travail	8,8%	13,6%	10,8%	6,5%	9,7%	7,5%	6,6%	13,6%	9,3%	7,0%	10,8%	8,3%
TraITEMENT ou autre soin	4,2%	6,3%	5,1%	2,8%	2,9%	2,8%	6,6%	5,7%	6,2%	3,7%	5,0%	4,2%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n = 278	≥ 45 ans n = 199	Ensemble n = 477	<45 ans n = 229	≥ 45 ans n = 107	Ensemble n = 336	<45 ans n = 144	≥ 45 ans n = 88*	Ensemble n = 232	<45 ans n = 1390	≥ 45 ans n = 752	Ensemble n = 2142
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	6,4%	19,5%	12,0%	6,5%	14,6%	9,1%	5,1%	12,5%	8,0%	7,7%	17,3%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	18,5%	11,5%	6,5%	14,6%	9,1%	5,1%	12,5%	8,0%	7,6%	17,1%	11,0%
Gêne dans le travail	2,6%	13,9%	7,4%	3,7%	7,8%	5,0%	4,4%	6,8%	5,3%	3,2%	9,2%	5,3%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	9,4%	5,5%	2,3%	2,9%	2,5%	2,9%	5,7%	4,0%	2,5%	6,4%	3,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	5,7%	10,3%	7,6%	7,9%	11,8%	9,1%	11,6%	14,8%	12,8%	7,8%	13,2%	9,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	9,7%	7,4%	7,4%	11,8%	8,8%	11,6%	14,8%	12,8%	7,7%	13,0%	9,6%
Gêne dans le travail	3,4%	6,2%	4,6%	4,2%	7,8%	5,4%	7,2%	10,2%	8,4%	4,5%	6,7%	5,3%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	4,7%	2,6%	2,3%	4,0%	2,9%	5,1%	4,5%	4,9%	2,6%	4,3%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolumbaires												
Existence d'un problème	12,6%	20,6%	16,0%	15,7%	15,0%	15,5%	16,7%	26,4%	20,4%	16,2%	21,3%	18,0%
Plaintes ou signes cliniques	12,2%	19,3%	15,2%	14,8%	15,0%	14,9%	16,7%	26,4%	20,4%	15,7%	20,8%	17,5%
Gêne dans le travail	6,9%	12,6%	9,3%	10,2%	8,0%	9,5%	10,1%	14,0%	11,6%	8,5%	12,6%	9,9%
TraITEMENT ou autre soin	4,2%	8,4%	6,0%	5,1%	3,0%	4,4%	8,0%	8,0%	8,0%	4,9%	7,1%	5,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis												
(l'un des 2 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	15,8%	25,8%	20,0%	19,0%	21,0%	19,6%	21,7%	32,2%	25,8%	19,8%	28,3%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	15,4%	24,5%	19,2%	18,5%	21,0%	19,3%	21,7%	32,2%	25,8%	19,5%	27,9%	22,4%
Gêne dans le travail	8,9%	15,7%	11,8%	12,6%	13,1%	12,7%	14,5%	18,6%	16,1%	11,0%	16,1%	12,8%
TraITEMENT ou autre soin	4,7%	10,5%	7,2%	6,1%	6,2%	6,1%	10,9%	10,3%	10,7%	6,0%	9,5%	7,2%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Financé en région par :



Partenariats régionaux :

