



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2011-2012

Région « Antilles – Guyane »

Juillet 2013

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2011-2012 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Antilles - Guyane

L'exploitation des données de la région des Antilles a porté sur **481 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2011 (n=295) et 2012 (n=186), puis saisies dans la base de données Everest.

Cet échantillon de salariés est assez proche de celui issus des DADS de l'INSEE (2010) en termes de sexe et d'âge (avec toutefois une sous-représentation des salariés de 55 ans et plus) ; il existe une sur-représentation des ouvriers (au détriment des employés), une sur-représentation de l'industrie et du commerce (au détriment des services).

Ce nombre de fiches 2011-2012 reste « faible » et doit inciter à une grande prudence quant à l'interprétation des résultats donnés dans ce rapport.

Le nombre de fiches 2011-2012 de la région permet cette année de fournir des résultats descriptifs uniquement par sexe.

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional des Antilles 2011-2012 aux données Insee (DADS 2010)

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon des Antilles 2011-2012 (n=481)	Données INSEE 2010 (DADS)
	%	%
Sexe		
Hommes	53,0	52,7
Femmes	47,0	47,3
Age		
≤ 24 ans	11,2	9,1
25-34 ans	19,8	21,1
35-44 ans	32,6	27,4
45- 54 ans	28,1	27,7
55 ans et plus	8,3	14,8
Catégorie socioprofessionnelle		
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,0	0,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures	7,7	10,7
Professions intermédiaires	24,5	21,9
Employés	34,3	45,7
Ouvriers	33,5	21,2
Secteur d'activité		
Agriculture	4,6	0,1
Industrie	18,1	7,7
Construction	4,0	5,9
Commerce	16,8	12,9
Services	56,5	73,4

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional des Antilles 2011-2012 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0	0,0
Cadres et professions intellectuelles supérieures	37	7,7
Professions intermédiaires	118	24,5
Employés	165	34,3
Ouvriers	161	33,5
Total général	481	100,0

Tableau 3: Descriptif de l'échantillon régional des Antilles 2011-2012 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	22	4,6
A. Agriculture, sylviculture et pêche	22	4,6
INDUSTRIE	87	18,1
B. Industries extractives	2	0,4
C. Industrie manufacturière	42	8,7
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	32	6,7
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	11	2,3
CONSTRUCTION	19	4,0
F. Construction	19	4,0
COMMERCE	81	16,8
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	81	16,8
SERVICES	272	56,5
H. Transports et entreposage	21	4,4
I. Hébergement et restauration	28	5,8
J. Information et communication	6	1,2
K. Activités financières et d'assurance	22	4,6
L. Activités immobilières	8	1,7
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	18	3,7
N. Activités de services administratifs et de soutien	49	10,2
O. Administration publique	8	1,7
P. Enseignement	4	0,8
Q. Santé humaine et action sociale	72	15,0
R. Arts, spectacles et activités récréatives	2	0,4
S. Autres activités de services	33	6,9
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	1	0,2
Total général	481	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=255	Femmes n=226	Ensemble n=481
≤24ans	12,5%	9,7%	11,2%
25-34ans	18,0%	21,7%	19,8%
35-44ans	32,9%	32,3%	32,6%
45-54ans	28,2%	27,9%	28,1%
55 ans et plus	8,2%	8,4%	8,3%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	7,8%	7,5%	7,7%
Professions intermédiaires	20,4%	29,2%	24,5%
Employés	16,1%	54,9%	34,3%
Ouvriers	55,7%	8,4%	33,5%
C. Industrie manufacturière	11,0%	6,2%	8,7%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	10,6%	2,2%	6,7%
F. Construction	6,3%	1,3%	4,0%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	14,5%	19,5%	16,8%
H. Transports et entreposage	6,3%	2,2%	4,4%
I. Hébergement et restauration	3,5%	8,4%	5,8%
J. Information et communication	1,2%	1,3%	1,2%
K. Activités financières et d'assurance	3,1%	6,2%	4,6%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	3,1%	4,4%	3,7%
N. Activités de services administratifs et de soutien	13,7%	6,2%	10,2%
O. Administration publique	0,8%	2,7%	1,7%
Q. Santé humaine et action sociale	8,2%	22,6%	15,0%
S. Autres activités de services	7,1%	6,6%	6,9%

Conditions de travail	Hommes n=255	Femmes n=226	Ensemble n=481
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	85,4%	86,7%	86,0%
Oui, raison médicale	1,6%	0,9%	1,3%
Oui, autre raison	12,6%	12,4%	12,5%
Oui, raison non précisée	0,4%	0,0%	0,2%
Travail à temps plein	84,1%	79,1%	81,8%
Travail en journée normale	85,3%	86,4%	85,8%
Coupures de plus de 2 heures	11,1%	11,6%	11,3%
Horaires décalés	29,8%	17,9%	24,2%
Horaires irréguliers ou alternés	25,0%	23,2%	24,2%
Travail de nuit	14,6%	4,1%	9,7%
Déplacements professionnels de plus de 24h	5,6%	1,8%	3,8%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	17,6%	14,3%	16,1%
Rarement	47,2%	51,1%	49,0%
Assez souvent	22,0%	24,2%	23,0%
Très souvent	13,2%	10,3%	11,8%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	27,7%	33,3%	30,4%
Rarement	35,7%	34,2%	35,0%
Assez souvent	24,5%	19,6%	22,2%
Très souvent	12,0%	12,9%	12,4%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	34,9%	38,4%	36,6%
Rarement	45,0%	42,0%	43,6%
Assez souvent	17,3%	14,7%	16,1%
Très souvent	2,8%	4,9%	3,8%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	11,0%	7,2%	9,2%
1	3,1%	6,7%	4,8%
2	7,1%	4,9%	6,1%
3	12,2%	9,4%	10,9%
4	7,5%	11,7%	9,4%
5	20,5%	22,4%	21,4%
6	12,2%	12,6%	12,4%
7	13,0%	9,9%	11,5%
8	8,3%	9,4%	8,8%
9	3,1%	1,8%	2,5%
10	2,0%	4,0%	2,9%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	38,6%	37,7%	38,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	47,0%	52,0%	49,4%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	59,0%	60,5%	59,7%
- Aspect positif du travail	41,0%	37,5%	39,3%

Appréciations sur le travail	Hommes n=255	Femmes n=226	Ensemble n=481
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	6,7%	5,8%	6,2%
Plutôt non	7,5%	10,2%	8,7%
Plutôt oui	36,5%	40,7%	38,5%
Oui tout à fait	49,4%	43,4%	46,6%
-Travail varié			
Non pas du tout	6,3%	7,5%	6,9%
Plutôt non	12,5%	12,8%	12,7%
Plutôt oui	46,7%	41,2%	44,1%
Oui tout à fait	34,5%	38,5%	36,4%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	15,7%	11,2%	13,6%
Plutôt non	18,8%	14,7%	16,9%
Plutôt oui	36,1%	39,7%	37,8%
Oui tout à fait	29,4%	34,4%	31,7%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,9%	7,1%	5,4%
Plutôt non	17,7%	13,4%	15,7%
Plutôt oui	48,8%	49,1%	49,0%
Oui tout à fait	29,5%	30,4%	29,9%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,2%	4,1%	2,5%
Plutôt non	13,0%	12,2%	12,6%
Plutôt oui	46,5%	53,2%	49,6%
Oui tout à fait	39,4%	30,6%	35,3%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	5,2%	9,5%	7,2%
Plutôt non	14,7%	10,4%	12,7%
Plutôt oui	48,8%	53,8%	51,2%
Oui tout à fait	31,3%	26,2%	29,0%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	35,6%	43,5%	39,3%
Plutôt non	41,1%	37,2%	39,3%
Plutôt oui	19,4%	13,9%	16,8%
Oui tout à fait	4,0%	5,4%	4,6%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	64,4%	59,2%	62,0%
Plutôt non	19,4%	22,9%	21,0%
Plutôt oui	11,9%	11,2%	11,6%
Oui tout à fait	4,3%	6,7%	5,5%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=255	Femmes n=226	Ensemble n=481
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	37,4%	52,9%	44,7%
Oui parfois	42,5%	28,4%	35,9%
Oui souvent	20,1%	18,7%	19,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	37,4%	52,9%	44,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	35,4%	25,8%	30,9%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	26,4%	21,3%	24,0%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	0,8%	0,0%	0,4%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	46,8%	58,7%	52,4%
Oui parfois	36,9%	27,6%	32,5%
Oui souvent	16,3%	13,8%	15,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	46,8%	58,7%	52,4%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	30,6%	24,4%	27,7%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	22,6%	16,4%	19,7%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	0,0%	0,4%	0,2%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	33,6%	34,8%	34,2%
Oui parfois	28,9%	27,7%	28,3%
Oui souvent	37,5%	37,5%	37,5%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	33,6%	34,8%	34,2%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	28,9%	22,8%	26,0%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	37,2%	41,5%	39,2%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	0,4%	0,9%	0,6%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	56,1%	68,6%	62,0%
Oui parfois	27,8%	15,0%	21,8%
Oui souvent	16,1%	16,4%	16,2%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	56,1%	68,6%	62,0%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	14,9%	11,1%	13,1%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	29,0%	19,5%	24,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	0,0%	0,9%	0,4%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	42,0%	49,3%	45,4%
Oui parfois	26,7%	15,6%	21,5%
Oui souvent	31,4%	35,1%	33,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	42,0%	49,3%	45,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	22,0%	23,1%	22,5%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	34,9%	24,4%	30,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	1,2%	3,1%	2,1%

Expositions	Hommes n=255	Femmes n=226	Ensemble n=481
Produits chimiques	26,7%	15,9%	21,6%
Poussières, fumées	52,4%	28,0%	40,9%
Rx ionisants	2,4%	1,8%	2,1%
Vibrations	33,5%	3,1%	19,2%
Gêne sonore	42,5%	24,3%	34,0%
Bruit > 80db	38,6%	6,2%	23,4%
Contrainte visuelle	30,0%	28,4%	29,3%
Conduite routière prolongée	20,1%	6,7%	13,8%
Chaleur intense	45,1%	16,4%	31,6%
Froid intense	3,9%	7,1%	5,4%
Intempéries	26,7%	6,2%	17,1%
Pression psychologique	26,0%	32,3%	28,9%
Agent biologique	11,8%	11,2%	11,5%
Contact avec le public	60,2%	79,1%	69,1%

Formation	Hommes n=255	Femmes n=226	Ensemble n=481
A bénéficié d'une formation depuis un an	47,5%	48,0%	47,7%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	86,0%	86,8%	86,3%
- En rapport avec le travail futur	24,1%	14,6%	19,6%
- Formation d'intérêt général	38,3%	36,5%	37,4%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	25,8%	24,8%	25,3%

Mode de vie	Hommes n=255	Femmes n=226	Ensemble n=481
Activité sportive régulière	57,0%	46,6%	52,1%
Consommation de tabac	21,7%	11,6%	16,9%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	2,8%	1,8%	2,3%
Consommation de café	42,1%	45,7%	43,8%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	1,6%	0,4%	1,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	21,8%	28,4%	24,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=481
	Hommes n=162	Femmes n=144	Ensemble n=306	Hommes n=93*	Femmes n=82*	Ensemble n=175	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	54,2%	51,9%	53,1%	45,5%	44,4%	45,0%	50,1%
- Surpoids	31,0%	30,4%	30,7%	42,0%	30,9%	36,7%	32,9%
- Obèses	14,8%	17,8%	16,2%	12,5%	24,7%	18,3%	17,0%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	3,7%	2,1%	3,0%	3,3%	6,1%	4,6%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	2,1%	2,6%	3,3%	6,1%	4,6%	3,4%
Gêne dans le travail	0,6%	0,0%	0,3%	1,1%	2,4%	1,7%	0,8%
Traitements ou autre soin	1,9%	1,4%	1,7%	3,3%	4,9%	4,0%	2,5%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	5,0%	2,8%	4,0%	6,5%	4,9%	5,7%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	2,8%	4,0%	6,5%	4,9%	5,7%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	0,7%	0,3%	0,0%	1,2%	0,6%	0,4%
Traitements ou autre soin	0,0%	1,4%	0,7%	0,0%	3,7%	1,7%	1,1%
HTA							
Existence d'un problème	6,3%	2,8%	4,7%	16,3%	18,5%	17,3%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	2,8%	4,3%	13,0%	17,3%	15,0%	8,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Traitements ou autre soin	2,5%	2,1%	2,3%	10,9%	13,6%	12,1%	5,9%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	13,7%	21,8%	17,5%	16,5%	19,5%	17,9%	17,6%
Plaintes ou signes cliniques	13,7%	20,7%	16,9%	16,5%	19,5%	17,9%	17,3%
Gêne dans le travail	6,8%	10,6%	8,6%	4,4%	11,0%	7,5%	8,2%
Traitements ou autre soin	1,3%	4,2%	2,7%	1,1%	7,3%	4,1%	3,2%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	6,2%	14,8%	10,2%	8,8%	13,4%	11,0%	10,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	14,2%	9,9%	8,8%	13,4%	11,0%	10,3%
Gêne dans le travail	3,1%	4,9%	4,0%	3,3%	4,9%	4,0%	4,0%
Traitements ou autre soin	0,6%	4,9%	2,6%	1,1%	6,1%	3,5%	2,9%
Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	7,0%	15,6%	11,1%	12,4%	11,0%	11,7%	11,3%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	15,0%	10,4%	12,4%	11,0%	11,7%	10,9%
Gêne dans le travail	3,2%	7,8%	5,4%	4,5%	4,9%	4,7%	5,1%
Traitements ou autre soin	1,9%	2,9%	2,4%	2,3%	4,9%	3,5%	2,8%
➤ Troubles neuro psychiques							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	1,9%	7,7%	4,6%	1,1%	4,9%	2,9%	4,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	6,4%	4,0%	1,1%	4,9%	2,9%	3,6%
Gêne dans le travail	1,2%	2,8%	2,0%	0,0%	2,4%	1,2%	1,7%
Traitements ou autre soin	0,0%	1,4%	0,7%	0,0%	2,4%	1,2%	0,8%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=481
	Hommes n=162	Femmes n=144	Ensemble n=306	Hommes n=93*	Femmes n=82*	Ensemble n=175	
Digestif							
Existence d'un problème	6,3%	9,9%	8,0%	5,6%	7,4%	6,4%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,3%	9,9%	8,0%	5,6%	7,4%	6,4%	7,4%
Gêne dans le travail	0,6%	1,4%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
Traitements ou autre soin	1,9%	4,3%	3,0%	0,0%	3,7%	1,8%	2,6%
Dermatologie							
Existence d'un problème	6,2%	4,9%	5,6%	5,6%	8,6%	7,0%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	4,9%	5,3%	4,5%	8,6%	6,5%	5,7%
Gêne dans le travail	1,9%	0,7%	1,3%	2,2%	1,2%	1,8%	1,5%
Traitements ou autre soin	3,1%	4,9%	4,0%	2,2%	6,2%	4,1%	4,0%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	1,3%	0,7%	1,0%	4,4%	1,2%	2,9%	1,7%
Plaintes ou signes cliniques	1,3%	0,7%	1,0%	4,4%	1,2%	2,9%	1,7%
Gêne dans le travail	0,6%	0,0%	0,3%	1,1%	0,0%	0,6%	0,4%
Traitements ou autre soin	0,6%	0,0%	0,3%	1,1%	0,0%	0,6%	0,4%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	5,0%	5,6%	5,3%	5,4%	11,0%	8,0%	6,3%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	5,0%	5,0%	5,4%	11,0%	8,0%	6,1%
Gêne dans le travail	3,1%	3,5%	3,3%	3,3%	7,3%	5,2%	4,0%
Traitements ou autre soin	2,5%	2,8%	2,7%	5,4%	3,7%	4,6%	3,4%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	1,2%	0,7%	1,0%	2,2%	2,4%	2,3%	1,5%
Plaintes ou signes cliniques	1,2%	0,7%	1,0%	2,2%	2,4%	2,3%	1,5%
Gêne dans le travail	1,2%	0,7%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%
Traitements ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	1,2%	1,1%	0,4%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	3,8%	5,0%	4,3%	7,6%	2,4%	5,2%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	5,0%	4,3%	7,6%	2,4%	5,2%	4,6%
Gêne dans le travail	3,1%	2,1%	2,7%	4,3%	2,4%	3,4%	2,9%
Traitements ou autre soin	1,3%	2,1%	1,7%	4,3%	1,2%	2,9%	2,1%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	10,1%	10,6%	10,3%	13,0%	12,2%	12,6%	11,2%
Plaintes ou signes cliniques	10,1%	9,9%	10,0%	13,0%	12,2%	12,6%	11,0%
Gêne dans le travail	7,6%	5,7%	6,7%	8,7%	9,8%	9,2%	7,6%
Traitements ou autre soin	3,8%	5,0%	4,3%	8,7%	4,9%	6,9%	5,3%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=481
	Hommes n=162	Femmes n=144	Ensemble n=306	Hommes n=93*	Femmes n=82*	Ensemble n=175	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	10,6%	9,2%	9,9%	9,8%	11,0%	10,3%	10,1%
Plaintes ou signes cliniques	10,6%	9,2%	9,9%	9,8%	11,0%	10,3%	10,1%
Gêne dans le travail	5,6%	5,0%	5,3%	4,3%	6,1%	5,2%	5,3%
TraITEMENT ou autre soin	3,7%	1,4%	2,6%	2,2%	8,5%	5,2%	3,6%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	1,9%	6,4%	4,0%	12,0%	8,5%	10,3%	6,3%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	6,4%	4,0%	11,0%	8,5%	9,8%	6,1%
Gêne dans le travail	1,9%	1,4%	1,7%	6,6%	3,7%	5,2%	3,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	6,4%	4,0%	12,0%	8,5%	10,3%	6,3%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	14,3%	15,6%	14,9%	20,9%	14,6%	17,9%	16,0%
Plaintes ou signes cliniques	14,3%	15,6%	14,9%	20,9%	14,6%	17,9%	16,0%
Gêne dans le travail	8,8%	9,9%	9,3%	15,4%	11,0%	13,3%	10,8%
TraITEMENT ou autre soin	3,8%	7,8%	5,6%	10,0%	7,4%	8,8%	6,8%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	15,0%	19,1%	16,9%	26,4%	18,3%	22,5%	19,0%
Plaintes ou signes cliniques	15,0%	19,1%	16,9%	25,6%	18,3%	22,1%	18,8%
Gêne dans le travail	9,4%	11,3%	10,3%	17,8%	12,2%	15,1%	12,1%
TraITEMENT ou autre soin	4,4%	8,6%	6,4%	13,5%	9,8%	11,7%	8,3%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence