



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2011-2012

Région Bourgogne

Juillet 2013

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2011-2012 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Bourgogne

L'exploitation des données de la région Bourgogne a porté sur **1 806 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2011 (n=869) et 2012 (n=937).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Everest est plus proche du champ des salariés de l'ACOSS (secteur privé) que de celui des salariés du champ des DADS (secteurs privés et public) (tableau 1). Le secteur industriel et les ouvriers sont surreprésentés dans l'échantillon Everest Bourgogne.

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Bourgogne 2011-2012 aux données Insee (DADS 2010) et ACOSS (2011).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon	Données INSEE	Données ACOSS
	Bourgogne 2011-2012 (n=1 806)	2010 (DADS) %	2011 %
Sexe			
Hommes	55,7	50,4	-
Femmes	44,3	49,6	-
Age			
≤ 24 ans	9,6	13,9	-
25-34 ans	24,0	22,3	-
35-44 ans	27,0	25,0	-
45- 54 ans	27,1	25,4	-
55 ans et plus	12,3	13,4	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs	0,4	0,6	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	7,9	10,8	-
Professions intermédiaires	21,2	19,6	-
Employés	31,0	38,0	-
Ouvriers	39,5	31,0	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,2	0,0	0,0
Industrie	29,0	17,4	23,6
Construction	6,8	6,6	8,7
Commerce	19,4	13,4	18,2
Services	44,6	62,5	49,6

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Bourgogne 2011-2012 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	7	0,4
Cadres et professions intellectuelles supérieures	143	7,9
Professions intermédiaires	383	21,2
Employés	560	31,0
Ouvriers	713	39,5
Total général	1 806	100,0

En ce qui concerne les secteurs d'activité, seuls 3 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Commerce - réparations d'automobile et de motocycles, Santé humaine et action sociale.

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Bourgogne 2011-2012 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	4	0,2
A. Agriculture, sylviculture et pêche	4	0,2
INDUSTRIE	524	29,0
B. Industries extractives	2	0,1
C. Industrie manufacturière	470	26,0
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	28	1,6
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	24	1,3
CONSTRUCTION	123	6,8
F. Construction	123	6,8
COMMERCE	350	19,4
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	350	19,4
SERVICES	805	44,6
H. Transports et entreposage	117	6,5
I. Hébergement et restauration	75	4,2
J. Information et communication	14	0,8
K. Activités financières et d'assurance	83	4,6
L. Activités immobilières	17	0,9
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	98	5,4
N. Activités de services administratifs et de soutien	75	4,2
O. Administration publique	45	2,5
P. Enseignement	16	0,9
Q. Santé humaine et action sociale	189	10,5
R. Arts, spectacles et activités récréatives	8	0,4
S. Autres activités de services	68	3,8
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0	0,0
Total général	1 806	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=1006	Femmes n=800	Ensemble n=1806
≤24ans	8,9%	10,5%	9,6%
25-34ans	24,9%	22,9%	24,0%
35-44ans	25,0%	29,5%	27,0%
45-54ans	29,0%	24,6%	27,1%
55 ans et plus	12,2%	12,5%	12,3%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,5%	0,3%	0,4%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	8,9%	6,6%	7,9%
Professions intermédiaires	21,3%	21,1%	21,2%
Employés	10,8%	56,4%	31,0%
Ouvriers	58,4%	15,6%	39,5%
C. Industrie manufacturière	32,7%	17,6%	26,0%
D. Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	2,3%	0,6%	1,6%
F. Construction	11,2%	1,3%	6,8%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	17,5%	21,8%	19,4%
H. Transports et entreposage	9,6%	2,5%	6,5%
I. Hébergement et restauration	3,0%	5,6%	4,2%
J. Information et communication	0,9%	0,6%	0,8%
K. Activités financières et d'assurance	2,7%	7,0%	4,6%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	4,9%	6,1%	5,4%
N. Activités de services administratifs et de soutien	3,7%	4,8%	4,2%
O. Administration publique	2,0%	3,1%	2,5%
Q. Santé humaine et action sociale	3,0%	19,9%	10,5%
S. Autres activités de services	2,1%	5,9%	3,8%

Conditions de travail	Hommes n=1006	Femmes n=800	Ensemble n=1806
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	89,2%	87,0%	88,2%
Oui, raison médicale	1,5%	1,6%	1,6%
Oui, autre raison	8,2%	11,0%	9,4%
Oui, raison non précisée	1,1%	0,4%	0,8%
Travail à temps plein	94,6%	72,4%	84,8%
Travail en journée normale	77,1%	81,4%	79,0%
Coupures de plus de 2 heures	17,0%	22,3%	19,3%
Horaires décalés	32,3%	23,9%	28,6%
Horaires irréguliers ou alternés	30,2%	27,5%	29,0%
Travail de nuit	13,1%	7,0%	10,4%
Déplacements professionnels de plus de 24h	13,9%	3,1%	9,1%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	17,9%	20,5%	19,1%
Rarement	44,8%	47,0%	45,7%
Assez souvent	25,4%	24,6%	25,1%
Très souvent	11,9%	8,0%	10,1%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	47,7%	51,5%	49,4%
Rarement	35,3%	28,4%	32,3%
Assez souvent	12,1%	15,5%	13,6%
Très souvent	4,9%	4,5%	4,7%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	37,2%	41,7%	39,2%
Rarement	39,1%	34,3%	37,0%
Assez souvent	19,4%	18,5%	19,0%
Très souvent	4,4%	5,5%	4,9%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	5,0%	5,7%	5,3%
1	2,9%	7,2%	4,8%
2	9,8%	8,9%	9,4%
3	12,6%	11,4%	12,1%
4	8,6%	10,8%	9,6%
5	24,0%	18,1%	21,4%
6	12,6%	11,8%	12,2%
7	12,0%	12,5%	12,2%
8	8,9%	9,4%	9,2%
9	1,9%	3,1%	2,5%
10	1,6%	1,0%	1,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	37,0%	37,9%	37,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	47,2%	51,9%	49,3%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	58,1%	57,7%	57,9%
- Aspect positif du travail	43,0%	48,5%	45,6%

Appréciations sur le travail	Hommes n=1006	Femmes n=800	Ensemble n=1806
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	8,3%	6,1%	7,3%
Plutôt non	12,9%	12,0%	12,5%
Plutôt oui	44,2%	44,3%	44,2%
Oui tout à fait	34,6%	37,5%	35,9%
-Travail varié			
Non pas du tout	5,0%	4,8%	4,9%
Plutôt non	12,7%	13,1%	12,8%
Plutôt oui	42,2%	40,5%	41,4%
Oui tout à fait	40,2%	41,7%	40,8%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	6,8%	8,6%	7,6%
Plutôt non	15,2%	15,3%	15,2%
Plutôt oui	44,1%	38,6%	41,6%
Oui tout à fait	33,9%	37,5%	35,5%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,6%	5,2%	4,3%
Plutôt non	11,5%	12,0%	11,7%
Plutôt oui	53,1%	49,9%	51,7%
Oui tout à fait	31,7%	33,0%	32,3%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,5%	2,3%	1,9%
Plutôt non	9,9%	12,3%	11,0%
Plutôt oui	56,8%	50,9%	54,2%
Oui tout à fait	31,8%	34,5%	33,0%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	6,5%	4,9%	5,8%
Plutôt non	13,9%	17,6%	15,5%
Plutôt oui	53,7%	52,1%	53,0%
Oui tout à fait	25,9%	25,4%	25,7%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	28,3%	36,4%	31,9%
Plutôt non	48,0%	45,7%	47,0%
Plutôt oui	19,8%	14,9%	17,6%
Oui tout à fait	3,9%	3,0%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	58,3%	59,5%	58,8%
Plutôt non	28,9%	29,2%	29,0%
Plutôt oui	9,8%	8,1%	9,1%
Oui tout à fait	3,0%	3,2%	3,1%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=1006	Femmes n=800	Ensemble n=1806
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	38,7%	48,8%	43,2%
Oui parfois	41,1%	33,9%	37,9%
Oui souvent	20,3%	17,3%	19,0%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	38,7%	48,8%	43,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	30,7%	26,3%	28,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	29,1%	22,3%	26,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	1,6%	2,5%	2,0%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	44,1%	57,8%	50,1%
Oui parfois	39,6%	27,1%	34,1%
Oui souvent	16,3%	15,1%	15,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	44,1%	57,8%	50,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	28,3%	24,6%	26,6%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	25,8%	14,8%	20,9%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	1,9%	2,9%	2,3%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	39,7%	34,6%	37,5%
Oui parfois	27,1%	23,0%	25,3%
Oui souvent	33,2%	42,3%	37,2%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	39,7%	34,6%	37,5%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	20,2%	20,7%	20,4%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	38,4%	40,1%	39,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,7%	4,7%	3,0%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	52,8%	70,0%	60,4%
Oui parfois	22,7%	12,6%	18,2%
Oui souvent	24,5%	17,4%	21,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	52,8%	70,0%	60,4%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	12,6%	7,6%	10,3%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	32,2%	20,1%	26,8%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	2,5%	2,4%	2,5%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	36,3%	49,1%	42,0%
Oui parfois	20,0%	13,2%	17,0%
Oui souvent	43,7%	37,7%	41,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	36,3%	49,1%	42,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	20,1%	18,6%	19,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	36,1%	27,8%	32,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	7,5%	4,5%	6,2%

Expositions	Hommes n=1006	Femmes n=800	Ensemble n=1806
Produits chimiques	30,7%	19,6%	25,8%
Poussières, fumées	49,9%	17,1%	35,4%
Rx ionisants	3,6%	1,6%	2,7%
Vibrations	31,9%	4,7%	19,9%
Gêne sonore	53,1%	25,6%	41,0%
Bruit > 80db	36,1%	9,1%	24,1%
Contrainte visuelle	33,8%	35,8%	34,7%
Conduite routière prolongée	22,6%	5,7%	15,2%
Chaleur intense	19,8%	11,6%	16,2%
Froid intense	13,2%	7,9%	10,8%
Intempéries	23,2%	4,0%	14,7%
Pression psychologique	23,4%	21,4%	22,5%
Agent biologique	5,7%	13,9%	9,4%
Contact avec le public	61,0%	72,3%	66,0%

Formation	Hommes n=1006	Femmes n=800	Ensemble n=1806
A bénéficié d'une formation depuis un an	42,5%	42,1%	42,3%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	90,0%	86,9%	88,6%
- En rapport avec le travail futur	14,0%	15,4%	14,6%
- Formation d'intérêt général	48,2%	39,0%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	27,3%	24,5%	26,1%

Mode de vie	Hommes n=1006	Femmes n=800	Ensemble n=1806
Activité sportive régulière	47,4%	44,9%	46,3%
Consommation de tabac	38,7%	34,1%	36,7%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	10,5%	5,7%	8,4%
Consommation de café	84,3%	72,0%	78,9%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	18,0%	10,7%	14,7%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	12,5%	14,2%	13,2%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1806
	Hommes n=591	Femmes n=503	Ensemble n=1094	Hommes n=415	Femmes n=297	Ensemble n=712	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	52,5%	68,9%	60,0%	35,8%	52,3%	42,6%	53,2%
- Surpoids	34,7%	18,2%	27,1%	44,9%	29,4%	38,5%	31,6%
- Obèses	12,8%	12,9%	12,9%	19,3%	18,3%	18,9%	15,2%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	5,2%	4,0%	4,7%	6,9%	3,8%	5,6%	5,0%
Plaîntes ou signes cliniques	4,7%	3,8%	4,3%	6,7%	3,8%	5,5%	4,8%
Gêne dans le travail	1,4%	0,4%	0,9%	2,0%	1,0%	1,6%	1,2%
Traitemennt ou autre soin	3,5%	2,4%	3,0%	3,4%	2,1%	2,9%	2,9%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	1,6%	1,6%	1,6%	8,9%	4,8%	7,2%	3,8%
Plaîntes ou signes cliniques	1,4%	1,6%	1,5%	7,9%	4,5%	6,5%	3,5%
Gêne dans le travail	0,2%	0,4%	0,3%	2,0%	0,3%	1,3%	0,7%
Traitemennt ou autre soin	0,7%	0,6%	0,7%	5,7%	2,1%	4,2%	2,0%
HTA							
Existence d'un problème	4,7%	3,0%	4,0%	17,6%	14,7%	16,4%	8,8%
Plaîntes ou signes cliniques	3,9%	2,4%	3,2%	14,9%	12,9%	14,1%	7,5%
Gêne dans le travail	0,2%	0,0%	0,1%	0,2%	1,1%	0,6%	0,3%
Traitemennt ou autre soin	1,2%	1,8%	1,5%	10,9%	11,5%	11,2%	5,3%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	14,4%	23,1%	18,4%	20,6%	28,9%	24,1%	20,6%
Plaîntes ou signes cliniques	14,2%	22,7%	18,1%	20,0%	28,6%	23,5%	20,3%
Gêne dans le travail	6,1%	8,8%	7,3%	12,0%	10,9%	11,5%	9,0%
Traitemennt ou autre soin	1,9%	2,7%	2,3%	2,0%	3,8%	2,8%	2,5%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	15,2%	24,8%	19,6%	22,2%	35,3%	27,7%	22,8%
Plaîntes ou signes cliniques	15,2%	24,3%	19,4%	21,8%	34,4%	27,0%	22,4%
Gêne dans le travail	5,9%	8,4%	7,1%	11,3%	13,7%	12,3%	9,1%
Traitemennt ou autre soin	1,6%	4,5%	2,9%	4,0%	8,5%	5,9%	4,1%
Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	14,6%	19,8%	17,0%	20,7%	29,6%	24,4%	19,9%
Plaîntes ou signes cliniques	13,8%	18,8%	16,1%	19,3%	28,6%	23,2%	18,9%
Gêne dans le travail	6,1%	7,4%	6,7%	7,1%	8,9%	7,8%	7,1%
Traitemennt ou autre soin	1,8%	3,9%	2,7%	4,3%	9,6%	6,5%	4,2%
➤ Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	3,8%	7,3%	5,4%	8,7%	11,9%	10,0%	7,2%
Plaîntes ou signes cliniques	3,6%	6,5%	5,0%	8,2%	10,9%	9,3%	6,7%
Gêne dans le travail	1,0%	2,2%	1,6%	3,5%	3,5%	3,5%	2,3%
Traitemennt ou autre soin	0,3%	1,0%	0,7%	1,0%	3,1%	1,9%	1,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1806
	Hommes n=591	Femmes n=503	Ensemble n=1094	Hommes n=415	Femmes n=297	Ensemble n=712	
Digestif							
Existence d'un problème	5,1%	8,5%	6,6%	9,1%	12,3%	10,4%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	8,5%	6,5%	8,9%	12,3%	10,3%	8,0%
Gêne dans le travail	1,9%	1,0%	1,5%	1,3%	4,0%	2,4%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	3,5%	2,7%	6,3%	4,3%	5,5%	3,8%
Dermatologie							
Existence d'un problème	4,4%	8,8%	6,4%	7,0%	6,6%	6,8%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	8,1%	5,9%	6,5%	6,6%	6,5%	6,1%
Gêne dans le travail	0,4%	1,2%	0,8%	1,2%	1,0%	1,2%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	4,9%	3,1%	3,5%	4,2%	3,8%	3,4%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	4,1%	3,3%	3,7%	20,2%	4,9%	13,8%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	3,3%	3,6%	19,7%	4,9%	13,5%	7,5%
Gêne dans le travail	0,9%	0,8%	0,9%	3,8%	2,8%	3,4%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	0,2%	0,5%	3,5%	1,1%	2,5%	1,3%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	7,6%	7,9%	7,7%	15,3%	22,0%	18,1%	11,8%
Plaintes ou signes cliniques	7,5%	7,9%	7,7%	14,9%	22,0%	17,8%	11,6%
Gêne dans le travail	3,1%	3,4%	3,3%	8,7%	13,3%	10,6%	6,1%
TraITEMENT ou autre soin	1,0%	3,0%	2,0%	4,7%	8,8%	6,4%	3,7%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	4,7%	4,4%	4,6%	7,7%	9,4%	8,4%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	4,4%	4,6%	7,4%	8,7%	8,0%	5,9%
Gêne dans le travail	2,8%	2,8%	2,8%	5,5%	6,3%	5,8%	4,0%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	1,8%	1,6%	2,0%	4,9%	3,2%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	7,9%	9,5%	8,7%	11,6%	19,2%	14,8%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	9,5%	8,6%	11,2%	18,8%	14,4%	10,8%
Gêne dans le travail	4,8%	4,8%	4,8%	5,7%	13,0%	8,7%	6,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	3,2%	2,6%	3,5%	9,6%	6,0%	3,9%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur							
<i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	16,6%	17,4%	17,0%	26,1%	33,9%	29,3%	21,8%
Plaintes ou signes cliniques	16,3%	17,4%	16,8%	25,9%	33,9%	29,2%	21,7%
Gêne dans le travail	8,7%	8,9%	8,8%	16,2%	23,4%	19,2%	12,9%
TraITEMENT ou autre soin	3,9%	6,7%	5,2%	8,5%	17,2%	12,1%	7,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1806
	Hommes n=591	Femmes n=503	Ensemble n=1094	Hommes n=415	Femmes n=297	Ensemble n=712	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	10,1%	10,3%	10,2%	20,7%	18,9%	20,0%	14,0%
Plaintes ou signes cliniques	9,9%	10,3%	10,1%	20,4%	18,6%	19,7%	13,8%
Gêne dans le travail	4,2%	4,7%	4,4%	10,8%	12,3%	11,4%	7,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,3%	3,7%	2,9%	7,5%	10,6%	8,8%	5,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	7,1%	13,2%	9,9%	12,4%	24,1%	17,2%	12,8%
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	13,2%	9,9%	12,4%	24,1%	17,2%	12,8%
Gêne dans le travail	2,6%	6,7%	4,5%	7,7%	16,1%	11,2%	7,1%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	3,1%	2,4%	4,7%	8,9%	6,4%	4,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	18,7%	21,2%	19,8%	26,2%	32,6%	28,9%	23,4%
Plaintes ou signes cliniques	18,4%	21,2%	19,7%	25,5%	32,2%	28,3%	23,1%
Gêne dans le travail	9,6%	11,8%	10,7%	17,0%	19,3%	18,0%	13,5%
TraITEMENT ou autre soin	5,8%	3,9%	4,9%	10,3%	14,6%	12,1%	7,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	22,0%	25,9%	23,8%	31,2%	40,7%	35,1%	28,2%
Plaintes ou signes cliniques	21,7%	25,9%	23,7%	30,7%	40,5%	34,7%	28,0%
Gêne dans le travail	10,7%	14,7%	12,5%	19,8%	24,3%	21,7%	16,1%
TraITEMENT ou autre soin	7,0%	5,1%	6,2%	11,8%	16,3%	13,6%	9,1%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Intermédiaires n=383	Employés n=560	Ouvriers n=713	Base Everest région n=1806
Répartition hommes/femmes	55,9% / 44,1%	19,5% / 80,5%	82,5% / 17,5%	55,7% / 44,3%
≤24ans	7,3%	13,4%	9,5%	9,6%
25-34ans	29,0%	22,5%	22,7%	24,0%
35-44ans	25,3%	27,3%	25,4%	27,0%
45-54ans	25,1%	23,6%	30,9%	27,1%
55 ans et plus	13,3%	13,2%	11,5%	12,3%
C. Industrie manufacturière	26,1%	6,3%	42,1%	26,0%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	3,4%	1,1%	0,7%	1,6%
F. Construction	4,4%	0,9%	13,5%	6,8%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	19,1%	30,4%	11,8%	19,4%
H. Transports et entreposage	0,8%	2,0%	13,9%	6,5%
I. Hébergement et restauration	1,0%	8,8%	2,4%	4,2%
J. Information et communication	1,0%	0,7%	0,0%	0,8%
K. Activités financières et d'assurance	8,4%	5,4%	0,4%	4,6%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	9,1%	6,6%	1,1%	5,4%
N. Activités de services administratifs et de soutien	2,9%	3,6%	5,9%	4,2%
O. Administration publique	3,9%	3,9%	1,0%	2,5%
Q. Santé humaine et action sociale	12,8%	20,2%	1,4%	10,5%
S. Autres activités de services	2,3%	7,9%	1,4%	3,8%

Conditions de travail	Intermédiaires n=383	Employés n=560	Ouvriers n=713	Base Everest région n=1806
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	88,0%	86,8%	90,2%	88,2%
Oui, raison médicale	0,3%	1,8%	2,1%	1,6%
Oui, autre raison	11,5%	10,7%	6,5%	9,4%
Oui, raison non précisée	0,3%	0,7%	1,1%	0,8%
Travail à temps plein	88,1%	71,1%	92,9%	84,8%
Travail en journée normale	89,1%	80,6%	69,3%	79,0%
Coupures de plus de 2 heures	17,6%	24,9%	15,9%	19,3%
Horaires décalés	21,4%	24,8%	37,4%	28,6%
Horaires irréguliers ou alternés	22,3%	26,5%	36,9%	29,0%
Travail de nuit	5,5%	6,0%	17,8%	10,4%
Déplacements professionnels de plus de 24h	14,6%	1,1%	9,2%	9,1%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	7,9%	18,8%	28,8%	19,1%
Rarement	41,6%	51,4%	47,3%	45,7%
Assez souvent	35,8%	23,6%	18,0%	25,1%
Très souvent	14,7%	6,1%	6,0%	10,1%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	37,3%	52,7%	58,8%	49,4%
Rarement	37,6%	29,5%	29,1%	32,3%
Assez souvent	19,0%	13,7%	9,2%	13,6%
Très souvent	6,1%	4,1%	3,0%	4,7%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	25,8%	43,6%	47,7%	39,2%
Rarement	40,2%	37,6%	33,8%	37,0%
Assez souvent	28,5%	13,9%	14,9%	19,0%
Très souvent	5,6%	4,9%	3,6%	4,9%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	4,2%	6,5%	5,8%	5,3%
1	2,6%	9,0%	3,4%	4,8%
2	6,3%	10,2%	10,4%	9,4%
3	9,7%	12,6%	13,3%	12,1%
4	10,2%	10,1%	9,2%	9,6%
5	19,9%	19,0%	24,5%	21,4%
6	16,0%	9,7%	12,6%	12,2%
7	14,4%	11,7%	10,8%	12,2%
8	11,3%	7,9%	6,8%	9,2%
9	3,9%	2,5%	1,7%	2,5%
10	1,3%	0,9%	1,4%	1,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	47,0%	32,7%	33,3%	37,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	61,9%	49,1%	38,1%	49,3%
<i>Parmi eux :</i>				
- Perturbe le travail	68,6%	52,2%	55,4%	57,9%
- Aspect positif du travail	42,0%	51,2%	39,5%	45,6%

Appréciations sur le travail	Intermédiaires n=383	Employés n=560	Ouvriers n=713	Base Everest région n=1806
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	1,6%	6,8%	12,3%	7,3%
Plutôt non	6,8%	13,4%	16,6%	12,5%
Plutôt oui	43,2%	47,0%	43,7%	44,2%
Oui tout à fait	48,4%	32,8%	27,4%	35,9%
-Travail varié				
Non pas du tout	1,0%	5,8%	7,4%	4,9%
Plutôt non	7,1%	13,7%	16,9%	12,8%
Plutôt oui	43,6%	41,9%	42,1%	41,4%
Oui tout à fait	48,3%	38,7%	33,7%	40,8%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	3,7%	8,2%	10,5%	7,6%
Plutôt non	14,2%	15,6%	17,6%	15,2%
Plutôt oui	45,8%	38,1%	41,1%	41,6%
Oui tout à fait	36,3%	38,1%	30,8%	35,5%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	2,9%	5,1%	5,3%	4,3%
Plutôt non	12,2%	11,6%	11,5%	11,7%
Plutôt oui	57,4%	49,8%	49,4%	51,7%
Oui tout à fait	27,5%	33,6%	33,8%	32,3%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	0,8%	3,1%	1,7%	1,9%
Plutôt non	15,0%	9,1%	9,8%	11,0%
Plutôt oui	57,2%	51,3%	54,5%	54,2%
Oui tout à fait	27,0%	36,5%	34,0%	33,0%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	4,0%	6,0%	7,6%	5,8%
Plutôt non	17,5%	15,3%	15,3%	15,5%
Plutôt oui	57,7%	52,0%	50,5%	53,0%
Oui tout à fait	20,9%	26,7%	26,6%	25,7%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	25,2%	38,0%	32,9%	31,9%
Plutôt non	55,1%	43,4%	43,3%	47,0%
Plutôt oui	16,8%	14,8%	20,2%	17,6%
Oui tout à fait	2,9%	3,8%	3,6%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	54,5%	64,0%	58,6%	58,8%
Plutôt non	32,3%	26,2%	27,5%	29,0%
Plutôt oui	10,6%	6,9%	9,9%	9,1%
Oui tout à fait	2,6%	2,9%	4,0%	3,1%

Charge physique du poste de travail	Intermédiaires n=383	Employés n=560	Ouvriers n=713	Base Everest région n=1806
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	55,0%	46,0%	28,3%	43,2%
Oui parfois	34,8%	34,5%	45,7%	37,9%
Oui souvent	10,2%	19,5%	26,0%	19,0%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	55,0%	46,0%	28,3%	43,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	18,8%	26,5%	39,8%	28,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	25,4%	25,2%	29,5%	26,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	0,8%	2,3%	2,4%	2,0%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	63,3%	52,4%	34,1%	50,1%
Oui parfois	28,2%	30,3%	44,4%	34,1%
Oui souvent	8,4%	17,2%	21,5%	15,8%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, Port de charges lourdes	63,3%	52,4%	34,1%	50,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	16,4%	26,0%	36,6%	26,6%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	19,8%	18,1%	26,6%	20,9%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,5%	3,4%	2,7%	2,3%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	55,9%	30,9%	25,0%	37,5%
Oui parfois	22,3%	23,9%	29,8%	25,3%
Oui souvent	21,8%	45,2%	45,2%	37,2%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	55,9%	30,9%	25,0%	37,5%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	12,1%	19,9%	28,2%	20,4%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	30,7%	44,5%	44,0%	39,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,3%	4,7%	2,8%	3,0%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	63,3%	64,5%	51,2%	60,4%
Oui parfois	19,7%	13,1%	23,5%	18,2%
Oui souvent	17,1%	22,4%	25,3%	21,4%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	63,3%	64,5%	51,2%	60,4%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	6,8%	9,0%	14,4%	10,3%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	28,1%	24,2%	31,0%	26,8%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,8%	2,3%	3,4%	2,5%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	55,8%	41,2%	28,1%	42,0%
Oui parfois	19,3%	15,1%	18,2%	17,0%
Oui souvent	24,9%	43,7%	53,7%	41,1%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	55,8%	41,2%	28,1%	42,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	12,4%	20,6%	25,1%	19,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	27,2%	32,3%	38,5%	32,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	4,5%	5,9%	8,3%	6,2%

Expositions	Intermédiaires n=383	Employés n=560	Ouvriers n=713	Base Everest région n=1806
Produits chimiques	20,9%	20,1%	36,2%	25,8%
Poussières, fumées	16,9%	18,4%	64,2%	35,4%
Rx ionisants	4,2%	1,6%	2,9%	2,7%
Vibrations	6,1%	3,3%	43,9%	19,9%
Gêne sonore	31,2%	21,6%	66,1%	41,0%
Bruit > 80db	13,0%	5,1%	48,7%	24,1%
Contrainte visuelle	42,3%	28,9%	32,2%	34,7%
Conduite routière prolongée	22,0%	3,6%	18,7%	15,2%
Chaleur intense	9,0%	12,9%	25,1%	16,2%
Froid intense	4,2%	8,5%	18,2%	10,8%
Intempéries	11,0%	5,0%	26,9%	14,7%
Pression psychologique	27,4%	18,4%	19,7%	22,5%
Agent biologique	10,8%	14,9%	5,9%	9,4%
Contact avec le public	75,7%	83,2%	46,7%	66,0%

Formation	Intermédiaires n=383	Employés n=560	Ouvriers n=713	Base Everest région n=1806
A bénéficié d'une formation depuis un an	51,3%	42,9%	32,4%	42,3%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	87,4%	88,1%	89,0%	88,6%
- En rapport avec le travail futur	15,5%	14,9%	13,4%	14,6%
- Formation d'intérêt général	44,3%	41,7%	43,6%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	39,6%	19,7%	18,9%	26,1%

Mode de vie	Intermédiaires n=383	Employés n=560	Ouvriers n=713	Base Everest région n=1806
Activité sportive régulière	52,6%	44,3%	42,4%	46,3%
Consommation de tabac	32,3%	35,6%	41,8%	36,7%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	6,3%	6,3%	11,9%	8,4%
Consommation de café	80,4%	72,6%	84,1%	78,9%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	13,9%	9,7%	19,5%	14,7%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	18,9%	13,0%	10,0%	13,2%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=236	≥45 ans n=147	Ensemble n=383	<45 ans n=354	≥45 ans n=206	Ensemble n=560	<45 ans n=411	≥45 ans n=302	Ensemble n=713	<45 ans n=1094	≥45 ans n=712	Global n=1806
Indice de masse corporelle												
- Normaux / maigres	59,3%	46,5%	54,3%	65,6%	51,3%	60,4%	53,5%	34,6%	45,6%	60,0%	42,6%	53,2%
- Surpoids	26,2%	40,1%	31,7%	23,7%	32,8%	27,0%	31,7%	40,6%	35,4%	27,1%	38,5%	31,6%
- Obèses	14,5%	13,4%	14,0%	10,7%	15,9%	12,6%	14,8%	24,8%	19,0%	12,9%	18,9%	15,2%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	4,3%	2,8%	3,7%	4,6%	5,0%	4,7%	4,5%	7,5%	5,7%	4,7%	5,6%	5,0%
Plautes ou signes cliniques	3,9%	2,8%	3,5%	4,3%	5,0%	4,6%	4,0%	7,1%	5,3%	4,3%	5,5%	4,8%
Gêne dans le travail	0,9%	1,4%	1,1%	0,6%	1,0%	0,7%	1,0%	2,4%	1,6%	0,9%	1,6%	1,2%
Traitemen ou autre soin	2,6%	1,4%	2,1%	2,6%	2,5%	2,6%	3,2%	3,7%	3,4%	3,0%	2,9%	2,9%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	0,9%	10,3%	4,5%	1,4%	5,5%	2,9%	1,7%	6,1%	3,6%	1,6%	7,2%	3,8%
Plautes ou signes cliniques	0,9%	9,0%	4,0%	1,4%	5,0%	2,8%	1,5%	5,5%	3,2%	1,5%	6,5%	3,5%
Gêne dans le travail	0,0%	2,1%	0,8%	0,6%	0,0%	0,4%	0,0%	1,7%	0,7%	0,3%	1,3%	0,7%
Traitemen ou autre soin	0,4%	6,2%	2,7%	0,6%	2,5%	1,3%	0,5%	3,8%	1,9%	0,7%	4,2%	2,0%
HTA												
Existence d'un problème	3,5%	17,8%	9,1%	3,2%	14,2%	7,2%	5,3%	17,1%	10,3%	4,0%	16,4%	8,8%
Plautes ou signes cliniques	3,1%	15,8%	8,1%	2,0%	12,7%	5,9%	4,5%	14,1%	8,6%	3,2%	14,1%	7,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,4%	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%	0,6%	0,3%
Traitemen ou autre soin	0,9%	12,3%	5,4%	2,3%	11,2%	5,5%	1,5%	10,6%	5,4%	1,5%	11,2%	5,3%
Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	20,1%	20,8%	20,4%	20,5%	29,8%	23,9%	14,4%	20,5%	17,0%	18,4%	24,1%	20,6%
Plautes ou signes cliniques	20,1%	19,6%	19,9%	20,0%	29,8%	23,6%	14,2%	20,2%	16,7%	18,1%	23,5%	20,3%
Gêne dans le travail	7,9%	11,1%	9,1%	6,4%	13,2%	8,9%	6,3%	9,7%	7,7%	7,3%	11,5%	9,0%
Traitemen ou autre soin	2,6%	1,4%	2,2%	2,6%	4,0%	3,1%	1,0%	2,1%	1,5%	2,3%	2,8%	2,5%
Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	22,4%	23,4%	22,8%	23,8%	35,0%	27,9%	14,0%	22,8%	17,7%	19,6%	27,7%	22,8%
Plautes ou signes cliniques	21,9%	21,5%	21,8%	23,6%	35,0%	27,8%	13,8%	22,1%	17,3%	19,4%	27,0%	22,4%
Gêne dans le travail	10,5%	11,0%	10,7%	7,9%	16,8%	11,1%	4,3%	9,0%	6,3%	7,1%	12,3%	9,1%
Traitemen ou autre soin	4,8%	4,2%	4,6%	4,1%	6,2%	4,9%	1,0%	6,3%	3,2%	2,9%	5,9%	4,1%
Troubles du sommeil												
Existence d'un problème	19,8%	24,5%	21,6%	15,9%	27,9%	20,3%	14,6%	21,7%	17,5%	17,0%	24,4%	19,9%
Plautes ou signes cliniques	19,4%	23,2%	20,9%	14,7%	26,3%	18,9%	14,1%	20,6%	16,8%	16,1%	23,2%	18,9%
Gêne dans le travail	8,4%	9,1%	8,7%	5,2%	10,3%	7,0%	5,3%	5,3%	5,3%	6,7%	7,8%	7,1%
Traitemen ou autre soin	3,5%	4,9%	4,1%	2,9%	9,2%	5,2%	1,8%	5,7%	3,4%	2,7%	6,5%	4,2%
➤ Troubles neuro-psychiques <i>(les 3 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	6,6%	11,0%	8,3%	6,1%	11,7%	8,1%	3,7%	7,8%	5,5%	5,4%	10,0%	7,2%
Plautes ou signes cliniques	6,6%	9,0%	7,5%	5,0%	11,2%	7,2%	3,5%	7,5%	5,2%	5,0%	9,3%	6,7%
Gêne dans le travail	2,2%	4,1%	2,9%	1,4%	5,0%	2,8%	0,7%	1,4%	1,0%	1,6%	3,5%	2,3%
Traitemen ou autre soin	0,9%	1,4%	1,1%	0,9%	3,0%	1,6%	0,2%	1,0%	0,6%	0,7%	1,9%	1,1%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans	≥45 ans	Ensemble n=383	<45 ans	≥45 ans	Ensemble n=560	<45 ans	≥45 ans	Ensemble n=713	<45 ans	≥45 ans	Global n=1806
	n=236	n=147		n=354	n=206		n=411	n=302		n=1094	n=712	
Digestif												
Existence d'un problème	6,7%	7,7%	7,1%	7,3%	14,9%	10,0%	5,8%	8,5%	6,9%	6,6%	10,4%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	7,0%	6,8%	7,3%	14,9%	10,0%	5,6%	8,5%	6,8%	6,5%	10,3%	8,0%
Gêne dans le travail	1,8%	0,7%	1,4%	1,8%	5,7%	3,2%	1,3%	1,4%	1,3%	1,5%	2,4%	1,9%
Traitement ou autre soin	2,7%	3,5%	3,0%	2,9%	7,3%	4,5%	2,3%	5,3%	3,5%	2,7%	5,5%	3,8%
Dermatologie												
Existence d'un problème	5,6%	4,8%	5,3%	8,5%	8,0%	8,3%	5,6%	7,2%	6,3%	6,4%	6,8%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	4,1%	5,1%	7,4%	8,0%	7,6%	5,3%	6,9%	6,0%	5,9%	6,5%	6,1%
Gêne dans le travail	0,4%	0,0%	0,3%	1,5%	1,0%	1,3%	0,5%	1,7%	1,0%	0,8%	1,2%	0,9%
Traitement ou autre soin	2,2%	3,4%	2,7%	5,3%	4,5%	5,0%	1,5%	3,8%	2,5%	3,1%	3,8%	3,4%
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	2,6%	10,6%	5,7%	1,8%	6,1%	3,3%	6,4%	22,2%	13,1%	3,7%	13,8%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	10,0%	5,4%	1,8%	6,1%	3,3%	6,2%	21,9%	12,9%	3,6%	13,5%	7,5%
Gêne dans le travail	0,9%	5,0%	2,4%	0,6%	2,5%	1,3%	0,8%	3,8%	2,1%	0,9%	3,4%	1,9%
Traitement ou autre soin	0,0%	2,9%	1,1%	0,0%	1,5%	0,6%	1,3%	2,8%	1,9%	0,5%	2,5%	1,3%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Existence d'un problème	8,3%	14,5%	10,7%	6,4%	20,7%	11,6%	9,5%	20,7%	14,2%	7,7%	18,1%	11,8%
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	14,5%	10,7%	6,1%	20,7%	11,4%	9,5%	20,2%	14,0%	7,7%	17,8%	11,6%
Gêne dans le travail	3,5%	7,6%	5,1%	2,9%	13,1%	6,6%	4,0%	11,9%	7,3%	3,3%	10,6%	6,1%
Traitement ou autre soin	2,6%	6,2%	4,0%	2,0%	8,2%	4,3%	2,0%	6,1%	3,7%	2,0%	6,4%	3,7%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Existence d'un problème	2,2%	8,3%	4,5%	2,9%	8,0%	4,8%	8,2%	9,9%	8,9%	4,6%	8,4%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	8,3%	4,5%	2,9%	7,1%	4,4%	8,2%	9,6%	8,8%	4,6%	8,0%	5,9%
Gêne dans le travail	1,3%	6,9%	3,5%	1,2%	5,1%	2,6%	5,5%	6,8%	6,1%	2,8%	5,8%	4,0%
Traitement ou autre soin	0,9%	3,4%	1,9%	0,9%	4,0%	2,0%	3,0%	3,1%	3,0%	1,6%	3,2%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Existence d'un problème	4,8%	8,3%	6,1%	6,3%	20,0%	11,3%	13,1%	16,1%	14,4%	8,7%	14,8%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	7,7%	5,9%	6,3%	19,5%	11,2%	12,9%	15,8%	14,1%	8,6%	14,4%	10,8%
Gêne dans le travail	3,0%	6,3%	4,3%	3,5%	14,1%	7,3%	7,7%	7,6%	7,6%	4,8%	8,7%	6,4%
Traitement ou autre soin	1,7%	3,5%	2,4%	1,7%	10,2%	4,8%	3,5%	5,2%	4,2%	2,6%	6,0%	3,9%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	13,9%	22,2%	17,1%	13,0%	33,2%	20,4%	23,4%	34,0%	27,8%	17,0%	29,3%	21,8%
Plaintes ou signes cliniques	13,9%	22,2%	17,1%	12,8%	33,2%	20,2%	23,2%	33,8%	27,6%	16,8%	29,2%	21,7%
Gêne dans le travail	7,0%	14,6%	9,9%	6,1%	25,1%	13,0%	13,3%	20,3%	16,2%	8,8%	19,2%	12,9%
Traitement ou autre soin	4,8%	8,4%	6,2%	4,0%	18,6%	9,3%	6,5%	11,1%	8,5%	5,2%	12,1%	7,9%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans	≥45 ans	Ensemble n=383	<45 ans	≥45 ans	Ensemble n=560	<45 ans	≥45 ans	Ensemble n=713	<45 ans	≥45 ans	Global n=1806
	n=236	n=147		n=354	n=206		n=411	n=302		n=1094	n=712	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	10,0%	17,9%	13,1%	9,5%	20,3%	13,4%	11,4%	22,8%	16,2%	10,2%	20,0%	14,0%
Plautes ou signes cliniques	9,6%	17,2%	12,5%	9,5%	20,3%	13,4%	11,4%	22,5%	16,1%	10,1%	19,7%	13,8%
Gêne dans le travail	2,2%	9,7%	5,1%	3,2%	12,8%	6,6%	7,0%	12,5%	9,3%	4,4%	11,4%	7,1%
Traitemen ou autre soin	2,2%	8,3%	4,6%	2,3%	12,2%	5,9%	3,5%	7,3%	5,1%	2,9%	8,8%	5,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	9,1%	16,0%	11,8%	11,0%	23,1%	15,4%	8,5%	15,4%	11,4%	9,9%	17,2%	12,8%
Plautes ou signes cliniques	9,1%	16,0%	11,8%	11,0%	23,1%	15,4%	8,5%	15,4%	11,4%	9,9%	17,2%	12,8%
Gêne dans le travail	2,6%	9,0%	5,1%	6,3%	14,1%	9,2%	3,8%	11,3%	6,9%	4,5%	11,2%	7,1%
Traitemen ou autre soin	3,0%	6,3%	4,3%	2,6%	8,6%	4,8%	1,8%	5,9%	3,5%	2,4%	6,4%	4,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires												
Existence d'un problème	15,4%	27,4%	20,1%	22,0%	33,8%	26,3%	21,6%	28,7%	24,6%	19,8%	28,9%	23,4%
Plautes ou signes cliniques	15,4%	26,9%	19,8%	22,0%	33,5%	26,2%	21,2%	27,8%	24,0%	19,7%	28,3%	23,1%
Gêne dans le travail	6,6%	15,1%	9,9%	11,9%	21,7%	15,5%	12,3%	19,2%	15,2%	10,7%	18,0%	13,5%
Traitemen ou autre soin	4,8%	10,4%	7,0%	4,4%	18,5%	9,5%	6,0%	10,4%	7,9%	4,9%	12,1%	7,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	20,5%	33,6%	25,6%	25,2%	40,9%	30,9%	24,9%	35,1%	29,2%	23,8%	35,1%	28,2%
Plautes ou signes cliniques	20,5%	33,6%	25,6%	25,2%	40,6%	30,8%	24,6%	34,4%	28,7%	23,7%	34,7%	28,0%
Gêne dans le travail	8,3%	19,3%	12,6%	14,8%	25,3%	18,6%	13,4%	23,4%	17,6%	12,5%	21,7%	16,1%
Traitemen ou autre soin	6,6%	12,7%	8,9%	5,6%	19,1%	10,5%	6,8%	12,6%	9,3%	6,2%	13,6%	9,1%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=470	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=350	Q. Santé humaine et action sociale n=189	Base Everest région n=1806
Répartition hommes/femmes	70,0% / 30,0%	50,3% / 49,7%	15,9% / 84,1%	55,7% / 44,3%
≤24ans	6,2%	11,1%	7,4%	9,6%
25-34ans	22,3%	32,0%	18,0%	24,0%
35-44ans	28,3%	25,4%	24,3%	27,0%
45-54ans	31,1%	23,1%	31,2%	27,1%
55 ans et plus	12,1%	8,3%	19,0%	12,3%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,0%	0,9%	1,1%	0,4%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	7,4%	5,7%	7,9%	7,9%
Professions intermédiaires	21,3%	20,9%	25,9%	21,2%
Employés	7,4%	48,6%	59,8%	31,0%
Ouvriers	63,8%	24,0%	5,3%	39,5%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=470	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=350	Q. Santé humaine et action sociale n=189	Base Everest région n=1806
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	89,7%	87,0%	89,2%	88,2%
Oui, raison médicale	1,9%	2,3%	1,1%	1,6%
Oui, autre raison	8,1%	10,4%	9,7%	9,4%
Oui, raison non précisée	0,2%	0,3%	0,0%	0,8%
Travail à temps plein	91,2%	81,7%	70,1%	84,8%
Travail en journée normale	66,1%	86,2%	74,9%	79,0%
Coupures de plus de 2 heures	9,4%	30,6%	23,2%	19,3%
Horaires décalés	36,4%	24,9%	31,1%	28,6%
Horaires irréguliers ou alternés	36,6%	27,6%	31,9%	29,0%
Travail de nuit	17,6%	4,1%	13,4%	10,4%
Déplacements professionnels de plus de 24h	8,5%	4,1%	2,2%	9,1%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	25,6%	14,7%	17,2%	19,1%
Rarement	43,3%	54,2%	46,2%	45,7%
Assez souvent	21,3%	21,6%	27,4%	25,1%
Très souvent	9,8%	9,5%	9,1%	10,1%
-Sauter ou écouter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	55,5%	51,9%	48,1%	49,4%
Rarement	31,4%	32,3%	27,3%	32,3%
Assez souvent	10,1%	11,0%	18,7%	13,6%
Très souvent	3,0%	4,9%	5,9%	4,7%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	39,1%	39,1%	35,7%	39,2%
Rarement	34,1%	39,7%	35,1%	37,0%
Assez souvent	22,8%	16,8%	19,5%	19,0%
Très souvent	3,9%	4,4%	9,7%	4,9%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	4,3%	6,3%	4,9%	5,3%
1	4,1%	6,3%	6,5%	4,8%
2	7,1%	13,4%	9,2%	9,4%
3	10,8%	11,7%	16,2%	12,1%
4	10,6%	8,9%	8,1%	9,6%
5	24,5%	18,6%	17,8%	21,4%
6	15,2%	11,4%	9,2%	12,2%
7	13,0%	9,4%	11,9%	12,2%
8	7,6%	10,0%	9,2%	9,2%
9	2,2%	2,0%	4,9%	2,5%
10	0,6%	2,0%	2,2%	1,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	38,5%	34,9%	37,3%	37,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	52,4%	56,5%	51,1%	49,3%
<i>Parmi eux :</i>				
- Perturbe le travail	63,8%	47,8%	60,9%	57,9%
- Aspect positif du travail	41,9%	55,7%	39,5%	45,6%

Appréciations sur le travail	C. Industrie manufacturière n=470	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=350	Q. Santé humaine et action sociale n=189	Base Everest région n=1806
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	9,4%	7,5%	4,8%	7,3%
Plutôt non	15,0%	12,4%	10,1%	12,5%
Plutôt oui	46,4%	41,7%	42,9%	44,2%
Oui tout à fait	29,3%	38,5%	42,3%	35,9%
-Travail varié				
Non pas du tout	5,2%	4,3%	4,8%	4,9%
Plutôt non	14,8%	14,9%	12,8%	12,8%
Plutôt oui	45,4%	32,4%	41,2%	41,4%
Oui tout à fait	34,6%	48,4%	41,2%	40,8%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	8,2%	7,6%	5,8%	7,6%
Plutôt non	14,2%	15,4%	12,2%	15,2%
Plutôt oui	45,3%	36,3%	48,1%	41,6%
Oui tout à fait	32,4%	40,7%	33,9%	35,5%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	5,0%	3,5%	6,5%	4,3%
Plutôt non	11,5%	11,3%	13,0%	11,7%
Plutôt oui	56,9%	47,1%	49,2%	51,7%
Oui tout à fait	26,6%	38,2%	31,4%	32,3%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	2,0%	1,8%	3,3%	1,9%
Plutôt non	11,0%	8,8%	10,9%	11,0%
Plutôt oui	59,6%	49,4%	54,3%	54,2%
Oui tout à fait	27,4%	40,1%	31,5%	33,0%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	9,0%	5,2%	7,0%	5,8%
Plutôt non	15,7%	14,8%	17,6%	15,5%
Plutôt oui	56,8%	50,1%	48,1%	53,0%
Oui tout à fait	18,6%	29,9%	27,3%	25,7%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	28,8%	34,2%	33,0%	31,9%
Plutôt non	50,1%	42,6%	46,3%	47,0%
Plutôt oui	17,6%	17,7%	15,4%	17,6%
Oui tout à fait	3,5%	5,5%	5,3%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	54,0%	63,8%	64,7%	58,8%
Plutôt non	32,6%	23,8%	24,1%	29,0%
Plutôt oui	10,1%	9,0%	7,0%	9,1%
Oui tout à fait	3,3%	3,5%	4,3%	3,1%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=470	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=350	Q. Santé humaine et action sociale n=189	Base Everest région n=1806
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	42,0%	38,8%	31,6%	43,2%
Oui parfois	41,2%	37,1%	43,3%	37,9%
Oui souvent	16,8%	24,1%	25,1%	19,0%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	42,0%	38,8%	31,6%	43,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	33,3%	29,9%	37,4%	28,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	23,0%	29,0%	29,4%	26,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	1,7%	2,3%	1,6%	2,0%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	47,3%	35,5%	43,2%	50,1%
Oui parfois	37,3%	40,2%	35,7%	34,1%
Oui souvent	15,4%	24,3%	21,1%	15,8%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, Port de charges lourdes	47,3%	35,5%	43,2%	50,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	31,1%	34,1%	32,4%	26,6%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	20,0%	26,6%	21,1%	20,9%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	1,5%	3,8%	3,2%	2,3%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	35,0%	34,9%	39,0%	37,5%
Oui parfois	28,5%	22,2%	20,9%	25,3%
Oui souvent	36,5%	42,9%	40,1%	37,2%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	35,0%	34,9%	39,0%	37,5%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	25,8%	22,2%	21,4%	20,4%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	36,9%	41,5%	35,3%	39,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,4%	1,4%	4,3%	3,0%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	51,6%	53,0%	59,7%	60,4%
Oui parfois	25,4%	15,9%	14,5%	18,2%
Oui souvent	23,0%	31,1%	25,8%	21,4%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	51,6%	53,0%	59,7%	60,4%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	14,0%	11,0%	11,3%	10,3%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	31,2%	34,6%	25,3%	26,8%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	3,2%	1,4%	3,8%	2,5%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	38,2%	24,1%	38,2%	42,0%
Oui parfois	17,6%	19,8%	16,1%	17,0%
Oui souvent	44,2%	56,2%	45,7%	41,1%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	38,2%	24,1%	38,2%	42,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	25,5%	24,6%	21,5%	19,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	30,3%	44,7%	34,9%	32,4%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	6,0%	6,6%	5,4%	6,2%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=470	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=350	Q. Santé humaine et action sociale n=189	Base Everest région n=1806
Produits chimiques	34,4%	22,8%	24,5%	25,8%
Poussières, fumées	50,2%	24,2%	14,5%	35,4%
Rx ionisants	2,8%	0,6%	4,3%	2,7%
Vibrations	26,0%	9,6%	4,3%	19,9%
Gêne sonore	58,9%	28,4%	22,0%	41,0%
Bruit > 80db	47,3%	15,3%	2,2%	24,1%
Contrainte visuelle	37,4%	25,2%	19,5%	34,7%
Conduite routière prolongée	8,4%	12,4%	7,6%	15,2%
Chaleur intense	24,7%	8,0%	14,0%	16,2%
Froid intense	14,2%	14,5%	2,2%	10,8%
Intempéries	7,5%	8,3%	3,8%	14,7%
Pression psychologique	20,4%	19,2%	32,1%	22,5%
Agent biologique	2,4%	3,2%	39,0%	9,4%
Contact avec le public	32,7%	84,1%	88,7%	66,0%

Formation	C. Industrie manufacturière n=470	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=350	Q. Santé humaine et action sociale n=189	Base Everest région n=1806
A bénéficié d'une formation depuis un an	38,7%	43,0%	49,5%	42,3%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	88,7%	89,6%	81,7%	88,6%
- En rapport avec le travail futur	15,2%	17,1%	12,5%	14,6%
- Formation d'intérêt général	52,5%	39,3%	51,7%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	26,0%	29,1%	22,5%	26,1%

Mode de vie	C. Industrie manufacturière n=470	G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles n=350	Q. Santé humaine et action sociale n=189	Base Everest région n=1806
Activité sportive régulière	46,4%	48,2%	46,1%	46,3%
Consommation de tabac	38,0%	34,7%	31,2%	36,7%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	7,6%	9,3%	5,8%	8,4%
Consommation de café	80,2%	78,4%	75,1%	78,9%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	15,5%	16,4%	13,0%	14,7%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,1%	14,2%	14,0%	13,2%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n=267	≥45 ans n=203	Ensemble n=470	<45 ans n=240	≥45 ans n=110	Ensemble n=350	<45 ans n=94*	≥45 ans n=95*	Ensemble n=189	<45 ans n=1094	≥45 ans n=712	Global n=1806
Indice de masse corporelle												
- Normaux / maigres	55,3%	38,4%	48,1%	65,2%	44,9%	58,8%	63,4%	55,8%	59,8%	60,0%	42,6%	53,2%
- Surpoids	30,8%	41,1%	35,2%	24,8%	38,3%	29,1%	21,5%	27,9%	24,6%	27,1%	38,5%	31,6%
- Obèses	13,8%	20,5%	16,7%	10,0%	16,8%	12,2%	15,1%	16,3%	15,6%	12,9%	18,9%	15,2%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	7,3%	6,1%	6,7%	4,7%	6,5%	5,3%	4,3%	6,6%	5,4%	4,7%	5,6%	5,0%
Plaintes ou signes cliniques	6,5%	6,1%	6,3%	3,9%	5,6%	4,4%	4,3%	6,6%	5,4%	4,3%	5,5%	4,8%
Gêne dans le travail	0,8%	1,0%	0,9%	0,4%	0,9%	0,6%	1,1%	1,1%	1,1%	0,9%	1,6%	1,2%
TraITEMENT ou autre soin	4,2%	2,5%	3,5%	3,4%	4,7%	3,8%	3,2%	1,1%	2,2%	3,0%	2,9%	2,9%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	3,1%	9,2%	5,7%	1,3%	5,6%	2,7%	2,2%	7,7%	4,9%	1,6%	7,2%	3,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	9,2%	5,5%	1,3%	3,7%	2,1%	2,2%	6,6%	4,4%	1,5%	6,5%	3,5%
Gêne dans le travail	0,4%	3,1%	1,5%	0,4%	1,9%	0,9%	1,1%	0,0%	0,5%	0,3%	1,3%	0,7%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	5,1%	2,8%	0,9%	1,9%	1,2%	0,0%	3,3%	1,6%	0,7%	4,2%	2,0%
HTA												
Existence d'un problème	3,8%	15,2%	8,8%	3,9%	21,0%	9,2%	5,4%	16,5%	10,9%	4,0%	16,4%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	11,7%	6,8%	3,5%	18,3%	8,1%	3,3%	15,4%	9,3%	3,2%	14,1%	7,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,0%	0,6%	0,0%	3,3%	1,6%	0,1%	0,6%	0,3%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	10,2%	5,5%	1,3%	10,5%	4,2%	3,2%	13,2%	8,2%	1,5%	11,2%	5,3%
Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	17,2%	23,1%	19,7%	21,1%	26,2%	22,7%	25,0%	33,0%	29,0%	18,4%	24,1%	20,6%
Plaintes ou signes cliniques	16,9%	23,1%	19,5%	20,4%	25,2%	22,0%	25,0%	33,0%	29,0%	18,1%	23,5%	20,3%
Gêne dans le travail	7,8%	11,8%	9,5%	7,4%	10,4%	8,3%	5,4%	17,6%	11,5%	7,3%	11,5%	9,0%
TraITEMENT ou autre soin	2,0%	3,6%	2,7%	3,0%	0,9%	2,4%	1,1%	6,7%	3,8%	2,3%	2,8%	2,5%
Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	14,2%	25,5%	19,0%	21,3%	30,5%	24,2%	25,0%	31,1%	28,0%	19,6%	27,7%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	13,5%	25,0%	18,4%	21,0%	29,5%	23,7%	25,0%	31,1%	28,0%	19,4%	27,0%	22,4%
Gêne dans le travail	5,4%	11,3%	7,9%	5,7%	17,1%	9,3%	7,6%	16,7%	12,1%	7,1%	12,3%	9,1%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	6,7%	4,0%	3,1%	3,9%	3,3%	3,3%	7,8%	5,5%	2,9%	5,9%	4,1%
Troubles du sommeil												
Existence d'un problème	16,3%	25,0%	20,0%	17,7%	25,2%	20,1%	23,9%	30,7%	27,2%	17,0%	24,4%	19,9%
Plaintes ou signes cliniques	16,3%	24,5%	19,8%	15,4%	24,5%	18,3%	23,9%	28,7%	26,3%	16,1%	23,2%	18,9%
Gêne dans le travail	7,0%	8,3%	7,6%	4,8%	7,5%	5,7%	9,9%	9,1%	9,5%	6,7%	7,8%	7,1%
TraITEMENT ou autre soin	1,6%	8,4%	4,5%	3,5%	4,7%	3,9%	4,3%	11,4%	7,8%	2,7%	6,5%	4,2%
➤ Troubles neuro-psychiques												
(les 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	5,4%	11,7%	8,1%	5,6%	8,4%	6,5%	7,6%	12,2%	9,9%	5,4%	10,0%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	11,7%	7,9%	4,4%	7,5%	5,4%	7,6%	11,2%	9,4%	5,0%	9,3%	6,7%
Gêne dans le travail	1,9%	3,6%	2,6%	1,3%	2,8%	1,8%	3,3%	5,5%	4,4%	1,6%	3,5%	2,3%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	2,5%	1,5%	0,9%	0,0%	0,6%	1,1%	4,4%	2,7%	0,7%	1,9%	1,1%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n=267	≥45 ans n=203	Ensemble n=470	<45 ans n=240	≥45 ans n=110	Ensemble n=350	<45 ans n=94*	≥45 ans n=95*	Ensemble n=189	<45 ans n=1094	≥45 ans n=712	Global n=1806
Digestif												
Existence d'un problème	7,0%	8,3%	7,6%	7,0%	7,7%	7,2%	9,8%	16,1%	12,8%	6,6%	10,4%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	8,3%	7,3%	7,0%	6,7%	6,9%	9,8%	16,1%	12,8%	6,5%	10,3%	8,0%
Gêne dans le travail	2,3%	0,5%	1,6%	0,9%	1,9%	1,2%	1,1%	8,0%	4,5%	1,5%	2,4%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	3,1%	4,7%	3,8%	3,1%	4,8%	3,6%	3,3%	6,9%	5,0%	2,7%	5,5%	3,8%
Dermatologie												
Existence d'un problème	5,4%	8,1%	6,6%	7,0%	7,5%	7,1%	7,6%	4,4%	6,0%	6,4%	6,8%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	7,1%	6,2%	5,8%	7,5%	6,3%	6,6%	4,4%	5,5%	5,9%	6,5%	6,1%
Gêne dans le travail	0,0%	2,0%	0,9%	0,4%	0,0%	0,3%	1,1%	1,1%	1,1%	0,8%	1,2%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,2%	3,6%	2,2%	3,1%	3,7%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,1%	3,8%	3,4%
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	4,7%	20,4%	11,5%	3,1%	15,0%	6,9%	5,6%	5,5%	5,5%	3,7%	13,8%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	20,0%	11,3%	3,1%	14,0%	6,6%	5,6%	5,5%	5,5%	3,6%	13,5%	7,5%
Gêne dans le travail	1,2%	3,7%	2,3%	0,0%	2,8%	0,9%	2,2%	3,3%	2,8%	0,9%	3,4%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	0,4%	2,6%	1,4%	0,4%	1,9%	0,9%	1,1%	2,2%	1,7%	0,5%	2,5%	1,3%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Existence d'un problème	8,8%	20,2%	13,7%	10,8%	25,5%	15,4%	6,5%	23,3%	14,8%	7,7%	18,1%	11,8%
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	19,8%	13,5%	10,8%	25,5%	15,4%	6,5%	23,3%	14,8%	7,7%	17,8%	11,6%
Gêne dans le travail	3,5%	9,1%	5,9%	4,7%	17,0%	8,6%	3,2%	17,8%	10,4%	3,3%	10,6%	6,1%
TraITEMENT ou autre soin	1,5%	6,6%	3,7%	3,0%	9,5%	5,0%	3,2%	9,0%	6,0%	2,0%	6,4%	3,7%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Existence d'un problème	7,7%	8,1%	7,9%	6,0%	9,3%	7,1%	3,2%	7,8%	5,5%	4,6%	8,4%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,7%	7,6%	7,6%	6,0%	9,3%	7,1%	3,2%	7,8%	5,5%	4,6%	8,0%	5,9%
Gêne dans le travail	5,0%	5,1%	5,0%	4,3%	7,5%	5,3%	1,1%	4,4%	2,7%	2,8%	5,8%	4,0%
TraITEMENT ou autre soin	2,7%	2,0%	2,4%	2,2%	6,5%	3,5%	1,1%	1,1%	1,1%	1,6%	3,2%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Existence d'un problème	10,3%	14,2%	12,0%	9,9%	15,0%	11,5%	4,3%	23,3%	13,7%	8,7%	14,8%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	10,3%	13,7%	11,8%	9,5%	14,2%	10,9%	4,3%	23,3%	13,7%	8,6%	14,4%	10,8%
Gêne dans le travail	6,9%	5,1%	6,1%	5,6%	8,5%	6,5%	1,1%	19,1%	9,9%	4,8%	8,7%	6,4%
TraITEMENT ou autre soin	3,4%	4,1%	3,7%	3,0%	5,7%	3,9%	0,0%	14,6%	7,1%	2,6%	6,0%	3,9%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	19,9%	31,0%	24,7%	19,8%	32,7%	23,9%	10,8%	34,8%	22,5%	17,0%	29,3%	21,8%
Plaintes ou signes cliniques	19,9%	31,0%	24,7%	19,5%	32,7%	23,7%	10,8%	34,8%	22,5%	16,8%	29,2%	21,7%
Gêne dans le travail	12,0%	15,7%	13,6%	10,4%	23,4%	14,5%	4,3%	29,2%	16,5%	8,8%	19,2%	12,9%
TraITEMENT ou autre soin	6,2%	9,8%	7,7%	5,7%	13,3%	8,1%	4,3%	21,3%	12,6%	5,2%	12,1%	7,9%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Base Everest région		
	<45 ans n=267	≥45 ans n=203	Ensemble n=470	<45 ans n=240	≥45 ans n=110	Ensemble n=350	<45 ans n=94*	≥45 ans n=95*	Ensemble n=189	<45 ans n=1094	≥45 ans n=712	Global n=1806
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	13,8%	21,2%	17,0%	10,0%	24,0%	14,3%	8,6%	22,5%	15,4%	10,2%	20,0%	14,0%
Plaintes ou signes cliniques	13,5%	21,2%	16,8%	10,0%	24,0%	14,3%	8,6%	21,3%	14,8%	10,1%	19,7%	13,8%
Gêne dans le travail	6,6%	10,1%	8,1%	3,0%	11,7%	5,7%	4,3%	17,0%	10,6%	4,4%	11,4%	7,1%
TraITEMENT ou autre soin	3,9%	7,1%	5,3%	3,5%	10,6%	5,7%	2,2%	13,8%	7,8%	2,9%	8,8%	5,2%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	12,0%	18,9%	14,9%	10,8%	18,7%	13,3%	15,2%	31,1%	23,1%	9,9%	17,2%	12,8%
Plaintes ou signes cliniques	12,0%	18,9%	14,9%	10,8%	18,7%	13,3%	15,2%	31,1%	23,1%	9,9%	17,2%	12,8%
Gêne dans le travail	5,8%	11,2%	8,1%	6,9%	13,1%	8,9%	5,4%	20,0%	12,6%	4,5%	11,2%	7,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,7%	6,2%	4,2%	3,5%	9,6%	5,4%	3,3%	10,0%	6,6%	2,4%	6,4%	4,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires												
Existence d'un problème	20,5%	27,8%	23,7%	25,2%	39,0%	29,6%	23,7%	34,4%	29,0%	19,8%	28,9%	23,4%
Plaintes ou signes cliniques	20,2%	26,9%	23,1%	25,2%	39,0%	29,6%	23,7%	33,7%	28,6%	19,7%	28,3%	23,1%
Gêne dans le travail	11,3%	17,5%	14,0%	14,8%	21,0%	16,7%	15,1%	27,8%	21,3%	10,7%	18,0%	13,5%
TraITEMENT ou autre soin	4,7%	9,3%	6,7%	5,7%	15,4%	8,7%	7,5%	18,9%	13,1%	4,9%	12,1%	7,7%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	26,0%	36,6%	30,5%	28,4%	45,7%	33,8%	25,8%	42,2%	33,9%	23,8%	35,1%	28,2%
Plaintes ou signes cliniques	25,7%	36,1%	30,2%	28,4%	45,7%	33,8%	25,8%	41,6%	33,5%	23,7%	34,7%	28,0%
Gêne dans le travail	14,0%	21,8%	17,3%	17,9%	25,7%	20,4%	15,1%	31,1%	23,0%	12,5%	21,7%	16,1%
TraITEMENT ou autre soin	6,3%	12,1%	8,7%	7,5%	18,6%	10,9%	7,6%	18,9%	13,2%	6,2%	13,6%	9,1%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence