



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2011-2012

Région Centre

Juillet 2013

(corrigé en octobre 2013)

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2011-2012 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Centre

L'exploitation des données de la région Centre a porté sur **1 402** remplies par les salariés et leurs médecins en 2011 (n=762) et 2012 (n=640).

Au niveau de la région Centre, l'échantillon des salariés Everest semble plus proche du champ des salariés du privé seul (données ACOSS) (tout du moins en ce qui concerne les secteurs d'activité représentés), que du champ des salariés des DADS, comprenant les secteurs publics et privés (tableau 1). Par rapport aux données ACOSS, l'échantillon Everest surreprésente le secteur de l'Industrie, au détriment du secteur de la Construction.

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 2 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Commerce - réparations d'automobile et de motocycles (tableau 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Centre 2011-2012 aux données INSEE (DADS 2010) et ACOSS (2011).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Centre 2011-2012 (n=1 402)	Données INSEE 2010 (DADS)	Données ACOSS 2011
	%	%	%
Sexe			
Hommes	55,1	50,8	-
Femmes	44,9	49,2	-
Age			
≤ 24 ans	7,1	14,1	-
25-34 ans	24,6	22,9	-
35-44 ans	28,5	25,2	-
45- 54 ans	29,2	25,1	-
55 ans et plus	10,6	12,7	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,4	0,6	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	11,7	11,4	-
Professions intermédiaires	23,9	20,0	-
Employés	28,3	37,5	-
Ouvriers	35,7	30,6	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,0	0,0%
Industrie	29,1	17,0	24,1%
Construction	5,1	7,0	9,5%
Commerce	16,1	12,9	16,7%
Services	49,7	63,1	49,7%

- : informations non disponibles

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Centre 2011-2012 selon les catégories socioprofessionnelles.

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	5	0,4
Cadres et professions intellectuelles supérieures	164	11,7
Professions intermédiaires	335	23,9
Employés	397	28,3
Ouvriers	501	35,7
Total général	1 402	100,0

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Centre 2011-2012 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	0	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
INDUSTRIE	408	29,1
B. Industries extractives	3	0,2
C. Industrie manufacturière	277	19,8
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	123	8,8
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	5	0,4
CONSTRUCTION	72	5,1
F. Construction	72	5,1
COMMERCE	226	16,1
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	226	16,1
SERVICES	696	49,7
H. Transports et entreposage	105	7,5
I. Hébergement et restauration	32	2,3
J. Information et communication	43	3,1
K. Activités financières et d'assurance	73	5,2
L. Activités immobilières	20	1,4
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	52	3,7
N. Activités de services administratifs et de soutien	113	8,1
O. Administration publique	41	2,9
P. Enseignement	14	1,0
Q. Santé humaine et action sociale	153	10,9
R. Arts, spectacles et activités récréatives	9	0,6
S. Autres activités de services	39	2,8
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	2	0,1
Total général	1 402	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=772	Femmes n=630	Ensemble n=1402
≤24ans	8,2%	5,9%	7,1%
25-34ans	25,4%	23,7%	24,6%
35-44ans	29,9%	26,8%	28,5%
45-54ans	27,8%	30,8%	29,2%
55 ans et plus	8,7%	12,9%	10,6%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,5%	0,2%	0,4%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	14,6%	8,1%	11,7%
Professions intermédiaires	25,5%	21,9%	23,9%
Employés	8,9%	52,1%	28,3%
Ouvriers	50,4%	17,8%	35,7%
C. Industrie manufacturière	22,7%	16,2%	19,8%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	13,3%	3,2%	8,8%
F. Construction	8,5%	1,0%	5,1%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	16,1%	16,2%	16,1%
H. Transports et entreposage	11,5%	2,5%	7,5%
I. Hébergement et restauration	1,4%	3,3%	2,3%
J. Information et communication	3,2%	2,9%	3,1%
K. Activités financières et d'assurance	2,2%	8,9%	5,2%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2,8%	4,8%	3,7%
N. Activités de services administratifs et de soutien	7,6%	8,6%	8,1%
O. Administration publique	1,2%	5,1%	2,9%
Q. Santé humaine et action sociale	4,0%	19,4%	10,9%
S. Autres activités de services	1,7%	4,1%	2,8%

Conditions de travail	Hommes n=772	Femmes n=630	Ensemble n=1402
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	86,4%	89,5%	87,8%
Oui, raison médicale	0,7%	0,2%	0,4%
Oui, autre raison	12,3%	9,3%	10,9%
Oui, raison non précisée	0,7%	1,1%	0,9%
Travail à temps plein	95,9%	76,3%	87,1%
Travail en journée normale	76,6%	78,6%	77,5%
Coupures de plus de 2 heures	12,7%	13,2%	12,9%
Horaires décalés	29,1%	22,6%	26,2%
Horaires irréguliers ou alternés	26,4%	21,9%	24,4%
Travail de nuit	14,6%	6,7%	11,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	10,3%	3,1%	7,0%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	15,7%	26,0%	20,3%
Rarement	47,1%	42,9%	45,2%
Assez souvent	26,8%	22,6%	24,9%
Très souvent	10,4%	8,5%	9,5%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	47,5%	58,5%	52,4%
Rarement	34,8%	25,1%	30,4%
Assez souvent	12,6%	11,7%	12,2%
Très souvent	5,1%	4,8%	5,0%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	37,4%	40,3%	38,7%
Rarement	38,0%	33,8%	36,1%
Assez souvent	18,4%	20,1%	19,1%
Très souvent	6,2%	5,8%	6,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	4,6%	3,7%	4,2%
1	3,9%	4,8%	4,3%
2	8,7%	9,8%	9,2%
3	11,7%	11,5%	11,6%
4	10,6%	12,2%	11,3%
5	24,1%	17,6%	21,2%
6	11,7%	13,4%	12,5%
7	14,1%	15,0%	14,5%
8	7,6%	8,8%	8,1%
9	1,7%	1,8%	1,7%
10	1,3%	1,4%	1,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	36,4%	40,5%	38,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	52,4%	55,0%	53,6%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	59,3%	58,7%	59,1%
- Aspect positif du travail	42,6%	37,7%	40,4%

Appréciations sur le travail	Hommes n=772	Femmes n=630	Ensemble n=1402
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	8,6%	6,8%	7,8%
Plutôt non	12,7%	14,6%	13,6%
Plutôt oui	41,9%	40,5%	41,3%
Oui tout à fait	36,8%	38,0%	37,3%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,7%	4,3%	4,5%
Plutôt non	12,2%	11,9%	12,1%
Plutôt oui	41,3%	36,6%	39,2%
Oui tout à fait	41,8%	47,2%	44,2%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	8,7%	9,1%	8,9%
Plutôt non	16,0%	18,2%	17,0%
Plutôt oui	41,6%	38,1%	40,0%
Oui tout à fait	33,8%	34,7%	34,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,8%	4,1%	3,9%
Plutôt non	10,8%	13,1%	11,8%
Plutôt oui	51,0%	50,9%	51,0%
Oui tout à fait	34,4%	31,9%	33,3%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,5%	2,4%	1,9%
Plutôt non	11,6%	13,8%	12,6%
Plutôt oui	52,1%	52,6%	52,3%
Oui tout à fait	34,9%	31,2%	33,2%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	4,8%	4,2%	4,5%
Plutôt non	16,3%	20,0%	18,0%
Plutôt oui	50,0%	48,7%	49,4%
Oui tout à fait	28,9%	27,1%	28,1%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	31,7%	35,8%	33,6%
Plutôt non	43,9%	40,1%	42,2%
Plutôt oui	20,0%	21,2%	20,5%
Oui tout à fait	4,4%	2,9%	3,7%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	61,0%	66,8%	63,6%
Plutôt non	25,5%	21,6%	23,7%
Plutôt oui	11,0%	8,5%	9,9%
Oui tout à fait	2,5%	3,1%	2,8%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=772	Femmes n=630	Ensemble n=1402
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	44,7%	53,5%	48,6%
Oui parfois	35,2%	27,2%	31,6%
Oui souvent	20,1%	19,3%	19,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	44,7%	53,5%	48,6%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	28,4%	24,7%	26,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	25,5%	19,7%	22,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	1,4%	2,1%	1,7%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	48,6%	60,3%	53,8%
Oui parfois	35,4%	24,2%	30,4%
Oui souvent	16,0%	15,5%	15,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	48,6%	60,3%	53,8%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	26,8%	23,4%	25,3%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	23,7%	14,1%	19,4%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,8%	2,2%	1,4%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	45,7%	39,1%	42,7%
Oui parfois	22,3%	20,6%	21,5%
Oui souvent	31,9%	40,4%	35,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	45,7%	39,1%	42,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	18,3%	23,1%	20,5%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	33,4%	35,1%	34,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,6%	2,7%	2,6%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	53,3%	72,3%	61,8%
Oui parfois	21,7%	10,8%	16,8%
Oui souvent	25,0%	16,9%	21,3%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	53,3%	72,3%	61,8%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	9,9%	7,2%	8,7%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	35,2%	18,9%	27,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,6%	1,6%	1,6%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	39,7%	51,6%	45,0%
Oui parfois	23,6%	12,5%	18,6%
Oui souvent	36,7%	35,9%	36,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	39,7%	51,6%	45,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	16,9%	16,8%	16,9%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	38,5%	26,4%	33,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	4,8%	5,1%	5,0%

Expositions	Hommes n=772	Femmes n=630	Ensemble n=1402
Produits chimiques	33,4%	20,7%	27,7%
Poussières, fumées	46,4%	17,1%	33,2%
Rx ionisants	7,7%	2,7%	5,5%
Vibrations	35,9%	5,3%	22,1%
Gêne sonore	48,6%	26,0%	38,4%
Bruit > 80db	36,5%	8,9%	24,2%
Contrainte visuelle	34,0%	33,4%	33,7%
Conduite routière prolongée	19,8%	4,8%	13,1%
Chaleur intense	18,5%	11,0%	15,1%
Froid intense	15,0%	6,4%	11,1%
Intempéries	20,0%	3,9%	12,8%
Pression psychologique	25,1%	25,5%	25,3%
Agent biologique	8,1%	12,5%	10,1%
Contact avec le public	51,6%	62,8%	56,7%

Formation	Hommes n=772	Femmes n=630	Ensemble n=1402
A bénéficié d'une formation depuis un an	50,3%	43,9%	47,5%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	90,9%	87,5%	89,5%
- En rapport avec le travail futur	13,8%	10,5%	12,5%
- Formation d'intérêt général	44,5%	43,8%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	29,0%	26,3%	27,8%

Mode de vie	Hommes n=772	Femmes n=630	Ensemble n=1402
Activité sportive régulière	49,5%	43,1%	46,6%
Consommation de tabac	38,8%	28,6%	34,3%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	10,2%	5,5%	8,1%
Consommation de café	84,5%	69,9%	77,9%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	18,7%	11,2%	15,3%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	12,3%	13,6%	12,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1402
	Hommes n=490	Femmes n=355	Ensemble n=845	Hommes n=282	Femmes n=275	Ensemble n=557	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	54,8%	62,9%	58,2%	36,2%	52,1%	44,0%	52,6%
- Surpoids	30,8%	23,8%	27,9%	45,7%	27,7%	36,8%	31,4%
- Obèses	14,4%	13,3%	13,9%	18,1%	20,2%	19,2%	16,0%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	3,1%	3,7%	3,4%	6,8%	4,1%	5,5%	4,2%
Plaîntes ou signes cliniques	3,1%	3,1%	3,1%	6,1%	4,1%	5,1%	3,9%
Gêne dans le travail	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,4%	0,5%	0,6%
Traitemennt ou autre soin	1,5%	2,3%	1,8%	2,2%	3,3%	2,7%	2,2%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	1,9%	2,8%	2,3%	2,9%	4,8%	3,8%	2,9%
Plaîntes ou signes cliniques	1,7%	2,8%	2,2%	2,5%	3,3%	2,9%	2,5%
Gêne dans le travail	0,2%	0,9%	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%
Traitemennt ou autre soin	1,0%	1,1%	1,1%	2,5%	3,3%	2,9%	1,8%
HTA							
Existence d'un problème	5,2%	4,9%	5,1%	20,8%	14,4%	17,7%	10,1%
Plaîntes ou signes cliniques	4,6%	3,8%	4,2%	17,9%	10,4%	14,2%	8,2%
Gêne dans le travail	0,8%	0,3%	0,6%	0,4%	0,7%	0,5%	0,6%
Traitemennt ou autre soin	1,9%	4,6%	3,0%	14,1%	12,6%	13,4%	7,2%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	15,3%	24,6%	19,2%	15,4%	27,7%	21,5%	20,1%
Plaîntes ou signes cliniques	15,1%	24,1%	18,9%	15,4%	27,4%	21,3%	19,8%
Gêne dans le travail	5,8%	12,1%	8,4%	8,6%	12,7%	10,6%	9,3%
Traitemennt ou autre soin	1,0%	3,5%	2,1%	2,2%	3,4%	2,7%	2,3%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	16,4%	19,3%	17,6%	22,7%	26,2%	24,4%	20,3%
Plaîntes ou signes cliniques	16,2%	18,7%	17,2%	21,9%	25,6%	23,7%	19,8%
Gêne dans le travail	6,0%	7,5%	6,6%	8,7%	10,7%	9,7%	7,8%
Traitemennt ou autre soin	1,2%	4,6%	2,7%	4,7%	8,6%	6,6%	4,2%
Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	11,5%	19,2%	14,8%	18,7%	29,5%	24,0%	18,5%
Plaîntes ou signes cliniques	10,7%	18,7%	14,1%	17,8%	28,6%	23,1%	17,7%
Gêne dans le travail	5,0%	8,4%	6,4%	7,9%	10,4%	9,1%	7,5%
Traitemennt ou autre soin	1,5%	3,7%	2,4%	5,0%	7,7%	6,4%	4,0%
➤ Troubles neuro psychiques <i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	3,5%	7,8%	5,3%	5,4%	11,1%	8,2%	6,4%
Plaîntes ou signes cliniques	3,1%	7,5%	4,9%	5,1%	10,4%	7,7%	6,0%
Gêne dans le travail	1,9%	2,9%	2,3%	2,9%	2,2%	2,6%	2,4%
Traitemennt ou autre soin	0,0%	0,6%	0,2%	0,7%	1,1%	0,9%	0,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1402
	Hommes n=490	Femmes n=355	Ensemble n=845	Hommes n=282	Femmes n=275	Ensemble n=557	
Digestif							
Existence d'un problème	4,7%	6,4%	5,4%	8,1%	8,8%	8,5%	6,6%
plaintes ou signes cliniques	4,2%	6,1%	5,0%	7,8%	8,1%	8,0%	6,2%
Gêne dans le travail	1,3%	1,2%	1,2%	0,7%	1,2%	0,9%	1,1%
Traitements ou autre soin	1,3%	2,6%	1,8%	2,2%	3,9%	3,0%	2,3%
Dermatologie							
Existence d'un problème	4,6%	6,0%	5,2%	6,5%	7,1%	6,8%	5,8%
plaintes ou signes cliniques	4,6%	5,7%	5,1%	6,2%	7,1%	6,6%	5,7%
Gêne dans le travail	0,6%	0,9%	0,7%	1,1%	1,5%	1,3%	0,9%
Traitements ou autre soin	2,1%	2,6%	2,3%	2,2%	4,1%	3,1%	2,6%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	6,3%	2,0%	4,5%	13,7%	5,7%	9,8%	6,6%
plaintes ou signes cliniques	6,1%	1,7%	4,3%	13,4%	5,7%	9,6%	6,4%
Gêne dans le travail	1,0%	0,6%	0,8%	2,5%	2,6%	2,6%	1,5%
Traitements ou autre soin	0,2%	0,0%	0,1%	2,2%	1,5%	1,9%	0,8%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	5,8%	9,5%	7,3%	11,5%	18,8%	15,1%	10,4%
plaintes ou signes cliniques	5,8%	9,5%	7,3%	11,5%	18,8%	15,1%	10,4%
Gêne dans le travail	2,5%	4,3%	3,2%	5,0%	10,0%	7,5%	4,9%
Traitements ou autre soin	1,0%	2,3%	1,6%	4,3%	5,9%	5,1%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	2,5%	4,0%	3,1%	9,0%	7,0%	8,0%	5,1%
plaintes ou signes cliniques	2,3%	4,0%	3,0%	8,3%	7,0%	7,7%	4,9%
Gêne dans le travail	1,7%	2,6%	2,0%	4,7%	3,7%	4,2%	2,9%
Traitements ou autre soin	0,4%	1,7%	1,0%	4,7%	3,3%	4,0%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	4,1%	8,0%	5,8%	5,0%	15,6%	10,2%	7,5%
plaintes ou signes cliniques	4,1%	8,0%	5,8%	5,0%	15,6%	10,2%	7,5%
Gêne dans le travail	2,5%	5,5%	3,7%	3,2%	9,7%	6,4%	4,8%
Traitements ou autre soin	1,0%	2,3%	1,6%	1,4%	4,9%	3,1%	2,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	11,0%	16,4%	13,3%	20,0%	30,0%	25,0%	17,9%
plaintes ou signes cliniques	11,0%	16,4%	13,3%	19,6%	30,0%	24,8%	17,8%
Gêne dans le travail	5,6%	9,8%	7,4%	9,5%	18,2%	13,8%	9,9%
Traitements ou autre soin	2,5%	4,0%	3,1%	8,8%	11,7%	10,2%	5,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1402
	Hommes n=490	Femmes n=355	Ensemble n=845	Hommes n=282	Femmes n=275	Ensemble n=557	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	6,6%	8,9%	7,6%	11,4%	12,5%	12,0%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	8,9%	7,6%	11,4%	12,5%	12,0%	9,3%
Gêne dans le travail	3,3%	4,6%	3,9%	8,2%	5,9%	7,1%	5,2%
Traitements ou autre soin	1,5%	2,3%	1,8%	4,6%	4,8%	4,7%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	6,4%	9,8%	7,8%	9,0%	14,0%	11,5%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	9,8%	7,8%	8,6%	14,0%	11,3%	9,2%
Gêne dans le travail	2,5%	6,9%	4,3%	4,3%	8,9%	6,6%	5,2%
Traitements ou autre soin	2,1%	4,0%	2,9%	3,6%	7,4%	5,5%	3,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	17,7%	14,2%	16,2%	24,9%	21,2%	23,1%	19,0%
Plaintes ou signes cliniques	17,2%	13,7%	15,7%	24,9%	20,6%	22,8%	18,5%
Gêne dans le travail	9,6%	8,4%	9,1%	14,5%	12,3%	13,4%	10,8%
Traitements ou autre soin	5,4%	4,4%	5,0%	9,8%	10,1%	9,9%	7,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	20,8%	19,1%	20,1%	29,0%	27,7%	28,3%	23,4%
Plaintes ou signes cliniques	20,5%	18,6%	19,7%	29,0%	27,1%	28,1%	23,0%
Gêne dans le travail	10,4%	11,9%	11,0%	16,0%	17,1%	16,5%	13,2%
Traitements ou autre soin	6,5%	6,7%	6,6%	11,6%	14,5%	13,1%	9,2%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Intermédiaires n=335	Employés n=397	Ouvriers n=501	Base Everest région n=1402
Répartition homme/femme	58,8% / 41,2%	17,4% / 82,6%	77,6% / 22,4%	55,1% / 44,9%
≤24ans	5,1%	8,6%	9,6%	7,1%
25-34ans	30,4%	25,2%	23,0%	24,6%
35-44ans	28,1%	26,4%	28,7%	28,5%
45-54ans	28,7%	28,2%	27,9%	29,2%
55 ans et plus	7,8%	11,6%	10,8%	10,6%
C. Industrie manufacturière	16,4%	6,8%	34,7%	19,8%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	21,5%	1,0%	3,6%	8,8%
F. Construction	1,8%	1,5%	10,4%	5,1%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	13,1%	23,9%	13,4%	16,1%
H. Transports et entreposage	4,8%	3,5%	14,2%	7,5%
I. Hébergement et restauration	0,9%	4,5%	1,8%	2,3%
J. Information et communication	3,9%	0,8%	0,4%	3,1%
K. Activités financières et d'assurance	3,9%	9,1%	0,0%	5,2%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	6,0%	3,8%	1,0%	3,7%
N. Activités de services administratifs et de soutien	2,1%	8,3%	13,4%	8,1%
O. Administration publique	3,9%	4,8%	0,8%	2,9%
Q. Santé humaine et action sociale	12,5%	22,2%	3,8%	10,9%
S. Autres activités de services	3,3%	4,5%	1,2%	2,8%

Conditions de travail	Intermédiaires n=335	Employés n=397	Ouvriers n=501	Base Everest région n=1402
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	87,7%	88,6%	87,5%	87,8%
Oui, raison médicale	0,6%	0,0%	0,8%	0,4%
Oui, autre raison	11,4%	10,4%	11,1%	10,9%
Oui, raison non précisée	0,3%	1,0%	0,6%	0,9%
Travail à temps plein	86,2%	80,6%	91,5%	87,1%
Travail en journée normale	82,6%	78,7%	69,5%	77,5%
Coupures de plus de 2 heures	11,8%	15,0%	13,3%	12,9%
Horaires décalés	22,0%	22,4%	35,4%	26,2%
Horaires irréguliers ou alternés	25,0%	22,3%	28,6%	24,4%
Travail de nuit	12,8%	7,1%	15,0%	11,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	10,2%	2,1%	3,5%	7,0%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	9,9%	24,6%	29,3%	20,3%
Rarement	45,1%	50,0%	47,7%	45,2%
Assez souvent	31,0%	21,3%	18,2%	24,9%
Très souvent	14,0%	4,1%	4,8%	9,5%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	35,8%	63,8%	62,8%	52,4%
Rarement	41,3%	23,0%	24,4%	30,4%
Assez souvent	17,2%	9,9%	9,1%	12,2%
Très souvent	5,7%	3,3%	3,6%	5,0%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	28,1%	43,6%	49,1%	38,7%
Rarement	39,9%	33,2%	32,9%	36,1%
Assez souvent	26,3%	17,3%	12,7%	19,1%
Très souvent	5,7%	5,9%	5,3%	6,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	3,0%	4,8%	5,9%	4,2%
1	5,1%	4,1%	4,8%	4,3%
2	7,5%	10,9%	10,5%	9,2%
3	8,7%	11,7%	13,9%	11,6%
4	12,9%	9,4%	10,1%	11,3%
5	18,0%	21,3%	23,6%	21,2%
6	18,0%	13,2%	8,9%	12,5%
7	16,8%	12,9%	12,9%	14,5%
8	6,9%	9,6%	5,5%	8,1%
9	2,4%	1,0%	1,8%	1,7%
10	0,9%	1,0%	2,0%	1,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	44,9%	37,8%	31,1%	38,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	64,8%	53,2%	38,8%	53,6%
<i>Parmi eux :</i>				
- Perturbe le travail	70,6%	55,0%	51,6%	59,1%
- Aspect positif du travail	34,0%	41,0%	45,5%	40,4%

Appréciations sur le travail	Intermédiaires n=335	Employés n=397	Ouvriers n=501	Base Everest région n=1402
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	2,1%	6,3%	15,1%	7,8%
Plutôt non	10,4%	13,9%	17,5%	13,6%
Plutôt oui	42,1%	44,6%	38,2%	41,3%
Oui tout à fait	45,4%	35,3%	29,2%	37,3%
-Travail varié				
Non pas du tout	0,6%	5,3%	7,6%	4,5%
Plutôt non	9,3%	11,6%	17,0%	12,1%
Plutôt oui	40,3%	38,6%	40,5%	39,2%
Oui tout à fait	49,9%	44,4%	34,9%	44,2%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	3,3%	6,3%	17,2%	8,9%
Plutôt non	20,4%	16,7%	17,4%	17,0%
Plutôt oui	44,1%	41,9%	36,0%	40,0%
Oui tout à fait	32,1%	35,1%	29,4%	34,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	2,1%	2,8%	7,2%	3,9%
Plutôt non	12,7%	13,5%	9,8%	11,8%
Plutôt oui	55,7%	49,5%	47,8%	51,0%
Oui tout à fait	29,5%	34,3%	35,2%	33,3%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	1,2%	3,3%	1,6%	1,9%
Plutôt non	15,9%	11,0%	10,8%	12,6%
Plutôt oui	54,3%	53,1%	50,6%	52,3%
Oui tout à fait	28,7%	32,7%	37,0%	33,2%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	4,8%	3,6%	5,8%	4,5%
Plutôt non	22,4%	16,2%	17,9%	18,0%
Plutôt oui	47,7%	50,8%	48,0%	49,4%
Oui tout à fait	25,1%	29,4%	28,2%	28,1%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	25,5%	39,3%	37,1%	33,6%
Plutôt non	48,5%	39,0%	35,7%	42,2%
Plutôt oui	23,6%	18,6%	21,6%	20,5%
Oui tout à fait	2,4%	3,1%	5,5%	3,7%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	65,5%	69,1%	58,6%	63,6%
Plutôt non	25,8%	21,4%	23,3%	23,7%
Plutôt oui	7,3%	7,5%	13,7%	9,9%
Oui tout à fait	1,5%	2,1%	4,5%	2,8%

Charge physique du poste de travail	Intermédiaires n=335	Employés n=397	Ouvriers n=501	Base Everest région n=1402
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	59,7%	51,3%	27,3%	48,6%
Oui parfois	29,3%	29,5%	41,1%	31,6%
Oui souvent	11,0%	19,2%	31,7%	19,7%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	59,7%	51,3%	27,3%	48,6%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	18,2%	25,8%	39,9%	26,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	20,0%	21,0%	31,1%	22,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	2,1%	2,0%	1,8%	1,7%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	61,5%	58,6%	31,9%	53,8%
Oui parfois	31,9%	24,6%	41,6%	30,4%
Oui souvent	6,6%	16,8%	26,5%	15,8%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, port de charges lourdes	61,5%	58,6%	31,9%	53,8%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	17,6%	22,3%	40,6%	25,3%
Effort, port de charges lourdes, pas diff. / pénible	19,1%	16,8%	26,7%	19,4%
Effort, port de charges lourdes, diff. / pénible n.p.	1,8%	2,3%	0,8%	1,4%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	59,1%	39,2%	22,6%	42,7%
Oui parfois	19,4%	23,3%	23,4%	21,5%
Oui souvent	21,5%	37,5%	53,9%	35,7%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	59,1%	39,2%	22,6%	42,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	12,2%	21,3%	30,7%	20,5%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	26,6%	36,2%	43,7%	34,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,1%	3,3%	3,0%	2,6%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	62,3%	68,0%	51,6%	61,8%
Oui parfois	17,1%	11,3%	21,1%	16,8%
Oui souvent	20,7%	20,7%	27,3%	21,3%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	62,3%	68,0%	51,6%	61,8%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible	8,1%	8,1%	12,0%	8,7%
Importants dépl. à pieds, pas difficile ou pénible	29,0%	22,2%	34,7%	27,9%
Importants dépl. à pied, difficile ou pénible n.p.	0,6%	1,8%	1,6%	1,6%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	55,9%	50,1%	22,5%	45,0%
Oui parfois	20,7%	13,2%	21,9%	18,6%
Oui souvent	23,4%	36,7%	55,5%	36,4%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	55,9%	50,1%	22,5%	45,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	11,7%	14,9%	26,8%	16,9%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	30,3%	27,6%	44,9%	33,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	2,1%	7,3%	5,8%	5,0%

Expositions	Intermédiaires n=335	Employés n=397	Ouvriers n=501	Base Everest région n=1402
Produits chimiques	25,7%	21,5%	41,4%	27,7%
Poussières, fumées	22,5%	14,0%	62,3%	33,2%
Rx ionisants	11,9%	2,0%	2,2%	5,5%
Vibrations	15,5%	3,6%	46,1%	22,1%
Gêne sonore	35,0%	21,8%	59,8%	38,4%
Bruit > 80db	23,0%	4,9%	44,4%	24,2%
Contrainte visuelle	40,5%	29,0%	30,9%	33,7%
Conduite routière prolongée	12,6%	3,8%	18,3%	13,1%
Chaleur intense	17,7%	10,7%	20,3%	15,1%
Froid intense	10,1%	5,3%	19,1%	11,1%
Intempéries	12,7%	5,1%	21,6%	12,8%
Pression psychologique	32,9%	23,5%	19,8%	25,3%
Agent biologique	12,7%	14,3%	6,6%	10,1%
Contact avec le public	60,7%	76,8%	39,8%	56,7%

Formation	Intermédiaires n=335	Employés n=397	Ouvriers n=501	Base Everest région n=1402
A bénéficié d'une formation depuis un an	60,0%	41,8%	36,7%	47,5%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	89,9%	93,8%	84,1%	89,5%
- En rapport avec le travail futur	11,0%	8,6%	12,0%	12,5%
- Formation d'intérêt général	46,6%	39,2%	41,7%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	37,3%	23,0%	19,5%	27,8%

Mode de vie	Intermédiaires n=335	Employés n=397	Ouvriers n=501	Base Everest région n=1402
Activité sportive régulière	51,1%	43,4%	42,5%	46,6%
Consommation de tabac	29,3%	33,7%	43,2%	34,3%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	7,0%	7,7%	10,9%	8,1%
Consommation de café	75,6%	71,8%	82,0%	77,9%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	12,5%	15,0%	19,8%	15,3%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,2%	11,8%	12,3%	12,9%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=213	≥45 ans n=122	Ensemble n=335	<45 ans n=239	≥45 ans n=158	Ensemble n=397	<45 ans n=307	≥45 ans n=194	Ensemble n=501	<45 ans n=845	≥45 ans n=557	Global n=1402
Indice de masse corporelle												
- Normaux / maigres	62,5%	47,5%	57,0%	57,1%	50,0%	54,3%	54,8%	36,2%	47,7%	58,2%	44,0%	52,6%
- Surpoids	26,0%	30,0%	27,4%	26,8%	33,3%	29,5%	30,0%	42,2%	34,6%	27,9%	36,8%	31,4%
- Obèses	11,5%	22,5%	15,5%	16,0%	16,7%	16,3%	15,2%	21,6%	17,6%	13,9%	19,2%	16,0%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	1,4%	5,0%	2,7%	5,1%	3,2%	4,3%	3,7%	8,3%	5,5%	3,4%	5,5%	4,2%
Plautes ou signes cliniques	1,4%	4,2%	2,4%	4,2%	3,2%	3,8%	3,7%	7,9%	5,3%	3,1%	5,1%	3,9%
Gêne dans le travail	0,5%	0,0%	0,3%	0,4%	0,0%	0,3%	1,0%	1,6%	1,2%	0,6%	0,5%	0,6%
Traitemen ou autre soin	0,5%	2,5%	1,2%	3,0%	2,6%	2,8%	2,0%	4,2%	2,8%	1,8%	2,7%	2,2%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	2,8%	3,3%	3,0%	2,1%	3,8%	2,8%	2,3%	5,3%	3,5%	2,3%	3,8%	2,9%
Plautes ou signes cliniques	2,4%	3,3%	2,7%	2,1%	2,5%	2,3%	2,3%	3,7%	2,8%	2,2%	2,9%	2,5%
Gêne dans le travail	0,5%	0,8%	0,6%	0,8%	0,6%	0,8%	0,3%	1,1%	0,6%	0,5%	0,7%	0,6%
Traitemen ou autre soin	1,4%	3,3%	2,1%	0,4%	2,6%	1,3%	1,3%	3,7%	2,2%	1,1%	2,9%	1,8%
HTA												
Existence d'un problème	3,4%	18,9%	9,1%	5,1%	14,2%	8,7%	6,0%	23,6%	12,8%	5,1%	17,7%	10,1%
Plautes ou signes cliniques	2,9%	15,6%	7,6%	4,3%	10,3%	6,7%	4,7%	19,9%	10,6%	4,2%	14,2%	8,2%
Gêne dans le travail	1,0%	0,8%	0,9%	0,4%	1,3%	0,8%	0,3%	0,0%	0,2%	0,6%	0,5%	0,6%
Traitemen ou autre soin	2,4%	15,7%	7,3%	4,3%	12,9%	7,7%	3,0%	14,8%	7,6%	3,0%	13,4%	7,2%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=213	≥45 ans n=122	Ensemble n=335	<45 ans n=239	≥45 ans n=158	Ensemble n=397	<45 ans n=307	≥45 ans n=194	Ensemble n=501	<45 ans n=845	≥45 ans n=557	Global n=1402
Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	21,4%	24,8%	22,7%	22,1%	22,4%	22,3%	14,5%	21,4%	17,2%	19,2%	21,5%	20,1%
Plaintes ou signes cliniques	21,4%	24,2%	22,4%	21,3%	22,4%	21,7%	14,2%	21,4%	17,0%	18,9%	21,3%	19,8%
Gêne dans le travail	8,6%	10,1%	9,1%	11,5%	11,0%	11,3%	5,9%	12,5%	8,5%	8,4%	10,6%	9,3%
TraITEMENT ou autre soin	2,4%	2,5%	2,4%	3,0%	1,9%	2,6%	0,3%	3,1%	1,4%	2,1%	2,7%	2,3%
Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	18,6%	28,9%	22,4%	19,1%	26,3%	22,0%	14,6%	22,0%	17,4%	17,6%	24,4%	20,3%
Plaintes ou signes cliniques	18,2%	27,5%	21,6%	18,4%	25,6%	21,3%	14,6%	22,0%	17,4%	17,2%	23,7%	19,8%
Gêne dans le travail	6,7%	16,8%	10,4%	7,2%	9,6%	8,2%	5,6%	6,8%	6,1%	6,6%	9,7%	7,8%
TraITEMENT ou autre soin	2,9%	5,9%	4,0%	4,3%	10,3%	6,7%	1,3%	3,7%	2,2%	2,7%	6,6%	4,2%
Troubles du sommeil												
Existence d'un problème	14,3%	26,4%	18,7%	19,1%	26,9%	22,3%	12,0%	22,0%	15,9%	14,8%	24,0%	18,5%
Plaintes ou signes cliniques	13,4%	24,4%	17,4%	19,1%	26,9%	22,3%	11,1%	21,6%	15,2%	14,1%	23,1%	17,7%
Gêne dans le travail	5,7%	8,3%	6,7%	7,7%	10,9%	9,0%	5,7%	8,9%	6,9%	6,4%	9,1%	7,5%
TraITEMENT ou autre soin	2,9%	4,1%	3,3%	3,0%	9,6%	5,6%	1,3%	4,2%	2,4%	2,4%	6,4%	4,0%
➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	5,7%	8,3%	6,6%	6,0%	9,6%	7,4%	4,3%	8,9%	6,1%	5,3%	8,2%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,3%	6,7%	5,8%	6,0%	9,6%	7,4%	4,0%	8,9%	5,9%	4,9%	7,7%	6,0%
Gêne dans le travail	1,4%	2,5%	1,8%	3,0%	2,6%	2,8%	2,0%	2,6%	2,2%	2,3%	2,6%	2,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	0,8%	0,6%	0,4%	0,6%	0,5%	0,0%	0,5%	0,2%	0,2%	0,9%	0,5%
Digestif												
Existence d'un problème	6,2%	11,1%	8,0%	5,2%	8,0%	6,3%	4,7%	8,7%	6,2%	5,4%	8,5%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,3%	8,8%	6,5%	5,2%	8,0%	6,3%	4,4%	8,7%	6,0%	5,0%	8,0%	6,2%
Gêne dans le travail	1,4%	1,7%	1,5%	0,4%	2,0%	1,1%	1,7%	0,0%	1,0%	1,2%	0,9%	1,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,9%	2,6%	2,8%	1,3%	3,4%	2,1%	1,7%	3,8%	2,5%	1,8%	3,0%	2,3%
Dermatologie												
Existence d'un problème	5,7%	8,4%	6,6%	6,9%	7,1%	7,0%	4,6%	5,8%	5,1%	5,2%	6,8%	5,8%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	8,4%	6,3%	6,9%	6,4%	6,7%	4,6%	5,8%	5,1%	5,1%	6,6%	5,7%
Gêne dans le travail	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,6%	0,8%	0,7%	2,6%	1,4%	0,7%	1,3%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	2,8%	3,4%	3,0%	2,2%	3,2%	2,6%	2,3%	3,2%	2,6%	2,3%	3,1%	2,6%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=213	≥45 ans n=122	Ensemble n=335	<45 ans n=239	≥45 ans n=158	Ensemble n=397	<45 ans n=307	≥45 ans n=194	Ensemble n=501	<45 ans n=845	≥45 ans n=557	Global n=1402
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	5,2%	6,6%	5,7%	2,6%	5,2%	3,6%	5,0%	15,8%	9,2%	4,5%	9,8%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	6,6%	5,7%	2,2%	5,2%	3,4%	4,7%	15,8%	9,0%	4,3%	9,6%	6,4%
Gêne dans le travail	1,9%	2,5%	2,1%	0,9%	0,7%	0,8%	0,3%	3,2%	1,4%	0,8%	2,6%	1,5%
Traitements ou autre soin	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	0,7%	0,3%	0,0%	3,7%	1,4%	0,1%	1,9%	0,8%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule												
Existence d'un problème	9,0%	14,0%	10,8%	9,4%	15,3%	11,7%	6,6%	19,3%	11,5%	7,3%	15,1%	10,4%
Plaintes ou signes cliniques	9,0%	14,0%	10,8%	9,4%	15,3%	11,7%	6,6%	19,3%	11,5%	7,3%	15,1%	10,4%
Gêne dans le travail	3,3%	4,1%	3,6%	4,3%	8,3%	5,9%	3,3%	11,5%	6,5%	3,2%	7,5%	4,9%
Traitements ou autre soin	1,4%	5,0%	2,7%	2,1%	3,8%	2,8%	1,7%	7,3%	3,9%	1,6%	5,1%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude												
Existence d'un problème	0,9%	5,8%	2,7%	5,1%	8,3%	6,4%	2,6%	9,9%	5,5%	3,1%	8,0%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	0,9%	5,8%	2,7%	5,1%	8,3%	6,4%	2,3%	8,9%	4,8%	3,0%	7,7%	4,9%
Gêne dans le travail	0,9%	4,2%	2,1%	2,6%	3,2%	2,8%	2,0%	5,8%	3,4%	2,0%	4,2%	2,9%
Traitements ou autre soin	0,0%	2,5%	0,9%	1,7%	3,2%	2,3%	1,0%	5,3%	2,6%	1,0%	4,0%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet												
Existence d'un problème	3,3%	7,4%	4,8%	7,2%	12,9%	9,5%	6,3%	12,6%	8,7%	5,8%	10,2%	7,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	7,4%	4,8%	7,2%	12,9%	9,5%	6,3%	12,6%	8,7%	5,8%	10,2%	7,5%
Gêne dans le travail	1,4%	6,6%	3,3%	4,3%	6,5%	5,1%	5,0%	8,5%	6,3%	3,7%	6,4%	4,8%
Traitements ou autre soin	0,5%	3,3%	1,5%	1,7%	3,2%	2,3%	2,0%	3,7%	2,7%	1,6%	3,1%	2,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur												
<i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	10,4%	24,2%	15,4%	17,0%	24,4%	19,9%	13,2%	30,9%	20,1%	13,3%	25,0%	17,9%
Plaintes ou signes cliniques	10,4%	24,2%	15,4%	17,0%	24,4%	19,9%	13,2%	30,4%	19,9%	13,3%	24,8%	17,8%
Gêne dans le travail	3,8%	11,7%	6,7%	9,4%	12,9%	10,8%	8,7%	19,9%	13,0%	7,4%	13,8%	9,9%
Traitements ou autre soin	1,4%	9,5%	4,3%	3,8%	7,8%	5,4%	4,0%	13,6%	7,7%	3,1%	10,2%	5,9%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=213	≥45 ans n=122	Ensemble n=335	<45 ans n=239	≥45 ans n=158	Ensemble n=397	<45 ans n=307	≥45 ans n=194	Ensemble n=501	<45 ans n=845	≥45 ans n=557	Global n=1402
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	7,1%	12,3%	9,0%	11,2%	10,9%	11,1%	6,6%	14,1%	9,5%	7,6%	12,0%	9,3%
Plaîntes ou signes cliniques	7,1%	12,3%	9,0%	11,2%	10,9%	11,1%	6,6%	14,1%	9,5%	7,6%	12,0%	9,3%
Gêne dans le travail	2,8%	6,6%	4,2%	4,7%	3,8%	4,4%	4,7%	11,5%	7,3%	3,9%	7,1%	5,2%
Traitemennt ou autre soin	2,4%	4,9%	3,3%	2,1%	5,2%	3,4%	1,7%	5,8%	3,3%	1,8%	4,7%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	9,4%	10,7%	9,9%	8,1%	13,5%	10,3%	6,6%	11,5%	8,5%	7,8%	11,5%	9,3%
Plaîntes ou signes cliniques	9,4%	10,7%	9,9%	8,1%	13,5%	10,3%	6,6%	11,0%	8,3%	7,8%	11,3%	9,2%
Gêne dans le travail	4,7%	5,7%	5,1%	5,1%	8,3%	6,4%	3,6%	7,4%	5,1%	4,3%	6,6%	5,2%
Traitemennt ou autre soin	3,8%	4,9%	4,2%	2,6%	7,7%	4,6%	2,3%	4,8%	3,3%	2,9%	5,5%	3,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolumbaires												
Existence d'un problème	15,1%	20,7%	17,1%	14,2%	20,1%	16,6%	17,6%	31,9%	23,2%	16,2%	23,1%	19,0%
Plaîntes ou signes cliniques	14,7%	20,7%	16,9%	13,1%	20,1%	15,9%	17,3%	31,2%	22,7%	15,7%	22,8%	18,5%
Gêne dans le travail	8,1%	10,0%	8,8%	6,9%	11,0%	8,5%	10,6%	22,1%	15,1%	9,1%	13,4%	10,8%
Traitemennt ou autre soin	5,2%	12,5%	7,9%	3,5%	7,8%	5,2%	5,0%	13,2%	8,2%	5,0%	9,9%	7,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis												
(l'un des 2 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	21,2%	24,8%	22,5%	19,0%	26,3%	21,9%	19,6%	35,8%	25,9%	20,1%	28,3%	23,4%
Plaîntes ou signes cliniques	21,2%	24,8%	22,5%	17,9%	26,3%	21,3%	19,3%	35,1%	25,4%	19,7%	28,1%	23,0%
Gêne dans le travail	10,4%	12,5%	11,2%	10,4%	16,1%	12,7%	11,3%	24,3%	16,3%	11,0%	16,5%	13,2%
Traitemennt ou autre soin	8,1%	14,2%	10,3%	4,8%	13,5%	8,3%	5,4%	14,9%	9,0%	6,6%	13,1%	9,2%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=277	G. Commerce ; réparations d'automobiles & motocycles n=226	Base Everest région n=1402
Répartition homme/femme	63,2% / 36,8%	54,9% / 45,1%	55,1% / 44,9%
≤24ans	3,6%	12,8%	7,1%
25-34ans	21,7%	24,3%	24,6%
35-44ans	31,4%	28,3%	28,5%
45-54ans	31,8%	26,5%	29,2%
55 ans et plus	11,6%	8,0%	10,6%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,0%	0,4%	0,4%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	7,6%	8,4%	11,7%
Professions intermédiaires	19,9%	19,5%	23,9%
Employés	9,7%	42,0%	28,3%
Ouvriers	62,8%	29,6%	35,7%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=277	G. Commerce ; réparations d'automobiles & motocycles n=226	Base Everest région n=1402
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	92,4%	88,0%	87,8%
Oui, raison médicale	0,7%	0,0%	0,4%
Oui, autre raison	6,5%	10,7%	10,9%
Oui, raison non précisée	0,4%	1,3%	0,9%
Travail à temps plein	92,7%	86,5%	87,1%
Travail en journée normale	70,6%	82,1%	77,5%
Coupures de plus de 2 heures	5,1%	19,6%	12,9%
Horaires décalés	32,1%	23,7%	26,2%
Horaires irréguliers ou alternés	25,7%	21,4%	24,4%
Travail de nuit	14,1%	3,3%	11,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	5,5%	5,9%	7,0%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	28,7%	17,7%	20,3%
Rarement	44,7%	46,9%	45,2%
Assez souvent	20,4%	26,1%	24,9%
Très souvent	6,2%	9,3%	9,5%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	63,0%	59,3%	52,4%
Rarement	24,2%	26,5%	30,4%
Assez souvent	7,7%	11,1%	12,2%
Très souvent	5,1%	3,1%	5,0%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	41,9%	42,9%	38,7%
Rarement	33,5%	33,0%	36,1%
Assez souvent	19,9%	17,4%	19,1%
Très souvent	4,8%	6,7%	6,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	3,6%	5,4%	4,2%
1	5,8%	3,6%	4,3%
2	8,8%	8,5%	9,2%
3	10,6%	12,1%	11,6%
4	10,9%	10,3%	11,3%
5	21,9%	23,7%	21,2%
6	13,1%	11,2%	12,5%
7	15,3%	15,2%	14,5%
8	7,3%	8,0%	8,1%
9	1,5%	0,9%	1,7%
10	1,1%	1,3%	1,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	38,3%	36,6%	38,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	56,0%	55,6%	53,6%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	54,4%	59,8%	59,1%
- Aspect positif du travail	46,7%	32,5%	40,4%

Appréciations sur le travail	C. Industrie manufacturière n=277	G. Commerce ; réparations d'automobiles & motocycles n=226	Base Everest région n=1402
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	12,7%	8,8%	7,8%
Plutôt non	18,2%	16,4%	13,6%
Plutôt oui	38,9%	40,7%	41,3%
Oui tout à fait	30,2%	34,1%	37,3%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,3%	6,6%	4,5%
Plutôt non	12,7%	10,2%	12,1%
Plutôt oui	42,0%	36,7%	39,2%
Oui tout à fait	40,9%	46,5%	44,2%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	15,6%	6,2%	8,9%
Plutôt non	13,8%	17,3%	17,0%
Plutôt oui	34,9%	35,8%	40,0%
Oui tout à fait	35,6%	40,7%	34,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	5,1%	3,1%	3,9%
Plutôt non	13,0%	11,1%	11,8%
Plutôt oui	48,6%	48,4%	51,0%
Oui tout à fait	33,3%	37,3%	33,3%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	0,7%	4,0%	1,9%
Plutôt non	13,2%	9,4%	12,6%
Plutôt oui	53,7%	50,7%	52,3%
Oui tout à fait	32,4%	35,9%	33,2%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	6,2%	4,9%	4,5%
Plutôt non	20,7%	17,0%	18,0%
Plutôt oui	48,4%	42,4%	49,4%
Oui tout à fait	24,7%	35,7%	28,1%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	34,7%	36,2%	33,6%
Plutôt non	40,5%	41,1%	42,2%
Plutôt oui	20,1%	20,1%	20,5%
Oui tout à fait	4,7%	2,7%	3,7%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	59,0%	70,0%	63,6%
Plutôt non	24,9%	21,5%	23,7%
Plutôt oui	12,1%	6,7%	9,9%
Oui tout à fait	4,0%	1,8%	2,8%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=277	G. Commerce ; réparations d'automobiles & motocycles n=226	Base Everest région n=1402
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	43,8%	44,2%	48,6%
Oui parfois	35,1%	32,3%	31,6%
Oui souvent	21,0%	23,5%	19,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	43,8%	44,2%	48,6%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	33,3%	30,5%	26,8%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	22,1%	23,0%	22,9%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	0,7%	2,2%	1,7%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	48,7%	40,0%	53,8%
Oui parfois	32,7%	40,4%	30,4%
Oui souvent	18,5%	19,6%	15,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	48,7%	40,0%	53,8%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	31,6%	33,3%	25,3%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	19,3%	24,0%	19,4%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,4%	2,7%	1,4%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	38,0%	38,1%	42,7%
Oui parfois	19,9%	21,7%	21,5%
Oui souvent	42,0%	40,3%	35,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	38,0%	38,1%	42,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	26,8%	23,5%	20,5%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	33,3%	34,5%	34,1%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,8%	4,0%	2,6%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	52,2%	57,8%	61,8%
Oui parfois	19,9%	18,2%	16,8%
Oui souvent	27,9%	24,0%	21,3%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	52,2%	57,8%	61,8%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	9,8%	10,7%	8,7%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	35,9%	30,7%	27,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	2,2%	0,9%	1,6%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	33,3%	38,4%	45,0%
Oui parfois	19,6%	18,8%	18,6%
Oui souvent	47,1%	42,9%	36,4%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	33,3%	38,4%	45,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	24,3%	20,5%	16,9%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	38,0%	35,7%	33,1%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	4,3%	5,4%	5,0%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=277	G. Commerce ; réparations d'automobiles & motocycles n=226	Base Everest région n=1402
Produits chimiques	37,5%	23,6%	27,7%
Poussières, fumées	50,5%	32,7%	33,2%
Rx ionisants	1,1%	0,4%	5,5%
Vibrations	26,5%	18,3%	22,1%
Gêne sonore	60,0%	27,9%	38,4%
Bruit > 80db	46,8%	16,6%	24,2%
Contrainte visuelle	43,8%	21,9%	33,7%
Conduite routière prolongée	6,2%	8,9%	13,1%
Chaleur intense	20,8%	8,0%	15,1%
Froid intense	13,9%	12,4%	11,1%
Intempéries	7,3%	8,0%	12,8%
Pression psychologique	22,3%	22,3%	25,3%
Agent biologique	5,1%	2,2%	10,1%
Contact avec le public	27,3%	76,0%	56,7%

Formation	C. Industrie manufacturière n=277	G. Commerce ; réparations d'automobiles & motocycles n=226	Base Everest région n=1402
A bénéficié d'une formation depuis un an	43,1%	42,7%	47,5%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	82,9%	90,4%	89,5%
- En rapport avec le travail futur	14,2%	9,0%	12,5%
- Formation d'intérêt général	45,6%	37,1%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	26,9%	32,0%	27,8%

Mode de vie	C. Industrie manufacturière n=277	G. Commerce ; réparations d'automobiles & motocycles n=226	Base Everest région n=1402
Activité sportive régulière	43,9%	47,2%	46,6%
Consommation de tabac	41,3%	35,9%	34,3%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	9,6%	9,0%	8,1%
Consommation de café	81,1%	77,7%	77,9%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	17,8%	17,4%	15,3%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	13,9%	13,2%	12,9%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations auto - moto			Base Everest région		
	<45 ans n=157	≥45 ans n=120	Ensemble n=277	<45 ans n=148	≥45 ans n=78*	Ensemble n=226	<45 ans n=845	≥45 ans n=557	Global n=1402
Indice de masse corporelle									
- Normaux / maigres	54,5%	45,7%	50,7%	65,0%	42,9%	57,3%	58,2%	44,0%	52,6%
- Surpoids	32,1%	38,8%	34,9%	25,9%	31,2%	27,7%	27,9%	36,8%	31,4%
- Obèses	13,5%	15,5%	14,3%	9,1%	26,0%	15,0%	13,9%	19,2%	16,0%
Appareil respiratoire									
Existence d'un problème	5,1%	10,2%	7,3%	2,7%	2,6%	2,7%	3,4%	5,5%	4,2%
Plautes ou signes cliniques	5,1%	8,6%	6,6%	2,1%	2,6%	2,2%	3,1%	5,1%	3,9%
Gêne dans le travail	1,9%	1,7%	1,8%	0,7%	0,0%	0,4%	0,6%	0,5%	0,6%
Traitemet ou autre soin	1,9%	6,0%	3,7%	2,7%	1,3%	2,2%	1,8%	2,7%	2,2%
Appareil cardio vasculaire									
Existence d'un problème	3,2%	5,9%	4,4%	4,1%	3,9%	4,0%	2,3%	3,8%	2,9%
Plautes ou signes cliniques	3,2%	5,1%	4,0%	4,1%	2,6%	3,6%	2,2%	2,9%	2,5%
Gêne dans le travail	0,6%	2,5%	1,5%	1,4%	0,0%	0,9%	0,5%	0,7%	0,6%
Traitemet ou autre soin	1,9%	3,4%	2,5%	2,1%	2,6%	2,3%	1,1%	2,9%	1,8%
HTA									
Existence d'un problème	5,1%	14,5%	9,2%	8,3%	19,2%	12,1%	5,1%	17,7%	10,1%
Plautes ou signes cliniques	3,8%	10,3%	6,6%	6,9%	15,4%	9,9%	4,2%	14,2%	8,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,9%	0,4%	0,7%	1,3%	0,9%	0,6%	0,5%	0,6%
Traitemet ou autre soin	3,2%	11,1%	6,6%	4,9%	13,0%	7,7%	3,0%	13,4%	7,2%
Digestif									
Existence d'un problème	7,2%	7,3%	7,3%	3,5%	7,7%	5,0%	5,4%	8,5%	6,6%
Plautes ou signes cliniques	7,2%	7,3%	7,3%	3,5%	7,7%	5,0%	5,0%	8,0%	6,2%
Gêne dans le travail	2,0%	0,0%	1,1%	0,7%	1,3%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%
Traitemet ou autre soin	2,0%	3,6%	2,7%	1,4%	1,3%	1,4%	1,8%	3,0%	2,3%
Dermatologie									
Existence d'un problème	7,0%	8,7%	7,7%	3,4%	5,1%	4,0%	5,2%	6,8%	5,8%
Plautes ou signes cliniques	7,0%	8,7%	7,7%	2,8%	5,1%	3,6%	5,1%	6,6%	5,7%
Gêne dans le travail	1,3%	3,5%	2,2%	1,4%	0,0%	0,9%	0,7%	1,3%	0,9%
Traitemet ou autre soin	3,8%	5,2%	4,4%	0,7%	1,3%	0,9%	2,3%	3,1%	2,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Base Everest région		
	<45 ans n=157	≥45 ans n=120	Ensemble n=277	<45 ans n=148	≥45 ans n=78*	Ensemble n=226	<45 ans n=845	≥45 ans n=557	Global n=1402
Troubles de l'audition									
Existence d'un problème	4,5%	11,3%	7,4%	5,6%	7,8%	6,4%	4,5%	9,8%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	11,3%	7,4%	5,6%	7,8%	6,4%	4,3%	9,6%	6,4%
Gêne dans le travail	1,3%	3,5%	2,2%	0,0%	2,6%	0,9%	0,8%	2,6%	1,5%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	4,4%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,9%	0,8%
Lassitude, fatigue									
Existence d'un problème	27,4%	22,0%	25,1%	16,4%	26,9%	20,1%	19,2%	21,5%	20,1%
Plaintes ou signes cliniques	27,4%	22,0%	25,1%	15,1%	26,9%	19,2%	18,9%	21,3%	19,8%
Gêne dans le travail	11,5%	11,0%	11,3%	6,2%	15,8%	9,5%	8,4%	10,6%	9,3%
TraITEMENT ou autre soin	0,6%	2,5%	1,5%	2,1%	3,9%	2,7%	2,1%	2,7%	2,3%
Anxiété, nervosité									
Existence d'un problème	21,7%	19,0%	20,5%	15,8%	25,6%	19,2%	17,6%	24,4%	20,3%
Plaintes ou signes cliniques	21,7%	19,0%	20,5%	15,1%	25,6%	18,8%	17,2%	23,7%	19,8%
Gêne dans le travail	8,3%	5,2%	7,0%	4,1%	13,0%	7,2%	6,6%	9,7%	7,8%
TraITEMENT ou autre soin	3,2%	7,8%	5,1%	0,7%	7,8%	3,1%	2,7%	6,6%	4,2%
Troubles du sommeil									
Existence d'un problème	19,1%	27,6%	22,7%	14,6%	25,6%	18,5%	14,8%	24,0%	18,5%
Plaintes ou signes cliniques	17,8%	27,0%	21,7%	14,0%	23,7%	17,4%	14,1%	23,1%	17,7%
Gêne dans le travail	10,9%	9,5%	10,3%	6,3%	12,8%	8,6%	6,4%	9,1%	7,5%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	7,8%	4,8%	0,7%	3,8%	1,8%	2,4%	6,4%	4,0%
➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	8,9%	6,0%	7,7%	3,4%	6,4%	4,5%	5,3%	8,2%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	6,0%	7,3%	2,8%	5,2%	3,6%	4,9%	7,7%	6,0%
Gêne dans le travail	3,2%	1,7%	2,6%	2,1%	3,8%	2,7%	2,3%	2,6%	2,4%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,8%	0,4%	0,0%	1,3%	0,4%	0,2%	0,9%	0,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Base Everest région		
	<45 ans n=157	≥45 ans n=120	Ensemble n=277	<45 ans n=148	≥45 ans n=78*	Ensemble n=226	<45 ans n=845	≥45 ans n=557	Global n=1402
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule									
Existence d'un problème	11,5%	18,6%	14,5%	6,2%	16,7%	9,8%	7,3%	15,1%	10,4%
Plaintes ou signes cliniques	11,5%	18,6%	14,5%	6,2%	16,7%	9,8%	7,3%	15,1%	10,4%
Gêne dans le travail	7,1%	9,3%	8,0%	2,7%	6,4%	4,0%	3,2%	7,5%	4,9%
TraITEMENT ou autre soin	3,8%	6,8%	5,1%	1,4%	3,9%	2,2%	1,6%	5,1%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude									
Existence d'un problème	4,5%	5,1%	4,7%	2,7%	13,0%	6,3%	3,1%	8,0%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	5,1%	4,4%	2,7%	13,0%	6,3%	3,0%	7,7%	4,9%
Gêne dans le travail	4,5%	2,5%	3,6%	1,4%	7,8%	3,6%	2,0%	4,2%	2,9%
TraITEMENT ou autre soin	2,5%	2,6%	2,6%	0,7%	6,6%	2,7%	1,0%	4,0%	2,2%
Troubles ostéoarticulaires du poignet									
Existence d'un problème	8,9%	7,7%	8,4%	5,5%	10,3%	7,1%	5,8%	10,2%	7,5%
Plaintes ou signes cliniques	8,9%	7,7%	8,4%	5,5%	10,3%	7,1%	5,8%	10,2%	7,5%
Gêne dans le travail	7,7%	5,1%	6,6%	3,4%	6,4%	4,5%	3,7%	6,4%	4,8%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	1,7%	2,2%	2,1%	3,9%	2,7%	1,6%	3,1%	2,2%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur									
<i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>									
Existence d'un problème	20,4%	24,6%	22,2%	12,3%	31,2%	18,8%	13,3%	25,0%	17,9%
Plaintes ou signes cliniques	20,4%	24,6%	22,2%	12,3%	31,2%	18,8%	13,3%	24,8%	17,8%
Gêne dans le travail	15,4%	14,4%	15,0%	6,8%	13,0%	9,0%	7,4%	13,8%	9,9%
TraITEMENT ou autre soin	7,7%	11,0%	9,1%	3,4%	9,5%	5,5%	3,1%	10,2%	5,9%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparations d'automobiles et de motocycles			Base Everest région		
	<45 ans n=157	≥45 ans n=120	Ensemble n=277	<45 ans n=148	≥45 ans n=78*	Ensemble n=226	<45 ans n=845	≥45 ans n=557	Global n=1402
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur									
Existence d'un problème	7,1%	11,9%	9,1%	9,0%	19,2%	12,6%	7,6%	12,0%	9,3%
Plaîntes ou signes cliniques	7,1%	11,9%	9,1%	9,0%	19,2%	12,6%	7,6%	12,0%	9,3%
Gêne dans le travail	3,9%	7,6%	5,5%	5,5%	12,8%	8,1%	3,9%	7,1%	5,2%
Traitemennt ou autre soin	3,2%	2,6%	2,9%	1,4%	6,4%	3,1%	1,8%	4,7%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales									
Existence d'un problème	8,9%	11,0%	9,8%	7,6%	7,8%	7,7%	7,8%	11,5%	9,3%
Plaîntes ou signes cliniques	8,9%	11,0%	9,8%	7,6%	7,8%	7,7%	7,8%	11,3%	9,2%
Gêne dans le travail	6,4%	6,8%	6,5%	2,8%	6,5%	4,1%	4,3%	6,6%	5,2%
Traitemennt ou autre soin	4,5%	6,0%	5,1%	2,1%	3,9%	2,7%	2,9%	5,5%	3,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires									
Existence d'un problème	17,3%	24,6%	20,4%	25,9%	22,1%	24,5%	16,2%	23,1%	19,0%
Plaîntes ou signes cliniques	16,8%	23,9%	19,9%	25,4%	22,1%	24,2%	15,7%	22,8%	18,5%
Gêne dans le travail	12,8%	15,3%	13,9%	12,6%	16,9%	14,1%	9,1%	13,4%	10,8%
Traitemennt ou autre soin	7,7%	8,5%	8,1%	7,0%	13,0%	9,1%	5,0%	9,9%	7,0%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	20,5%	29,7%	24,5%	30,8%	23,7%	28,3%	20,1%	28,3%	23,4%
Plaîntes ou signes cliniques	20,0%	29,1%	23,9%	30,3%	23,7%	28,0%	19,7%	28,1%	23,0%
Gêne dans le travail	15,4%	18,6%	16,8%	14,0%	17,1%	15,1%	11,0%	16,5%	13,2%
Traitemennt ou autre soin	9,7%	12,0%	10,7%	8,5%	13,2%	10,1%	6,6%	13,1%	9,2%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

