



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2011-2012

### Région Haute Normandie

Juillet 2013

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2011-2012 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

## **Descriptif de l'échantillon Haute Normandie**

L'exploitation des données de la région Haute Normandie a porté sur **1018 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2011 (n=506) et 2012 (n=512), puis saisies dans la base de données Evrest.

Au niveau de la région Haute Normandie, l'échantillon de salariés Evrest est un peu plus proche du champ des salariés des secteurs publics et privés confondus (données DADS de l'INSEE) que de celui des salariés du privé (données ACOSS) (tableau 1). Le secteur de la construction est sous-représenté.

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Le nombre de fiches 2011-2012 de la région permet de fournir des résultats pour le secteur de l'industrie manufacturière (tableau 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Haute Normandie 2011-2012 aux données Insee (DADS 2010) et Acoss (2011).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Haute Normandie 2011-2012 (n=1018)	Données INSEE 2010 (DADS)	Données ACOSS 2011 %
	%	%	
<b>Sexe</b>			
Hommes	54,1	51,7	-
Femmes	45,9	48,3	-
<b>Age</b>			
≤ 24 ans	8,7	14,1	-
25-34 ans	29,0	23,9	-
35-44 ans	26,6	25,6	-
45- 54 ans	26,9	24,8	-
55 ans et plus	8,7	11,6	-
<b>Catégorie socioprofessionnelle</b>			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,3	0,5	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	12,1	11,1	-
Professions intermédiaires	25,2	20,1	-
Employés	30,8	36,6	-
Ouvriers	31,5	31,7	-
<b>Secteur d'activité</b>			
Agriculture	0,1	0,1	0,0%
Industrie	23,9	17,9	24,9%
Construction	4,9	7,2	9,4%
Commerce	11,5	11,9	15,3%
Services	59,6	62,9	50,4%

- : informations non disponibles

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Haute Normandie 2011-2012 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	3	0,3
Cadres et professions intellectuelles supérieures	123	12,1
<b>Professions intermédiaires</b>	<b>257</b>	<b>25,2</b>
<b>Employés</b>	<b>314</b>	<b>30,8</b>
<b>Ouvriers</b>	<b>321</b>	<b>31,5</b>
Total général	1018	100,0

Tableau 3: Descriptif de l'échantillon régional Haute Normandie 2011-2012 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
<b>AGRICULTURE</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>
A. Agriculture, sylviculture et pêche	1	0,1
<b>INDUSTRIE</b>	<b>243</b>	<b>23,9</b>
B. Industries extractives	0	0,0
<b>C. Industrie manufacturière</b>	<b>195</b>	<b>19,2</b>
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	41	4,0
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	7	0,7
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>50</b>	<b>4,9</b>
F. Construction	50	4,9
<b>COMMERCE</b>	<b>117</b>	<b>11,5</b>
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	117	11,5
<b>SERVICES</b>	<b>607</b>	<b>59,6</b>
H. Transports et entreposage	51	5,0
I. Hébergement et restauration	26	2,6
J. Information et communication	17	1,7
K. Activités financières et d'assurance	135	13,3
L. Activités immobilières	28	2,8
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	67	6,6
N. Activités de services administratifs et de soutien	75	7,4
O. Administration publique	65	6,4
P. Enseignement	7	0,7
Q. Santé humaine et action sociale	115	11,3
R. Arts, spectacles et activités récréatives	1	0,1
S. Autres activités de services	18	1,8
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférencierées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	2	0,2
<b>Total général</b>	<b>1018</b>	<b>100,0</b>

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=551	Femmes n=467	Ensemble n=1018
≤24ans	9,4%	7,9%	8,7%
25-34ans	30,7%	27,0%	29,0%
35-44ans	27,4%	25,7%	26,6%
45-54ans	24,7%	29,6%	26,9%
55 ans et plus	7,8%	9,9%	8,7%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,5%	0,0%	0,3%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	15,8%	7,7%	12,1%
Professions intermédiaires	24,7%	25,9%	25,2%
Employés	15,6%	48,8%	30,8%
Ouvriers	43,4%	17,6%	31,5%
C. Industrie manufacturière	24,7%	12,6%	19,2%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	6,2%	1,5%	4,0%
F. Construction	8,7%	0,4%	4,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	12,0%	10,9%	11,5%
H. Transports et entreposage	6,4%	3,4%	5,0%
I. Hébergement et restauration	1,8%	3,4%	2,6%
J. Information et communication	2,4%	0,9%	1,7%
K. Activités financières et d'assurance	10,0%	17,1%	13,3%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	6,7%	6,4%	6,6%
N. Activités de services administratifs et de soutien	7,1%	7,7%	7,4%
O. Administration publique	5,4%	7,5%	6,4%
Q. Santé humaine et action sociale	4,2%	19,7%	11,3%
S. Autres activités de services	0,4%	3,4%	1,8%

Conditions de travail	Hommes n=551	Femmes n=467	Ensemble n=1018
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	82,8%	86,4%	84,4%
Oui, raison médicale	0,5%	1,1%	0,8%
Oui, autre raison	14,9%	11,0%	13,1%
Oui, raison non précisée	1,8%	1,5%	1,7%
Travail à temps plein	94,7%	71,1%	83,9%
Travail en journée normale	76,1%	81,9%	78,7%
Coupures de plus de 2 heures	11,6%	17,6%	14,3%
Horaires décalés	28,4%	24,2%	26,5%
Horaires irréguliers ou alternés	28,9%	26,5%	27,8%
Travail de nuit	18,4%	7,4%	13,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	11,2%	1,6%	6,8%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	17,6%	24,8%	20,9%
Rarement	44,6%	42,4%	43,6%
Assez souvent	23,0%	24,8%	23,8%
Très souvent	14,8%	8,0%	11,7%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	34,2%	48,4%	40,7%
Rarement	41,9%	27,8%	35,4%
Assez souvent	18,0%	17,8%	17,9%
Très souvent	5,9%	6,1%	6,0%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	35,9%	36,8%	36,3%
Rarement	41,3%	36,4%	39,0%
Assez souvent	18,4%	20,5%	19,4%
Très souvent	4,5%	6,3%	5,3%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	3,9%	5,8%	4,8%
1	6,3%	5,6%	6,0%
2	10,9%	11,3%	11,0%
3	13,4%	13,4%	13,4%
4	9,9%	7,8%	9,0%
5	19,2%	21,4%	20,2%
6	11,6%	10,0%	10,8%
7	14,2%	11,5%	12,9%
8	8,7%	9,1%	8,9%
9	1,8%	3,5%	2,6%
10	0,2%	0,6%	0,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	36,5%	34,6%	35,6%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	51,7%	44,8%	48,5%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	57,7%	64,5%	60,6%
- Aspect positif du travail	36,7%	42,9%	39,3%

<b>Appréciations sur le travail</b>	<b>Hommes n=551</b>	<b>Femmes n=467</b>	<b>Ensemble n=1018</b>
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	5,9%	7,3%	6,5%
Plutôt non	8,2%	12,4%	10,2%
Plutôt oui	43,5%	42,9%	43,2%
Oui tout à fait	42,4%	37,3%	40,1%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,4%	6,3%	5,2%
Plutôt non	11,5%	12,5%	11,9%
Plutôt oui	44,6%	44,8%	44,7%
Oui tout à fait	39,5%	36,4%	38,1%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	5,9%	10,8%	8,1%
Plutôt non	20,3%	17,1%	18,8%
Plutôt oui	40,3%	43,6%	41,8%
Oui tout à fait	33,5%	28,5%	31,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	3,6%	5,6%	4,6%
Plutôt non	10,0%	14,3%	12,0%
Plutôt oui	52,0%	53,7%	52,8%
Oui tout à fait	34,3%	26,4%	30,7%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	0,8%	1,7%	1,2%
Plutôt non	10,2%	10,7%	10,4%
Plutôt oui	56,6%	61,9%	59,0%
Oui tout à fait	32,5%	25,7%	29,3%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	4,8%	5,3%	5,0%
Plutôt non	14,4%	16,1%	15,2%
Plutôt oui	52,1%	55,8%	53,8%
Oui tout à fait	28,7%	22,7%	26,0%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	30,6%	34,3%	32,3%
Plutôt non	47,6%	47,4%	47,5%
Plutôt oui	17,5%	15,8%	16,7%
Oui tout à fait	4,3%	2,4%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	59,3%	62,3%	60,7%
Plutôt non	31,0%	25,9%	28,6%
Plutôt oui	7,1%	8,7%	7,8%
Oui tout à fait	2,6%	3,1%	2,9%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=551	Femmes n=467	Ensemble n=1018
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	42,7%	50,5%	46,3%
Oui parfois	37,5%	27,5%	32,9%
Oui souvent	19,8%	21,9%	20,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	42,7%	50,5%	46,3%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	20,0%	28,0%	23,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	33,8%	20,4%	27,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	3,5%	1,1%	2,4%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	45,5%	57,4%	50,9%
Oui parfois	36,2%	25,5%	31,3%
Oui souvent	18,3%	17,1%	17,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	45,5%	57,4%	50,9%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	19,9%	25,3%	22,4%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	30,7%	15,2%	23,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	3,8%	2,2%	3,1%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	44,1%	32,8%	38,9%
Oui parfois	28,0%	23,4%	25,9%
Oui souvent	27,8%	43,8%	35,2%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	44,1%	32,8%	38,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	13,0%	21,0%	16,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	37,7%	40,3%	38,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	5,1%	5,9%	5,5%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	46,3%	66,9%	55,7%
Oui parfois	11,7%	9,2%	10,6%
Oui souvent	38,3%	21,7%	30,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	46,3%	66,9%	55,7%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	11,7%	9,2%	10,6%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	38,3%	21,7%	30,7%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	3,8%	2,2%	3,1%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	41,2%	49,1%	44,8%
Oui parfois	26,2%	13,6%	20,4%
Oui souvent	32,6%	37,3%	34,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	41,2%	49,1%	44,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	14,9%	19,0%	16,8%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	38,1%	27,6%	33,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	5,8%	4,3%	5,1%

<b>Expositions</b>	<b>Hommes n=551</b>	<b>Femmes n=467</b>	<b>Ensemble n=1018</b>
Produits chimiques	35,2%	24,8%	30,5%
Poussières, fumées	44,9%	21,9%	34,4%
Rx ionisants	6,7%	1,1%	4,1%
Vibrations	28,8%	4,8%	17,8%
Gêne sonore	49,3%	32,7%	41,7%
Bruit > 80db	35,5%	13,8%	25,6%
Contrainte visuelle	30,3%	34,1%	32,0%
Conduite routière prolongée	19,5%	5,7%	13,2%
Chaleur intense	14,2%	12,2%	13,3%
Froid intense	10,8%	8,3%	9,7%
Intempéries	27,1%	5,0%	17,0%
Pression psychologique	21,8%	22,9%	22,3%
Agent biologique	8,1%	13,2%	10,4%
Contact avec le public	55,4%	64,2%	59,4%

<b>Formation</b>	<b>Hommes n=551</b>	<b>Femmes n=467</b>	<b>Ensemble n=1018</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	52,8%	49,0%	51,0%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	92,2%	90,7%	91,5%
- En rapport avec le travail futur	19,1%	13,2%	16,5%
- Formation d'intérêt général	41,0%	35,1%	38,4%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	29,3%	22,6%	26,2%

<b>Mode de vie</b>	<b>Hommes n=551</b>	<b>Femmes n=467</b>	<b>Ensemble n=1018</b>
Activité sportive régulière	50,7%	45,2%	48,1%
Consommation de tabac	42,5%	31,2%	37,3%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	11,4%	5,7%	8,8%
Consommation de café	87,1%	70,2%	79,4%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	20,0%	14,6%	17,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	15,6%	14,9%	15,3%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1018
	Hommes n=372	Femmes n=283	Ensemble n=655	Hommes n=179	Femmes n=184	Ensemble n=363	
<b>Indice de masse corporelle</b>							
- Normaux ou maigres	54,6%	60,0%	56,9%	30,1%	52,0%	41,2%	51,3%
- Surpoids	35,5%	23,3%	30,2%	47,4%	30,7%	38,9%	33,3%
- Obèses	10,0%	16,7%	12,9%	22,5%	17,3%	19,9%	15,4%
<b>Appareil respiratoire</b>							
Existence d'un problème	4,1%	6,4%	5,1%	7,3%	10,5%	8,9%	6,5%
Plaintes ou signes cliniques	4,1%	5,3%	4,6%	6,8%	10,5%	8,7%	6,1%
Gêne dans le travail	0,0%	1,1%	0,5%	1,1%	1,1%	1,1%	0,7%
TraITEMENT ou autre soin	2,7%	5,0%	3,7%	3,4%	6,1%	4,7%	4,1%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>							
Existence d'un problème	2,7%	3,6%	3,1%	6,2%	3,4%	4,8%	3,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	3,2%	3,0%	5,1%	3,4%	4,2%	3,4%
Gêne dans le travail	1,1%	1,8%	1,4%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	1,4%	1,1%	5,1%	0,6%	2,8%	1,7%
<b>HTA</b>							
Existence d'un problème	3,6%	2,9%	3,3%	19,2%	17,2%	18,2%	8,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	2,1%	2,3%	14,7%	11,7%	13,2%	6,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,4%	0,2%	1,7%	1,7%	1,7%	0,7%
TraITEMENT ou autre soin	2,5%	1,8%	2,2%	14,4%	13,4%	13,9%	6,4%
<b>Lassitude, fatigue</b>							
Existence d'un problème	16,5%	32,4%	23,4%	21,3%	34,3%	27,8%	25,0%
Plaintes ou signes cliniques	16,3%	31,5%	22,9%	20,3%	34,3%	27,3%	24,5%
Gêne dans le travail	8,0%	14,3%	10,8%	14,6%	16,9%	15,7%	12,5%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	3,2%	2,0%	1,7%	7,4%	4,6%	2,9%
<b>Anxiété, nervosité</b>							
Existence d'un problème	17,6%	27,3%	21,9%	20,8%	38,5%	29,7%	24,7%
Plaintes ou signes cliniques	17,6%	26,7%	21,6%	20,2%	38,5%	29,4%	24,4%
Gêne dans le travail	6,6%	10,3%	8,2%	9,6%	13,4%	11,5%	9,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,8%	4,7%	3,6%	4,0%	10,8%	7,4%	4,9%
<b>Trouble du sommeil</b>							
Existence d'un problème	14,7%	16,5%	15,5%	20,3%	33,9%	27,1%	19,6%
Plaintes ou signes cliniques	14,2%	15,9%	15,0%	19,8%	32,2%	25,9%	18,9%
Gêne dans le travail	4,5%	8,7%	6,3%	7,9%	8,0%	7,9%	6,9%
TraITEMENT ou autre soin	2,8%	4,3%	3,5%	5,1%	11,4%	8,2%	5,2%
<b>➤ Troubles neuro psychiques</b>							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	4,7%	9,3%	6,7%	6,7%	12,4%	9,6%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	8,3%	6,2%	6,7%	12,4%	9,6%	7,4%
Gêne dans le travail	2,2%	3,2%	2,6%	2,8%	3,4%	3,1%	2,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,8%	0,7%	0,8%	0,0%	3,4%	1,7%	1,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1018
	Hommes n=372	Femmes n=283	Ensemble n=655	Hommes n=179	Femmes n=184	Ensemble n=363	
<b>Digestif</b>							
Existence d'un problème	7,0%	9,4%	8,1%	9,8%	16,6%	13,2%	9,9%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	9,4%	7,9%	9,2%	16,0%	12,6%	9,6%
Gêne dans le travail	1,4%	1,1%	1,3%	2,3%	2,3%	2,3%	1,6%
TraITEMENT ou autre soin	4,2%	5,1%	4,6%	5,2%	9,9%	7,6%	5,6%
<b>Dermatologie</b>							
Existence d'un problème	7,2%	11,8%	9,2%	9,6%	10,0%	9,8%	9,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	11,8%	8,8%	9,0%	9,5%	9,3%	8,9%
Gêne dans le travail	1,1%	2,2%	1,6%	0,6%	0,6%	0,6%	1,2%
TraITEMENT ou autre soin	3,3%	7,2%	5,0%	4,5%	3,4%	3,9%	4,6%
<b>Troubles de l'audition</b>							
Existence d'un problème	5,0%	3,6%	4,4%	11,4%	6,7%	9,0%	6,0%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	3,3%	4,1%	11,4%	6,7%	9,0%	5,8%
Gêne dans le travail	0,8%	0,7%	0,8%	4,0%	3,4%	3,7%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	1,1%	0,5%	1,1%	1,7%	1,4%	0,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>							
Existence d'un problème	4,7%	10,7%	7,3%	11,9%	23,6%	17,8%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	10,7%	7,3%	11,4%	23,6%	17,6%	11,0%
Gêne dans le travail	1,9%	6,1%	3,7%	5,7%	15,4%	10,6%	6,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	2,9%	2,0%	2,9%	8,8%	5,9%	3,4%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>							
Existence d'un problème	2,5%	4,3%	3,3%	6,8%	11,0%	8,9%	5,3%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	4,3%	3,3%	6,8%	11,0%	8,9%	5,3%
Gêne dans le travail	0,8%	1,8%	1,2%	3,4%	6,0%	4,7%	2,5%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	1,1%	1,1%	2,3%	3,9%	3,1%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>							
Existence d'un problème	4,9%	6,8%	5,7%	6,2%	16,5%	11,4%	7,8%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	6,8%	5,7%	6,2%	15,5%	10,9%	7,6%
Gêne dans le travail	2,5%	2,9%	2,6%	4,0%	8,4%	6,2%	3,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	1,8%	1,9%	1,7%	5,6%	3,7%	2,5%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)</b>							
Existence d'un problème	9,9%	17,9%	13,3%	18,3%	38,5%	28,6%	18,8%
Plaintes ou signes cliniques	9,9%	17,9%	13,3%	18,3%	37,6%	28,1%	18,6%
Gêne dans le travail	4,4%	9,0%	6,4%	9,2%	23,2%	16,4%	9,9%
TraITEMENT ou autre soin	3,0%	4,7%	3,8%	5,2%	15,2%	10,3%	6,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1018
	Hommes n=372	Femmes n=283	Ensemble n=655	Hommes n=179	Femmes n=184	Ensemble n=363	
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>							
Existence d'un problème	9,1%	10,0%	9,5%	9,1%	16,0%	12,6%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	9,1%	10,0%	9,5%	9,1%	16,0%	12,6%	10,6%
Gêne dans le travail	4,1%	2,9%	3,6%	4,6%	6,7%	5,6%	4,3%
Traitements ou autre soin	3,0%	3,2%	3,1%	3,4%	6,1%	4,8%	3,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>							
Existence d'un problème	6,0%	13,2%	9,1%	7,9%	24,3%	16,2%	11,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	13,2%	9,0%	7,9%	24,3%	16,2%	11,5%
Gêne dans le travail	3,3%	7,1%	5,0%	3,4%	15,6%	9,6%	6,6%
Traitements ou autre soin	1,1%	3,9%	2,3%	1,1%	11,2%	6,2%	3,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>							
Existence d'un problème	17,1%	25,8%	20,9%	17,0%	26,7%	21,9%	21,3%
Plaintes ou signes cliniques	16,2%	25,5%	20,3%	17,0%	26,7%	21,9%	20,8%
Gêne dans le travail	8,1%	10,8%	9,3%	11,4%	14,5%	13,0%	10,6%
Traitements ou autre soin	4,7%	8,3%	6,3%	5,1%	10,6%	7,9%	6,9%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	20,7%	33,3%	26,2%	22,7%	39,7%	31,3%	28,0%
Plaintes ou signes cliniques	20,2%	33,1%	25,8%	22,7%	39,7%	31,3%	27,8%
Gêne dans le travail	10,3%	14,7%	12,3%	13,7%	24,2%	19,0%	14,7%
Traitements ou autre soin	5,3%	10,2%	7,4%	5,7%	15,8%	10,8%	8,6%

**Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles**

Description de la population	Intermédiaires n=257	Employés n=314	Ouvriers n=321	Base Evrest région n=1018
Répartition homme/femme	52,9% / 47,1%	27,4% / 72,6%	74,5% / 25,5%	54,1% / 45,9%
≤24ans	8,6%	11,1%	9,0%	8,7%
25-34ans	34,2%	26,4%	29,9%	29,0%
35-44ans	23,0%	24,5%	28,0%	26,6%
45-54ans	26,1%	28,3%	24,0%	26,9%
55 ans et plus	8,2%	9,6%	9,0%	8,7%
C. Industrie manufacturière	16,7%	3,2%	36,4%	19,2%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	13,2%	0,3%	0,3%	4,0%
F. Construction	2,7%	0,3%	12,5%	4,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	10,1%	15,6%	10,3%	11,5%
H. Transports et entreposage	2,7%	3,2%	10,0%	5,0%
I. Hébergement et restauration	0,8%	5,7%	1,9%	2,6%
J. Information et communication	3,1%	0,0%	0,0%	1,7%
K. Activités financières et d'assurance	17,1%	15,0%	0,3%	13,3%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	7,0%	6,4%	3,7%	6,6%
N. Activités de services administratifs et de soutien	1,9%	6,4%	15,3%	7,4%
O. Administration publique	2,7%	15,9%	1,9%	6,4%
Q. Santé humaine et action sociale	15,6%	18,5%	3,4%	11,3%
S. Autres activités de services	1,6%	3,2%	0,9%	1,8%

Conditions de travail	Intermédiaires n=257	Employés n=314	Ouvriers n=321	Base Evrest région n=1018
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	81,6%	84,7%	87,5%	84,4%
Oui, raison médicale	0,4%	1,3%	0,6%	0,8%
Oui, autre raison	16,8%	12,5%	9,7%	13,1%
Oui, raison non précisée	1,2%	1,6%	2,2%	1,7%
Travail à temps plein	89,8%	71,1%	90,0%	83,9%
Travail en journée normale	85,0%	81,7%	63,9%	78,7%
Coupures de plus de 2 heures	9,2%	18,5%	14,5%	14,3%
Horaires décalés	20,2%	23,9%	38,3%	26,5%
Horaires irréguliers ou alternés	23,6%	29,3%	36,0%	27,8%
Travail de nuit	9,5%	7,6%	25,9%	13,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	9,7%	1,3%	4,5%	6,8%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	7,5%	26,9%	33,1%	20,9%
Rarement	45,9%	45,6%	47,9%	43,6%
Assez souvent	33,3%	21,0%	12,6%	23,8%
Très souvent	13,3%	6,6%	6,3%	11,7%
-Sauter ou écourter un repas, pas prendre de pause				
Jamais	29,0%	47,4%	52,2%	40,7%
Rarement	42,0%	29,7%	31,9%	35,4%
Assez souvent	23,1%	18,0%	11,9%	17,9%
Très souvent	5,9%	4,9%	4,1%	6,0%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	26,5%	41,6%	45,7%	36,3%
Rarement	41,5%	36,7%	38,1%	39,0%
Assez souvent	26,9%	15,1%	12,7%	19,4%
Très souvent	5,1%	6,6%	3,5%	5,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	4,3%	4,6%	6,6%	4,8%
1	4,3%	6,2%	8,5%	6,0%
2	11,3%	12,1%	12,0%	11,0%
3	11,7%	16,3%	12,0%	13,4%
4	7,4%	10,1%	10,1%	9,0%
5	19,8%	17,6%	21,2%	20,2%
6	12,5%	10,1%	9,5%	10,8%
7	17,5%	8,8%	10,4%	12,9%
8	8,9%	10,4%	7,0%	8,9%
9	2,3%	2,9%	2,2%	2,6%
10	0,0%	1,0%	0,3%	0,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	41,2%	33,2%	29,4%	35,6%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	54,9%	44,2%	36,0%	48,5%
<i>Parmi eux :</i>				
- Perturbe le travail	68,1%	60,8%	50,0%	60,6%
- Aspect positif du travail	30,1%	37,7%	42,9%	39,3%

Appréciations sur le travail	Intermédiaires n=257	Employés n=314	Ouvriers n=321	Base Evrest région n=1018
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	2,7%	8,3%	10,0%	6,5%
Plutôt non	7,8%	13,7%	11,0%	10,2%
Plutôt oui	40,2%	44,4%	46,4%	43,2%
Oui tout à fait	49,2%	33,5%	32,6%	40,1%
-Travail varié				
Non pas du tout	0,4%	7,4%	8,8%	5,2%
Plutôt non	8,9%	13,5%	15,7%	11,9%
Plutôt oui	46,3%	46,3%	43,3%	44,7%
Oui tout à fait	44,4%	32,8%	32,3%	38,1%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	4,3%	9,7%	12,6%	8,1%
Plutôt non	20,3%	21,9%	17,4%	18,8%
Plutôt oui	43,8%	40,6%	38,8%	41,8%
Oui tout à fait	31,6%	27,7%	31,2%	31,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	1,6%	5,2%	7,5%	4,6%
Plutôt non	12,1%	16,5%	7,2%	12,0%
Plutôt oui	54,3%	50,8%	51,1%	52,8%
Oui tout à fait	32,0%	27,5%	34,2%	30,7%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	1,2%	1,6%	1,3%	1,2%
Plutôt non	11,0%	11,7%	9,2%	10,4%
Plutôt oui	63,4%	61,0%	52,5%	59,0%
Oui tout à fait	24,4%	25,6%	37,0%	29,3%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	4,7%	5,3%	6,4%	5,0%
Plutôt non	16,8%	16,8%	14,7%	15,2%
Plutôt oui	56,3%	54,3%	47,4%	53,8%
Oui tout à fait	22,3%	23,7%	31,4%	26,0%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	24,5%	37,5%	35,7%	32,3%
Plutôt non	52,6%	43,8%	43,7%	47,5%
Plutôt oui	19,0%	15,1%	17,3%	16,7%
Oui tout à fait	4,0%	3,6%	3,3%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	59,7%	63,9%	59,1%	60,7%
Plutôt non	30,8%	25,8%	27,6%	28,6%
Plutôt oui	7,5%	7,0%	9,3%	7,8%
Oui tout à fait	2,0%	3,3%	4,0%	2,9%

Charge physique du poste de travail	Intermédiaires n=257	Employés n=314	Ouvriers n=321	Base Evrest region n=1018
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	55,5%	47,9%	24,7%	46,3%
Oui parfois	33,5%	28,6%	41,9%	32,9%
Oui souvent	11,0%	23,5%	33,4%	20,8%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	55,5%	47,9%	24,7%	46,3%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	16,9%	25,4%	34,1%	23,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	25,6%	24,1%	38,4%	27,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	2,0%	2,6%	2,8%	2,4%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	59,4%	49,4%	32,3%	50,9%
Oui parfois	31,6%	30,8%	38,6%	31,3%
Oui souvent	9,0%	19,8%	29,2%	17,7%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, Port de charges lourdes	59,4%	49,4%	32,3%	50,9%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	15,6%	25,3%	33,2%	22,4%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	23,4%	21,4%	29,8%	23,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	1,6%	3,9%	4,7%	3,1%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	54,7%	28,2%	23,7%	38,9%
Oui parfois	24,6%	27,2%	28,1%	25,9%
Oui souvent	20,7%	44,7%	48,3%	35,2%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	54,7%	28,2%	23,7%	38,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	9,4%	18,8%	25,9%	16,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	33,2%	46,0%	42,9%	38,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,7%	7,1%	7,6%	5,5%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	59,8%	61,4%	37,4%	55,7%
Oui parfois	18,0%	14,1%	21,8%	17,5%
Oui souvent	22,3%	24,4%	40,8%	26,8%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	59,8%	61,4%	37,4%	55,7%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	9,4%	8,0%	17,4%	10,6%
Importants déplacements à pieds, pas diff. ou pénible	28,1%	27,7%	41,1%	30,7%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	2,7%	2,9%	4,0%	3,1%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	59,1%	43,3%	22,1%	44,8%
Oui parfois	16,9%	18,9%	25,5%	20,4%
Oui souvent	24,0%	37,8%	52,3%	34,7%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	59,1%	43,3%	22,1%	44,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	13,4%	17,3%	24,0%	16,8%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	24,8%	34,3%	45,5%	33,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	2,8%	5,1%	8,4%	5,1%

Expositions	Intermédiaires n=257	Employés n=314	Ouvriers n=321	Base Evrest région n=1018
Produits chimiques	24,5%	26,5%	45,8%	30,5%
Poussières, fumées	24,5%	28,3%	56,9%	34,4%
Rx ionisants	9,3%	0,3%	4,2%	4,1%
Vibrations	12,1%	4,9%	40,1%	17,8%
Gêne sonore	42,1%	30,2%	57,5%	41,7%
Bruit > 80db	23,5%	11,9%	44,4%	25,6%
Contrainte visuelle	35,7%	30,2%	28,7%	32,0%
Conduite routière prolongée	17,6%	3,6%	14,6%	13,2%
Chaleur intense	12,2%	12,4%	17,3%	13,3%
Froid intense	7,5%	10,4%	14,4%	9,7%
Intempéries	12,2%	10,1%	31,1%	17,0%
Pression psychologique	28,2%	24,5%	14,7%	22,3%
Agent biologique	13,7%	13,4%	7,1%	10,4%
Contact avec le public	63,1%	72,5%	48,3%	59,4%

Formation	Intermédiaires n=257	Employés n=314	Ouvriers n=321	Base Evrest région n=1018
A bénéficié d'une formation depuis un an	60,8%	46,5%	42,3%	51,0%
<i>Parmi eux :</i>				
- En rapport avec le travail actuel	93,4%	90,8%	88,1%	91,5%
- En rapport avec le travail futur	14,2%	15,3%	18,8%	16,5%
- Formation d'intérêt général	41,0%	38,9%	38,2%	38,4%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	34,7%	20,1%	18,4%	26,2%

Mode de vie	Intermédiaires n=257	Employés n=314	Ouvriers n=321	Base Evrest région n=1018
Activité sportive régulière	53,0%	43,9%	44,2%	48,1%
Consommation de tabac	27,6%	34,4%	51,1%	37,3%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	7,5%	7,1%	14,0%	8,8%
Consommation de café	80,2%	71,0%	85,5%	79,4%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	17,1%	16,7%	19,9%	17,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,7%	15,9%	10,5%	15,3%

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest region		
	<45 ans n=169	≥45 ans n=88*	Ensemble n=257	<45 ans n=195	≥45 ans n=119	Ensemble n=314	<45 ans n=215	≥45 ans n=106	Ensemble n=321	<45 ans n=655	≥45 ans n=363	Global n=1018
<b>Indice de masse corporelle</b>												
- Normaux / maigres	56,7%	45,8%	53,0%	54,7%	42,6%	50,2%	56,5%	30,8%	47,9%	56,9%	41,2%	51,3%
- Surpoids	32,9%	38,6%	34,8%	28,9%	33,9%	30,8%	29,7%	45,2%	34,8%	30,2%	38,9%	33,3%
- Obèses	10,4%	15,7%	12,1%	16,3%	23,5%	19,0%	13,9%	24,0%	17,3%	12,9%	19,9%	15,4%
<b>Appareil respiratoire</b>												
Existence d'un problème	3,0%	8,0%	4,7%	5,7%	8,6%	6,8%	6,6%	8,5%	7,3%	5,1%	8,9%	6,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	8,0%	4,7%	4,7%	8,6%	6,2%	6,2%	8,5%	6,9%	4,6%	8,7%	6,1%
Gêne dans le travail	0,0%	1,1%	0,4%	1,0%	0,9%	1,0%	0,0%	0,9%	0,3%	0,5%	1,1%	0,7%
Traitement ou autre soin	3,0%	5,7%	3,9%	4,2%	3,4%	3,9%	4,3%	4,7%	4,4%	3,7%	4,7%	4,1%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>												
Existence d'un problème	2,4%	9,1%	4,7%	4,2%	3,5%	3,9%	2,8%	4,7%	3,5%	3,1%	4,8%	3,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,4%	6,8%	3,9%	3,7%	3,5%	3,6%	2,8%	4,7%	3,5%	3,0%	4,2%	3,4%
Gêne dans le travail	1,2%	3,4%	2,0%	2,6%	0,0%	1,7%	1,0%	1,0%	1,0%	1,4%	1,1%	1,3%
Traitement ou autre soin	0,6%	4,5%	2,0%	1,6%	1,8%	1,6%	1,0%	3,8%	1,9%	1,1%	2,8%	1,7%
<b>HTA</b>												
Existence d'un problème	3,6%	21,6%	9,8%	2,6%	18,3%	8,5%	3,8%	18,1%	8,6%	3,3%	18,2%	8,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	15,9%	7,9%	2,1%	14,8%	6,9%	1,9%	11,4%	5,1%	2,3%	13,2%	6,2%
Gêne dans le travail	0,0%	2,3%	0,8%	0,0%	0,9%	0,3%	0,5%	2,9%	1,3%	0,2%	1,7%	0,7%
Traitement ou autre soin	1,8%	14,0%	6,0%	2,1%	14,0%	6,6%	2,4%	14,4%	6,4%	2,2%	13,9%	6,4%
<b>Lassitude, fatigue</b>												
Existence d'un problème	20,8%	34,9%	25,6%	33,5%	29,6%	32,0%	18,6%	24,5%	20,6%	23,4%	27,8%	25,0%
Plaintes ou signes cliniques	20,8%	34,9%	25,6%	32,1%	29,6%	31,1%	18,2%	22,9%	19,7%	22,9%	27,3%	24,5%
Gêne dans le travail	9,5%	20,9%	13,4%	15,3%	14,8%	15,1%	8,2%	14,2%	10,2%	10,8%	15,7%	12,5%
Traitement ou autre soin	1,2%	10,6%	4,3%	4,3%	2,6%	3,7%	1,4%	2,9%	1,9%	2,0%	4,6%	2,9%
<b>Anxiété, nervosité</b>												
Existence d'un problème	16,2%	33,3%	22,0%	30,7%	36,5%	32,9%	17,5%	22,6%	19,2%	21,9%	29,7%	24,7%
Plaintes ou signes cliniques	15,7%	33,3%	21,7%	30,2%	36,5%	32,6%	17,5%	21,7%	18,9%	21,6%	29,4%	24,4%
Gêne dans le travail	7,8%	20,7%	12,2%	12,5%	9,6%	11,4%	6,2%	10,5%	7,6%	8,2%	11,5%	9,4%
Traitement ou autre soin	1,2%	10,3%	4,3%	7,4%	7,1%	7,3%	3,3%	7,7%	4,8%	3,6%	7,4%	4,9%
<b>Troubles du sommeil</b>												
Existence d'un problème	12,1%	35,6%	20,2%	19,5%	32,5%	24,3%	13,8%	17,9%	15,2%	15,5%	27,1%	19,6%
Plaintes ou signes cliniques	12,1%	34,1%	19,6%	19,0%	32,5%	24,1%	12,6%	16,0%	13,7%	15,0%	25,9%	18,9%
Gêne dans le travail	6,1%	8,1%	6,8%	9,5%	8,8%	9,2%	4,8%	7,5%	5,7%	6,3%	7,9%	6,9%
Traitement ou autre soin	1,2%	10,3%	4,4%	6,3%	7,1%	6,6%	1,9%	9,4%	4,5%	3,5%	8,2%	5,2%
<b>➤ Troubles neuro- psychiques (les 3 signes ci-dessus)</b>												
Existence d'un problème	4,8%	18,6%	9,4%	9,9%	6,1%	8,5%	6,2%	7,5%	6,6%	6,7%	9,6%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,2%	18,6%	9,1%	9,9%	6,1%	8,5%	5,3%	7,5%	6,0%	6,2%	9,6%	7,4%
Gêne dans le travail	2,4%	5,7%	3,5%	3,1%	3,5%	3,3%	2,8%	1,9%	2,5%	2,6%	3,1%	2,8%
Traitement ou autre soin	0,6%	6,9%	2,7%	0,5%	0,0%	0,3%	1,4%	0,0%	1,0%	0,8%	1,7%	1,1%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest région		
	<45 ans n=169	≥45 ans n=88*	Ensemble n=257	<45 ans n=195	≥45 ans n=119	Ensemble n=314	<45 ans n=215	≥45 ans n=106	Ensemble n=321	<45 ans n=655	≥45 ans n=363	Global n=1018
<b>Digestif</b>												
Existence d'un problème	10,9%	19,3%	13,8%	7,4%	12,7%	9,4%	7,8%	10,8%	8,8%	8,1%	13,2%	9,9%
Plaintes ou signes cliniques	10,9%	19,3%	13,8%	7,4%	12,7%	9,4%	7,4%	9,8%	8,2%	7,9%	12,6%	9,6%
Gêne dans le travail	1,2%	4,5%	2,4%	1,1%	1,9%	1,4%	2,0%	2,0%	2,0%	1,3%	2,3%	1,6%
TraITEMENT ou autre soin	4,8%	12,5%	7,5%	4,8%	7,5%	5,8%	4,9%	3,9%	4,6%	4,6%	7,6%	5,6%
<b>Dermatologie</b>												
Existence d'un problème	12,0%	11,5%	11,8%	9,0%	10,3%	9,5%	5,7%	7,5%	6,3%	9,2%	9,8%	9,4%
Plaintes ou signes cliniques	11,4%	11,5%	11,5%	9,0%	9,6%	9,2%	5,2%	6,6%	5,7%	8,8%	9,3%	8,9%
Gêne dans le travail	1,2%	0,0%	0,8%	2,1%	0,9%	1,6%	1,4%	0,0%	1,0%	1,6%	0,6%	1,2%
TraITEMENT ou autre soin	7,2%	8,0%	7,5%	4,8%	0,9%	3,3%	2,4%	3,8%	2,8%	5,0%	3,9%	4,6%
<b>Troubles de l'audition</b>												
Existence d'un problème	5,4%	5,7%	5,5%	1,6%	8,7%	4,3%	4,3%	12,5%	7,0%	4,4%	9,0%	6,0%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	5,7%	5,1%	1,6%	8,7%	4,3%	3,8%	12,5%	6,7%	4,1%	9,0%	5,8%
Gêne dans le travail	0,0%	4,5%	1,6%	0,5%	4,3%	2,0%	1,4%	3,9%	2,2%	0,8%	3,7%	1,8%
TraITEMENT ou autre soin	1,2%	1,1%	1,2%	0,5%	1,7%	1,0%	0,0%	1,9%	0,6%	0,5%	1,4%	0,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>												
Existence d'un problème	6,0%	9,1%	7,1%	7,3%	21,6%	12,7%	9,9%	24,5%	14,8%	7,3%	17,8%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,0%	8,0%	6,7%	7,3%	21,6%	12,7%	9,9%	24,5%	14,8%	7,3%	17,6%	11,0%
Gêne dans le travail	4,2%	6,9%	5,1%	3,6%	11,3%	6,5%	4,8%	17,0%	8,9%	3,7%	10,6%	6,2%
TraITEMENT ou autre soin	2,4%	5,7%	3,6%	3,1%	7,0%	4,6%	1,4%	6,7%	3,2%	2,0%	5,9%	3,4%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>												
Existence d'un problème	1,2%	9,1%	4,0%	4,7%	11,2%	7,1%	2,8%	7,6%	4,4%	3,3%	8,9%	5,3%
Plaintes ou signes cliniques	1,2%	9,1%	4,0%	4,7%	11,2%	7,1%	2,8%	7,6%	4,4%	3,3%	8,9%	5,3%
Gêne dans le travail	0,6%	5,7%	2,4%	1,6%	5,2%	2,9%	0,9%	4,8%	2,2%	1,2%	4,7%	2,5%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	5,7%	2,0%	2,1%	2,6%	2,3%	0,9%	1,9%	1,3%	1,1%	3,1%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>												
Existence d'un problème	4,8%	10,2%	6,7%	7,3%	12,9%	9,4%	6,1%	14,3%	8,8%	5,7%	11,4%	7,8%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	9,1%	6,3%	7,3%	12,9%	9,4%	6,1%	13,5%	8,5%	5,7%	10,9%	7,6%
Gêne dans le travail	1,8%	3,4%	2,4%	3,6%	7,0%	4,9%	3,3%	8,7%	5,1%	2,6%	6,2%	3,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,2%	6,8%	3,1%	2,6%	1,8%	2,3%	2,4%	3,8%	2,9%	1,9%	3,7%	2,5%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b>												
<i>(l'un des 3 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	10,2%	21,6%	14,2%	14,6%	33,6%	21,8%	15,6%	34,6%	21,8%	13,3%	28,6%	18,8%
Plaintes ou signes cliniques	10,2%	20,5%	13,8%	14,6%	33,6%	21,8%	15,6%	34,0%	21,6%	13,3%	28,1%	18,6%
Gêne dans le travail	6,0%	11,5%	7,9%	6,8%	16,5%	10,4%	7,7%	24,3%	13,1%	6,4%	16,4%	9,9%
TraITEMENT ou autre soin	3,0%	12,6%	6,3%	5,2%	10,5%	7,2%	3,8%	9,9%	5,8%	3,8%	10,3%	6,1%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest région		
	<45 ans n=169	≥45 ans n=88*	Ensemble n=257	<45 ans n=195	≥45 ans n=119	Ensemble n=314	<45 ans n=215	≥45 ans n=106	Ensemble n=321	<45 ans n=655	≥45 ans n=363	Global n=1018
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>												
Existence d'un problème	6,7%	19,3%	11,1%	10,5%	14,0%	11,8%	11,8%	9,6%	11,1%	9,5%	12,6%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	19,3%	11,1%	10,5%	14,0%	11,8%	11,8%	9,6%	11,1%	9,5%	12,6%	10,6%
Gêne dans le travail	3,0%	8,0%	4,8%	3,7%	6,1%	4,6%	4,7%	5,8%	5,1%	3,6%	5,6%	4,3%
Traitements ou autre soin	3,6%	11,4%	6,3%	4,8%	1,8%	3,6%	2,4%	3,9%	2,9%	3,1%	4,8%	3,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>												
Existence d'un problème	6,6%	19,3%	11,0%	12,0%	20,9%	15,3%	8,5%	12,3%	9,7%	9,1%	16,2%	11,6%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	19,3%	11,0%	11,5%	20,9%	15,0%	8,5%	12,3%	9,7%	9,0%	16,2%	11,5%
Gêne dans le travail	3,0%	10,3%	5,5%	6,8%	12,3%	8,8%	4,3%	7,6%	5,4%	5,0%	9,6%	6,6%
Traitements ou autre soin	3,6%	12,5%	6,7%	3,1%	5,3%	3,9%	1,0%	3,8%	1,9%	2,3%	6,2%	3,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>												
Existence d'un problème	20,6%	17,4%	19,5%	26,2%	23,3%	25,1%	19,9%	25,7%	21,8%	20,9%	21,9%	21,3%
Plaintes ou signes cliniques	20,1%	17,4%	19,2%	26,2%	23,3%	25,1%	18,3%	25,7%	20,8%	20,3%	21,9%	20,8%
Gêne dans le travail	8,5%	8,1%	8,4%	12,6%	12,2%	12,4%	8,7%	18,1%	11,9%	9,3%	13,0%	10,6%
Traitements ou autre soin	6,1%	10,5%	7,6%	9,0%	7,8%	8,6%	4,3%	7,6%	5,4%	6,3%	7,9%	6,9%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>												
(l'un des 2 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	24,2%	27,9%	25,5%	33,0%	35,7%	34,0%	24,5%	33,3%	27,4%	26,2%	31,3%	28,0%
Plaintes ou signes cliniques	23,8%	27,9%	25,2%	33,0%	35,7%	34,0%	23,8%	33,3%	27,0%	25,8%	31,3%	27,8%
Gêne dans le travail	10,3%	15,1%	12,0%	16,8%	20,2%	18,0%	11,2%	23,1%	15,2%	12,3%	19,0%	14,7%
Traitements ou autre soin	7,9%	16,3%	10,8%	10,6%	9,7%	10,3%	4,9%	10,6%	6,8%	7,4%	10,8%	8,6%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=195	Base Evrest région n=1018
Répartition hommes/femmes	69,7% / 30,3%	54,1% / 45,9%
≤24ans	7,2%	8,7%
25-34ans	22,1%	29,0%
35-44ans	31,3%	26,6%
45-54ans	28,2%	26,9%
55 ans et plus	11,3%	8,7%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,0%	0,3%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	12,8%	12,1%
Professions intermédiaires	22,1%	25,2%
Employés	5,1%	30,8%
Ouvriers	60,0%	31,5%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=195	Base Evrest région n=1018
-Changement de travail depuis 1an :		
Non	89,2%	84,4%
Oui, raison médicale	1,5%	0,8%
Oui, autre raison	6,7%	13,1%
Oui, raison non précisée	2,6%	1,7%
Travail à temps plein	93,8%	83,9%
Travail en journée normale	58,4%	78,7%
Coupures de plus de 2 heures	6,2%	14,3%
Horaires décalés	42,7%	26,5%
Horaires irréguliers ou alternés	40,3%	27,8%
Travail de nuit	26,3%	13,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	10,0%	6,8%
-Dépasser ses horaires normaux		
Jamais	31,1%	20,9%
Rarement	39,9%	43,6%
Assez souvent	16,6%	23,8%
Très souvent	12,4%	11,7%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause		
Jamais	46,7%	40,7%
Rarement	35,4%	35,4%
Assez souvent	12,8%	17,9%
Très souvent	5,1%	6,0%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin		
Jamais	36,8%	36,3%
Rarement	40,4%	39,0%
Assez souvent	20,7%	19,4%
Très souvent	2,1%	5,3%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)		
0	4,7%	4,8%
1	3,1%	6,0%
2	13,1%	11,0%
3	14,1%	13,4%
4	9,9%	9,0%
5	22,0%	20,2%
6	7,3%	10,8%
7	13,6%	12,9%
8	8,9%	8,9%
9	3,1%	2,6%
10	0,0%	0,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	33,0%	35,6%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	49,2%	48,5%
<i>Parmi eux :</i>		
- Perturbe le travail	64,1%	60,6%
- Aspect positif du travail	44,1%	39,3%

Appréciations sur le travail	C. Industrie manufacturière n=195	Base Evrest région n=1018
-Travail permet d'apprendre		
Non pas du tout	7,7%	6,5%
Plutôt non	8,2%	10,2%
Plutôt oui	43,6%	43,2%
Oui tout à fait	40,5%	40,1%
-Travail varié		
Non pas du tout	4,6%	5,2%
Plutôt non	12,9%	11,9%
Plutôt oui	38,1%	44,7%
Oui tout à fait	44,3%	38,1%
-Choix dans la façon de procéder		
Non pas du tout	10,4%	8,1%
Plutôt non	16,7%	18,8%
Plutôt oui	38,5%	41,8%
Oui tout à fait	34,4%	31,2%
-Possibilités suffisantes d'entraide		
Non pas du tout	4,6%	4,6%
Plutôt non	7,2%	12,0%
Plutôt oui	55,7%	52,8%
Oui tout à fait	32,5%	30,7%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité		
Non pas du tout	1,1%	1,2%
Plutôt non	9,2%	10,4%
Plutôt oui	59,2%	59,0%
Oui tout à fait	30,4%	29,3%
-Travail reconnu		
Non pas du tout	6,3%	5,0%
Plutôt non	13,6%	15,2%
Plutôt oui	51,3%	53,8%
Oui tout à fait	28,8%	26,0%
-Faire des choses que l'on désapprouve		
Non pas du tout	30,0%	32,3%
Plutôt non	50,6%	47,5%
Plutôt oui	14,4%	16,7%
Oui tout à fait	5,0%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi		
Non pas du tout	51,4%	60,7%
Plutôt non	35,4%	28,6%
Plutôt oui	10,5%	7,8%
Oui tout à fait	2,8%	2,9%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=195	Base Evrest région n=1018
<b>Postures contraignantes :</b>		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	42,3%	46,3%
Oui parfois	37,6%	32,9%
Oui souvent	20,1%	20,8%
<i>Difficulté</i>		
Pas de postures contraignantes	42,3%	46,3%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	26,3%	23,6%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	29,4%	27,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	2,1%	2,4%
<b>Effort, Port de charges lourdes :</b>		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	48,5%	50,9%
Oui parfois	32,0%	31,3%
Oui souvent	19,6%	17,7%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'effort, Port de charges lourdes	48,5%	50,9%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	24,2%	22,4%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	23,2%	23,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	4,1%	3,1%
<b>Gestes répétitifs :</b>		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	37,1%	38,9%
Oui parfois	23,7%	25,9%
Oui souvent	39,2%	35,2%
<i>Difficulté</i>		
Pas de gestes répétitifs	37,1%	38,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	23,7%	16,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	33,0%	38,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	6,2%	5,5%
<b>Importants déplacements à pieds :</b>		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	42,1%	55,7%
Oui parfois	21,5%	17,5%
Oui souvent	36,4%	26,8%
<i>Difficulté</i>		
Pas d'importants déplacements à pieds	42,1%	55,7%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	15,4%	10,6%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	38,5%	30,7%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	4,1%	3,1%
<b>Station debout prolongée :</b>		
<i>Fréquence</i>		
Non jamais	34,4%	44,8%
Oui parfois	23,1%	20,4%
Oui souvent	42,6%	34,7%
<i>Difficulté</i>		
Pas de station debout prolongée	34,4%	44,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	20,5%	16,8%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	37,9%	33,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	7,2%	5,1%

<b>Expositions</b>	<b>C. Industrie manufacturière n=195</b>	<b>Base Evrest région n=1018</b>
Produits chimiques	33,3%	30,5%
Poussières, fumées	40,5%	34,4%
Rx ionisants	5,8%	4,1%
Vibrations	25,4%	17,8%
Gêne sonore	58,9%	41,7%
Bruit > 80db	51,3%	25,6%
Contrainte visuelle	42,3%	32,0%
Conduite routière prolongée	6,8%	13,2%
Chaleur intense	16,2%	13,3%
Froid intense	8,8%	9,7%
Intempéries	9,4%	17,0%
Pression psychologique	20,7%	22,3%
Agent biologique	3,6%	10,4%
Contact avec le public	24,6%	59,4%

<b>Formation</b>	<b>C. Industrie manufacturière n=195</b>	<b>Base Evrest région n=1018</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	44,8%	51,0%
<i>Parmi eux :</i>		
- En rapport avec le travail actuel	82,8%	91,5%
- En rapport avec le travail futur	20,3%	16,5%
- Formation d'intérêt général	44,9%	38,4%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	28,9%	26,2%

<b>Mode de vie</b>	<b>C. Industrie manufacturière n=195</b>	<b>Base Evrest région n=1018</b>
Activité sportive régulière	47,3%	48,1%
Consommation de tabac	41,1%	37,3%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	12,0%	8,8%
Consommation de café	83,2%	79,4%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	22,5%	17,5%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,1%	15,3%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			Base Evrest région		
	<45 ans n=118	≥45 ans n=77*	Ensemble n=195	<45 ans n=655	≥45 ans n=363	Global n=1018
<b>Indice de masse corporelle</b>						
- Normaux / maigres	58,2%	30,1%	47,0%	56,9%	41,2%	51,3%
- Surpoids	30,0%	49,3%	37,7%	30,2%	38,9%	33,3%
- Obèses	11,8%	20,5%	15,3%	12,9%	19,9%	15,4%
<b>Appareil respiratoire</b>						
Existence d'un problème	5,2%	6,5%	5,7%	5,1%	8,9%	6,5%
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	6,5%	5,2%	4,6%	8,7%	6,1%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	1,1%	0,7%
Traitements ou autre soin	4,3%	3,9%	4,2%	3,7%	4,7%	4,1%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>						
Existence d'un problème	6,1%	2,6%	4,7%	3,1%	4,8%	3,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	2,6%	4,7%	3,0%	4,2%	3,4%
Gêne dans le travail	1,8%	0,0%	1,1%	1,4%	1,1%	1,3%
Traitements ou autre soin	1,8%	1,3%	1,6%	1,1%	2,8%	1,7%
<b>HTA</b>						
Existence d'un problème	6,1%	16,9%	10,5%	3,3%	18,2%	8,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,4%	10,4%	6,8%	2,3%	13,2%	6,2%
Gêne dans le travail	0,9%	2,6%	1,6%	0,2%	1,7%	0,7%
Traitements ou autre soin	3,5%	12,0%	6,9%	2,2%	13,9%	6,4%
<b>Lassitude, fatigue</b>						
Existence d'un problème	27,6%	20,8%	24,9%	23,4%	27,8%	25,0%
Plaintes ou signes cliniques	26,1%	19,7%	23,6%	22,9%	27,3%	24,5%
Gêne dans le travail	11,4%	11,7%	11,5%	10,8%	15,7%	12,5%
Traitements ou autre soin	0,0%	2,6%	1,1%	2,0%	4,6%	2,9%
<b>Anxiété, nervosité</b>						
Existence d'un problème	20,7%	22,1%	21,2%	21,9%	29,7%	24,7%
Plaintes ou signes cliniques	20,7%	22,1%	21,2%	21,6%	29,4%	24,4%
Gêne dans le travail	7,0%	10,5%	8,4%	8,2%	11,5%	9,4%
Traitements ou autre soin	0,9%	5,3%	2,6%	3,6%	7,4%	4,9%
<b>Troubles du sommeil</b>						
Existence d'un problème	14,9%	18,2%	16,2%	15,5%	27,1%	19,6%
Plaintes ou signes cliniques	14,2%	18,2%	15,8%	15,0%	25,9%	18,9%
Gêne dans le travail	5,3%	7,8%	6,3%	6,3%	7,9%	6,9%
Traitements ou autre soin	1,8%	3,9%	2,6%	3,5%	8,2%	5,2%
<b>➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)</b>						
Existence d'un problème	5,2%	3,9%	4,7%	6,7%	9,6%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	3,9%	3,7%	6,2%	9,6%	7,4%
Gêne dans le travail	0,9%	2,6%	1,6%	2,6%	3,1%	2,8%
Traitements ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	1,7%	1,1%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			Base Evrest région		
	<45 ans n=118	≥45 ans n=77*	Ensemble n=195	<45 ans n=655	≥45 ans n=363	Global n=1018
<b>Digestif</b>						
Existence d'un problème	10,6%	13,5%	11,8%	8,1%	13,2%	9,9%
Plaintes ou signes cliniques	9,8%	12,2%	10,8%	7,9%	12,6%	9,6%
Gêne dans le travail	1,8%	2,7%	2,1%	1,3%	2,3%	1,6%
Traitements ou autre soin	5,3%	6,8%	5,9%	4,6%	7,6%	5,6%
<b>Dermatologie</b>						
Existence d'un problème	11,2%	10,4%	10,9%	9,2%	9,8%	9,4%
Plaintes ou signes cliniques	10,3%	9,1%	9,8%	8,8%	9,3%	8,9%
Gêne dans le travail	0,9%	0,0%	0,5%	1,6%	0,6%	1,2%
Traitements ou autre soin	6,1%	5,2%	5,7%	5,0%	3,9%	4,6%
<b>Troubles de l'audition</b>						
Existence d'un problème	11,2%	9,2%	10,4%	4,4%	9,0%	6,0%
Plaintes ou signes cliniques	11,2%	9,2%	10,4%	4,1%	9,0%	5,8%
Gêne dans le travail	2,6%	4,0%	3,1%	0,8%	3,7%	1,8%
Traitements ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	1,4%	0,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>						
Existence d'un problème	9,6%	22,1%	14,7%	7,3%	17,8%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	9,6%	22,1%	14,7%	7,3%	17,6%	11,0%
Gêne dans le travail	5,4%	11,7%	7,9%	3,7%	10,6%	6,2%
Traitements ou autre soin	0,0%	6,5%	2,6%	2,0%	5,9%	3,4%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>						
Existence d'un problème	3,5%	9,1%	5,7%	3,3%	8,9%	5,3%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	9,1%	5,7%	3,3%	8,9%	5,3%
Gêne dans le travail	2,6%	3,9%	3,1%	1,2%	4,7%	2,5%
Traitements ou autre soin	0,9%	2,6%	1,6%	1,1%	3,1%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>						
Existence d'un problème	5,2%	15,8%	9,4%	5,7%	11,4%	7,8%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	15,8%	9,4%	5,7%	10,9%	7,6%
Gêne dans le travail	3,5%	10,5%	6,3%	2,6%	6,2%	3,9%
Traitements ou autre soin	1,7%	6,6%	3,7%	1,9%	3,7%	2,5%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b>						
(l'un des 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	15,7%	28,9%	20,9%	13,3%	28,6%	18,8%
Plaintes ou signes cliniques	15,7%	28,9%	20,9%	13,3%	28,1%	18,6%
Gêne dans le travail	8,8%	18,4%	12,7%	6,4%	16,4%	9,9%
Traitements ou autre soin	2,7%	10,7%	5,9%	3,8%	10,3%	6,1%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. industrie manufacturière			Base Evrest région		
	<45 ans n=118	≥45 ans n=77*	Ensemble n=195	<45 ans n=655	≥45 ans n=363	Global n=1018
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>						
Existence d'un problème	10,3%	14,3%	11,9%	9,5%	12,6%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	10,3%	14,3%	11,9%	9,5%	12,6%	10,6%
Gêne dans le travail	5,2%	7,9%	6,3%	3,6%	5,6%	4,3%
Traitements ou autre soin	4,3%	5,3%	4,7%	3,1%	4,8%	3,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>						
Existence d'un problème	11,2%	14,3%	12,4%	9,1%	16,2%	11,6%
Plaintes ou signes cliniques	11,2%	14,3%	12,4%	9,0%	16,2%	11,5%
Gêne dans le travail	5,3%	9,1%	6,8%	5,0%	9,6%	6,6%
Traitements ou autre soin	1,8%	3,9%	2,6%	2,3%	6,2%	3,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>						
Existence d'un problème	18,3%	24,0%	20,5%	20,9%	21,9%	21,3%
Plaintes ou signes cliniques	16,7%	24,0%	19,6%	20,3%	21,9%	20,8%
Gêne dans le travail	8,8%	17,3%	12,2%	9,3%	13,0%	10,6%
Traitements ou autre soin	7,0%	5,3%	6,3%	6,3%	7,9%	6,9%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b> <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>						
Existence d'un problème	26,7%	33,3%	29,3%	26,2%	31,3%	28,0%
Plaintes ou signes cliniques	26,7%	33,3%	29,3%	25,8%	31,3%	27,8%
Gêne dans le travail	12,4%	24,0%	17,0%	12,3%	19,0%	14,7%
Traitements ou autre soin	8,8%	9,3%	9,0%	7,4%	10,8%	8,6%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence