



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2011-2012

**Région Languedoc Roussillon**

**Juillet 2013**

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2011-2012 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

## **Descriptif de l'échantillon Languedoc Roussillon**

L'exploitation des données de la région Languedoc Roussillon a porté sur **834 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2011 (n=366) et 2012 (n=468), puis saisies dans la base de données Everest.

L'échantillon régional de salariés ayant participé à Everest est proche du champ des salariés concernés par les DADS de l'INSEE (salariés du privé et du public) sur les critères étudiés (tableau 1). Ces quelques paramètres ne permettent cependant pas de garantir la représentativité de l'échantillon de salariés de la région.

Le nombre de fiches 2011-2012 de la région permet cette année de fournir des résultats descriptifs séparément pour les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers ; en revanche, aucun secteur d'activité n'est suffisamment représenté pour faire l'objet d'un descriptif détaillé (tableaux 2 et 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Languedoc Roussillon 2011-2012 aux données Insee (DADS 2010) et Acoss (2011).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Languedoc Roussillon	Données INSEE 2010 (DADS)	Données ACOSS 2011
	2011-2012 (n=834)	%	%
<b>Sexe</b>			
Hommes	51,2	50,2	-
Femmes	48,8	49,8	-
<b>Age</b>			
≤ 24 ans	10,6	14,6	-
25-34 ans	25,4	23,6	-
35-44 ans	26,6	25,2	-
45- 54 ans	24,3	24,1	-
55 ans et plus	13,1	12,5	-
<b>Catégorie socioprofessionnelle</b>			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,2	0,7	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	10,0	11,7	-
Professions intermédiaires	24,1	19,5	-
Employés	39,0	44,1	-
Ouvriers	26,7	24,1	-
<b>Secteur d'activité</b>			
Agriculture	0,1	0,1	0,0
Industrie	9,1	8,2	11,7
Construction	7,7	7,1	10,0
Commerce	15,7	15,1	20,9
Services	67,4	69,6	57,4

- : informations non disponibles

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Languedoc Roussillon 2011-2012 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	2	0,2
Cadres et professions intellectuelles supérieures	83	10,0
<b>Professions intermédiaires</b>	<b>201</b>	<b>24,1</b>
<b>Employés</b>	<b>325</b>	<b>39,0</b>
<b>Ouvriers</b>	<b>223</b>	<b>26,7</b>
Total général	834	100,0

Tableau 3: Descriptif de l'échantillon régional Languedoc Roussillon 2011-2012 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
<b>AGRICULTURE</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>
A. Agriculture, sylviculture et pêche	1	0,1
<b>INDUSTRIE</b>	<b>76</b>	<b>9,1</b>
B. Industries extractives	2	0,2
C. Industrie manufacturière	68	8,2
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	0	0,0
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	6	0,7
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>64</b>	<b>7,7</b>
F. Construction	64	7,7
<b>COMMERCE</b>	<b>131</b>	<b>15,7</b>
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	131	15,7
<b>SERVICES</b>	<b>562</b>	<b>67,4</b>
H. Transports et entreposage	27	3,2
I. Hébergement et restauration	53	6,4
J. Information et communication	18	2,2
K. Activités financières et d'assurance	55	6,6
L. Activités immobilières	28	3,4
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	52	6,2
N. Activités de services administratifs et de soutien	69	8,3
O. Administration publique	74	8,9
P. Enseignement	6	0,7
Q. Santé humaine et action sociale	125	15,0
R. Arts, spectacles et activités récréatives	8	1,0
S. Autres activités de services	47	5,6
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférencierées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0	0,0
<b>Total général</b>	<b>834</b>	<b>100,0</b>

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=427	Femmes n=407	Ensemble n=834
≤24ans	12,6%	8,4%	10,6%
25-34ans	27,4%	23,3%	25,4%
35-44ans	26,9%	26,3%	26,6%
45-54ans	23,7%	25,1%	24,3%
55 ans et plus	9,4%	17,0%	13,1%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,5%	0,0%	0,2%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	11,5%	8,4%	10,0%
Professions intermédiaires	20,4%	28,0%	24,1%
Employés	23,9%	54,8%	39,0%
Ouvriers	43,8%	8,8%	26,7%
C. Industrie manufacturière	11,2%	4,9%	8,2%
D. Production et distribution d'électricité, gaz,vapeur et air conditionné	0,0%	0,0%	0,0%
F. Construction	14,1%	1,0%	7,7%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	13,6%	17,9%	15,7%
H. Transports et entreposage	5,2%	1,2%	3,2%
I. Hébergement et restauration	7,7%	4,9%	6,4%
J. Information et communication	2,8%	1,5%	2,2%
K. Activités financières et d'assurance	4,9%	8,4%	6,6%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	5,2%	7,4%	6,2%
N. Activités de services administratifs et de soutien	10,1%	6,4%	8,3%
O. Administration publique	8,0%	9,8%	8,9%
Q. Santé humaine et action sociale	8,4%	21,9%	15,0%
S. Autres activités de services	3,0%	8,4%	5,6%

Conditions de travail	Hommes n=427	Femmes n=407	Ensemble n=834
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	82,9%	88,1%	85,4%
Oui, raison médicale	0,5%	1,5%	1,0%
Oui, autre raison	15,5%	9,2%	12,4%
Oui, raison non précisée	1,2%	1,2%	1,2%
Travail à temps plein	87,7%	66,4%	77,3%
Travail en journée normale	74,7%	81,1%	77,8%
Coupures de plus de 2 heures	20,8%	19,7%	20,3%
Horaires décalés	32,1%	22,0%	27,2%
Horaires irréguliers ou alternés	26,5%	25,5%	26,0%
Travail de nuit	13,9%	6,4%	10,3%
Déplacements professionnels de plus de 24h	11,3%	4,4%	7,9%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	16,9%	18,8%	17,8%
Rarement	44,4%	43,1%	43,8%
Assez souvent	24,5%	26,5%	25,5%
Très souvent	14,3%	11,6%	13,0%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	45,3%	45,5%	45,4%
Rarement	33,5%	31,1%	32,3%
Assez souvent	15,1%	15,7%	15,4%
Très souvent	6,1%	7,7%	6,9%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	37,1%	34,5%	35,8%
Rarement	39,7%	39,5%	39,6%
Assez souvent	18,2%	20,6%	19,4%
Très souvent	5,0%	5,5%	5,2%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	6,9%	2,5%	4,7%
1	4,7%	5,0%	4,9%
2	9,5%	10,5%	10,0%
3	11,3%	10,0%	10,7%
4	10,4%	9,5%	10,0%
5	19,9%	16,3%	18,1%
6	10,4%	12,0%	11,2%
7	11,8%	17,3%	14,5%
8	10,9%	11,5%	11,2%
9	1,7%	3,5%	2,6%
10	2,6%	1,8%	2,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	37,4%	46,1%	41,6%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue <i>Parmi eux :</i>	46,9%	52,7%	49,8%
- Perturbe le travail	56,7%	63,2%	60,1%
- Aspect positif du travail	45,0%	40,6%	42,8%

Appréciations sur le travail	Hommes n=427	Femmes n=407	Ensemble n=834
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	7,3%	7,4%	7,3%
Plutôt non	10,8%	13,1%	11,9%
Plutôt oui	47,7%	37,2%	42,5%
Oui tout à fait	34,3%	42,4%	38,2%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,0%	4,9%	4,4%
Plutôt non	18,3%	14,3%	16,3%
Plutôt oui	41,3%	41,6%	41,5%
Oui tout à fait	36,4%	39,2%	37,7%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	7,1%	8,6%	7,9%
Plutôt non	18,5%	20,2%	19,3%
Plutôt oui	43,6%	42,9%	43,2%
Oui tout à fait	30,8%	28,3%	29,6%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	2,8%	3,7%	3,3%
Plutôt non	12,5%	16,1%	14,3%
Plutôt oui	54,6%	52,1%	53,4%
Oui tout à fait	30,0%	28,0%	29,1%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,7%	5,0%	3,3%
Plutôt non	13,3%	9,4%	11,4%
Plutôt oui	54,3%	62,4%	58,3%
Oui tout à fait	30,7%	23,3%	27,0%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	6,5%	8,3%	7,4%
Plutôt non	15,5%	16,5%	16,0%
Plutôt oui	52,8%	55,6%	54,2%
Oui tout à fait	25,2%	19,5%	22,4%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	32,4%	30,7%	31,6%
Plutôt non	46,7%	48,8%	47,7%
Plutôt oui	17,6%	16,8%	17,2%
Oui tout à fait	3,3%	3,7%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	56,8%	58,0%	57,4%
Plutôt non	29,8%	30,4%	30,1%
Plutôt oui	10,0%	8,1%	9,1%
Oui tout à fait	3,3%	3,5%	3,4%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=427	Femmes n=407	Ensemble n=834
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	41,1%	45,1%	43,1%
Oui parfois	35,7%	34,2%	35,0%
Oui souvent	23,2%	20,7%	22,0%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	41,1%	45,1%	43,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	27,0%	28,8%	27,9%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	28,8%	21,4%	25,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	3,1%	4,7%	3,9%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	42,9%	54,5%	48,5%
Oui parfois	36,3%	29,9%	33,1%
Oui souvent	20,9%	15,7%	18,3%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	42,9%	54,5%	48,5%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	26,8%	26,9%	26,8%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	26,3%	14,7%	20,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible non précisé	4,0%	4,0%	4,0%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	31,2%	32,3%	31,7%
Oui parfois	33,1%	23,3%	28,3%
Oui souvent	35,7%	44,4%	40,0%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	31,2%	32,3%	31,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	18,7%	21,1%	19,9%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	44,0%	39,7%	41,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	6,1%	6,9%	6,5%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	56,3%	67,7%	61,9%
Oui parfois	20,6%	11,9%	16,3%
Oui souvent	23,2%	20,3%	21,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	56,3%	67,7%	61,9%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	11,1%	9,2%	10,2%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	30,0%	21,1%	25,7%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible non précisé	2,6%	2,0%	2,3%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	35,4%	49,5%	42,3%
Oui parfois	24,1%	12,1%	18,2%
Oui souvent	40,6%	38,4%	39,5%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	35,4%	49,5%	42,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	19,8%	20,9%	20,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	35,6%	20,4%	28,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	9,2%	9,1%	9,2%

<b>Expositions</b>	<b>Hommes n=427</b>	<b>Femmes n=407</b>	<b>Ensemble n=834</b>
Produits chimiques	30,0%	23,7%	26,9%
Poussières, fumées	46,0%	19,5%	32,9%
Rx ionisants	2,9%	4,8%	3,8%
Vibrations	34,1%	6,4%	20,5%
Gêne sonore	48,6%	25,9%	37,5%
Bruit > 80db	35,4%	10,7%	23,3%
Contrainte visuelle	35,9%	35,3%	35,6%
Conduite routière prolongée	22,5%	7,8%	15,3%
Chaleur intense	26,8%	10,8%	18,9%
Froid intense	25,1%	8,7%	17,1%
Intempéries	30,1%	5,5%	18,1%
Pression psychologique	26,7%	28,5%	27,6%
Agent biologique	7,9%	18,1%	12,9%
Contact avec le public	65,2%	77,4%	71,1%

<b>Formation</b>	<b>Hommes n=427</b>	<b>Femmes n=407</b>	<b>Ensemble n=834</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	35,9%	45,8%	40,7%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	94,0%	89,6%	91,5%
- En rapport avec le travail futur	22,1%	26,7%	24,6%
- Formation d'intérêt général	45,2%	45,5%	45,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	25,5%	26,1%	25,8%

<b>Mode de vie</b>	<b>Hommes n=427</b>	<b>Femmes n=407</b>	<b>Ensemble n=834</b>
Activité sportive régulière	52,6%	49,4%	51,0%
Consommation de tabac	43,1%	38,5%	40,9%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	12,3%	5,8%	9,1%
Consommation de café	83,6%	74,6%	79,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	17,1%	12,7%	15,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	11,7%	19,3%	15,4%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=834
	Hommes n=286	Femmes n=236	Ensemble n=522	Hommes n=141	Femmes n=171	Ensemble n=312	
<b>Indice de masse corporelle</b>							
- Normaux ou maigres	54,1%	72,2%	62,2%	38,2%	64,2%	52,3%	58,6%
- Surpoids	35,2%	19,1%	28,0%	43,4%	21,0%	31,2%	29,2%
- Obèses	10,7%	8,7%	9,8%	18,4%	14,8%	16,4%	12,2%
<b>Appareil respiratoire</b>							
Existence d'un problème	3,5%	4,3%	3,9%	5,9%	6,1%	6,0%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	4,3%	3,9%	5,1%	4,9%	5,0%	4,3%
Gêne dans le travail	1,4%	2,2%	1,7%	1,5%	1,2%	1,3%	1,6%
Traitements ou autres soins	1,8%	3,4%	2,5%	4,4%	5,5%	5,0%	3,4%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>							
Existence d'un problème	2,1%	3,0%	2,5%	6,0%	4,9%	5,4%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	3,0%	2,1%	4,5%	4,3%	4,4%	3,0%
Gêne dans le travail	0,4%	0,9%	0,6%	0,8%	0,6%	0,7%	0,6%
Traitements ou autres soins	1,1%	1,7%	1,4%	3,7%	3,7%	3,7%	2,2%
<b>HTA</b>							
Existence d'un problème	2,5%	2,2%	2,3%	9,6%	14,1%	12,1%	5,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	2,2%	2,3%	6,8%	9,8%	8,4%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,3%	0,1%
Traitements ou autres soins	0,7%	1,3%	1,0%	6,7%	13,5%	10,4%	4,5%
<b>Lassitude, fatigue</b>							
Existence d'un problème	13,7%	25,0%	18,8%	23,4%	27,3%	25,5%	21,2%
Plaintes ou signes cliniques	13,3%	24,6%	18,4%	22,1%	26,8%	24,7%	20,7%
Gêne dans le travail	6,3%	13,9%	9,7%	11,1%	12,9%	12,1%	10,6%
Traitements ou autres soins	1,1%	4,4%	2,5%	1,5%	5,6%	3,7%	3,0%
<b>Anxiété, nervosité</b>							
Existence d'un problème	14,0%	21,9%	17,6%	19,7%	28,7%	24,7%	20,2%
Plaintes ou signes cliniques	14,0%	21,5%	17,4%	17,6%	26,8%	22,7%	19,3%
Gêne dans le travail	5,6%	10,3%	7,7%	11,1%	13,4%	12,4%	9,4%
Traitements ou autres soins	2,8%	3,0%	2,9%	1,5%	6,3%	4,1%	3,3%
<b>Trouble du sommeil</b>							
Existence d'un problème	12,5%	18,3%	15,1%	20,7%	28,9%	25,2%	18,8%
Plaintes ou signes cliniques	11,4%	18,3%	14,5%	18,8%	27,4%	23,6%	17,8%
Gêne dans le travail	5,4%	7,0%	6,1%	8,3%	8,5%	8,4%	7,0%
Traitements ou autres soins	2,5%	1,7%	2,2%	4,5%	9,8%	7,5%	4,1%
<b>➤ Troubles neuro psychiques</b>							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	4,6%	7,7%	6,0%	9,5%	12,7%	11,3%	7,9%
Plaintes ou signes cliniques	4,2%	7,7%	5,8%	7,4%	11,0%	9,3%	7,1%
Gêne dans le travail	1,8%	3,0%	2,3%	5,2%	3,0%	4,0%	2,9%
Traitements ou autres soins	0,4%	0,0%	0,2%	0,0%	1,8%	1,0%	0,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=834
	Hommes n=286	Femmes n=236	Ensemble n=522	Hommes n=141	Femmes n=171	Ensemble n=312	
<b>Digestif</b>							
Existence d'un problème	6,8%	7,4%	7,1%	6,1%	7,6%	6,9%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	7,4%	6,7%	6,1%	7,0%	6,6%	6,7%
Gêne dans le travail	0,4%	2,6%	1,4%	3,8%	1,9%	2,8%	1,9%
Traitements ou autre soin	3,6%	3,9%	3,8%	2,3%	3,8%	3,1%	3,5%
<b>Dermatologie</b>							
Existence d'un problème	9,2%	9,0%	9,1%	6,7%	6,1%	6,3%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	9,0%	8,9%	5,9%	6,1%	6,0%	7,8%
Gêne dans le travail	1,8%	3,4%	2,5%	0,0%	2,4%	1,3%	2,1%
Traitements ou autre soin	6,0%	6,0%	6,0%	5,2%	2,4%	3,7%	5,2%
<b>Troubles de l'audition</b>							
Existence d'un problème	2,9%	2,2%	2,6%	13,9%	8,6%	11,0%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	2,2%	2,4%	13,1%	8,0%	10,3%	5,3%
Gêne dans le travail	0,7%	0,4%	0,6%	4,4%	6,7%	5,7%	2,5%
Traitements ou autre soin	0,4%	0,0%	0,2%	0,7%	1,8%	1,3%	0,6%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>							
Existence d'un problème	6,4%	6,1%	6,2%	16,2%	19,3%	17,9%	10,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,0%	6,1%	6,0%	16,2%	19,3%	17,9%	10,4%
Gêne dans le travail	4,3%	4,3%	4,3%	9,6%	10,8%	10,3%	6,5%
Traitements ou autre soin	1,8%	2,6%	2,1%	6,7%	11,0%	9,1%	4,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>							
Existence d'un problème	3,9%	2,2%	3,1%	8,8%	7,2%	7,9%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	2,2%	2,7%	8,8%	6,6%	7,6%	4,5%
Gêne dans le travail	2,5%	0,9%	1,8%	5,2%	4,8%	5,0%	3,0%
Traitements ou autre soin	1,4%	0,0%	0,8%	3,7%	3,7%	3,7%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>							
Existence d'un problème	4,2%	6,9%	5,4%	11,0%	13,3%	12,3%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	6,9%	5,3%	11,0%	12,8%	12,0%	7,7%
Gêne dans le travail	2,1%	2,2%	2,1%	7,4%	9,8%	8,7%	4,6%
Traitements ou autre soin	1,4%	1,7%	1,6%	4,4%	6,2%	5,4%	3,0%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)</b>							
Existence d'un problème	11,7%	13,5%	12,5%	24,3%	27,9%	26,2%	17,6%
Plaintes ou signes cliniques	11,3%	13,5%	12,3%	24,3%	27,4%	26,0%	17,4%
Gêne dans le travail	7,8%	6,6%	7,2%	16,3%	19,6%	18,1%	11,2%
Traitements ou autre soin	4,3%	4,4%	4,3%	11,1%	16,1%	13,9%	7,8%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=834
	Hommes n=286	Femmes n=236	Ensemble n=522	Hommes n=141	Femmes n=171	Ensemble n=312	
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>							
Existence d'un problème	8,5%	7,0%	7,8%	16,2%	18,7%	17,5%	11,4%
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	7,0%	7,4%	16,2%	17,6%	16,9%	10,9%
Gêne dans le travail	3,5%	3,5%	3,5%	8,9%	11,0%	10,0%	5,9%
TraITEMENT ou autre soin	2,8%	3,5%	3,1%	7,4%	9,8%	8,7%	5,2%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>							
Existence d'un problème	6,7%	12,1%	9,1%	12,4%	18,1%	15,5%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,3%	11,6%	8,7%	12,4%	17,6%	15,2%	11,1%
Gêne dans le travail	3,2%	6,9%	4,9%	8,1%	13,3%	11,0%	7,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,8%	6,5%	4,5%	3,7%	10,4%	7,4%	5,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>							
Existence d'un problème	16,3%	20,4%	18,2%	29,2%	27,1%	28,1%	21,8%
Plaintes ou signes cliniques	15,1%	20,1%	17,3%	28,1%	26,2%	27,1%	20,9%
Gêne dans le travail	8,6%	12,7%	10,4%	12,7%	18,9%	16,1%	12,5%
TraITEMENT ou autre soin	5,0%	9,2%	6,9%	10,4%	17,1%	14,0%	9,5%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	20,6%	29,0%	24,4%	33,6%	32,5%	33,0%	27,6%
Plaintes ou signes cliniques	19,7%	28,7%	23,8%	33,1%	31,7%	32,3%	26,9%
Gêne dans le travail	10,4%	17,1%	13,4%	16,4%	22,6%	19,8%	15,8%
TraITEMENT ou autre soin	6,8%	13,5%	9,9%	11,2%	20,7%	16,4%	12,3%

**Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles**

Description de la population	Professions intermédiaires n=201	Employés n=325	Ouvriers n=223	Base Everest région n=834
Répartition homme/femme	43,3% / 56,7%	31,4% / 68,6%	83,9% / 16,1%	51,2% / 48,8%
≤24ans	6,0%	12,0%	16,6%	10,6%
25-34ans	27,4%	23,7%	26,5%	25,4%
35-44ans	25,4%	24,6%	26,5%	26,6%
45-54ans	29,4%	21,5%	23,8%	24,3%
55 ans et plus	11,9%	18,2%	6,7%	13,1%
C. Industrie manufacturière	6,5%	1,2%	20,2%	8,2%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F. Construction	5,5%	0,9%	19,3%	7,7%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	12,4%	22,2%	11,7%	15,7%
H. Transports et entreposage	2,0%	1,5%	8,1%	3,2%
I. Hébergement et restauration	4,0%	8,6%	7,2%	6,4%
J. Information et communication	3,0%	0,6%	0,0%	2,2%
K. Activités financières et d'assurance	9,0%	8,9%	0,4%	6,6%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	9,0%	5,2%	2,7%	6,2%
N. Activités de services administratifs et de soutien	3,5%	7,7%	15,7%	8,3%
O. Administration publique	5,5%	14,8%	3,6%	8,9%
Q. Santé humaine et action sociale	25,4%	15,7%	4,0%	15,0%
S. Autres activités de services	7,0%	8,0%	2,7%	5,6%

Conditions de travail	Professions intermédiaires n=201	Employés n=325	Ouvriers n=223	Base Everest région n=834
-Changement de travail depuis 1an :				
Non	85,4%	86,4%	82,1%	85,4%
Oui, raison médicale	0,0%	1,5%	1,3%	1,0%
Oui, autre raison	12,6%	11,4%	15,7%	12,4%
Oui, raison non précisée	2,0%	0,6%	0,9%	1,2%
Travail à temps plein	82,5%	69,4%	84,6%	77,3%
Travail en journée normale	84,4%	73,1%	75,5%	77,8%
Coupures de plus de 2 heures	18,6%	19,4%	19,9%	20,3%
Horaires décalés	22,6%	26,6%	32,1%	27,2%
Horaires irréguliers ou alternés	22,6%	30,5%	24,4%	26,0%
Travail de nuit	4,3%	10,7%	13,9%	10,3%
Déplacements professionnels de plus de 24h	9,7%	3,2%	4,7%	7,9%
-Dépasser ses horaires normaux				
Jamais	8,0%	21,2%	27,3%	17,8%
Rarement	40,0%	45,8%	49,5%	43,8%
Assez souvent	35,0%	24,0%	16,4%	25,5%
Très souvent	17,0%	9,0%	6,8%	13,0%
-Sauter/écourter un repas, ne pas prendre de pause				
Jamais	37,9%	49,1%	54,5%	45,4%
Rarement	37,4%	31,4%	28,8%	32,3%
Assez souvent	19,7%	11,2%	11,7%	15,4%
Très souvent	5,1%	8,4%	5,0%	6,9%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais	27,1%	41,3%	41,8%	35,8%
Rarement	40,7%	36,6%	40,0%	39,6%
Assez souvent	27,1%	17,8%	13,6%	19,4%
Très souvent	5,0%	4,4%	4,5%	5,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)				
0	2,0%	5,3%	7,7%	4,7%
1	3,6%	6,6%	4,1%	4,9%
2	9,6%	9,7%	10,4%	10,0%
3	9,6%	10,0%	13,1%	10,7%
4	10,2%	11,3%	9,9%	10,0%
5	17,8%	17,2%	19,8%	18,1%
6	13,7%	9,1%	10,8%	11,2%
7	17,3%	13,8%	13,5%	14,5%
8	11,7%	12,2%	7,7%	11,2%
9	3,0%	2,5%	0,9%	2,6%
10	1,5%	2,2%	2,3%	2,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	47,2%	39,8%	35,1%	41,6%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	58,0%	49,4%	39,1%	49,8%
<i>Parmi eux :</i>				
- Perturbe le travail	66,1%	55,6%	53,8%	60,1%
- Aspect positif du travail	37,3%	45,6%	40,2%	42,8%

Appréciations sur le travail	Professions intermédiaires n=201	Employés n=325	Ouvriers n=223	Base Everest région n=834
-Travail permet d'apprendre				
Non pas du tout	3,5%	8,6%	11,7%	7,3%
Plutôt non	6,5%	16,7%	12,1%	11,9%
Plutôt oui	37,3%	41,7%	46,2%	42,5%
Oui tout à fait	52,7%	33,0%	30,0%	38,2%
-Travail varié				
Non pas du tout	1,0%	5,2%	7,6%	4,4%
Plutôt non	10,0%	21,6%	19,3%	16,3%
Plutôt oui	41,3%	41,4%	43,0%	41,5%
Oui tout à fait	47,8%	31,8%	30,0%	37,7%
-Choix dans la façon de procéder				
Non pas du tout	3,0%	11,2%	9,0%	7,9%
Plutôt non	14,5%	24,2%	21,2%	19,3%
Plutôt oui	48,5%	40,4%	42,3%	43,2%
Oui tout à fait	34,0%	24,2%	27,5%	29,6%
-Possibilités suffisantes d'entraide				
Non pas du tout	1,0%	4,4%	3,6%	3,3%
Plutôt non	15,9%	16,5%	10,9%	14,3%
Plutôt oui	51,7%	51,1%	55,9%	53,4%
Oui tout à fait	31,3%	28,0%	29,5%	29,1%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité				
Non pas du tout	2,0%	5,6%	2,3%	3,3%
Plutôt non	15,0%	10,9%	8,4%	11,4%
Plutôt oui	56,5%	58,4%	57,2%	58,3%
Oui tout à fait	26,5%	25,0%	32,1%	27,0%
-Travail reconnu				
Non pas du tout	6,0%	8,9%	8,3%	7,4%
Plutôt non	18,6%	15,9%	13,8%	16,0%
Plutôt oui	54,8%	53,0%	54,4%	54,2%
Oui tout à fait	20,6%	22,2%	23,5%	22,4%
-Faire des choses que l'on désapprouve				
Non pas du tout	33,8%	28,8%	34,5%	31,6%
Plutôt non	44,8%	47,6%	46,8%	47,7%
Plutôt oui	17,4%	19,4%	16,4%	17,2%
Oui tout à fait	4,0%	4,1%	2,3%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi				
Non pas du tout	54,0%	61,2%	55,7%	57,4%
Plutôt non	34,0%	29,5%	29,2%	30,1%
Plutôt oui	9,5%	6,2%	10,5%	9,1%
Oui tout à fait	2,5%	3,1%	4,6%	3,4%

Charge physique du poste de travail	Professions intermédiaires n=201	Employés n=325	Ouvriers n=223	Base Everest région n=834
Postures contraignantes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	54,5%	42,9%	22,3%	43,1%
Oui parfois	32,0%	34,6%	44,1%	35,0%
Oui souvent	13,5%	22,5%	33,6%	22,0%
<i>Difficulté</i>				
Pas de postures contraignantes	54,5%	42,9%	22,3%	43,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	19,0%	29,3%	40,9%	27,9%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	24,5%	22,2%	32,7%	25,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	2,0%	5,6%	4,1%	3,9%
Effort, Port de charges lourdes :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	59,7%	50,3%	25,6%	48,5%
Oui parfois	30,3%	33,1%	41,1%	33,1%
Oui souvent	10,0%	16,6%	33,3%	18,3%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'effort, Port de charges lourdes	59,7%	50,3%	25,6%	48,5%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	17,4%	27,2%	41,6%	26,8%
Effort, Port de charges lourdes, pas diff. ou pénible	18,4%	19,1%	27,4%	20,6%
Effort, Port de charges lourdes, diff. ou pénible n.p.	4,5%	3,4%	5,5%	4,0%
Gestes répétitifs :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	45,7%	26,3%	16,2%	31,7%
Oui parfois	27,1%	28,1%	32,0%	28,3%
Oui souvent	27,1%	45,6%	51,8%	40,0%
<i>Difficulté</i>				
Pas de gestes répétitifs	45,7%	26,3%	16,2%	31,7%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	13,1%	22,5%	27,0%	19,9%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	36,2%	44,1%	49,5%	41,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	5,0%	7,2%	7,2%	6,5%
Importants déplacements à pieds :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	65,8%	64,6%	48,0%	61,9%
Oui parfois	16,1%	14,3%	21,3%	16,3%
Oui souvent	18,1%	21,1%	30,8%	21,8%
<i>Difficulté</i>				
Pas d'importants déplacements à pieds	65,8%	64,6%	48,0%	61,9%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible	6,5%	11,5%	14,0%	10,2%
Importants dépl. à pieds, pas difficile ou pénible	26,1%	21,4%	34,8%	25,7%
Importants dépl. à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,5%	2,5%	3,2%	2,3%
Station debout prolongée :				
<i>Fréquence</i>				
Non jamais	52,2%	43,8%	20,4%	42,3%
Oui parfois	21,4%	13,9%	23,1%	18,2%
Oui souvent	26,4%	42,3%	56,6%	39,5%
<i>Difficulté</i>				
Pas de station debout prolongée	52,2%	43,8%	20,4%	42,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	12,4%	24,1%	27,1%	20,4%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	28,9%	22,8%	39,8%	28,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	6,5%	9,3%	12,7%	9,2%

Expositions	Professions intermédiaires n=201	Employés n=325	Ouvriers n=223	Base Everest région n=834
Produits chimiques	26,5%	19,8%	46,8%	26,9%
Poussières, fumées	19,5%	21,4%	68,5%	32,9%
Rx ionisants	9,1%	1,9%	1,4%	3,8%
Vibrations	12,6%	5,3%	55,0%	20,5%
Gêne sonore	30,3%	24,1%	69,5%	37,5%
Bruit > 80db	13,5%	8,9%	54,9%	23,3%
Contrainte visuelle	44,4%	28,7%	35,5%	35,6%
Conduite routière prolongée	20,4%	6,9%	20,2%	15,3%
Chaleur intense	10,6%	11,6%	40,4%	18,9%
Froid intense	12,6%	11,0%	33,5%	17,1%
Intempéries	14,1%	7,5%	39,9%	18,1%
Pression psychologique	37,2%	26,7%	17,9%	27,6%
Agent biologique	19,0%	15,2%	6,9%	12,9%
Contact avec le public	77,3%	82,6%	50,2%	71,1%

Formation	Professions intermédiaires n=201	Employés n=325	Ouvriers n=223	Base Everest région n=834
A bénéficié d'une formation depuis un an	51,0%	40,9%	28,8%	40,7%
Parmi eux :				
En rapport avec le travail actuel	90,0%	90,0%	96,7%	91,5%
En rapport avec le travail futur	23,7%	24,2%	33,9%	24,6%
Formation d'intérêt général	44,7%	47,5%	40,0%	45,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	38,1%	20,4%	15,4%	25,8%

Mode de vie	Professions intermédiaires n=201	Employés n=325	Ouvriers n=223	Base Everest région n=834
Activité sportive régulière	52,8%	50,5%	48,6%	51,0%
Consommation de tabac	36,9%	41,1%	49,5%	40,9%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	5,6%	8,2%	14,1%	9,1%
Consommation de café	77,7%	75,2%	83,9%	79,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	10,4%	14,0%	17,9%	15,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,9%	14,6%	11,7%	15,4%

Etat de santé	Professions intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=118	≥45 ans n=83*	Ensemble n=201	<45 ans n=196	≥45 ans n=129	Ensemble n=325	<45 ans n=155	≥45 ans n=68*	Ensemble n=223	<45 ans n=522	≥45 ans n=312	Global n=834
<b>Indice de masse corporelle</b>												
- Normaux / maigres	60,3%	58,2%	59,5%	66,7%	56,1%	62,5%	56,2%	40,9%	51,6%	62,2%	52,3%	58,6%
- Surpoids	30,2%	25,3%	28,2%	22,9%	28,5%	25,1%	32,0%	36,4%	33,3%	28,0%	31,2%	29,2%
- Obèses	9,5%	16,5%	12,3%	10,4%	15,4%	12,4%	11,8%	22,7%	15,1%	9,8%	16,4%	12,2%
<b>Appareil respiratoire</b>												
Existence d'un problème	5,2%	7,7%	6,2%	4,6%	8,0%	6,0%	2,6%	3,0%	2,7%	3,9%	6,0%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	6,5%	5,7%	4,6%	6,4%	5,3%	2,6%	3,0%	2,7%	3,9%	5,0%	4,3%
Gêne dans le travail	3,4%	2,6%	3,1%	1,5%	0,8%	1,3%	1,3%	1,5%	1,4%	1,7%	1,3%	1,6%
Traitements ou autre soin	3,5%	6,4%	4,7%	3,6%	7,3%	5,0%	1,3%	1,5%	1,4%	2,5%	5,0%	3,4%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>												
Existence d'un problème	0,9%	6,4%	3,1%	3,6%	8,1%	5,3%	2,6%	0,0%	1,8%	2,5%	5,4%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	0,9%	6,4%	3,1%	3,6%	5,7%	4,4%	1,3%	0,0%	0,9%	2,1%	4,4%	3,0%
Gêne dans le travail	0,9%	1,3%	1,0%	0,5%	0,8%	0,6%	0,6%	0,0%	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%
Traitements ou autre soin	0,9%	6,4%	3,1%	1,5%	4,9%	2,8%	1,9%	0,0%	1,4%	1,4%	3,7%	2,2%
<b>HTA</b>												
Existence d'un problème	3,5%	5,1%	4,2%	1,6%	17,9%	7,9%	2,6%	10,4%	5,0%	2,3%	12,1%	5,9%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	5,1%	4,2%	1,6%	12,3%	5,7%	2,6%	7,5%	4,1%	2,3%	8,4%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%
Traitements ou autre soin	0,9%	5,1%	2,6%	1,0%	15,4%	6,6%	1,3%	7,5%	3,2%	1,0%	10,4%	4,5%
<b>Digestif</b>												
Existence d'un problème	6,9%	5,3%	6,3%	8,9%	5,8%	7,7%	4,0%	9,2%	5,6%	7,1%	6,9%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	5,3%	6,3%	8,4%	5,0%	7,1%	4,0%	9,2%	5,6%	6,7%	6,6%	6,7%
Gêne dans le travail	0,9%	5,3%	2,6%	2,6%	1,7%	2,2%	0,0%	3,1%	0,9%	1,4%	2,8%	1,9%
Traitements ou autre soin	3,4%	2,7%	3,1%	6,3%	3,3%	5,1%	1,3%	4,6%	2,3%	3,8%	3,1%	3,5%
<b>Dermatologie</b>												
Existence d'un problème	11,2%	10,0%	10,7%	9,2%	6,5%	8,1%	5,8%	4,6%	5,5%	9,1%	6,3%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	11,2%	10,0%	10,7%	9,2%	5,6%	7,8%	5,8%	4,6%	5,5%	8,9%	6,0%	7,8%
Gêne dans le travail	3,4%	2,5%	3,1%	2,6%	1,6%	2,2%	2,6%	0,0%	1,8%	2,5%	1,3%	2,1%
Traitements ou autre soin	7,8%	5,0%	6,6%	6,1%	4,1%	5,3%	3,2%	3,1%	3,2%	6,0%	3,7%	5,2%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Professions intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=118	≥45 ans n=83*	Ensemble n=201	<45 ans n=196	≥45 ans n=129	Ensemble n=325	<45 ans n=155	≥45 ans n=68*	Ensemble n=223	<45 ans n=522	≥45 ans n=312	Global n=834
<b>Lassitude, fatigue</b>												
Existence d'un problème	28,7%	26,3%	27,7%	19,0%	25,0%	21,3%	10,3%	25,4%	14,9%	18,8%	25,5%	21,2%
Plaintes ou signes cliniques	28,7%	25,0%	27,2%	18,5%	24,4%	20,8%	9,7%	24,2%	14,0%	18,4%	24,7%	20,7%
Gêne dans le travail	17,4%	16,5%	17,0%	8,7%	12,2%	10,1%	4,5%	7,7%	5,5%	9,7%	12,1%	10,6%
TraITEMENT ou autre soin	6,1%	3,8%	5,2%	2,1%	5,8%	3,5%	0,6%	0,0%	0,5%	2,5%	3,7%	3,0%
<b>Anxiété, nervosité</b>												
Existence d'un problème	25,0%	23,8%	24,5%	17,9%	28,6%	22,1%	12,3%	23,9%	15,8%	17,6%	24,7%	20,2%
Plaintes ou signes cliniques	25,0%	22,5%	24,0%	17,4%	26,0%	20,8%	12,3%	21,2%	14,9%	17,4%	22,7%	19,3%
Gêne dans le travail	12,9%	15,0%	13,8%	8,2%	13,0%	10,1%	3,2%	7,7%	4,5%	7,7%	12,4%	9,4%
TraITEMENT ou autre soin	4,3%	2,6%	3,6%	2,6%	6,6%	4,1%	3,2%	1,5%	2,7%	2,9%	4,1%	3,3%
<b>Troubles du sommeil</b>												
Existence d'un problème	19,8%	30,0%	24,0%	17,5%	24,8%	20,4%	6,0%	21,5%	10,6%	15,1%	25,2%	18,8%
Plaintes ou signes cliniques	19,8%	28,8%	23,5%	17,0%	22,8%	19,2%	5,3%	20,3%	9,8%	14,5%	23,6%	17,8%
Gêne dans le travail	10,4%	12,7%	11,3%	5,7%	7,3%	6,3%	2,6%	4,8%	3,3%	6,1%	8,4%	7,0%
TraITEMENT ou autre soin	3,5%	10,3%	6,2%	2,1%	9,8%	5,1%	1,3%	1,6%	1,4%	2,2%	7,5%	4,1%
<b>➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)</b>												
Existence d'un problème	9,5%	11,3%	10,2%	7,2%	11,3%	8,8%	1,3%	11,9%	4,5%	6,0%	11,3%	7,9%
Plaintes ou signes cliniques	9,5%	10,0%	9,7%	7,2%	8,9%	7,9%	1,3%	9,1%	3,6%	5,8%	9,3%	7,1%
Gêne dans le travail	4,3%	6,3%	5,1%	2,1%	2,4%	2,2%	0,6%	3,1%	1,4%	2,3%	4,0%	2,9%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	2,5%	1,5%	0,0%	0,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	1,0%	0,5%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Professions intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Evrest région		
	<45 ans n=118	≥45 ans n=83*	Ensemble n=201	<45 ans n=196	≥45 ans n=129	Ensemble n=325	<45 ans n=155	≥45 ans n=68*	Ensemble n=223	<45 ans n=522	≥45 ans n=312	Global n=834
<b>Troubles de l'audition</b>												
Existence d'un problème	1,8%	13,8%	6,7%	1,0%	8,9%	4,1%	4,6%	13,6%	7,3%	2,6%	11,0%	5,7%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	12,5%	6,2%	1,0%	8,1%	3,8%	4,6%	13,6%	7,3%	2,4%	10,3%	5,3%
Gêne dans le travail	0,0%	7,6%	3,1%	0,5%	6,5%	2,8%	1,3%	3,1%	1,8%	0,6%	5,7%	2,5%
TraITEMENT ou autre soin	0,9%	1,3%	1,0%	0,0%	1,6%	0,6%	0,0%	1,5%	0,5%	0,2%	1,3%	0,6%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>												
Existence d'un problème	2,6%	15,0%	7,7%	7,7%	20,8%	12,8%	7,1%	18,2%	10,5%	6,2%	17,9%	10,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	15,0%	7,7%	7,7%	20,8%	12,8%	7,1%	18,2%	10,5%	6,0%	17,9%	10,4%
Gêne dans le travail	2,6%	10,0%	5,6%	5,1%	9,6%	6,9%	5,2%	13,8%	7,8%	4,3%	10,3%	6,5%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	7,5%	3,1%	3,1%	11,4%	6,3%	3,2%	7,8%	4,6%	2,1%	9,1%	4,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>												
Existence d'un problème	3,5%	11,3%	6,7%	2,1%	5,6%	3,4%	3,9%	10,6%	5,9%	3,1%	7,9%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	11,3%	6,7%	2,1%	4,8%	3,1%	3,2%	10,6%	5,5%	2,7%	7,6%	4,5%
Gêne dans le travail	2,6%	6,3%	4,1%	1,0%	3,2%	1,9%	2,6%	7,7%	4,1%	1,8%	5,0%	3,0%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	5,1%	3,6%	0,0%	3,2%	1,3%	0,7%	3,1%	1,4%	0,8%	3,7%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>												
Existence d'un problème	2,6%	6,3%	4,1%	6,2%	14,5%	9,4%	5,2%	19,7%	9,5%	5,4%	12,3%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	6,3%	4,1%	6,2%	13,8%	9,1%	5,2%	19,7%	9,5%	5,3%	12,0%	7,7%
Gêne dans le travail	0,0%	5,0%	2,1%	2,1%	10,7%	5,4%	3,9%	13,8%	6,8%	2,1%	8,7%	4,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	3,8%	1,5%	1,0%	6,6%	3,2%	2,6%	7,7%	4,1%	1,6%	5,4%	3,0%
<b>➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b>												
(l'un des 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	8,7%	25,0%	15,4%	12,9%	29,0%	19,2%	14,3%	27,3%	18,2%	12,5%	26,2%	17,6%
Plaintes ou signes cliniques	8,7%	25,0%	15,4%	12,9%	28,5%	18,9%	14,3%	27,3%	18,2%	12,3%	26,0%	17,4%
Gêne dans le travail	5,2%	17,5%	10,3%	6,7%	18,9%	11,4%	10,4%	21,5%	13,7%	7,2%	18,1%	11,2%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	11,4%	6,2%	4,1%	17,4%	9,2%	5,8%	12,3%	7,8%	4,3%	13,9%	7,8%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Professions intermédiaires			Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=118	≥45 ans n=83*	Ensemble n=201	<45 ans n=196	≥45 ans n=129	Ensemble n=325	<45 ans n=155	≥45 ans n=68*	Ensemble n=223	<45 ans n=522	≥45 ans n=312	Global n=834
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>												
Existence d'un problème	10,5%	17,5%	13,4%	5,2%	20,0%	11,0%	10,3%	18,2%	12,7%	7,8%	17,5%	11,4%
Plaintes ou signes cliniques	9,6%	17,5%	12,9%	5,2%	18,5%	10,4%	10,3%	18,2%	12,7%	7,4%	16,9%	10,9%
Gêne dans le travail	3,5%	7,5%	5,2%	2,6%	13,0%	6,6%	5,8%	12,3%	7,7%	3,5%	10,0%	5,9%
TraITEMENT ou autre soin	4,4%	7,5%	5,7%	3,1%	10,6%	6,0%	2,6%	10,8%	5,0%	3,1%	8,7%	5,2%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>												
Existence d'un problème	10,5%	16,3%	12,9%	10,7%	16,0%	12,8%	5,8%	17,9%	9,5%	9,1%	15,5%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	10,5%	16,3%	12,9%	10,2%	15,3%	12,2%	5,8%	17,9%	9,5%	8,7%	15,2%	11,1%
Gêne dans le travail	5,3%	10,0%	7,2%	6,6%	12,1%	8,8%	3,2%	13,6%	6,3%	4,9%	11,0%	7,1%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	5,0%	3,6%	6,7%	8,9%	7,5%	2,6%	9,1%	4,5%	4,5%	7,4%	5,5%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>												
Existence d'un problème	16,4%	26,3%	20,4%	18,7%	28,8%	22,6%	20,3%	29,9%	23,2%	18,2%	28,1%	21,8%
Plaintes ou signes cliniques	15,7%	24,4%	19,2%	17,8%	28,2%	21,9%	19,7%	28,8%	22,5%	17,3%	27,1%	20,9%
Gêne dans le travail	8,7%	12,8%	10,4%	10,9%	20,2%	14,6%	11,8%	18,5%	13,8%	10,4%	16,1%	12,5%
TraITEMENT ou autre soin	6,1%	11,4%	8,2%	8,9%	16,9%	12,0%	7,2%	13,8%	9,2%	6,9%	14,0%	9,5%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>												
Existence d'un problème	25,2%	32,5%	28,2%	24,7%	33,6%	28,2%	24,2%	34,3%	27,3%	24,4%	33,0%	27,6%
Plaintes ou signes cliniques	25,2%	31,6%	27,8%	24,0%	33,1%	27,5%	23,7%	33,3%	26,6%	23,8%	32,3%	26,9%
Gêne dans le travail	12,4%	17,9%	14,7%	14,6%	22,6%	17,7%	13,8%	23,1%	16,6%	13,4%	19,8%	15,8%
TraITEMENT ou autre soin	8,8%	13,9%	10,9%	13,0%	19,4%	15,5%	7,9%	16,9%	10,6%	9,9%	16,4%	12,3%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence