



## Evolution et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2011-2012

### Région Midi-Pyrénées

Juillet 2013



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2011-2012 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

## Descriptif de l'échantillon Midi-Pyrénées

L'exploitation des données de la région Midi-Pyrénées a porté sur **460 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2011 (n=143) et 2012 (n=317), puis saisies dans la base de données Evrest.

Cet échantillon de salariés est très différent de celui du champ des DADS de l'INSEE (secteur public et privé de la région) : les hommes, les professions intermédiaires, les secteurs de l'industrie et de la construction sont sur-représentés.

Les données globales concernant la région doivent donc être lues avec une grande prudence, et ne peuvent certainement pas être utilisées comme « référence » ; on leur préférera, pour les données régionales, les données par secteur d'activité (ou par catégories socioprofessionnelles).

Le nombre de fiches 2011-2012 de la région ne permet cette année de fournir que des résultats descriptifs en fonction du sexe.

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Midi-Pyrénées 2011-2012 aux données Insee (DADS 2010)

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Midi-Pyrénées 2011-2012 (n=460) %	Données INSEE 2010 (DADS) %
<b>Sexe</b>		
Hommes	69,3	51,4
Femmes	30,7	48,6
<b>Age</b>		
≤ 24 ans	5,0	13,4
25-34 ans	23,7	24,0
35-44 ans	27,0	25,3
45- 54 ans	32,8	24,6
55 ans et plus	11,5	12,7
<b>Catégorie socioprofessionnelle</b>		
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,7	0,7
Cadres et professions intellectuelles supérieures	17,2	15,1
Professions intermédiaires	36,1	20,8
Employés	20,7	39,2
Ouvriers	25,4	24,3
<b>Secteur d'activité</b>		
Agriculture	0,0	0,0
Industrie	52,4	13,1
Construction	15,9	6,7
Commerce	8,3	13,1
Services	23,5	67,1

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Midi-Pyrénées 2011-2012 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	3	0,7
Cadres et professions intellectuelles supérieures	79	17,2
Professions intermédiaires	166	36,1
Employés	95	20,7
Ouvriers	117	25,4
Total général	460	100,0

Tableau 3: Descriptif de l'échantillon régional Midi-Pyrénées 2011-2012 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
<b>AGRICULTURE</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
<b>INDUSTRIE</b>	<b>241</b>	<b>52,4</b>
B. Industries extractives	0	0,0
C. Industrie manufacturière	76	16,5
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	163	35,4
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	2	0,4
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>73</b>	<b>15,9</b>
F. Construction	73	15,9
<b>COMMERCE</b>	<b>38</b>	<b>8,3</b>
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	38	8,3
<b>SERVICES</b>	<b>108</b>	<b>23,5</b>
H. Transports et entreposage	10	2,2
I. Hébergement et restauration	14	3,0
J. Information et communication	1	0,2
K. Activités financières et d'assurance	5	1,1
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	16	3,5
N. Activités de services administratifs et de soutien	5	1,1
O. Administration publique	9	2,0
Q. Santé humaine et action sociale	29	6,3
R. Arts, spectacles et activités récréatives	6	1,3
S. Autres activités de services	13	2,8
<b>Total général</b>	<b>460</b>	<b>100,0</b>

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=319	Femmes n=141	Ensemble n=460
≤24ans	5,0%	5,0%	5,0%
25-34ans	22,9%	25,5%	23,7%
35-44ans	29,8%	20,6%	27,0%
45-54ans	31,7%	35,5%	32,8%
55 ans et plus	10,7%	13,5%	11,5%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	19,7%	11,3%	17,2%
Professions intermédiaires	39,5%	28,4%	36,1%
Employés	7,2%	51,1%	20,7%
Ouvriers	32,9%	8,5%	25,4%
C. Industrie manufacturière	19,4%	9,9%	16,5%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	42,6%	19,1%	35,4%
F. Construction	20,7%	5,0%	15,9%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	4,4%	17,0%	8,3%
H. Transports et entreposage	2,2%	2,1%	2,2%
I. Hébergement et restauration	1,6%	6,4%	3,0%
J. Information et communication	0,3%	0,0%	0,2%
K. Activités financières et d'assurance	0,0%	3,5%	1,1%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1,6%	7,8%	3,5%
N. Activités de services administratifs et de soutien	0,9%	1,4%	1,1%
O. Administration publique	1,3%	3,5%	2,0%
Q. Santé humaine et action sociale	1,3%	17,7%	6,3%
S. Autres activités de services	2,2%	4,3%	2,8%

Conditions de travail	Hommes n=319	Femmes n=141	Ensemble n=460
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	85,8%	85,1%	85,6%
Oui, raison médicale	0,6%	0,7%	0,7%
Oui, autre raison	13,2%	13,5%	13,3%
Oui, raison non précisée	0,3%	0,7%	0,4%
Travail à temps plein	92,1%	63,1%	83,2%
Travail en journée normale	83,0%	83,1%	83,0%
Coupures de plus de 2 heures	9,0%	23,4%	13,4%
Horaires décalés	24,1%	21,9%	23,4%
Horaires irréguliers ou alternés	23,1%	23,4%	23,2%
Travail de nuit	21,1%	3,7%	15,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	18,9%	5,1%	14,6%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	10,1%	19,1%	12,9%
Rarement	45,9%	38,3%	43,5%
Assez souvent	27,2%	27,7%	27,4%
Très souvent	16,8%	14,9%	16,2%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	35,3%	45,7%	38,5%
Rarement	46,7%	31,2%	42,0%
Assez souvent	13,9%	13,0%	13,6%
Très souvent	4,1%	10,1%	5,9%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	21,1%	29,9%	23,8%
Rarement	48,9%	31,4%	43,6%
Assez souvent	23,6%	29,9%	25,6%
Très souvent	6,4%	8,8%	7,1%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	1,9%	6,5%	3,3%
1	2,5%	7,2%	3,9%
2	7,9%	5,8%	7,2%
3	12,9%	9,4%	11,8%
4	10,7%	12,9%	11,4%
5	25,5%	22,3%	24,5%
6	13,2%	6,5%	11,2%
7	13,2%	12,2%	12,9%
8	9,1%	13,7%	10,5%
9	2,8%	3,6%	3,1%
10	0,3%	0,0%	0,2%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	38,7%	36,0%	37,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	54,9%	61,0%	56,8%
Parmi eux :			
- Perturbe le travail	69,2%	57,3%	65,4%
- Aspect positif du travail	36,7%	41,3%	38,2%

Appréciations sur le travail	Hommes n=319	Femmes n=141	Ensemble n=460
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	2,5%	9,9%	4,8%
Plutôt non	10,1%	14,2%	11,3%
Plutôt oui	53,1%	41,1%	49,5%
Oui tout à fait	34,3%	34,8%	34,4%
-Travail varié			
Non pas du tout	1,9%	7,8%	3,7%
Plutôt non	11,3%	14,2%	12,2%
Plutôt oui	47,6%	39,0%	45,0%
Oui tout à fait	39,2%	39,0%	39,1%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	4,7%	8,5%	5,9%
Plutôt non	15,8%	17,7%	16,4%
Plutôt oui	50,9%	39,0%	47,3%
Oui tout à fait	28,5%	34,8%	30,4%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	1,9%	7,1%	3,5%
Plutôt non	13,2%	15,6%	14,0%
Plutôt oui	53,3%	50,4%	52,4%
Oui tout à fait	31,5%	27,0%	30,1%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,9%	0,7%	1,5%
Plutôt non	13,5%	20,7%	15,7%
Plutôt oui	59,4%	57,9%	59,0%
Oui tout à fait	25,2%	20,7%	23,8%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	4,1%	7,9%	5,3%
Plutôt non	17,8%	19,3%	18,2%
Plutôt oui	59,7%	52,1%	57,4%
Oui tout à fait	18,4%	20,7%	19,1%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	19,6%	32,1%	23,4%
Plutôt non	58,0%	45,0%	54,0%
Plutôt oui	20,2%	18,6%	19,7%
Oui tout à fait	2,2%	4,3%	2,8%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	67,0%	58,0%	64,3%
Plutôt non	25,8%	28,3%	26,5%
Plutôt oui	6,3%	10,1%	7,5%
Oui tout à fait	0,9%	3,6%	1,8%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=319	Femmes n=141	Ensemble n=460
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	48,9%	54,7%	50,7%
Oui parfois	37,2%	28,1%	34,4%
Oui souvent	13,9%	17,3%	14,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	48,9%	54,7%	50,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	24,6%	25,9%	25,0%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	25,9%	18,7%	23,7%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	0,6%	0,7%	0,7%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	54,2%	61,4%	56,4%
Oui parfois	37,0%	26,4%	33,8%
Oui souvent	8,8%	12,1%	9,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	54,2%	61,4%	56,4%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	21,0%	22,9%	21,6%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	24,1%	14,3%	21,1%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,6%	1,4%	0,9%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	54,2%	39,6%	49,8%
Oui parfois	28,8%	30,2%	29,3%
Oui souvent	16,9%	30,2%	21,0%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	54,2%	39,6%	49,8%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	14,7%	27,3%	18,6%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	29,8%	31,7%	30,3%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	1,3%	1,4%	1,3%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	50,2%	71,2%	56,6%
Oui parfois	30,6%	9,4%	24,1%
Oui souvent	19,2%	19,4%	19,3%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	50,2%	71,2%	56,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	8,2%	8,6%	8,3%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	40,1%	19,4%	33,8%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,6%	0,7%	1,3%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	48,0%	57,9%	51,0%
Oui parfois	27,0%	15,0%	23,3%
Oui souvent	25,1%	27,1%	25,7%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	48,0%	57,9%	51,0%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	15,4%	21,4%	17,2%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	33,5%	17,9%	28,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisé	3,1%	2,9%	3,1%

Expositions	Hommes n=319	Femmes n=141	Ensemble n=460
Produits chimiques	31,9%	18,4%	27,7%
Poussières, fumées	42,0%	13,5%	33,2%
Rx ionisants	8,9%	2,9%	7,0%
Vibrations	26,5%	2,1%	19,0%
Gêne sonore	52,8%	26,6%	44,8%
Bruit > 80db	45,1%	6,4%	33,3%
Contrainte visuelle	38,2%	45,0%	40,3%
Conduite routière prolongée	22,7%	6,5%	17,8%
Chaleur intense	13,6%	9,3%	12,3%
Froid intense	11,6%	5,7%	9,8%
Intempéries	30,7%	6,4%	23,2%
Pression psychologique	28,9%	31,2%	29,6%
Agent biologique	5,1%	12,3%	7,3%
Contact avec le public	40,8%	68,6%	49,3%

Formation	Hommes n=319	Femmes n=141	Ensemble n=460
A bénéficié d'une formation depuis un an	62,8%	47,5%	58,1%
<i>Parmi eux :</i>			
En rapport avec le travail actuel	92,4%	87,7%	91,2%
En rapport avec le travail futur	13,8%	11,9%	13,4%
Formation d'intérêt général	42,7%	36,5%	41,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	34,6%	27,9%	32,5%

Mode de vie	Hommes n=319	Femmes n=141	Ensemble n=460
Activité sportive régulière	64,9%	51,1%	60,7%
Consommation de tabac	31,4%	29,5%	30,8%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	6,7%	4,3%	5,9%
Consommation de café	88,3%	78,4%	85,2%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	13,3%	5,8%	11,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	19,9%	23,5%	21,0%



Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=460
	Hommes n=184	Femmes n=72*	Ensemble n=256	Hommes n=135	Femmes n=69*	Ensemble n=204	
<b>Indice de masse corporelle</b>							
- Normaux ou maigres	56,6%	77,9%	62,4%	33,8%	50,8%	39,5%	52,4%
- Surpoids	34,1%	11,8%	28,0%	55,4%	29,2%	46,7%	36,2%
- Obèses	9,3%	10,3%	9,6%	10,8%	20,0%	13,8%	11,5%
<b>Appareil respiratoire</b>							
Existence d'un problème	5,4%	8,5%	6,3%	7,5%	3,0%	6,0%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	8,5%	6,3%	7,5%	3,0%	6,0%	6,1%
Gêne dans le travail	1,1%	0,0%	0,8%	1,5%	1,5%	1,5%	1,1%
Traitement ou autre soin	3,3%	5,6%	3,9%	2,2%	3,0%	2,5%	3,3%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>							
Existence d'un problème	2,2%	4,2%	2,7%	5,2%	10,6%	7,0%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	4,2%	2,7%	5,2%	10,6%	7,0%	4,6%
Gêne dans le travail	0,5%	1,4%	0,8%	1,5%	7,6%	3,5%	2,0%
Traitement ou autre soin	1,6%	1,4%	1,6%	4,5%	7,7%	5,5%	3,3%
<b>HTA</b>							
Existence d'un problème	3,3%	1,4%	2,8%	14,3%	16,7%	15,1%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	1,4%	2,4%	12,8%	15,2%	13,6%	7,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	3,0%	2,0%	0,9%
Traitement ou autre soin	0,5%	1,4%	0,8%	11,3%	10,6%	11,1%	5,3%
<b>Lassitude, fatigue</b>							
Existence d'un problème	26,1%	46,5%	31,8%	26,1%	40,3%	30,8%	31,4%
Plaintes ou signes cliniques	25,5%	46,5%	31,4%	24,6%	40,3%	29,9%	30,7%
Gêne dans le travail	10,3%	23,9%	14,1%	12,8%	23,9%	16,5%	15,2%
Traitement ou autre soin	0,5%	5,7%	2,0%	4,5%	6,1%	5,0%	3,3%
<b>Anxiété, nervosité</b>							
Existence d'un problème	20,7%	49,3%	28,6%	23,1%	32,8%	26,4%	27,6%
Plaintes ou signes cliniques	20,7%	49,3%	28,6%	23,1%	32,8%	26,4%	27,6%
Gêne dans le travail	8,7%	23,9%	12,9%	11,9%	16,4%	13,4%	13,2%
Traitement ou autre soin	1,6%	7,1%	3,1%	3,0%	7,6%	4,5%	3,7%
<b>Trouble du sommeil</b>							
Existence d'un problème	19,3%	26,8%	21,4%	22,4%	32,8%	25,9%	23,4%
Plaintes ou signes cliniques	19,3%	26,8%	21,4%	22,4%	32,8%	25,9%	23,4%
Gêne dans le travail	7,7%	11,3%	8,7%	5,2%	14,9%	8,5%	8,6%
Traitement ou autre soin	0,0%	2,8%	0,8%	3,7%	6,0%	4,5%	2,4%
➤ <b>Troubles neuro psychiques</b> (association des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	3,3%	16,9%	7,1%	8,2%	16,4%	10,9%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	16,9%	7,1%	7,5%	16,4%	10,4%	8,6%
Gêne dans le travail	1,1%	7,0%	2,7%	3,0%	7,5%	4,5%	3,5%
Traitement ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	3,0%	2,0%	0,9%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=460
	Hommes n=184	Femmes n=72*	Ensemble n=256	Hommes n=135	Femmes n=69*	Ensemble n=204	
<b>Digestif</b>							
Existence d'un problème	6,6%	23,5%	11,2%	7,6%	10,8%	8,6%	10,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	23,5%	11,2%	7,6%	10,8%	8,6%	10,1%
Gêne dans le travail	1,1%	7,4%	2,8%	3,0%	3,1%	3,0%	2,9%
Traitement ou autre soin	1,7%	10,3%	4,0%	3,8%	7,7%	5,1%	4,5%
<b>Dermatologie</b>							
Existence d'un problème	6,6%	15,5%	9,1%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	15,5%	9,1%	8,3%	9,0%	8,5%	8,8%
Gêne dans le travail	1,1%	5,6%	2,4%	0,0%	1,5%	0,5%	1,5%
Traitement ou autre soin	2,2%	8,5%	3,9%	5,3%	4,5%	5,0%	4,4%
<b>Troubles de l'audition</b>							
Existence d'un problème	7,7%	4,2%	6,7%	20,3%	10,6%	17,1%	11,3%
Plaintes ou signes cliniques	7,7%	2,8%	6,3%	20,3%	9,1%	16,6%	10,9%
Gêne dans le travail	2,2%	4,2%	2,8%	6,8%	4,6%	6,1%	4,2%
Traitement ou autre soin	0,6%	0,0%	0,4%	0,8%	1,5%	1,0%	0,7%
<b>Troubles ostéoarticulaires de l'épaule</b>							
Existence d'un problème	11,5%	12,7%	11,8%	15,0%	23,9%	18,0%	14,5%
Plaintes ou signes cliniques	11,5%	12,7%	11,8%	15,0%	23,9%	18,0%	14,5%
Gêne dans le travail	3,3%	9,9%	5,1%	9,8%	10,4%	10,1%	7,3%
Traitement ou autre soin	1,1%	4,2%	2,0%	5,3%	13,4%	8,0%	4,6%
<b>Troubles ostéoarticulaires du coude</b>							
Existence d'un problème	3,8%	2,8%	3,5%	6,0%	9,2%	7,1%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	2,8%	3,5%	6,0%	9,2%	7,1%	5,1%
Gêne dans le travail	1,1%	2,8%	1,6%	3,0%	4,6%	3,5%	2,4%
Traitement ou autre soin	0,0%	1,4%	0,4%	1,5%	3,1%	2,0%	1,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires du poignet</b>							
Existence d'un problème	6,0%	7,0%	6,3%	11,2%	31,8%	18,0%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	5,5%	7,0%	5,9%	10,4%	31,8%	17,5%	11,0%
Gêne dans le travail	2,7%	4,2%	3,1%	6,7%	21,2%	11,5%	6,8%
Traitement ou autre soin	1,1%	0,0%	0,8%	0,7%	15,2%	5,5%	2,9%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b> (l'un des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	18,6%	19,7%	18,9%	23,5%	45,5%	30,8%	24,1%
Plaintes ou signes cliniques	18,1%	19,7%	18,6%	23,5%	45,5%	30,8%	23,9%
Gêne dans le travail	6,6%	15,5%	9,1%	13,6%	27,7%	18,3%	13,1%
Traitement ou autre soin	2,2%	5,7%	3,2%	5,3%	23,1%	11,2%	6,7%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=460
	Hommes n=184	Femmes n=72*	Ensemble n=256	Hommes n=135	Femmes n=69*	Ensemble n=204	
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>							
Existence d'un problème	15,4%	14,1%	15,0%	23,3%	27,3%	24,6%	19,2%
Plaintes ou signes cliniques	15,4%	12,7%	14,6%	23,3%	27,3%	24,6%	19,0%
Gêne dans le travail	7,1%	4,2%	6,3%	12,0%	13,6%	12,6%	9,1%
Traitement ou autre soin	4,4%	4,2%	4,3%	7,5%	9,1%	8,0%	6,0%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales</b>							
Existence d'un problème	10,3%	16,9%	12,2%	13,6%	25,8%	17,7%	14,6%
Plaintes ou signes cliniques	10,3%	16,9%	12,2%	13,6%	25,8%	17,7%	14,6%
Gêne dans le travail	4,3%	7,0%	5,1%	9,8%	15,2%	11,6%	7,9%
Traitement ou autre soin	2,2%	8,5%	3,9%	2,3%	15,2%	6,6%	5,1%
<b>Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires</b>							
Existence d'un problème	21,2%	31,4%	24,0%	28,2%	27,3%	27,9%	25,7%
Plaintes ou signes cliniques	21,2%	31,4%	24,0%	28,2%	27,3%	27,9%	25,7%
Gêne dans le travail	7,7%	17,1%	10,3%	14,5%	16,7%	15,2%	12,4%
Traitement ou autre soin	6,6%	14,5%	8,8%	10,7%	16,7%	12,7%	10,5%
➤ <b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>							
<i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	25,5%	35,7%	28,3%	33,6%	37,9%	35,0%	31,3%
Plaintes ou signes cliniques	25,5%	35,7%	28,3%	33,6%	37,9%	35,0%	31,3%
Gêne dans le travail	11,5%	20,0%	13,8%	19,2%	22,7%	20,4%	16,7%
Traitement ou autre soin	8,2%	17,4%	10,8%	11,5%	21,2%	14,8%	12,5%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence