



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2011-2012

Région Picardie

Juillet 2013



EADS



L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2011-2012 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Picardie

L'exploitation des données de la région Picardie a porté sur **1085 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2011 (n=387) et 2012 (n=698).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Everest est assez éloigné de la répartition des salariés de la région Picarde, que ce soit pour les salariés du privé (Acoss) ou ceux du privé et du public (DADS) ; ceci est lié à la très forte participation des services de santé du travail du BTP, qui engendre une nette surreprésentation de ce secteur d'activité, et par conséquent des hommes et des ouvriers (tableau 1).

Les données globales concernant la région doivent donc être lues avec une grande prudence, et ne peuvent être utilisées comme « référence » ; on leur préfèrera les données nationales par secteur d'activité.

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Employés et les Ouvriers (tableau 2). La prudence s'impose encore à ce niveau, les ouvriers étant issus du secteur de la construction pour 41% d'entre eux, donc non représentatifs des ouvriers de la région.

En ce qui concerne les secteurs d'activité, seuls 2 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Construction.

Tableau 1 : Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Picardie 2011-2012 aux données Insee (DADS 2010) et Acoss (2011).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Picardie 2011-2012 (n=1085)	Données INSEE 2010 (DADS)	Données ACOSS 2011
	%	%	%
Sexe			
Hommes	63,4	52,5	-
Femmes	36,6	47,5	-
Age			
≤ 24 ans	11,0	14,3	-
25-34 ans	25,4	24,2	-
35-44 ans	29,0	25,4	-
45- 54 ans	25,5	24,3	-
55 ans et plus	9,0	11,8	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,5	0,6	-
Cadres et prof. intellectuelles supérieures	8,4	10,5	-
Professions intermédiaires	16,7	18,8	-
Employés	26,2	37,0	-
Ouvriers	48,3	33,1	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,1	0,0
Industrie	24,3	18,0	25,7
Construction	21,6	6,4	8,5
Commerce	15,5	12,8	16,4
Services	38,6	62,7	53,0

- : informations non disponibles

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Picardie 2011-2012 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	5	0,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures	91	8,4
Professions intermédiaires	181	16,7
Employés	284	26,2
Ouvriers	524	48,3
Total général	1085	100,0

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Picardie 2011-2012 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	0	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
INDUSTRIE	264	24,3
B. Industries extractives	4	0,4
C. Industrie manufacturière	249	22,9
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	2	0,2
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	9	0,8
CONSTRUCTION	234	21,6
F. Construction	264	21,6
COMMERCE	168	15,5
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	168	15,5
SERVICES	419	38,6
H. Transports et entreposage	57	5,3
I. Hébergement et restauration	28	2,6
J. Information et communication	8	0,7
K. Activités financières et d'assurance	19	1,8
L. Activités immobilières	22	2,0
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	39	3,6
N. Activités de services administratifs et de soutien	66	6,1
O. Administration publique	53	4,9
P. Enseignement	13	1,2
Q. Santé humaine et action sociale	85	7,8
R. Arts, spectacles et activités récréatives	3	0,3
S. Autres activités de services	26	2,4
Total général	1085	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=688	Femmes n=397	Ensemble n=1085
≤24ans	12,4%	8,6%	11,0%
25-34ans	26,5%	23,7%	25,4%
35-44ans	29,5%	28,2%	29,0%
45-54ans	23,0%	30,0%	25,5%
55 ans et plus	8,7%	9,6%	9,0%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,6%	0,3%	0,5%
Cadres et professions intellectuelles supérieures	8,6%	8,1%	8,4%
Professions intermédiaires	14,5%	20,4%	16,7%
Employés	11,2%	52,1%	26,2%
Ouvriers	65,1%	19,1%	48,3%
C. Industrie manufacturière	27,0%	15,9%	22,9%
D. Production distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné	0,3%	0,0%	0,2%
F. Construction	32,0%	3,5%	21,6%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	11,8%	21,9%	15,5%
H. Transports et entreposage	6,0%	4,0%	5,3%
I. Hébergement et restauration	2,5%	2,8%	2,6%
J. Information et communication	0,4%	1,3%	0,7%
K. Activités financières et d'assurance	1,2%	2,8%	1,8%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2,9%	4,8%	3,6%
N. Activités de services administratifs et de soutien	4,9%	8,1%	6,1%
O. Administration publique	2,5%	9,1%	4,9%
Q. Santé humaine et action sociale	3,2%	15,9%	7,8%
S. Autres activités de services	1,3%	4,3%	2,4%

Conditions de travail	Hommes n=688	Femmes n=397	Ensemble n=1085
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	91,5%	91,6%	91,6%
Oui, raison médicale	0,7%	0,5%	0,6%
Oui, autre raison	6,3%	6,8%	6,5%
Oui, raison non précisée	1,5%	1,0%	1,3%
Travail à temps plein	95,0%	75,6%	87,9%
Travail en journée normale	81,0%	80,3%	80,7%
Coupures de plus de 2 heures	10,8%	18,5%	13,6%
Horaires décalés	31,5%	28,6%	30,4%
Horaires irréguliers ou alternés	25,3%	25,4%	25,3%
Travail de nuit	16,9%	7,6%	13,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	8,4%	1,8%	6,0%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	22,2%	23,3%	22,6%
Rarement	46,3%	47,6%	46,8%
Assez souvent	23,2%	24,6%	23,7%
Très souvent	8,2%	4,6%	6,9%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	54,6%	60,7%	56,9%
Rarement	32,3%	24,7%	29,5%
Assez souvent	10,2%	11,5%	10,6%
Très souvent	2,9%	3,1%	3,0%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	52,5%	57,7%	54,4%
Rarement	32,3%	26,8%	30,3%
Assez souvent	12,7%	11,7%	12,3%
Très souvent	2,5%	3,9%	3,0%
- Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	4,2%	6,3%	5,0%
1	2,9%	2,8%	2,9%
2	5,6%	6,8%	6,0%
3	7,8%	9,1%	8,3%
4	7,8%	8,4%	8,0%
5	28,8%	21,8%	26,3%
6	12,3%	9,6%	11,3%
7	14,6%	17,0%	15,5%
8	11,6%	10,9%	11,3%
9	1,6%	3,8%	2,4%
10	2,8%	3,5%	3,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	42,9%	44,8%	43,6%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	42,7%	50,4%	45,5%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	51,6%	49,2%	50,6%
- Aspect positif du travail	38,6%	40,1%	39,2%

Appréciations sur le travail	Hommes n=688	Femmes n=397	Ensemble n=1085
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	7,3%	8,1%	7,6%
Plutôt non	12,3%	10,4%	11,6%
Plutôt oui	35,5%	35,2%	35,4%
Oui tout à fait	45,0%	46,3%	45,5%
-Travail varié			
Non pas du tout	4,8%	6,8%	5,5%
Plutôt non	11,5%	11,1%	11,4%
Plutôt oui	33,2%	33,5%	33,3%
Oui tout à fait	50,4%	48,6%	49,8%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	9,4%	7,9%	8,8%
Plutôt non	10,8%	17,5%	13,3%
Plutôt oui	38,9%	31,5%	36,2%
Oui tout à fait	40,8%	43,1%	41,7%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	5,4%	5,6%	5,5%
Plutôt non	7,5%	9,1%	8,1%
Plutôt oui	41,5%	37,6%	40,1%
Oui tout à fait	45,6%	47,7%	46,4%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,3%	1,3%	1,3%
Plutôt non	7,1%	7,4%	7,2%
Plutôt oui	43,6%	46,5%	44,7%
Oui tout à fait	48,0%	44,8%	46,8%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	5,7%	5,1%	5,5%
Plutôt non	12,1%	11,7%	12,0%
Plutôt oui	45,8%	46,1%	45,9%
Oui tout à fait	36,4%	37,2%	36,7%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	41,0%	43,8%	42,0%
Plutôt non	31,7%	32,1%	31,8%
Plutôt oui	23,3%	21,6%	22,7%
Oui tout à fait	4,0%	2,5%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	66,4%	62,9%	65,1%
Plutôt non	19,5%	16,6%	18,4%
Plutôt oui	10,5%	16,6%	12,8%
Oui tout à fait	3,6%	3,8%	3,7%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=688	Femmes n=397	Ensemble n=1085
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	37,0%	56,2%	44,1%
Oui parfois	36,6%	21,4%	31,0%
Oui souvent	26,4%	22,4%	24,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	37,0%	56,2%	44,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	38,5%	29,2%	35,1%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	23,4%	13,1%	19,6%
Postures contraignantes, difficile ou pénible non précisé	1,0%	1,5%	1,2%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	38,0%	61,6%	46,7%
Oui parfois	37,6%	24,2%	32,7%
Oui souvent	24,4%	14,1%	20,6%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	38,0%	61,6%	46,7%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	36,4%	23,5%	31,7%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	24,7%	13,6%	20,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,9%	1,3%	1,0%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	34,9%	34,9%	34,9%
Oui parfois	23,3%	17,8%	21,3%
Oui souvent	41,8%	47,3%	43,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	34,9%	34,9%	34,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	30,6%	37,2%	33,0%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	33,1%	27,0%	30,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisés	1,3%	1,0%	1,2%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	58,1%	75,8%	64,6%
Oui parfois	17,3%	9,8%	14,5%
Oui souvent	24,7%	14,4%	20,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	58,1%	75,8%	64,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	16,2%	11,1%	14,4%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	25,1%	12,6%	20,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	0,6%	0,5%	0,6%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	32,4%	49,9%	38,8%
Oui parfois	16,1%	13,2%	15,0%
Oui souvent	51,5%	37,0%	46,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	32,4%	49,9%	38,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	29,3%	27,3%	28,6%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	35,6%	20,8%	30,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible non précisée	2,6%	2,0%	2,4%

Expositions	Hommes n=688	Femmes n=397	Ensemble n=1085
Produits chimiques	29,8%	14,0%	24,1%
Poussières, fumées	66,8%	29,3%	53,1%
Rx ionisants	3,1%	0,3%	2,1%
Vibrations	42,4%	6,6%	29,4%
Gêne sonore	57,3%	28,5%	46,8%
Bruit > 80db	47,6%	6,8%	32,8%
Contrainte visuelle	27,2%	36,7%	30,7%
Conduite routière prolongée	20,1%	7,1%	15,3%
Chaleur intense	19,0%	5,1%	14,0%
Froid intense	16,7%	3,3%	11,8%
Intempéries	38,3%	12,1%	28,8%
Pression psychologique	20,7%	19,7%	20,3%
Agent biologique	6,5%	10,4%	7,9%
Contact avec le public	64,6%	74,0%	68,0%

Formation	Hommes n=688	Femmes n=397	Ensemble n=1085
A bénéficié d'une formation depuis un an	41,1%	42,7%	41,7%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	91,3%	95,2%	92,8%
- En rapport avec le travail futur	22,8%	12,7%	19,1%
- Formation d'intérêt général	57,6%	61,6%	59,1%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	31,0%	34,9%	32,4%

Mode de vie	Hommes n=688	Femmes n=397	Ensemble n=1085
Activité sportive régulière	50,2%	51,6%	50,7%
Consommation de tabac	43,3%	38,7%	41,6%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	14,1%	9,5%	12,4%
Consommation de café	88,6%	80,1%	85,5%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	26,7%	20,9%	24,6%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,9%	12,8%	14,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1085
	Hommes n=470	Femmes n=240	Ensemble n=710	Hommes n=218	Femmes n=157	Ensemble n=375	
Indice de masse corporelle							
- Normaux ou maigres	50,1%	59,1%	53,2%	35,5%	40,9%	37,7%	47,8%
- Surpoids	33,6%	25,3%	30,8%	42,4%	33,1%	38,5%	33,5%
- Obèses	16,3%	15,6%	16,0%	22,1%	26,0%	23,7%	18,7%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	6,7%	5,5%	6,3%	5,1%	6,5%	5,7%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	5,0%	6,1%	5,1%	6,5%	5,7%	6,0%
Gêne dans le travail	1,5%	1,3%	1,4%	1,9%	3,9%	2,7%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	5,0%	4,2%	4,7%	2,3%	3,3%	2,7%	4,0%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	2,8%	4,7%	3,4%	11,6%	3,9%	8,4%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	4,7%	3,3%	9,8%	3,9%	7,3%	4,7%
Gêne dans le travail	0,2%	1,7%	0,7%	1,4%	1,3%	1,4%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,1%	2,1%	1,4%	9,0%	3,2%	6,6%	3,2%
HTA							
Existence d'un problème	3,7%	4,2%	3,9%	21,5%	25,8%	23,3%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	4,2%	3,4%	19,8%	22,1%	20,8%	9,4%
Gêne dans le travail	0,4%	0,4%	0,4%	4,3%	3,9%	4,1%	1,7%
TraITEMENT ou autre soin	1,9%	3,4%	2,4%	16,6%	22,9%	19,2%	8,2%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	21,9%	34,9%	26,3%	25,2%	44,2%	33,2%	28,7%
Plaintes ou signes cliniques	21,9%	34,9%	26,3%	25,2%	44,2%	33,2%	28,7%
Gêne dans le travail	12,5%	21,9%	15,7%	15,0%	28,4%	20,6%	17,4%
TraITEMENT ou autre soin	1,7%	4,6%	2,7%	3,3%	5,9%	4,4%	3,3%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	20,8%	35,7%	25,9%	26,0%	44,9%	34,0%	28,7%
Plaintes ou signes cliniques	20,6%	35,4%	25,6%	25,2%	44,9%	33,5%	28,3%
Gêne dans le travail	11,4%	20,3%	14,4%	15,1%	26,9%	20,1%	16,4%
TraITEMENT ou autre soin	1,3%	3,8%	2,2%	4,7%	6,6%	5,5%	3,3%
Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	15,4%	21,4%	17,4%	19,3%	30,8%	24,2%	19,8%
Plaintes ou signes cliniques	15,0%	21,1%	17,0%	19,3%	30,8%	24,2%	19,5%
Gêne dans le travail	7,6%	9,3%	8,2%	8,6%	14,9%	11,3%	9,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,7%	2,1%	1,9%	2,4%	5,8%	3,8%	2,5%
➤ Troubles neuro psychiques							
<i>(association des 3 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	6,9%	10,5%	8,1%	9,8%	15,4%	12,2%	9,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	10,5%	8,0%	9,8%	15,4%	12,2%	9,4%
Gêne dans le travail	3,7%	7,1%	4,8%	4,7%	10,3%	7,0%	5,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,4%	0,1%	1,4%	0,6%	1,1%	0,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1085
	Hommes n=470	Femmes n=240	Ensemble n=710	Hommes n=218	Femmes n=157	Ensemble n=375	
Digestif							
Existence d'un problème	5,4%	12,3%	7,8%	8,0%	9,3%	8,5%	8,0%
plaintes ou signes cliniques	5,4%	12,3%	7,8%	8,0%	9,3%	8,5%	8,0%
Gêne dans le travail	1,3%	6,8%	3,2%	2,4%	6,6%	4,1%	3,5%
Traitements ou autre soin	3,7%	6,4%	4,6%	4,7%	4,0%	4,4%	4,5%
Dermatologie							
Existence d'un problème	6,9%	11,0%	8,3%	6,5%	10,3%	8,1%	8,2%
plaintes ou signes cliniques	6,9%	11,0%	8,3%	6,5%	10,3%	8,1%	8,2%
Gêne dans le travail	1,7%	4,6%	2,7%	0,9%	3,2%	1,9%	2,4%
Traitements ou autre soin	4,5%	7,2%	5,4%	3,7%	9,6%	6,2%	5,7%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	6,9%	2,6%	5,5%	17,6%	6,5%	12,9%	8,0%
plaintes ou signes cliniques	6,7%	2,6%	5,3%	17,6%	6,5%	12,9%	7,9%
Gêne dans le travail	2,4%	1,3%	2,0%	5,2%	1,9%	3,8%	2,7%
Traitements ou autre soin	0,7%	1,3%	0,9%	1,4%	0,6%	1,1%	0,9%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	7,5%	8,8%	8,0%	14,9%	19,4%	16,8%	11,0%
plaintes ou signes cliniques	7,5%	8,8%	8,0%	14,9%	19,4%	16,8%	11,0%
Gêne dans le travail	4,3%	6,7%	5,1%	10,2%	15,6%	12,5%	7,7%
Traitements ou autre soin	2,2%	2,5%	2,3%	7,0%	14,8%	10,3%	5,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	3,4%	3,4%	3,4%	5,6%	5,2%	5,4%	4,1%
plaintes ou signes cliniques	3,4%	3,4%	3,4%	5,6%	5,2%	5,4%	4,1%
Gêne dans le travail	3,2%	2,1%	2,8%	3,7%	3,9%	3,8%	3,2%
Traitements ou autre soin	1,9%	0,4%	1,4%	0,9%	2,6%	1,6%	1,5%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	6,3%	9,2%	7,3%	7,4%	22,7%	13,8%	9,5%
plaintes ou signes cliniques	6,3%	9,2%	7,3%	7,4%	22,7%	13,8%	9,5%
Gêne dans le travail	5,2%	5,1%	5,1%	5,1%	15,8%	9,5%	6,6%
Traitements ou autre soin	3,0%	3,4%	3,1%	1,9%	13,8%	6,8%	4,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	13,5%	15,2%	14,1%	22,8%	35,1%	27,9%	18,9%
plaintes ou signes cliniques	13,5%	15,2%	14,1%	22,8%	35,1%	27,9%	18,9%
Gêne dans le travail	9,7%	10,2%	9,9%	16,4%	25,8%	20,3%	13,4%
Traitements ou autre soin	5,7%	5,1%	5,5%	9,3%	24,3%	15,5%	8,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1085
	Hommes n=470	Femmes n=240	Ensemble n=710	Hommes n=218	Femmes n=157	Ensemble n=375	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	9,2%	5,9%	8,1%	14,5%	14,3%	14,4%	10,3%
Plaintes ou signes cliniques	9,2%	5,9%	8,1%	14,1%	14,3%	14,2%	10,2%
Gêne dans le travail	5,6%	4,6%	5,3%	8,9%	12,4%	10,4%	7,0%
TraITEMENT ou autre soin	4,1%	4,2%	4,1%	6,6%	10,5%	8,2%	5,5%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	6,0%	17,2%	9,8%	11,2%	27,6%	18,1%	12,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,0%	16,9%	9,7%	11,2%	27,6%	18,1%	12,6%
Gêne dans le travail	4,9%	13,5%	7,8%	9,3%	19,4%	13,5%	9,8%
TraITEMENT ou autre soin	3,0%	7,6%	4,6%	5,2%	12,9%	8,4%	5,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	22,6%	29,1%	24,8%	30,7%	26,8%	29,1%	26,3%
Plaintes ou signes cliniques	22,6%	28,5%	24,6%	30,4%	26,8%	28,9%	26,1%
Gêne dans le travail	17,1%	22,4%	18,9%	20,5%	23,0%	21,5%	19,8%
TraITEMENT ou autre soin	9,5%	15,7%	11,6%	11,4%	17,1%	13,8%	12,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>							
Existence d'un problème	24,9%	36,1%	28,8%	35,3%	39,4%	37,0%	31,6%
Plaintes ou signes cliniques	24,9%	35,6%	28,6%	35,0%	39,4%	36,9%	31,4%
Gêne dans le travail	18,9%	27,5%	21,8%	25,6%	28,9%	27,0%	23,6%
TraITEMENT ou autre soin	10,4%	18,6%	13,2%	13,3%	21,7%	16,8%	14,4%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Employés n=284	Ouvriers n=524	Base Evrest région n=1085
Répartition homme/femme	27,1%/72,9%	85,5%/14,5%	63,4%/36,6%
≤24ans	13,7%	12,6%	11,0%
25-34ans	25,7%	23,3%	25,4%
35-44ans	30,6%	27,9%	29,0%
45-54ans	22,2%	27,1%	25,5%
55 ans et plus	7,7%	9,2%	9,0%
C. Industrie manufacturière	4,6%	33,8%	22,9%
D. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	0,0%	0,0%	0,2%
F. Construction	2,8%	36,8%	21,6%
G. Commerce; réparations automobiles et de motocycles	31,0%	7,3%	15,5%
H. Transports et entreposage	5,3%	5,7%	5,3%
I. Hébergement et restauration	4,9%	1,7%	2,6%
J. Information et communication	1,1%	0,4%	0,7%
K. Activités financières et d'assurance	1,8%	0,0%	1,8%
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	5,6%	0,4%	3,6%
N. Activités de services administratifs et de soutien	5,3%	8,0%	6,1%
O. Administration publique	8,8%	1,7%	4,9%
Q. Santé humaine et action sociale	18,0%	1,3%	7,8%
S. Autres activités de services	5,6%	0,6%	2,4%

Conditions de travail	Employés n=284	Ouvriers n=524	Base Evrest région n=1085
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	95,1%	90,4%	91,6%
Oui, raison médicale	0,0%	1,2%	0,6%
Oui, autre raison	4,2%	6,7%	6,5%
Oui, raison non précisée	0,7%	1,7%	1,3%
Travail à temps plein	74,7%	92,5%	87,9%
Travail en journée normale	80,7%	76,8%	80,7%
Coupures de plus de 2 heures	21,6%	12,3%	13,6%
Horaires décalés	32,7%	30,8%	30,4%
Horaires irréguliers ou alternés	30,1%	23,9%	25,3%
Travail de nuit	13,8%	16,2%	13,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	2,2%	6,2%	6,0%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	26,4%	27,2%	22,6%
Rarement	47,1%	51,1%	46,8%
Assez souvent	22,1%	17,9%	23,7%
Très souvent	4,3%	3,9%	6,9%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	62,1%	60,9%	56,9%
Rarement	24,6%	31,4%	29,5%
Assez souvent	10,4%	6,2%	10,6%
Très souvent	2,9%	1,6%	3,0%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	60,2%	59,2%	54,4%
Rarement	26,3%	31,2%	30,3%
Assez souvent	9,9%	8,0%	12,3%
Très souvent	3,6%	1,6%	3,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	7,4%	4,2%	5,0%
1	3,5%	2,3%	2,9%
2	7,1%	6,0%	6,0%
3	7,1%	9,6%	8,3%
4	6,4%	9,4%	8,0%
5	22,7%	31,0%	26,3%
6	11,7%	12,1%	11,3%
7	16,0%	12,7%	15,5%
8	9,6%	8,7%	11,3%
9	5,0%	1,2%	2,4%
10	3,5%	2,7%	3,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	45,7%	37,4%	43,6%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	50,7%	30,0%	45,5%
Parmi eux :			
- Perturbe le travail	41,7%	48,3%	50,6%
- Aspect positif du travail	39,1%	35,6%	39,2%

Appréciations sur le travail	Employés n=284	Ouvriers n=524	Base Evrest région n=1085
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	8,5%	8,9%	7,6%
Plutôt non	11,6%	12,9%	11,6%
Plutôt oui	33,1%	36,0%	35,4%
Oui tout à fait	46,8%	42,2%	45,5%
-Travail varié			
Non pas du tout	6,0%	6,9%	5,5%
Plutôt non	15,1%	13,0%	11,4%
Plutôt oui	31,7%	35,2%	33,3%
Oui tout à fait	47,2%	44,8%	49,8%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	8,2%	11,5%	8,8%
Plutôt non	20,6%	12,5%	13,3%
Plutôt oui	28,7%	38,1%	36,2%
Oui tout à fait	42,6%	37,9%	41,7%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	5,7%	7,1%	5,5%
Plutôt non	10,3%	7,1%	8,1%
Plutôt oui	33,3%	41,1%	40,1%
Oui tout à fait	50,7%	44,6%	46,4%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	1,8%	1,2%	1,3%
Plutôt non	7,8%	6,8%	7,2%
Plutôt oui	41,1%	41,9%	44,7%
Oui tout à fait	49,3%	50,1%	46,8%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	5,4%	5,7%	5,5%
Plutôt non	13,2%	10,2%	12,0%
Plutôt oui	45,7%	45,2%	45,9%
Oui tout à fait	35,7%	38,9%	36,7%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	47,5%	43,1%	42,0%
Plutôt non	27,7%	31,8%	31,8%
Plutôt oui	19,9%	22,2%	22,7%
Oui tout à fait	5,0%	2,9%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	64,9%	68,7%	65,1%
Plutôt non	15,8%	15,7%	18,4%
Plutôt oui	15,4%	11,5%	12,8%
Oui tout à fait	3,9%	4,1%	3,7%

Charge physique du poste de travail	Employés n=284	Ouvriers n=524	Base Everest région n=1085
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	52,1%	30,7%	44,1%
Oui parfois	19,7%	41,8%	31,0%
Oui souvent	28,2%	27,6%	24,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	52,1%	30,7%	44,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	33,5%	41,0%	35,1%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	13,7%	26,2%	19,6%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	0,7%	2,1%	1,2%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	59,7%	29,5%	46,7%
Oui parfois	19,4%	43,1%	32,7%
Oui souvent	20,8%	27,4%	20,6%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	59,7%	29,5%	46,7%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	25,4%	42,0%	31,7%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	14,8%	26,6%	20,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	0,0%	1,9%	1,0%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	30,6%	25,1%	34,9%
Oui parfois	18,1%	27,2%	21,3%
Oui souvent	51,2%	47,7%	43,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	30,6%	25,1%	34,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	40,9%	33,0%	33,0%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	28,1%	40,0%	30,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	0,4%	1,9%	1,2%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	72,2%	56,8%	64,6%
Oui parfois	9,9%	18,8%	14,5%
Oui souvent	18,0%	24,4%	20,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	72,2%	56,8%	64,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	13,0%	15,9%	14,4%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	13,7%	26,7%	20,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	1,1%	0,6%	0,6%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	47,5%	21,7%	38,8%
Oui parfois	11,6%	16,7%	15,0%
Oui souvent	40,8%	61,5%	46,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	47,5%	21,7%	38,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	30,6%	30,6%	28,6%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	20,1%	43,7%	30,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	1,8%	4,0%	2,4%

Expositions	Employés n=284	Ouvriers n=524	Base Evrest région n=1085
Produits chimiques	16,3%	32,2%	24,1%
Poussières, fumées	29,3%	75,3%	53,1%
Rx ionisants	0,4%	2,9%	2,1%
Vibrations	5,7%	51,2%	29,4%
Gêne sonore	23,5%	65,5%	46,8%
Bruit > 80db	1,8%	57,5%	32,8%
Contrainte visuelle	33,2%	21,5%	30,7%
Conduite routière prolongée	6,0%	15,4%	15,3%
Chaleur intense	3,2%	22,2%	14,0%
Froid intense	2,8%	19,9%	11,8%
Intempéries	9,5%	40,4%	28,8%
Pression psychologique	20,8%	15,3%	20,3%
Agent biologique	13,9%	6,2%	7,9%
Contact avec le public	85,1%	52,8%	68,0%

Formation	Employés n=284	Ouvriers n=524	Base Evrest région n=1085
A bénéficié d'une formation depuis un an	44,8%	33,2%	41,7%
Parmi eux :			
En rapport avec le travail actuel	96,0%	87,5%	92,8%
En rapport avec le travail futur	14,0%	26,7%	19,1%
Formation d'intérêt général	65,8%	51,2%	59,1%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	31,5%	24,3%	32,4%

Mode de vie	Employés n=284	Ouvriers n=524	Base Evrest région n=1085
Activité sportive régulière	54,2%	45,5%	50,7%
Consommation de tabac	42,3%	45,0%	41,6%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	11,1%	13,8%	12,4%
Consommation de café	79,5%	88,7%	85,5%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	21,2%	25,8%	24,6%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	13,2%	12,5%	14,1%

Etat de santé	Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=199	≥45 ans n=85*	Ensemble n=284	<45 ans n=334	≥45 ans n=190	Ensemble n=524	<45 ans n=710	≥45 ans n=375	Global n=1085
Indice de masse corporelle									
- Normaux / maigres	59,5%	36,9%	52,7%	48,3%	34,4%	43,3%	53,2%	37,7%	47,8%
- Surpoids	25,6%	35,7%	28,7%	34,4%	40,7%	36,7%	30,8%	38,5%	33,5%
- Obèses	14,9%	27,4%	18,6%	17,2%	24,9%	20,0%	16,0%	23,7%	18,7%
Appareil respiratoire									
Existence d'un problème	7,1%	5,9%	6,8%	6,6%	4,3%	5,8%	6,3%	5,7%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	5,9%	6,4%	6,6%	4,3%	5,8%	6,1%	5,7%	6,0%
Gêne dans le travail	2,0%	2,4%	2,1%	1,5%	1,1%	1,4%	1,4%	2,7%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	5,6%	4,8%	5,4%	4,2%	2,1%	3,5%	4,7%	2,7%	4,0%
Appareil cardio vasculaire									
Existence d'un problème	6,1%	7,1%	6,4%	2,4%	9,6%	5,0%	3,4%	8,4%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	7,1%	6,4%	2,1%	8,0%	4,3%	3,3%	7,3%	4,7%
Gêne dans le travail	2,0%	1,2%	1,8%	0,3%	2,2%	1,0%	0,7%	1,4%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	4,8%	2,9%	1,2%	7,6%	3,5%	1,4%	6,6%	3,2%
HTA									
Existence d'un problème	3,6%	20,2%	8,6%	4,6%	26,1%	12,4%	3,9%	23,3%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	17,9%	7,9%	3,7%	23,5%	10,9%	3,4%	20,8%	9,4%
Gêne dans le travail	0,5%	2,4%	1,1%	0,0%	4,8%	1,8%	0,4%	4,1%	1,7%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	18,1%	7,2%	3,0%	21,0%	9,5%	2,4%	19,2%	8,2%
Lassitude, fatigue									
Existence d'un problème	33,0%	43,5%	36,2%	18,1%	25,3%	20,7%	26,3%	33,2%	28,7%
Plaintes ou signes cliniques	33,0%	43,5%	36,2%	18,1%	25,3%	20,7%	26,3%	33,2%	28,7%
Gêne dans le travail	22,8%	31,0%	25,3%	9,7%	15,1%	11,6%	15,7%	20,6%	17,4%
TraITEMENT ou autre soin	5,1%	8,3%	6,1%	1,5%	2,2%	1,7%	2,7%	4,4%	3,3%
Anxiété, nervosité									
Existence d'un problème	33,5%	43,5%	36,5%	16,9%	26,7%	20,5%	25,9%	34,0%	28,7%
Plaintes ou signes cliniques	32,7%	43,5%	35,9%	16,9%	26,2%	20,3%	25,6%	33,5%	28,3%
Gêne dans le travail	21,9%	25,9%	23,1%	7,0%	14,6%	9,7%	14,4%	20,1%	16,4%
TraITEMENT ou autre soin	3,6%	7,1%	4,7%	1,2%	5,4%	2,7%	2,2%	5,5%	3,3%
Troubles du sommeil									
Existence d'un problème	24,5%	30,6%	26,3%	13,4%	18,4%	15,2%	17,4%	24,2%	19,8%
Plaintes ou signes cliniques	23,6%	30,6%	25,7%	13,1%	18,4%	15,0%	17,0%	24,2%	19,5%
Gêne dans le travail	11,8%	13,4%	12,3%	3,6%	8,1%	5,3%	8,2%	11,3%	9,2%
TraITEMENT ou autre soin	2,6%	5,9%	3,6%	1,2%	3,2%	2,0%	1,9%	3,8%	2,5%
➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	12,7%	17,6%	14,2%	4,2%	7,0%	5,2%	8,1%	12,2%	9,5%
Plaintes ou signes cliniques	12,2%	17,6%	13,8%	4,2%	7,0%	5,2%	8,0%	12,2%	9,4%
Gêne dans le travail	9,1%	10,7%	9,6%	0,6%	4,3%	1,9%	4,8%	7,0%	5,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,5%	2,4%	1,1%	0,0%	1,1%	0,4%	0,1%	1,1%	0,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=199	≥45 ans n=85*	Ensemble n=284	<45 ans n=334	≥45 ans n=190	Ensemble n=524	<45 ans n=710	≥45 ans n=375	Global n=1085
Digestif									
Existence d'un problème	11,4%	7,4%	10,2%	4,3%	2,7%	3,7%	7,8%	8,5%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	11,4%	7,4%	10,2%	4,3%	2,7%	3,7%	7,8%	8,5%	8,0%
Gêne dans le travail	6,2%	4,9%	5,8%	0,6%	1,1%	0,8%	3,2%	4,1%	3,5%
Traitements ou autre soin	5,7%	3,7%	5,1%	2,1%	1,6%	2,0%	4,6%	4,4%	4,5%
Dermatologie									
Existence d'un problème	11,8%	5,9%	10,0%	5,5%	7,5%	6,2%	8,3%	8,1%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	11,8%	5,9%	10,0%	5,5%	7,5%	6,2%	8,3%	8,1%	8,2%
Gêne dans le travail	4,6%	1,2%	3,6%	1,5%	1,1%	1,4%	2,7%	1,9%	2,4%
Traitements ou autre soin	9,3%	5,9%	8,2%	3,0%	5,4%	3,9%	5,4%	6,2%	5,7%
Troubles de l'audition									
Existence d'un problème	2,1%	6,0%	3,3%	7,6%	16,5%	10,8%	5,5%	12,9%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	6,0%	3,3%	7,3%	16,5%	10,6%	5,3%	12,9%	7,9%
Gêne dans le travail	1,1%	0,0%	0,7%	2,7%	6,6%	4,1%	2,0%	3,8%	2,7%
Traitements ou autre soin	1,1%	1,2%	1,1%	0,6%	1,6%	1,0%	0,9%	1,1%	0,9%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule									
Existence d'un problème	10,7%	18,8%	13,1%	8,2%	14,5%	10,4%	8,0%	16,8%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	10,7%	18,8%	13,1%	8,2%	14,5%	10,4%	8,0%	16,8%	11,0%
Gêne dans le travail	8,1%	16,5%	10,6%	4,5%	9,1%	6,2%	5,1%	12,5%	7,7%
Traitements ou autre soin	4,6%	15,3%	7,8%	1,5%	7,0%	3,5%	2,3%	10,3%	5,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude									
Existence d'un problème	3,1%	5,9%	3,9%	4,8%	5,9%	5,2%	3,4%	5,4%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	5,9%	3,9%	4,8%	5,9%	5,2%	3,4%	5,4%	4,1%
Gêne dans le travail	2,0%	2,4%	2,1%	4,2%	4,3%	4,2%	2,8%	3,8%	3,2%
Traitements ou autre soin	1,0%	2,4%	1,4%	2,1%	2,1%	2,1%	1,4%	1,6%	1,5%
Troubles ostéoarticulaires du poignet									
Existence d'un problème	11,2%	20,0%	13,8%	6,1%	10,2%	7,6%	7,3%	13,8%	9,5%
Plaintes ou signes cliniques	11,2%	20,0%	13,8%	6,1%	10,2%	7,6%	7,3%	13,8%	9,5%
Gêne dans le travail	7,7%	14,3%	9,6%	4,6%	7,0%	5,4%	5,1%	9,5%	6,6%
Traitements ou autre soin	5,1%	15,5%	8,2%	2,1%	4,3%	2,9%	3,1%	6,8%	4,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	18,4%	31,8%	22,4%	14,2%	24,7%	18,0%	14,1%	27,9%	18,9%
Plaintes ou signes cliniques	18,4%	31,8%	22,4%	14,2%	24,7%	18,0%	14,1%	27,9%	18,9%
Gêne dans le travail	12,8%	23,8%	16,1%	10,3%	16,8%	12,6%	9,9%	20,3%	13,4%
Traitements ou autre soin	7,7%	23,8%	12,5%	5,2%	11,9%	7,6%	5,5%	15,5%	8,9%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Employés			Ouvriers			Base Everest région		
	<45 ans n=199	≥45 ans n=85*	Ensemble n=284	<45 ans n=334	≥45 ans n=190	Ensemble n=524	<45 ans n=710	≥45 ans n=375	Global n=1085
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur									
Existence d'un problème	8,6%	11,8%	9,6%	7,9%	14,0%	10,1%	8,1%	14,4%	10,3%
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	11,8%	9,6%	7,9%	13,5%	9,9%	8,1%	14,2%	10,2%
Gêne dans le travail	7,1%	9,4%	7,8%	4,5%	9,7%	6,4%	5,3%	10,4%	7,0%
Traitements ou autre soin	5,6%	7,1%	6,0%	3,3%	7,1%	4,7%	4,1%	8,2%	5,5%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales									
Existence d'un problème	18,3%	21,2%	19,1%	6,4%	10,7%	7,9%	9,8%	18,1%	12,7%
Plaintes ou signes cliniques	17,9%	21,2%	18,9%	6,4%	10,7%	7,9%	9,7%	18,1%	12,6%
Gêne dans le travail	15,2%	16,7%	15,7%	4,5%	7,5%	5,6%	7,8%	13,5%	9,8%
Traitements ou autre soin	9,2%	11,8%	10,0%	3,0%	4,8%	3,7%	4,6%	8,4%	5,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires									
Existence d'un problème	32,1%	25,0%	30,0%	20,9%	29,6%	24,0%	24,8%	29,1%	26,3%
Plaintes ou signes cliniques	31,4%	25,0%	29,5%	20,9%	29,2%	23,9%	24,6%	28,9%	26,1%
Gêne dans le travail	26,0%	21,4%	24,6%	14,4%	19,5%	16,2%	18,9%	21,5%	19,8%
Traitements ou autre soin	18,5%	16,7%	17,9%	7,7%	11,6%	9,1%	11,6%	13,8%	12,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>									
Existence d'un problème	39,1%	33,3%	37,4%	23,6%	34,8%	27,7%	28,8%	37,0%	31,6%
Plaintes ou signes cliniques	38,5%	33,3%	36,9%	23,6%	34,4%	27,5%	28,6%	36,9%	31,4%
Gêne dans le travail	31,6%	26,5%	30,1%	16,3%	24,2%	19,1%	21,8%	27,0%	23,6%
Traitements ou autre soin	21,5%	19,0%	20,8%	8,9%	14,8%	11,0%	13,2%	16,8%	14,4%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=249	F. Construction n=234	Base Evrest région n=1085
Répartition homme/femme	74,7%/25,3%	94,0%/6,0%	63,4%/36,6%
≤24ans	7,2%	17,9%	11,0%
25-34ans	18,1%	29,9%	25,4%
35-44ans	31,3%	26,1%	29,0%
45-54ans	34,5%	17,1%	25,5%
55 ans et plus	8,8%	9,0%	9,0%
Cadres	10,4%	6,0%	8,4%
Intermédiaires	13,3%	8,1%	16,7%
Employés	5,2%	3,4%	26,2%
Ouvriers	71,1%	82,5%	48,3%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=249	F. Construction n=234	Base Everest région n=1085
-Changement de travail depuis 1an :			
Non	89,1%	94,0%	91,6%
Oui, raison médicale	1,2%	0,4%	0,6%
Oui, autre raison	7,3%	4,7%	6,5%
Oui, raison non précisée	2,4%	0,9%	1,3%
Travail à temps plein	95,2%	93,6%	87,9%
Travail en journée normale	67,5%	93,4%	80,7%
Coupures de plus de 2 heures	6,3%	7,3%	13,6%
Horaires décalés	39,0%	14,7%	30,4%
Horaires irréguliers ou alternés	28,1%	13,1%	25,3%
Travail de nuit	23,1%	5,6%	13,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	4,5%	9,1%	6,0%
-Dépasser ses horaires normaux			
Jamais	30,2%	14,7%	22,6%
Rarement	43,5%	52,2%	46,8%
Assez souvent	21,8%	24,1%	23,7%
Très souvent	4,4%	9,1%	6,9%
-Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause			
Jamais	60,0%	53,0%	56,9%
Rarement	29,0%	37,9%	29,5%
Assez souvent	7,3%	8,2%	10,6%
Très souvent	3,7%	0,9%	3,0%
-Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin			
Jamais	52,7%	51,3%	54,4%
Rarement	30,1%	38,2%	30,3%
Assez souvent	15,9%	7,9%	12,3%
Très souvent	1,3%	2,6%	3,0%
Difficultés liées à la pression temporelle (0 : pas difficile, 10 : très difficile)			
0	3,7%	4,3%	5,0%
1	2,0%	3,4%	2,9%
2	4,5%	6,4%	6,0%
3	7,7%	10,3%	8,3%
4	8,9%	9,0%	8,0%
5	24,8%	32,2%	26,3%
6	13,4%	13,3%	11,3%
7	17,5%	12,4%	15,5%
8	12,6%	6,0%	11,3%
9	2,4%	0,4%	2,4%
10	2,4%	2,1%	3,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	48,4%	34,3%	43,6%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	48,6%	29,4%	45,5%
<i>Parmi eux :</i>			
- Perturbe le travail	49,1%	61,2%	50,6%
- Aspect positif du travail	42,2%	38,8%	39,2%

Appréciations sur le travail	C. Industrie manufacturière n=249	F. Construction n=234	Base Everest région n=1085
-Travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	11,0%	3,4%	7,6%
Plutôt non	15,9%	7,3%	11,6%
Plutôt oui	38,6%	42,1%	35,4%
Oui tout à fait	34,6%	47,2%	45,5%
-Travail varié			
Non pas du tout	6,8%	2,6%	5,5%
Plutôt non	14,5%	8,2%	11,4%
Plutôt oui	38,6%	39,1%	33,3%
Oui tout à fait	40,2%	50,2%	49,8%
-Choix dans la façon de procéder			
Non pas du tout	11,2%	4,3%	8,8%
Plutôt non	11,2%	10,7%	13,3%
Plutôt oui	40,6%	48,1%	36,2%
Oui tout à fait	36,9%	36,9%	41,7%
-Possibilités suffisantes d'entraide			
Non pas du tout	4,5%	3,9%	5,5%
Plutôt non	8,9%	6,5%	8,1%
Plutôt oui	46,3%	43,1%	40,1%
Oui tout à fait	40,2%	46,6%	46,4%
-Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	0,0%	0,9%	1,3%
Plutôt non	8,9%	4,3%	7,2%
Plutôt oui	54,5%	41,6%	44,7%
Oui tout à fait	36,6%	53,2%	46,8%
-Travail reconnu			
Non pas du tout	8,0%	2,6%	5,5%
Plutôt non	16,5%	9,9%	12,0%
Plutôt oui	45,0%	49,6%	45,9%
Oui tout à fait	30,5%	37,9%	36,7%
-Faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	38,5%	36,1%	42,0%
Plutôt non	30,5%	41,6%	31,8%
Plutôt oui	26,4%	19,3%	22,7%
Oui tout à fait	4,6%	3,0%	3,5%
-Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	59,2%	74,1%	65,1%
Plutôt non	22,7%	19,0%	18,4%
Plutôt oui	13,9%	6,0%	12,8%
Oui tout à fait	4,2%	0,9%	3,7%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=249	F. Construction n=234	Base Everest région n=1085
Postures contraignantes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	37,1%	34,8%	44,1%
Oui parfois	36,7%	41,6%	31,0%
Oui souvent	26,2%	23,6%	24,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas de postures contraignantes	37,1%	34,8%	44,1%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	38,3%	38,6%	35,1%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	21,8%	25,8%	19,6%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n.p.	2,8%	0,9%	1,2%
Effort, Port de charges lourdes :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	39,1%	33,0%	46,7%
Oui parfois	38,7%	42,1%	32,7%
Oui souvent	22,2%	24,9%	20,6%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'effort, Port de charges lourdes	39,1%	33,0%	46,7%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible	38,3%	36,9%	31,7%
Effort, Port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	20,6%	28,8%	20,6%
Effort, Port de charges lourdes, difficile ou pénible n.p.	2,0%	1,3%	1,0%
Gestes répétitifs :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	34,3%	35,6%	34,9%
Oui parfois	19,8%	33,5%	21,3%
Oui souvent	46,0%	30,9%	43,8%
<i>Difficulté</i>			
Pas de gestes répétitifs	34,3%	35,6%	34,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	33,9%	21,9%	33,0%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	29,4%	41,6%	30,9%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	2,4%	0,9%	1,2%
Importants déplacements à pieds :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	53,5%	57,0%	64,6%
Oui parfois	16,7%	21,3%	14,5%
Oui souvent	29,8%	21,7%	20,9%
<i>Difficulté</i>			
Pas d'importants déplacements à pieds	53,5%	57,0%	64,6%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible	17,6%	13,9%	14,4%
Importants déplacements à pieds, pas difficile ou pénible	28,6%	28,7%	20,5%
Importants déplacements à pieds, difficile ou pénible n.p.	0,4%	0,4%	0,6%
Station debout prolongée :			
<i>Fréquence</i>			
Non jamais	31,4%	26,6%	38,8%
Oui parfois	18,0%	15,0%	15,0%
Oui souvent	50,6%	58,4%	46,1%
<i>Difficulté</i>			
Pas de station debout prolongée	31,4%	26,6%	38,8%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	33,5%	21,5%	28,6%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	31,8%	47,6%	30,2%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n.p.	3,3%	4,3%	2,4%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=249	F. Construction n=234	Base Everest région n=1085
Produits chimiques	29,6%	34,3%	24,1%
Poussières, fumées	59,1%	81,5%	53,1%
Rx ionisants	4,5%	2,2%	2,1%
Vibrations	27,5%	62,1%	29,4%
Gêne sonore	62,8%	69,5%	46,8%
Bruit > 80db	51,9%	69,8%	32,8%
Contrainte visuelle	30,1%	21,9%	30,7%
Conduite routière prolongée	9,8%	16,7%	15,3%
Chaleur intense	19,1%	23,6%	14,0%
Froid intense	9,3%	25,3%	11,8%
Intempéries	13,9%	59,2%	28,8%
Pression psychologique	18,8%	18,0%	20,3%
Agent biologique	5,3%	4,3%	7,9%
Contact avec le public	34,6%	69,0%	68,0%

Formation	C. Industrie manufacturière n=249	F. Construction n=234	Base Everest région n=1085
A bénéficié d'une formation depuis un an	40,7%	35,6%	41,7%
<i>Parmi eux :</i>			
- En rapport avec le travail actuel	83,3%	90,1%	92,8%
- En rapport avec le travail futur	16,3%	33,3%	19,1%
- Formation d'intérêt général	57,9%	51,9%	59,1%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	35,4%	21,4%	32,4%

Mode de vie	C. Industrie manufacturière n=249	F. Construction n=234	Base Everest région n=1085
Activité sportive régulière	47,7%	44,9%	50,7%
Consommation de tabac	40,5%	48,1%	41,6%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	10,9%	18,0%	12,4%
Consommation de café	87,8%	91,2%	85,5%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	26,4%	21,1%	24,6%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	11,8%	19,2%	14,1%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			Base Everest région		
	<45 ans n=141	≥45 ans n=108	Ensemble n=249	<45 ans n=173	≥45 ans n=61*	Ensemble n=234	<45 ans n=710	≥45 ans n=375	Global n=1085
Indice de masse corporelle									
- Normaux / maigres	46,4%	36,1%	41,9%	55,0%	41,7%	51,5%	53,2%	37,7%	47,8%
- Surpoids	37,1%	45,4%	40,7%	29,8%	35,0%	31,2%	30,8%	38,5%	33,5%
- Obèses	16,4%	18,5%	17,3%	15,2%	23,3%	17,3%	16,0%	23,7%	18,7%
Appareil respiratoire									
Existence d'un problème	8,6%	5,6%	7,3%	2,3%	0,0%	1,7%	6,3%	5,7%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	5,6%	7,3%	2,3%	0,0%	1,7%	6,1%	5,7%	6,0%
Gêne dans le travail	0,7%	2,8%	1,6%	1,2%	0,0%	0,9%	1,4%	2,7%	1,9%
TraITEMENT ou autre soin	5,0%	1,9%	3,7%	1,2%	0,0%	0,9%	4,7%	2,7%	4,0%
Appareil cardio vasculaire									
Existence d'un problème	3,6%	11,2%	6,9%	1,2%	6,6%	2,6%	3,4%	8,4%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	9,3%	5,7%	1,2%	6,6%	2,6%	3,3%	7,3%	4,7%
Gêne dans le travail	0,7%	0,9%	0,8%	0,0%	1,7%	0,4%	0,7%	1,4%	0,9%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	9,3%	4,9%	1,2%	5,0%	2,2%	1,4%	6,6%	3,2%
HTA									
Existence d'un problème	5,8%	26,4%	14,8%	2,9%	14,8%	6,0%	3,9%	23,3%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	24,5%	13,5%	2,3%	14,8%	5,6%	3,4%	20,8%	9,4%
Gêne dans le travail	0,0%	2,8%	1,2%	0,0%	3,3%	0,9%	0,4%	4,1%	1,7%
TraITEMENT ou autre soin	3,6%	20,8%	11,1%	1,8%	8,5%	3,5%	2,4%	19,2%	8,2%
Lassitude, fatigue									
Existence d'un problème	26,4%	26,2%	26,3%	11,6%	22,0%	14,3%	26,3%	33,2%	28,7%
Plaintes ou signes cliniques	26,4%	26,2%	26,3%	11,6%	22,0%	14,3%	26,3%	33,2%	28,7%
Gêne dans le travail	15,8%	19,6%	17,5%	5,8%	10,2%	6,9%	15,7%	20,6%	17,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,2%	1,9%	2,0%	1,2%	0,0%	0,9%	2,7%	4,4%	3,3%
Anxiété, nervosité									
Existence d'un problème	22,9%	26,2%	24,3%	11,6%	23,3%	14,7%	25,9%	34,0%	28,7%
Plaintes ou signes cliniques	22,9%	26,2%	24,3%	11,6%	21,7%	14,2%	25,6%	33,5%	28,3%
Gêne dans le travail	10,9%	15,0%	12,7%	6,4%	10,3%	7,4%	14,4%	20,1%	16,4%
TraITEMENT ou autre soin	2,9%	2,8%	2,9%	1,2%	5,1%	2,2%	2,2%	5,5%	3,3%
Troubles du sommeil									
Existence d'un problème	19,4%	26,2%	22,4%	8,1%	10,3%	8,7%	17,4%	24,2%	19,8%
Plaintes ou signes cliniques	19,4%	26,2%	22,4%	8,1%	10,3%	8,7%	17,0%	24,2%	19,5%
Gêne dans le travail	7,9%	9,3%	8,5%	3,5%	5,3%	3,9%	8,2%	11,3%	9,2%
TraITEMENT ou autre soin	2,2%	2,8%	2,4%	2,9%	1,8%	2,6%	1,9%	3,8%	2,5%
➤ Troubles neuro-psychiques (les 3 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	6,4%	9,3%	7,7%	3,5%	6,8%	4,3%	8,1%	12,2%	9,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	9,3%	7,7%	3,5%	6,8%	4,3%	8,0%	12,2%	9,4%
Gêne dans le travail	2,9%	6,5%	4,5%	1,2%	1,7%	1,3%	4,8%	7,0%	5,6%
TraITEMENT ou autre soin	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,1%	0,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			Base Everest région		
	<45 ans n=141	≥45 ans n=108	Ensemble n=249	<45 ans n=173	≥45 ans n=61*	Ensemble n=234	<45 ans n=710	≥45 ans n=375	Global n=1085
Digestif									
Existence d'un problème	9,4%	3,8%	6,9%	3,5%	5,0%	3,9%	7,8%	8,5%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	9,4%	3,8%	6,9%	3,5%	5,0%	3,9%	7,8%	8,5%	8,0%
Gêne dans le travail	2,9%	0,0%	1,6%	0,0%	1,7%	0,4%	3,2%	4,1%	3,5%
TraITEMENT ou autre soin	4,3%	1,9%	3,3%	2,9%	1,7%	2,6%	4,6%	4,4%	4,5%
Dermatologie									
Existence d'un problème	6,5%	11,2%	8,5%	4,1%	5,0%	4,3%	8,3%	8,1%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,5%	11,2%	8,5%	4,1%	5,0%	4,3%	8,3%	8,1%	8,2%
Gêne dans le travail	2,2%	1,9%	2,0%	1,2%	0,0%	0,9%	2,7%	1,9%	2,4%
TraITEMENT ou autre soin	3,6%	7,5%	5,3%	2,3%	3,3%	2,6%	5,4%	6,2%	5,7%
Troubles de l'audition									
Existence d'un problème	8,7%	21,9%	14,4%	5,8%	18,0%	9,1%	5,5%	12,9%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	8,7%	21,9%	14,4%	5,3%	18,0%	8,6%	5,3%	12,9%	7,9%
Gêne dans le travail	2,9%	6,7%	4,5%	1,8%	4,9%	2,6%	2,0%	3,8%	2,7%
TraITEMENT ou autre soin	0,7%	1,9%	1,2%	1,2%	1,6%	1,3%	0,9%	1,1%	0,9%
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule									
Existence d'un problème	6,4%	11,4%	8,6%	4,1%	13,1%	6,4%	8,0%	16,8%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	11,4%	8,6%	4,1%	13,1%	6,4%	8,0%	16,8%	11,0%
Gêne dans le travail	4,3%	6,7%	5,3%	1,8%	8,2%	3,4%	5,1%	12,5%	7,7%
TraITEMENT ou autre soin	2,9%	4,8%	3,7%	0,6%	8,2%	2,6%	2,3%	10,3%	5,0%
Troubles ostéoarticulaires du coude									
Existence d'un problème	5,0%	4,7%	4,9%	2,9%	6,6%	3,9%	3,4%	5,4%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	4,7%	4,9%	2,9%	6,6%	3,9%	3,4%	5,4%	4,1%
Gêne dans le travail	4,3%	3,8%	4,1%	2,9%	4,9%	3,4%	2,8%	3,8%	3,2%
TraITEMENT ou autre soin	1,4%	1,9%	1,6%	1,7%	3,3%	2,1%	1,4%	1,6%	1,5%
Troubles ostéoarticulaires du poignet									
Existence d'un problème	6,4%	12,3%	8,9%	3,5%	8,2%	4,8%	7,3%	13,8%	9,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	12,3%	8,9%	3,5%	8,2%	4,8%	7,3%	13,8%	9,5%
Gêne dans le travail	5,0%	8,5%	6,5%	2,4%	3,3%	2,6%	5,1%	9,5%	6,6%
TraITEMENT ou autre soin	3,6%	6,6%	4,9%	1,2%	3,3%	1,7%	3,1%	6,8%	4,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	13,6%	23,8%	18,0%	9,4%	21,3%	12,5%	14,1%	27,9%	18,9%
Plaintes ou signes cliniques	13,6%	23,8%	18,0%	9,4%	21,3%	12,5%	14,1%	27,9%	18,9%
Gêne dans le travail	10,7%	17,3%	13,5%	5,9%	13,1%	7,8%	9,9%	20,3%	13,4%
TraITEMENT ou autre soin	7,2%	12,4%	9,4%	2,9%	11,5%	5,2%	5,5%	15,5%	8,9%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			Base Everest région		
	<45 ans n=141	≥45 ans n=108	Ensemble n=249	<45 ans n=173	≥45 ans n=61*	Ensemble n=234	<45 ans n=710	≥45 ans n=375	Global n=1085
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur									
Existence d'un problème	7,9%	16,2%	11,4%	8,7%	16,4%	10,7%	8,1%	14,4%	10,3%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	15,4%	11,1%	8,7%	16,4%	10,7%	8,1%	14,2%	10,2%
Gêne dans le travail	5,7%	8,7%	7,0%	3,5%	14,8%	6,4%	5,3%	10,4%	7,0%
TraITEMENT ou autre soin	2,1%	7,7%	4,5%	2,9%	11,7%	5,2%	4,1%	8,2%	5,5%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales									
Existence d'un problème	10,1%	17,0%	13,1%	4,1%	6,6%	4,7%	9,8%	18,1%	12,7%
Plaintes ou signes cliniques	10,1%	17,0%	13,1%	4,1%	6,6%	4,7%	9,7%	18,1%	12,6%
Gêne dans le travail	7,9%	14,2%	10,6%	2,9%	3,3%	3,0%	7,8%	13,5%	9,8%
TraITEMENT ou autre soin	4,3%	7,5%	5,7%	2,9%	3,3%	3,0%	4,6%	8,4%	5,9%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires									
Existence d'un problème	26,8%	29,8%	28,1%	13,5%	30,0%	17,8%	24,8%	29,1%	26,3%
Plaintes ou signes cliniques	26,8%	29,8%	28,1%	13,5%	28,8%	17,5%	24,6%	28,9%	26,1%
Gêne dans le travail	20,3%	21,4%	20,7%	8,8%	23,3%	12,6%	18,9%	21,5%	19,8%
TraITEMENT ou autre soin	11,6%	14,7%	12,9%	4,1%	13,8%	6,6%	11,6%	13,8%	12,4%
➤ Troubles ostéoarticulaires du rachis <i>(l'un des 2 signes ci-dessus)</i>									
Existence d'un problème	29,0%	37,7%	32,8%	16,5%	33,3%	20,9%	28,8%	37,0%	31,6%
Plaintes ou signes cliniques	29,0%	37,7%	32,8%	16,5%	32,2%	20,5%	28,6%	36,9%	31,4%
Gêne dans le travail	21,7%	28,8%	24,8%	11,2%	23,3%	14,3%	21,8%	27,0%	23,6%
TraITEMENT ou autre soin	12,4%	19,4%	15,4%	6,5%	13,8%	8,3%	13,2%	16,8%	14,4%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence