



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2009-2010

Région Bourgogne

Juin 2011



alimentation, environnement, travail



Agence Nationale
pour l'Amélioration des
Conditions de Travail



CENTRE D'ÉTUDES DE L'EMPLOI



Institut de Santé au Travail
du Nord de la France

Nord - Pas de Calais / Picardie



Lille 2
Université du Droit
et de la Santé

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2009-2010 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Bourgogne

L'exploitation des données de la région Bourgogne a porté sur **2 713 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2009 (n=1324) et 2010 (n=1389).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Everest semble nettement plus proche du champ des salariés de l'Unedic (secteur privé) que de celui des salariés du champ des DADS (secteurs privés et public) (tableau 1). A noter, le secteur industriel est nettement surreprésenté dans l'échantillon Everest.

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Bourgogne 2009-2010 aux données Insee (DADS 2008) et Unedic (2009).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Bourgogne 2009-2010 (n=2 713)	Données INSEE 2008 (DADS)	Données UNEDIC 2009
	%	%	%
Sexe			
Hommes	55,8	52,9	54,8
Femmes	44,2	47,1	45,2
Age			
≤ 24 ans	12,6	16,3	-
25-34 ans	23,9	22,7	-
35-44 ans	27,5	25,7	-
45- 54 ans	26,6	24,3	-
55 ans et plus	9,4	10,9	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,7	0,5	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	8,1	8,0	-
Professions intermédiaires	21,2	20,8	-
Employés	29,8	34,2	-
Ouvriers	40,3	36,6	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,9	0,0	0,0
Industrie	29,0	20,8	25,6
Construction	8,9	7,5	9,8
Commerce	18,8	15,3	19,8
Services	42,4	56,3	44,8

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Bourgogne 2009-2010 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	18	0,7
Cadres et professions intellectuelles supérieures	219	8,1
Professions intermédiaires	574	21,2
Employés	809	29,8
Ouvriers	1093	40,3
Total général	2 713	100,0

En ce qui concerne les secteurs d'activité, seuls 4 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Commerce - réparations d'automobile et de motocycles, Activités de services administratifs et de soutien, Santé humaine et action sociale.

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Bourgogne 2009-2010 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	23	0,8
A. Agriculture, sylviculture et pêche	23	0,8
INDUSTRIE	773	28,5
B. Industries extractives	7	0,3
C. Industrie manufacturière	717	26,4
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	18	0,7
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	31	1,1
CONSTRUCTION	237	8,7
F. Construction	237	8,7
COMMERCE	501	18,5
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	501	18,5
SERVICES	1130	41,7
H. Transports et entreposage	162	6,0
I. Hébergement et restauration	91	3,4
J. Information et communication	25	0,9
K. Activités financières et d'assurance	88	3,2
L. Activités immobilières	21	0,8
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	121	4,5
N. Activités de services administratifs et de soutien	157	5,8
O. Administration publique	49	1,8
P. Enseignement	36	1,3
Q. Santé humaine et action sociale	279	10,3
R. Arts, spectacles et activités récréatives	10	0,4
S. Autres activités de services	91	3,4
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférencierées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0	0,0
Données manquantes	49	1,8
Total général	2713	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=1513	Femmes n=1199	Ensemble n=2713
≤24ans	12,9%	12,2%	12,6%
25-34ans	23,9%	23,9%	23,9%
35-44ans	27,1%	28,1%	27,5%
45-54ans	26,0%	27,5%	26,6%
≥55ans	10,2%	8,3%	9,4%
 Cadres	 9,8%	 5,9%	 8,1%
Intermédiaires	19,8%	22,9%	21,2%
Employés	9,4%	55,6%	29,8%
Ouvriers	59,9%	15,4%	40,3%
 Agriculture	 0,9%	 0,8%	 0,9%
Industrie	37,9%	17,6%	29,0%
Construction	14,2%	2,1%	8,9%
Commerce	15,8%	22,6%	18,8%
Services	31,1%	57,0%	42,4%

Conditions de travail	Hommes n=1513	Femmes n=1199	Ensemble n=2713
Changement de travail depuis 1an :			
Non	86,7%	85,9%	86,3%
Oui, raison médicale	0,7%	1,0%	0,8%
Oui, autre raison	12,5%	12,7%	12,6%
Oui, raison non précisée	0,2%	0,4%	0,3%
Personnes travaillant à temps plein	93,5%	72,2%	84,1%
Travail en journée normale	78,1%	79,2%	78,6%
Coupures de plus de 2 heures	15,0%	23,5%	18,8%
Horaires décalés	32,7%	22,1%	28,0%
Horaires irréguliers ou alternés	29,0%	26,5%	27,9%
Travail de nuit	13,5%	5,2%	9,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	14,5%	2,5%	9,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	50,0%	53,2%	51,4%
Parmi eux :			
➤ Perturbe le travail	53,4%	56,9%	55,0%
➤ Sans conséquence	46,0%	39,2%	42,9%
➤ Aspect positif sur le travail	39,1%	40,2%	39,6%
Dépasser ses horaires normaux	38,1%	33,9%	36,3%
Sauter le repas ou la pause	19,2%	18,1%	18,7%
Traiter trop vite une opération	22,3%	24,7%	23,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	20,9%	19,1%	20,1%
Travail pas varié	17,9%	19,1%	18,4%
Pas de choix dans la façon de procéder	23,7%	26,9%	25,1%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	16,0%	18,6%	17,1%
Travail pas reconnu	22,5%	26,0%	24,1%
Formations et informations insuffisantes	19,6%	22,4%	20,9%
Objectifs et consignes pas clairement définis	18,7%	18,2%	18,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	38,8%	36,2%	37,7%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=1513	Femmes n=1199	Ensemble n=2713
Postures contraignantes :			
Non	36,6%	47,4%	41,3%
Oui, difficile ou pénible	32,4%	28,1%	30,5%
Oui, pas difficile ou pénible	29,7%	23,3%	26,9%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,3%	1,2%	1,2%
Effort, Port de charges lourdes :			
Non	40,8%	56,8%	47,8%
Oui, difficile ou pénible	29,7%	26,3%	28,2%
Oui, pas difficile ou pénible	28,2%	15,9%	22,8%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,3%	0,9%	1,2%
Gestes répétitifs :			
Non	39,5%	37,4%	38,6%
Oui, difficile ou pénible	21,2%	22,1%	21,6%
Oui, pas difficile ou pénible	37,9%	39,2%	38,5%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,4%	1,3%	1,4%
Importants déplacements à pieds :			
Non	51,1%	67,7%	58,4%
Oui, difficile ou pénible	12,2%	11,8%	12,0%
Oui, pas difficile ou pénible	35,0%	19,9%	28,3%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,7%	0,7%	1,2%
Station debout prolongée :			
Non	36,0%	46,0%	40,4%
Oui, difficile ou pénible	21,4%	25,5%	23,2%
Oui, pas difficile ou pénible	41,2%	27,4%	35,1%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,4%	1,1%	1,3%

Expositions	Hommes n=1513	Femmes n=1199	Ensemble n=2713
Produits chimiques	32,1%	20,2%	26,8%
Poussières, fumées	50,8%	17,2%	36,0%
Rx ionisants	2,4%	2,1%	2,3%
Vibrations	33,7%	4,4%	20,7%
Gêne sonore	52,9%	24,9%	40,6%
Bruit > 80db	38,8%	9,0%	25,7%
Contrainte visuelle	29,7%	32,7%	31,1%
Conduite routière prolongée	22,8%	5,2%	15,0%
Chaleur intense	15,8%	8,6%	12,6%
Froid intense	13,5%	7,0%	10,6%
Intempéries	26,5%	4,6%	16,9%
Pression psychologique	24,4%	25,5%	24,9%
Agent biologique	7,9%	14,4%	10,8%
Contact avec le public	60,9%	73,6%	66,5%

Formation	Hommes n=1513	Femmes n=1199	Ensemble n=2713
A bénéficié d'une formation depuis un an	44,9%	42,9%	44,0%
Parmi eux :			
➤ En rapport avec le travail actuel	91,2%	89,2%	90,4%
➤ En rapport avec le travail futur	15,0%	13,0%	14,1%
➤ Formation d'intérêt général	46,5%	47,9%	47,1%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	27,7%	21,3%	24,9%

Mode de vie	Hommes n=1513	Femmes n=1199	Ensemble n=2713
Activité sportive régulière	43,9%	43,3%	43,7%
Consommation de tabac	40,6%	31,7%	36,6%
Consommation de tabac>15 cig / jour	11,9%	4,8%	8,8%
Consommation de café	84,3%	72,7%	79,1%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	17,9%	9,2%	14,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,1%	13,4%	13,8%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2713
	Hommes n=966	Femmes n=769	Ensemble n=1736	Hommes n=547	Femmes n=430	Ensemble n=977	
Indice de masse corporelle							
➤ Normaux ou maigres	55,4%	66,2%	60,2%	33,3%	56,3%	43,4%	54,2%
➤ Surpoids	32,3%	22,4%	27,9%	45,4%	27,1%	37,3%	31,3%
➤ Obèses	12,3%	11,4%	11,9%	21,3%	16,6%	19,2%	14,5%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	4,2%	3,8%	4,0%	6,5%	4,0%	5,4%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,7%	3,3%	3,5%	5,9%	3,6%	4,9%	4,0%
Gêne dans le travail	0,7%	0,3%	0,5%	1,7%	0,7%	1,2%	0,8%
Consommation médicamenteuse	2,1%	3,0%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	2,9%	3,1%	3,0%	4,3%	2,8%	3,6%	3,2%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	2,1%	3,5%	2,7%	8,7%	4,5%	6,8%	4,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	3,3%	2,3%	7,0%	4,0%	5,7%	3,5%
Gêne dans le travail	0,2%	1,8%	0,9%	1,5%	2,1%	1,8%	1,2%
Consommation médicamenteuse	0,7%	1,1%	0,9%	5,4%	1,9%	3,8%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	2,8%	1,9%	6,5%	2,8%	4,9%	3,0%
HTA							
Existence d'un problème	3,4%	2,9%	3,2%	18,6%	12,4%	15,8%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	1,6%	2,4%	12,8%	9,1%	11,2%	5,6%
Gêne dans le travail	0,2%	0,3%	0,2%	0,6%	0,7%	0,6%	0,4%
Consommation médicamenteuse	1,1%	2,0%	1,5%	14,0%	9,8%	12,1%	5,3%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	1,7%	1,6%	15,2%	10,7%	13,3%	5,8%
➤ Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	13,0%	23,7%	17,8%	17,2%	28,5%	22,2%	19,4%
Plaintes ou signes cliniques	12,8%	23,5%	17,5%	17,2%	28,1%	22,0%	19,1%
Gêne dans le travail	5,6%	10,6%	7,8%	6,9%	12,6%	9,4%	8,4%
Consommation médicamenteuse	0,8%	4,4%	2,4%	1,1%	3,6%	2,2%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	6,1%	4,1%	2,8%	6,0%	4,2%	4,1%
➤ Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	16,0%	24,0%	19,6%	20,6%	30,5%	24,9%	21,5%
Plaintes ou signes cliniques	15,9%	23,7%	19,4%	20,2%	29,8%	24,4%	21,2%
Gêne dans le travail	6,5%	9,6%	7,9%	8,5%	14,0%	10,9%	9,0%
Consommation médicamenteuse	1,6%	5,7%	3,4%	3,3%	7,5%	5,2%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	3,5%	6,2%	4,7%	3,9%	8,0%	5,7%	5,1%
➤ Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	13,3%	19,4%	16,0%	19,7%	31,7%	25,0%	19,3%
Plaintes ou signes cliniques	13,2%	19,2%	15,9%	19,1%	30,4%	24,1%	18,8%
Gêne dans le travail	5,0%	6,3%	5,6%	5,1%	8,9%	6,7%	6,0%
Consommation médicamenteuse	1,1%	4,0%	2,4%	4,9%	9,1%	6,7%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	4,7%	3,5%	4,9%	7,9%	6,2%	4,5%
Troubles neuro psychiques							
(les 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	4,0%	7,8%	5,7%	5,0%	13,2%	8,6%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	7,4%	5,4%	5,0%	11,8%	8,0%	6,4%
Gêne dans le travail	1,5%	2,6%	2,0%	1,3%	2,8%	2,0%	2,0%
Consommation médicamenteuse	0,2%	1,2%	0,6%	0,4%	1,4%	0,8%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	0,6%	1,7%	1,1%	0,9%	2,1%	1,5%	1,2%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2713
	Hommes n=966	Femmes n=769	Ensemble n=1736	Hommes n=547	Femmes n=430	Ensemble n=977	
Digestif							
Existence d'un problème	5,4%	8,2%	6,7%	10,1%	11,7%	10,8%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	8,0%	6,4%	9,2%	11,4%	10,2%	7,8%
Gêne dans le travail	1,1%	0,7%	0,9%	1,7%	2,9%	2,2%	1,4%
Consommation médicamenteuse	2,1%	3,1%	2,5%	4,5%	5,5%	4,9%	3,4%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	4,5%	3,4%	6,0%	7,4%	6,6%	4,5%
Dermatologie							
Existence d'un problème	5,9%	8,0%	6,8%	10,7%	5,7%	8,5%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	7,7%	6,7%	9,8%	5,7%	8,0%	7,1%
Gêne dans le travail	0,8%	1,3%	1,1%	1,1%	0,5%	0,8%	1,0%
Consommation médicamenteuse	2,5%	3,7%	3,0%	5,2%	3,3%	4,4%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	3,8%	5,6%	4,6%	9,2%	4,5%	7,2%	5,5%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	7,4%	3,9%	5,8%	20,6%	6,2%	14,3%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	3,8%	5,5%	19,0%	6,0%	13,3%	8,3%
Gêne dans le travail	1,4%	1,6%	1,5%	3,7%	2,9%	3,4%	2,1%
Consommation médicamenteuse	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%	0,5%	0,3%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	5,6%	2,2%	4,1%	14,3%	4,6%	10,1%	6,2%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur							
(l'un des 3 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	12,7%	12,4%	12,5%	20,6%	31,9%	25,5%	17,2%
Plaintes ou signes cliniques	12,6%	12,1%	12,3%	20,0%	31,7%	25,1%	16,9%
Gêne dans le travail	7,6%	7,8%	7,7%	12,2%	18,7%	15,1%	10,3%
Consommation médicamenteuse	1,6%	3,6%	2,5%	5,4%	12,8%	8,6%	4,6%
Pathologie diagnostiquée	5,7%	6,1%	5,9%	13,0%	17,7%	15,0%	9,1%
➤ Epaule							
Existence d'un problème	6,8%	6,7%	6,8%	13,8%	20,5%	16,8%	10,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	6,6%	6,7%	13,4%	20,3%	16,4%	10,2%
Gêne dans le travail	3,7%	4,2%	3,9%	7,9%	11,5%	9,5%	5,9%
Consommation médicamenteuse	1,4%	2,4%	1,8%	4,1%	7,9%	5,7%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	2,6%	2,6%	7,9%	9,3%	8,5%	4,7%
➤ Coude							
Existence d'un problème	2,7%	2,6%	2,7%	7,0%	5,9%	6,5%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	2,4%	2,5%	7,0%	5,5%	6,3%	3,9%
Gêne dans le travail	2,0%	2,0%	2,0%	5,4%	3,6%	4,6%	2,9%
Consommation médicamenteuse	0,3%	1,1%	0,6%	1,5%	2,4%	1,9%	1,1%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	1,7%	1,5%	3,9%	3,6%	3,7%	2,3%
➤ Poignet							
Existence d'un problème	5,6%	6,0%	5,8%	7,0%	15,0%	10,5%	7,5%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	5,8%	5,7%	6,8%	14,8%	10,3%	7,3%
Gêne dans le travail	3,6%	3,3%	3,4%	3,9%	8,2%	5,8%	4,3%
Consommation médicamenteuse	0,3%	1,4%	0,8%	1,5%	5,8%	3,4%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	3,2%	2,9%	4,3%	8,9%	6,3%	4,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2713
	Hommes n=966	Femmes n=769	Ensemble n=1736	Hommes n=547	Femmes n=430	Ensemble n=977	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	7,6%	7,8%	7,6%	13,3%	15,1%	14,1%	10,0%
Plaintes ou signes cliniques	7,6%	7,5%	7,5%	12,6%	15,1%	13,7%	9,8%
Gêne dans le travail	4,3%	4,1%	4,2%	7,3%	7,1%	7,2%	5,3%
Consommation médicamenteuse	1,3%	2,0%	1,6%	4,5%	6,4%	5,3%	2,9%
Pathologie diagnostiquée	4,8%	3,3%	4,2%	8,0%	10,9%	9,3%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires du rachis							
(l'un des 2 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	21,6%	26,0%	23,6%	34,3%	37,1%	35,5%	27,9%
Plaintes ou signes cliniques	21,5%	25,8%	23,4%	33,0%	36,6%	34,6%	27,4%
Gêne dans le travail	12,4%	15,4%	13,8%	21,1%	20,8%	21,0%	16,4%
Consommation médicamenteuse	4,5%	6,5%	5,4%	10,2%	13,8%	11,8%	7,7%
Pathologie diagnostiquée	8,2%	9,2%	8,6%	16,7%	20,6%	18,4%	12,1%
➤ Vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	6,0%	11,7%	8,5%	11,2%	21,0%	15,5%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	6,0%	11,6%	8,5%	10,8%	21,0%	15,3%	10,9%
Gêne dans le travail	2,3%	6,9%	4,3%	7,5%	11,5%	9,2%	6,1%
Consommation médicamenteuse	0,9%	3,8%	2,2%	2,8%	6,7%	4,5%	3,0%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	4,4%	2,9%	4,1%	9,0%	6,3%	4,1%
➤ Vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	18,7%	19,4%	19,0%	28,0%	27,7%	27,9%	22,2%
Plaintes ou signes cliniques	18,6%	19,2%	18,8%	27,0%	27,0%	27,0%	21,8%
Gêne dans le travail	11,5%	11,7%	11,6%	16,7%	15,0%	16,0%	13,2%
Consommation médicamenteuse	3,7%	4,2%	3,9%	8,1%	11,1%	9,4%	5,9%
Pathologie diagnostiquée	7,0%	6,0%	6,5%	13,8%	16,9%	15,2%	9,6%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=219	Intermédiaires n=574	Employés n=809	Ouvriers n=1093	Ensemble (region) n=2713
Répartition homme/femme	67,6%/32,4%	52,3%/47,7%	17,6%/82,4%	83,1%/16,9%	55,8%/44,2%
≤24ans	3,7%	8,5%	16,1%	14,1%	12,6%
25-34ans	24,2%	29,4%	24,4%	20,5%	23,9%
35-44ans	35,6%	28,0%	26,2%	26,7%	27,5%
45-54ans	25,6%	24,4%	25,2%	29,1%	26,6%
≥55ans	11,0%	9,6%	8,2%	9,6%	9,4%
Agriculture	0,0%	0,2%	0,3%	1,8%	0,9%
Industrie	34,3%	29,7%	7,1%	43,9%	29,0%
Construction	5,1%	4,5%	1,9%	17,1%	8,9%
Commerce	14,4%	18,5%	30,9%	10,6%	18,8%
Services	46,3%	47,1%	59,9%	26,6%	42,4%

Conditions de travail	Cadres n=219	Intermédiaires n=574	Employés n=809	Ouvriers n=1093	Ensemble (region) n=2713
Changement de travail depuis 1an :					
Non	87,2%	89,0%	84,7%	85,9%	86,3%
Oui, raison médicale	1,4%	0,3%	0,4%	1,3%	0,8%
Oui, autre raison	11,4%	10,5%	14,6%	12,4%	12,6%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%
Personnes travaillant à temps plein	90,7%	88,1%	68,7%	91,9%	84,1%
Travail en journée normale	92,5%	86,0%	80,4%	70,3%	78,6%
Coupures de plus de 2 heures	14,0%	14,9%	28,1%	15,1%	18,8%
Horaires décalés	25,6%	21,2%	23,8%	35,1%	28,0%
Horaires irréguliers ou alternés	20,6%	17,7%	29,9%	33,4%	27,9%
Travail de nuit	1,9%	5,1%	6,3%	16,6%	9,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	27,1%	12,0%	1,9%	8,8%	9,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	75,8%	64,3%	53,4%	37,5%	51,4%
Parmi eux :					
➤ Perturbe le travail	60,5%	62,4%	51,8%	49,9%	55,0%
➤ Sans conséquence	40,8%	35,7%	42,6%	50,3%	42,9%
➤ Aspect positif sur le travail	42,2%	37,3%	41,5%	38,0%	39,6%
Dépasser ses horaires normaux	74,4%	50,5%	31,4%	23,8%	36,3%
Sauter le repas ou la pause	30,6%	25,2%	17,0%	13,7%	18,7%
Traiter trop vite une opération	39,0%	30,4%	21,9%	16,7%	23,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	3,7%	9,4%	17,9%	31,0%	20,1%
Travail pas varié	6,0%	8,9%	20,1%	25,0%	18,4%
Pas de choix dans la façon de procéder	11,1%	18,3%	26,9%	30,5%	25,1%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	14,4%	16,8%	18,0%	17,3%	17,1%
Travail pas reconnu	13,5%	24,5%	23,5%	26,8%	24,1%
Formations et informations insuffisantes	15,1%	19,4%	21,0%	22,9%	20,9%
Objectifs et consignes pas clairement définis	19,9%	21,4%	17,5%	17,5%	18,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	59,4%	44,0%	33,0%	33,3%	37,7%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=219	Intermédiaires n=574	Employés n=809	Ouvriers n=1093	Ensemble (region) n=2713
Postures contraignantes :					
Non	78,8%	56,5%	44,1%	23,5%	41,3%
Oui, difficile ou pénible	7,8%	18,5%	31,8%	40,7%	30,5%
Oui, pas difficile ou pénible	12,4%	24,6%	22,5%	34,3%	26,9%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,9%	0,3%	1,6%	1,5%	1,2%
Effort, Port de charges lourdes :					
Non	87,6%	61,1%	52,7%	28,9%	47,8%
Oui, difficile ou pénible	4,1%	19,3%	27,7%	38,4%	28,2%
Oui, pas difficile ou pénible	8,3%	18,4%	18,3%	31,5%	22,8%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,0%	1,2%	1,4%	1,2%	1,2%
Gestes répétitifs :					
Non	76,0%	59,8%	32,3%	24,1%	38,6%
Oui, difficile ou pénible	3,2%	10,3%	24,6%	29,2%	21,6%
Oui, pas difficile ou pénible	19,8%	28,6%	41,3%	45,6%	38,5%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,9%	1,4%	1,9%	1,1%	1,4%
Importants déplacements à pieds :					
Non	82,4%	65,0%	62,7%	46,9%	58,4%
Oui, difficile ou pénible	1,9%	8,2%	13,2%	15,4%	12,0%
Oui, pas difficile ou pénible	14,8%	25,5%	23,4%	36,1%	28,3%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,9%	1,2%	0,7%	1,7%	1,2%
Station debout prolongée :					
Non	76,3%	54,6%	41,1%	24,9%	40,4%
Oui, difficile ou pénible	6,0%	16,1%	26,6%	28,2%	23,2%
Oui, pas difficile ou pénible	17,2%	27,7%	30,9%	45,6%	35,1%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,5%	1,6%	1,4%	1,2%	1,3%

Expositions	Cadres n=219	Intermédiaires n=574	Employés n=809	Ouvriers n=1093	Ensemble (region) n=2713
Produits chimiques					
Poussières, fumées	8,7%	19,7%	18,8%	40,5%	26,8%
Rx ionisants	9,6%	22,5%	15,8%	63,7%	36,0%
Vibrations	1,4%	4,0%	1,9%	1,8%	2,3%
Gêne sonore	4,1%	8,7%	3,0%	43,9%	20,7%
Bruit > 80db	17,0%	30,7%	20,8%	65,6%	40,6%
Contrainte visuelle	7,8%	16,5%	4,1%	50,1%	25,7%
Conduite routière prolongée	43,4%	34,4%	27,3%	29,9%	31,1%
Chaleur intense	25,3%	20,8%	4,1%	17,5%	15,0%
Froid intense	4,6%	6,3%	9,3%	20,2%	12,6%
Intempéries	2,3%	4,2%	8,2%	17,6%	10,6%
Pression psychologique	5,0%	9,5%	5,6%	31,5%	16,9%
Agent biologique	35,8%	31,8%	22,6%	20,6%	24,9%
Contact avec le public	3,7%	13,5%	15,6%	7,4%	10,8%
	67,1%	73,9%	85,8%	47,7%	66,5%

Formation	Cadres n=219	Intermédiaires n=574	Employés n=809	Ouvriers n=1093	Ensemble (region) n=2713
A bénéficié d'une formation depuis un an	60,1%	55,6%	41,1%	36,7%	44,0%
Parmi eux :					
➤ En rapport avec le travail actuel	89,8%	92,0%	90,2%	89,2%	90,4%
➤ En rapport avec le travail futur	16,1%	9,2%	13,9%	17,3%	14,1%
➤ Formation d'intérêt général	49,6%	50,5%	45,9%	44,5%	47,1%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	46,0%	32,9%	21,0%	18,5%	24,9%

Mode de vie	Cadres n=219	Intermédiaires n=574	Employés n=809	Ouvriers n=1093	Ensemble (region) n=2713
Activité sportive régulière	56,4%	50,1%	42,7%	38,4%	43,7%
Consommation de tabac	21,2%	31,9%	34,7%	44,2%	36,6%
Consommation de tabac>15 cig / jour	6,0%	6,0%	6,0%	13,0%	8,8%
Consommation de café	80,2%	79,8%	73,4%	83,0%	79,1%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	12,4%	11,0%	8,9%	19,8%	14,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	15,1%	19,6%	12,8%	11,2%	13,8%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=139	≥45ans n=80*	Ens. n=219	<45ans n=379	≥45ans n=195	Ens. n=574	<45ans n=539	≥45ans n=270	Ens. n=809	<45ans n=670	≥45ans n=423	Ens. n=1093	<45ans n=1736	≥45ans n=977	Ens. n=2713
Indice de masse corporelle															
➤ Normaux ou maigres	59,1%	37,5%	50,9%	62,7%	47,4%	57,5%	62,5%	55,7%	60,3%	57,0%	35,8%	48,8%	60,2%	43,4%	54,2%
➤ Surpoids	29,5%	37,5%	32,5%	27,1%	37,9%	30,7%	25,2%	29,2%	26,5%	30,2%	41,2%	34,4%	27,9%	37,3%	31,3%
➤ Obèses	11,4%	25,0%	16,5%	10,2%	14,7%	11,7%	12,2%	15,2%	13,2%	12,8%	23,0%	16,7%	11,9%	19,2%	14,5%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	1,5%	3,8%	2,3%	4,3%	2,1%	3,5%	3,8%	6,4%	4,6%	4,7%	6,5%	5,4%	4,0%	5,4%	4,5%
Plaîntes ou signes cliniques	1,5%	3,8%	2,3%	4,0%	2,1%	3,3%	3,2%	6,0%	4,1%	3,9%	5,6%	4,5%	3,5%	4,9%	4,0%
Gêne dans le travail	0,7%	0,0%	0,5%	0,3%	0,0%	0,2%	0,2%	0,8%	0,4%	0,9%	2,4%	1,5%	0,5%	1,2%	0,8%
Consommation médic.	0,0%	3,8%	1,4%	2,1%	1,0%	1,8%	3,0%	3,4%	3,1%	2,9%	2,4%	2,7%	2,5%	2,6%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	0,7%	2,5%	1,4%	3,5%	1,5%	2,8%	2,8%	4,2%	3,3%	3,5%	4,3%	3,8%	3,0%	3,6%	3,2%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	0,7%	6,3%	2,8%	2,9%	6,2%	4,0%	3,2%	4,9%	3,8%	2,6%	8,4%	4,8%	2,7%	6,8%	4,2%
Plaîntes ou signes cliniques	0,7%	5,0%	2,3%	2,9%	3,1%	3,0%	2,3%	3,7%	2,8%	2,1%	8,2%	4,5%	2,3%	5,7%	3,5%
Gêne dans le travail	0,0%	2,5%	0,9%	1,1%	0,0%	0,7%	1,3%	1,9%	1,5%	0,8%	2,2%	1,3%	0,9%	1,8%	1,2%
Consommation médic.	0,7%	3,8%	1,8%	1,1%	5,1%	2,5%	0,9%	2,6%	1,5%	0,8%	4,1%	2,0%	0,9%	3,8%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	0,7%	3,8%	1,8%	2,1%	5,2%	3,2%	2,5%	3,4%	2,8%	1,7%	5,8%	3,2%	1,9%	4,9%	3,0%
HTA															
Existence d'un problème	3,7%	11,7%	6,6%	2,1%	16,0%	6,9%	4,0%	14,4%	7,5%	2,9%	17,8%	8,7%	3,2%	15,8%	7,7%
Plaîntes ou signes cliniques	3,7%	9,1%	5,6%	0,8%	11,3%	4,4%	3,0%	9,9%	5,3%	2,4%	12,6%	6,3%	2,4%	11,2%	5,6%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,3%	0,3%	1,0%	0,6%	0,2%	0,6%	0,4%
Consommation médic.	2,2%	9,1%	4,7%	1,1%	10,9%	4,4%	1,9%	11,7%	5,2%	1,2%	13,8%	6,1%	1,5%	12,1%	5,3%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	10,4%	4,7%	1,1%	12,9%	5,1%	2,5%	12,9%	5,9%	1,2%	14,5%	6,3%	1,6%	13,3%	5,8%
➤ Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	17,6%	21,3%	19,0%	18,0%	22,6%	19,5%	20,4%	28,2%	23,0%	15,5%	18,5%	16,7%	17,8%	22,2%	19,4%
Plaîntes ou signes cliniques	17,6%	21,3%	19,0%	17,2%	21,6%	18,7%	20,4%	28,2%	23,0%	15,4%	18,5%	16,6%	17,5%	22,0%	19,1%
Gêne dans le travail	8,1%	7,5%	7,9%	8,9%	9,4%	9,1%	8,2%	12,8%	9,7%	7,0%	7,5%	7,2%	7,8%	9,4%	8,4%
Consommation médic.	4,4%	2,5%	3,7%	2,4%	2,1%	2,3%	3,2%	3,0%	3,2%	1,4%	1,7%	1,5%	2,4%	2,2%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	6,6%	3,8%	5,6%	5,4%	4,7%	5,2%	4,2%	5,3%	4,6%	2,6%	3,1%	2,8%	4,1%	4,2%	4,1%
➤ Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	22,1%	27,8%	24,2%	22,5%	24,2%	23,1%	20,8%	32,5%	24,7%	16,3%	19,7%	17,6%	19,6%	24,9%	21,5%
Plaîntes ou signes cliniques	22,1%	27,8%	24,2%	22,3%	23,3%	22,6%	20,6%	31,7%	24,3%	16,3%	19,5%	17,5%	19,4%	24,4%	21,2%
Gêne dans le travail	11,8%	16,5%	13,5%	9,9%	13,9%	11,3%	8,0%	14,4%	10,1%	5,8%	6,3%	6,0%	7,9%	10,9%	9,0%
Consommation médic.	6,6%	6,3%	6,5%	3,5%	5,9%	4,3%	4,6%	6,9%	5,3%	1,8%	3,4%	2,4%	3,4%	5,2%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	5,1%	6,4%	5,6%	6,5%	5,3%	6,1%	5,1%	8,1%	6,1%	3,2%	4,3%	3,6%	4,7%	5,7%	5,1%
➤ Trouble du sommeil															
Existence d'un problème	17,0%	20,0%	18,1%	16,2%	28,0%	20,2%	17,1%	30,8%	21,7%	14,9%	20,8%	17,2%	16,0%	25,0%	19,3%
Plaîntes ou signes cliniques	17,0%	20,0%	18,1%	16,2%	27,5%	20,0%	16,7%	29,5%	21,0%	14,8%	19,9%	16,7%	15,9%	24,1%	18,8%
Gêne dans le travail	6,7%	6,3%	6,5%	6,2%	4,8%	5,7%	4,9%	8,8%	6,2%	5,4%	6,3%	5,7%	5,6%	6,7%	6,0%
Consommation médic.	3,0%	3,8%	3,3%	2,4%	7,3%	4,1%	2,9%	9,6%	5,1%	1,8%	5,1%	3,1%	2,4%	6,7%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	3,7%	3,8%	3,7%	4,1%	7,9%	5,3%	3,4%	6,9%	4,6%	3,2%	5,3%	4,0%	3,5%	6,2%	4,5%
Troubles neuropsychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	6,6%	10,0%	7,8%	7,2%	7,3%	7,2%	6,4%	15,0%	9,3%	4,1%	5,0%	4,5%	5,7%	8,6%	6,7%
Plaîntes ou signes cliniques	6,6%	10,0%	7,8%	6,7%	6,7%	6,7%	6,0%	13,2%	8,4%	4,1%	5,0%	4,5%	5,4%	8,0%	6,4%
Gêne dans le travail	4,4%	3,8%	4,1%	2,7%	1,0%	2,1%	1,7%	3,8%	2,4%	1,4%	1,0%	1,2%	2,0%	2,0%	2,0%
Consommation médic.	2,2%	1,3%	1,8%	0,8%	1,0%	0,9%	0,6%	0,8%	0,6%	0,3%	0,7%	0,5%	0,6%	0,8%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	2,5%	2,3%	2,1%	1,6%	1,9%	0,8%	1,9%	1,1%	0,6%	1,0%	0,7%	1,1%	1,5%	1,2%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=139	≥45ans n=80*	Ens. n=219	<45ans n=379	≥45ans n=195	Ens. n=574	<45ans n=539	≥45ans n=270	Ens. n=809	<45ans n=670	≥45ans n=423	Ens. n=1093	<45ans n=1736	≥45ans n=977	Ens. n=2713
Digestif															
Existence d'un problème	9,8%	10,0%	9,9%	5,7%	13,0%	8,2%	7,0%	10,3%	8,1%	6,2%	10,2%	7,8%	6,7%	10,8%	8,1%
Plaintes, signes cliniques	9,8%	10,0%	9,9%	5,7%	12,4%	8,0%	6,7%	10,3%	7,9%	5,9%	9,0%	7,1%	6,4%	10,2%	7,8%
Gêne dans le travail	0,0%	3,8%	1,4%	1,3%	1,6%	1,4%	0,6%	2,3%	1,1%	0,9%	2,2%	1,4%	0,9%	2,2%	1,4%
Consommation médic.	4,5%	6,3%	5,2%	2,7%	8,3%	4,6%	2,7%	4,6%	3,3%	2,0%	3,4%	2,5%	2,5%	4,9%	3,4%
Pathologie diagnostiquée	6,1%	7,5%	6,6%	3,2%	9,9%	5,5%	3,6%	5,7%	4,3%	2,7%	5,4%	3,8%	3,4%	6,6%	4,5%
Dermatologie															
Existence d'un problème	6,6%	10,0%	7,9%	7,2%	5,7%	6,7%	6,9%	7,1%	7,0%	6,5%	10,4%	8,0%	6,8%	8,5%	7,4%
Plaintes, signes cliniques	6,6%	10,0%	7,9%	6,9%	5,7%	6,5%	6,8%	7,1%	6,9%	6,4%	9,2%	7,4%	6,7%	8,0%	7,1%
Gêne dans le travail	0,7%	0,0%	0,5%	0,8%	0,5%	0,7%	1,1%	0,8%	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	0,8%	1,0%
Consommation médic.	2,9%	5,0%	3,7%	4,0%	2,6%	3,5%	3,8%	3,7%	3,8%	2,0%	5,5%	3,3%	3,0%	4,4%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	5,1%	7,5%	6,0%	6,1%	5,2%	5,8%	4,7%	6,0%	5,1%	3,5%	8,9%	5,6%	4,6%	7,2%	5,5%
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	5,8%	11,4%	7,9%	5,3%	11,5%	7,4%	2,6%	4,9%	3,4%	8,8%	21,8%	13,8%	5,8%	14,3%	8,9%
Plaintes, signes cliniques	5,8%	10,1%	7,4%	5,1%	11,5%	7,2%	2,4%	4,5%	3,1%	8,2%	19,9%	12,7%	5,5%	13,3%	8,3%
Gêne dans le travail	3,6%	2,5%	3,2%	1,6%	4,7%	2,6%	0,9%	2,6%	1,5%	1,4%	3,2%	2,1%	1,5%	3,4%	2,1%
Consommation médic.	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	0,7%	0,2%	0,8%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	2,9%	2,5%	2,8%	4,8%	6,8%	5,5%	1,1%	4,2%	2,1%	6,4%	16,6%	10,3%	4,1%	10,1%	6,2%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur															
(l'un des 3 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	6,7%	12,5%	8,8%	9,4%	20,1%	13,0%	12,6%	32,6%	19,2%	15,6%	26,6%	19,8%	12,5%	25,5%	17,2%
Plaintes, signes cliniques	6,7%	12,5%	8,8%	9,1%	19,6%	12,7%	12,4%	32,6%	19,1%	15,5%	25,8%	19,5%	12,3%	25,1%	16,9%
Gêne dans le travail	3,0%	5,1%	3,7%	4,8%	9,8%	6,5%	7,7%	20,1%	11,8%	10,4%	16,5%	12,7%	7,7%	15,1%	10,3%
Consommation médic.	0,7%	2,6%	1,4%	1,9%	6,7%	3,5%	3,6%	13,5%	6,8%	2,3%	7,6%	4,3%	2,5%	8,6%	4,6%
Pathologie diagnostiquée	3,0%	7,6%	4,7%	5,1%	12,4%	7,6%	6,8%	18,1%	10,5%	6,2%	16,1%	10,0%	5,9%	15,0%	9,1%
➤ Epaule															
Existence d'un problème	5,9%	11,3%	7,9%	5,9%	10,8%	7,6%	6,6%	21,0%	11,4%	7,7%	18,2%	11,7%	6,8%	16,8%	10,4%
Plaintes, signes cliniques	5,9%	11,3%	7,9%	5,6%	10,3%	7,2%	6,6%	20,6%	11,3%	7,7%	18,0%	11,7%	6,7%	16,4%	10,2%
Gêne dans le travail	2,9%	3,8%	3,3%	2,4%	4,1%	3,0%	4,1%	12,8%	7,0%	4,8%	11,1%	7,2%	3,9%	9,5%	5,9%
Consommation médic.	0,7%	2,6%	1,4%	1,1%	3,6%	1,9%	2,4%	9,1%	4,6%	2,0%	5,3%	3,3%	1,8%	5,7%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	6,3%	3,7%	2,4%	6,2%	3,7%	3,6%	9,1%	5,4%	2,0%	9,9%	5,0%	2,6%	8,5%	4,7%
➤ Coude															
Existence d'un problème	0,7%	2,5%	1,4%	1,6%	6,2%	3,2%	2,8%	5,6%	3,8%	3,6%	8,2%	5,4%	2,7%	6,5%	4,1%
Plaintes, signes cliniques	0,0%	2,5%	0,9%	1,3%	5,7%	2,8%	2,8%	5,6%	3,8%	3,5%	7,9%	5,2%	2,5%	6,3%	3,9%
Gêne dans le travail	0,0%	2,5%	0,9%	1,3%	3,6%	2,1%	2,3%	3,8%	2,8%	2,6%	6,0%	3,9%	2,0%	4,6%	2,9%
Consommation médic.	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	1,6%	1,2%	1,1%	1,9%	1,4%	0,2%	2,4%	1,0%	0,6%	1,9%	1,1%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	1,3%	0,5%	0,5%	3,6%	1,6%	2,3%	3,0%	2,5%	1,7%	4,8%	2,9%	1,5%	3,7%	2,3%
➤ Poignet															
Existence d'un problème	2,2%	2,5%	2,3%	3,5%	10,3%	5,8%	6,0%	14,8%	8,9%	7,7%	9,7%	8,4%	5,8%	10,5%	7,5%
Plaintes, signes cliniques	2,2%	2,5%	2,3%	3,2%	10,3%	5,6%	5,8%	14,8%	8,8%	7,7%	9,2%	8,3%	5,7%	10,3%	7,3%
Gêne dans le travail	0,7%	1,3%	0,9%	1,6%	5,2%	2,8%	3,2%	8,0%	4,8%	5,3%	5,6%	5,4%	3,4%	5,8%	4,3%
Consommation médic.	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	3,1%	1,4%	1,3%	6,1%	2,9%	0,8%	2,4%	1,4%	0,8%	3,4%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	1,3%	1,9%	2,7%	6,7%	4,1%	2,6%	8,7%	4,7%	3,5%	5,6%	4,3%	2,9%	6,3%	4,1%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=139	≥45an- s n=80*	Ens. n=21 9	<45ans n=379	≥45ans n=195	Ens. n=574	<45ans n=539	≥45ans n=270	Ens. n=809	<45ans n=670	≥45ans n=423	Ens. n=1093	<45ans n=1736	≥45ans n=977	Ens. n=2713
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	8,0%	7,6%	7,9%	8,5%	14,5%	10,5%	7,2%	16,9%	10,4%	7,3%	12,9%	9,5%	7,6%	14,1%	10,0%
Plaintes ou signes cliniques	8,0%	7,6%	7,9%	8,3%	14,5%	10,4%	7,0%	16,9%	10,3%	7,3%	12,0%	9,1%	7,5%	13,7%	9,8%
Gêne dans le travail	3,6%	1,3%	2,8%	4,0%	5,2%	4,4%	4,0%	7,2%	5,1%	4,4%	8,9%	6,1%	4,2%	7,2%	5,3%
Consommation médic.	1,5%	2,5%	1,9%	1,6%	4,7%	2,6%	1,7%	8,3%	3,9%	1,4%	4,3%	2,5%	1,6%	5,3%	2,9%
Pathologie diagnostiquée	5,8%	5,1%	5,6%	4,3%	9,4%	6,0%	3,6%	10,9%	6,1%	3,9%	8,7%	5,8%	4,2%	9,3%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	15,7%	24,4%	18,9%	21,9%	30,7%	24,9%	26,8%	38,9%	30,8%	23,7%	37,4%	29,0%	23,6%	35,5%	27,9%
Plaintes ou signes cliniques	15,0%	24,4%	18,5%	21,7%	29,6%	24,4%	26,6%	38,5%	30,6%	23,7%	36,0%	28,4%	23,4%	34,6%	27,4%
Gêne dans le travail	10,4%	10,3%	10,4%	10,8%	16,5%	12,7%	16,2%	22,8%	18,4%	14,4%	24,1%	18,1%	13,8%	21,0%	16,4%
Consommation médic.	2,2%	3,8%	2,8%	6,7%	9,1%	7,5%	6,7%	15,4%	9,6%	4,3%	12,0%	7,3%	5,4%	11,8%	7,7%
Pathologie diagnostiquée	6,7%	14,3%	9,5%	9,1%	17,1%	11,8%	9,2%	18,3%	12,2%	8,4%	19,6%	12,7%	8,6%	18,4%	12,1%
➤ Vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	5,9%	10,3%	7,5%	10,4%	13,0%	11,3%	10,8%	21,9%	14,5%	6,3%	13,4%	9,1%	8,5%	15,5%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	10,3%	7,5%	10,2%	13,0%	11,1%	10,8%	21,9%	14,5%	6,3%	13,0%	8,9%	8,5%	15,3%	10,9%
Gêne dans le travail	3,7%	6,4%	4,7%	4,8%	5,8%	5,1%	6,0%	12,2%	8,1%	2,9%	9,4%	5,4%	4,3%	9,2%	6,1%
Consommation médic.	1,5%	3,8%	2,3%	3,7%	3,2%	3,5%	3,2%	7,6%	4,7%	0,8%	3,1%	1,7%	2,2%	4,5%	3,0%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	6,4%	3,3%	4,0%	6,8%	5,0%	4,0%	6,5%	4,8%	1,8%	5,8%	3,3%	2,9%	6,3%	4,1%
➤ Vertèbres dorsolombaires															
Existence d'un problème	12,6%	16,7%	14,1%	15,7%	24,7%	18,8%	20,8%	29,2%	23,6%	20,8%	30,5%	24,6%	19,0%	27,9%	22,2%
Plaintes ou signes cliniques	11,9%	16,7%	13,7%	15,5%	23,7%	18,3%	20,6%	28,5%	23,3%	20,8%	29,4%	24,1%	18,8%	27,0%	21,8%
Gêne dans le travail	8,9%	5,1%	7,5%	7,8%	13,8%	9,8%	12,9%	17,4%	14,4%	13,4%	18,2%	15,3%	11,6%	16,0%	13,2%
Consommation médic.	1,5%	1,3%	1,4%	4,3%	8,0%	5,5%	4,7%	12,3%	7,2%	3,7%	9,8%	6,0%	3,9%	9,4%	5,9%
Pathologie diagnostiquée	5,2%	10,4%	7,1%	6,4%	14,9%	9,3%	5,9%	15,5%	9,1%	7,5%	15,8%	10,7%	6,5%	15,2%	9,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=717	F. Construction n=237	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=501	Q. Santé humaine et action sociale n=279	Région n=2713
Répartition homme/femme	72,2% / 27,8%	89,9% / 10,1%	47,3% / 52,7%	17,9% / 82,1%	55,8% / 44,2%
≤24ans	8,4%	18,1%	15,2%	8,6%	12,6%
25-34ans	20,5%	21,1%	29,9%	22,9%	23,9%
35-44ans	28,9%	29,5%	26,9%	27,6%	27,5%
45-54ans	31,4%	24,5%	21,0%	30,8%	26,7%
≥55ans	10,8%	6,8%	7,0%	10,0%	9,4%
Cadres	9,6%	4,6%	6,2%	4,3%	8,1%
Intermédiaires	21,6%	10,5%	20,6%	32,6%	21,2%
Employés	7,1%	6,3%	48,7%	57,7%	29,8%
Ouvriers	61,4%	78,1%	23,0%	5,4%	40,3%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=717	F. Construction n=237	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=501	Q. Santé humaine et action sociale n=279	Région n=2713
Changement de travail depuis 1an :					
Non	88,9%	90,2%	86,4%	88,9%	86,3%
Oui, raisons médicales	0,6%	0,0%	0,6%	0,4%	0,8%
Oui, autres raisons	10,2%	9,8%	12,8%	10,4%	12,6%
Oui, raisons non précisée	0,3%	0,0%	0,2%	0,4%	0,3%
Personnes travaillant à temps plein	92,8%	95,8%	82,0%	73,6%	84,1%
Travail en journée normale	68,7%	96,6%	85,9%	75,1%	78,6%
Coupures de plus de 2 heures	9,8%	6,1%	29,6%	22,6%	18,8%
Horaires décalés	35,7%	8,7%	21,5%	28,7%	28,0%
Horaires irréguliers ou alternés	34,4%	4,9%	26,7%	34,2%	27,9%
Travail de nuit	14,5%	2,6%	3,6%	11,3%	9,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	9,7%	12,3%	6,5%	2,2%	9,2%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	55,7%	41,8%	56,7%	49,1%	51,4%
Parmi eux :					
➤ Perturbe le travail	55,1%	53,1%	52,6%	65,2%	55,0%
➤ Sans conséquence	43,4%	49,0%	43,2%	33,3%	42,9%
➤ Aspect positif sur le travail	39,6%	35,4%	43,6%	31,8%	39,6%
Dépasser ses horaires normaux	35,5%	25,7%	36,3%	34,8%	36,3%
Sauter le repas ou la pause	15,2%	9,3%	15,7%	23,5%	18,7%
Traiter trop vite une opération	26,1%	12,3%	22,9%	28,5%	23,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	24,7%	13,2%	20,3%	12,2%	20,1%
Travail pas varié	18,1%	9,7%	19,4%	17,3%	18,4%
Pas de choix dans la façon de procéder	24,4%	20,8%	25,4%	25,9%	25,1%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	17,2%	7,2%	15,8%	19,6%	17,1%
Travail pas reconnu	29,6%	13,6%	21,1%	28,5%	24,1%
Formations et informations insuffisantes	23,5%	22,6%	22,0%	19,9%	20,9%
Objectifs et consignes pas clairement définis	21,8%	17,9%	16,9%	18,8%	18,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	42,2%	30,4%	32,0%	39,6%	37,7%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=717	F. Construction n=237	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=501	Q. Santé humaine et action sociale n=279	Région n=2713
Postures contraignantes :					
Non	42,2%	25,8%	37,4%	28,7%	41,3%
Oui, difficile ou pénible	30,5%	47,0%	31,6%	41,2%	30,5%
Oui, pas difficile ou pénible	25,7%	27,1%	29,0%	29,0%	26,9%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,5%	0,0%	2,0%	1,1%	1,2%
Effort, Port de charges lourdes :					
Non	44,9%	34,3%	36,2%	37,3%	47,8%
Oui, difficile ou pénible	29,2%	41,1%	34,1%	40,6%	28,2%
Oui, pas difficile ou pénible	24,3%	24,6%	27,9%	20,7%	22,8%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,7%	0,0%	1,8%	1,4%	1,2%
Gestes répétitifs :					
Non	39,6%	39,1%	37,9%	36,6%	38,6%
Oui, difficile ou pénible	22,8%	28,9%	23,0%	24,4%	21,6%
Oui, pas difficile ou pénible	36,3%	31,1%	36,7%	37,6%	38,5%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,3%	0,9%	2,4%	1,4%	1,4%
Importants déplacements à pieds :					
Non	49,4%	60,4%	53,2%	55,1%	58,4%
Oui, difficile ou pénible	14,3%	16,2%	13,5%	16,7%	12,0%
Oui, pas difficile ou pénible	34,2%	23,0%	32,5%	27,2%	28,3%
Oui, difficile ou pénible non précisé	2,1%	0,4%	0,8%	1,1%	1,2%
Station debout prolongée :					
Non	34,5%	37,3%	28,6%	30,9%	40,4%
Oui, difficile ou pénible	25,2%	19,9%	28,4%	34,9%	23,2%
Oui, pas difficile ou pénible	38,7%	42,4%	41,4%	32,7%	35,1%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,5%	0,4%	1,6%	1,4%	1,3%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=717	F. Construction n=237	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=501	Q. Santé humaine et action sociale n=279	Région n=2713
Produits chimiques	34,0%	38,9%	20,6%	26,2%	26,8%
Poussières, fumées	49,6%	75,4%	26,7%	13,3%	36,0%
Rx ionisants	2,4%	4,2%	0,0%	5,4%	2,3%
Vibrations	22,9%	62,1%	9,7%	2,9%	20,7%
Gêne sonore	59,4%	67,8%	29,1%	22,2%	40,6%
Bruit > 80db	48,7%	45,1%	13,9%	4,7%	25,7%
Contrainte visuelle	36,4%	27,8%	26,1%	18,0%	31,1%
Conduite routière prolongée	9,9%	17,4%	12,6%	10,1%	15,0%
Chaleur intense	18,7%	10,6%	6,2%	11,2%	12,6%
Froid intense	12,7%	10,6%	14,8%	3,2%	10,6%
Intempéries	9,7%	55,7%	9,2%	7,2%	16,9%
Pression psychologique	23,7%	23,3%	20,8%	34,7%	24,9%
Agent biologique	4,6%	8,5%	3,6%	49,5%	10,8%
Contact avec le public	36,2%	67,2%	82,8%	87,5%	66,5%

Formation	C. Industrie manufacturière n=717	F. Construction n=237	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=501	Q. Santé humaine et action sociale n=279	Région n=2713
A bénéficié d'une formation depuis un an	43,3%	30,3%	43,9%	50,9%	44,0%
Parmi eux :					
➤ En rapport avec le travail actuel	85,3%	97,1%	94,9%	84,8%	90,4%
➤ En rapport avec le travail futur	14,5%	19,7%	15,5%	10,7%	14,1%
➤ Formation d'intérêt général	53,7%	22,6%	43,6%	53,8%	47,1%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	26,4%	26,4%	27,5%	25,2%	24,9%

Mode de vie	C. Industrie manufacturière n=717	F. Construction n=237	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=501	Q. Santé humaine et action sociale n=279	Région n=2713
Activité sportive régulière	45,3%	33,2%	42,9%	49,3%	43,7%
Consommation de tabac	36,1%	51,7%	34,5%	30,5%	36,6%
Consommation de tabac>15 cig / jour	9,1%	21,4%	6,7%	6,6%	8,8%
Consommation de café	80,5%	87,9%	78,2%	72,9%	79,1%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	16,1%	16,5%	12,2%	9,2%	14,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	11,8%	12,6%	13,8%	17,0%	13,8%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=415	≥45ans n=302	Ens. n=717	<45ans n=163	≥45ans n=74*	Ens. n=237	<45ans n=361	≥45ans n=140	Ens. n=501	<45ans n=165	≥45ans n=114	Ens. n=279	<45ans n=1736	≥45ans n=977	Ens. n=2713
Indice de masse corporelle															
➤ Normaux, maigres	56,5%	39,2%	49,3%	57,9%	40,5%	52,4%	62,9%	44,9%	57,8%	58,1%	55,0%	56,9%	60,2%	43,4%	54,2%
➤ Surpoids	31,1%	39,9%	34,8%	29,6%	43,2%	33,9%	26,9%	32,6%	28,5%	28,1%	32,1%	29,7%	27,9%	37,3%	31,3%
➤ Obèses	12,3%	21,0%	15,9%	12,6%	16,2%	13,7%	10,2%	22,5%	13,6%	13,8%	12,8%	13,4%	11,9%	19,2%	14,5%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	6,3%	5,1%	5,8%	1,9%	8,1%	3,8%	5,9%	2,9%	5,0%	0,6%	4,5%	2,2%	4,0%	5,4%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	4,0%	4,8%	1,9%	8,1%	3,8%	5,0%	2,9%	4,4%	0,6%	3,6%	1,8%	3,5%	4,9%	4,0%
Gêne dans le travail	1,0%	1,3%	1,1%	0,6%	1,4%	0,9%	0,3%	2,2%	0,8%	0,0%	0,9%	0,4%	0,5%	1,2%	0,8%
Consommation médic.	4,4%	2,4%	3,5%	0,0%	4,1%	1,3%	3,9%	1,4%	3,2%	0,0%	2,7%	1,1%	2,5%	2,6%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	4,6%	4,0%	4,4%	1,2%	6,8%	3,0%	5,3%	2,2%	4,4%	0,0%	3,6%	1,5%	3,0%	3,6%	3,2%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	3,4%	7,4%	5,1%	0,0%	2,7%	0,9%	3,6%	9,4%	5,2%	3,1%	4,5%	3,7%	2,7%	6,8%	4,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	5,7%	4,0%	0,0%	2,7%	0,9%	3,1%	7,2%	4,2%	2,5%	4,5%	3,3%	2,3%	5,7%	3,5%
Gêne dans le travail	1,2%	2,0%	1,6%	0,0%	2,7%	0,9%	1,7%	2,2%	1,8%	0,6%	0,9%	0,7%	0,9%	1,8%	1,2%
Consommation médic.	1,2%	4,4%	2,5%	0,0%	2,7%	0,9%	0,8%	5,0%	2,0%	0,6%	2,7%	1,5%	0,9%	3,8%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	4,4%	3,3%	0,0%	2,7%	0,9%	2,5%	7,9%	4,0%	1,9%	2,7%	2,2%	1,9%	4,9%	3,0%
HTA															
Existence d'un problème	3,2%	20,2%	10,4%	0,6%	8,3%	3,0%	2,3%	18,1%	6,7%	5,6%	11,8%	8,1%	3,2%	15,8%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	12,5%	7,0%	0,6%	6,9%	2,6%	1,7%	17,4%	6,1%	4,3%	7,3%	5,6%	2,4%	11,2%	5,6%
Gêne dans le travail	0,5%	0,7%	0,6%	0,0%	2,8%	0,9%	0,3%	0,0%	0,2%	0,6%	0,9%	0,7%	0,2%	0,6%	0,4%
Consommation médic.	1,2%	13,5%	6,4%	0,0%	8,3%	2,6%	1,1%	13,0%	4,5%	3,1%	10,1%	5,9%	1,5%	12,1%	5,3%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	15,9%	7,5%	0,0%	8,3%	2,6%	1,4%	15,2%	5,3%	3,1%	9,1%	5,5%	1,6%	13,3%	5,8%
➤ Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	20,5%	17,9%	19,4%	16,1%	20,3%	17,4%	16,0%	25,9%	18,8%	23,3%	29,7%	25,9%	17,8%	22,2%	19,4%
Plaintes ou signes cliniques	20,0%	17,6%	19,0%	16,1%	20,3%	17,4%	15,7%	25,9%	18,5%	23,3%	29,7%	25,9%	17,5%	22,0%	19,1%
Gêne dans le travail	8,8%	7,5%	8,3%	6,3%	9,6%	7,3%	7,0%	14,4%	9,1%	12,7%	12,7%	12,7%	7,8%	9,4%	8,4%
Consommation médic.	2,7%	2,0%	2,4%	0,6%	2,7%	1,3%	1,1%	3,6%	1,8%	6,3%	0,9%	4,1%	2,4%	2,2%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	5,4%	3,7%	4,7%	2,5%	6,8%	3,8%	3,4%	2,9%	3,2%	6,3%	1,8%	4,5%	4,1%	4,2%	4,1%
➤ Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	19,5%	22,7%	20,8%	23,9%	20,3%	22,7%	18,1%	32,6%	22,1%	27,3%	23,6%	25,8%	19,6%	24,9%	21,5%
Plaintes ou signes cliniques	19,2%	22,0%	20,4%	23,9%	19,2%	22,4%	18,1%	32,6%	22,1%	26,7%	23,6%	25,5%	19,4%	24,4%	21,2%
Gêne dans le travail	7,6%	9,2%	8,3%	10,1%	9,6%	9,9%	7,9%	17,2%	10,5%	11,2%	11,9%	11,5%	7,9%	10,9%	9,0%
Consommation médic.	2,7%	5,8%	4,0%	2,5%	1,4%	2,2%	3,7%	8,3%	5,0%	3,1%	3,6%	3,3%	3,4%	5,2%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	5,4%	5,5%	5,4%	3,2%	2,7%	3,0%	4,5%	4,5%	4,5%	6,2%	8,2%	7,0%	4,7%	5,7%	5,1%
➤ Trouble du sommeil															
Existence d'un problème	17,5%	22,8%	19,7%	14,4%	16,2%	15,0%	14,1%	33,3%	19,5%	20,6%	29,5%	24,3%	16,0%	25,0%	19,3%
Plaintes ou signes cliniques	17,5%	21,8%	19,3%	13,8%	16,2%	14,5%	13,8%	32,1%	18,9%	20,0%	29,5%	23,9%	15,9%	24,1%	18,8%
Gêne dans le travail	7,7%	7,5%	7,6%	4,4%	1,4%	3,5%	5,1%	11,9%	7,0%	6,3%	6,4%	6,3%	5,6%	6,7%	6,0%
Consommation médic.	3,2%	6,8%	4,7%	0,6%	2,7%	1,3%	1,4%	9,7%	3,7%	3,8%	6,4%	4,8%	2,4%	6,7%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	5,4%	6,8%	6,0%	1,9%	5,4%	3,0%	2,5%	5,2%	3,3%	4,4%	5,5%	4,8%	3,5%	6,2%	4,5%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	7,3%	6,8%	7,1%	3,1%	2,7%	3,0%	4,5%	14,5%	7,3%	8,1%	8,9%	8,4%	5,7%	8,6%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	7,3%	6,4%	6,9%	3,1%	2,7%	3,0%	4,2%	13,1%	6,7%	6,8%	8,9%	7,7%	5,4%	8,0%	6,4%
Gêne dans le travail	3,4%	1,7%	2,7%	1,3%	1,4%	1,3%	0,6%	5,8%	2,0%	1,9%	0,0%	1,1%	2,0%	2,0%	2,0%
Consommation médic.	1,0%	1,0%	1,0%	0,6%	0,0%	0,4%	0,0%	1,4%	0,4%	1,2%	0,0%	0,7%	0,6%	0,8%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	2,0%	1,7%	1,8%	0,6%	1,4%	0,9%	0,3%	1,4%	0,6%	2,5%	0,9%	1,8%	1,1%	1,5%	1,2%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=415	≥45ans n=302	Ens. n=717	<45ans n=163	≥45ans n=74*	Ens. n=237	<45ans n=361	≥45ans n=140	Ens. n=501	<45ans n=165	≥45ans n=114	Ens. n=279	<45ans n=1736	≥45ans n=977	Ens. n=2713
Digestif															
Existence d'un problème	8,1%	10,2%	9,0%	6,9%	12,5%	8,6%	7,3%	11,9%	8,6%	6,9%	11,6%	8,9%	6,7%	10,8%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	9,2%	8,4%	6,9%	11,1%	8,2%	7,1%	11,9%	8,4%	6,9%	11,6%	8,9%	6,4%	10,2%	7,8%
Gêne dans le travail	0,5%	1,0%	0,7%	2,5%	2,8%	2,6%	0,8%	3,0%	1,4%	1,3%	3,6%	2,2%	0,9%	2,2%	1,4%
Consommation médic.	3,2%	4,8%	3,9%	1,9%	2,8%	2,2%	2,8%	5,2%	3,5%	1,9%	3,6%	2,6%	2,5%	4,9%	3,4%
Pathologie diagnostiquée	3,7%	7,2%	5,2%	1,9%	4,2%	2,6%	4,8%	7,4%	5,5%	3,2%	5,4%	4,1%	3,4%	6,6%	4,5%
Dermatologie															
Existence d'un problème	5,8%	8,9%	7,1%	7,5%	13,5%	9,4%	8,1%	10,1%	8,7%	9,3%	5,4%	7,7%	6,8%	8,5%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	8,2%	6,7%	7,5%	10,8%	8,5%	7,5%	10,1%	8,2%	9,3%	5,4%	7,7%	6,7%	8,0%	7,1%
Gêne dans le travail	0,7%	1,7%	1,1%	0,6%	1,4%	0,9%	0,8%	0,0%	0,6%	1,9%	0,9%	1,5%	1,1%	0,8%	1,0%
Consommation médic.	1,0%	4,4%	2,4%	3,8%	8,1%	5,1%	5,3%	7,2%	5,8%	3,1%	0,9%	2,2%	3,0%	4,4%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	7,5%	5,0%	5,0%	12,2%	7,3%	7,0%	9,4%	7,7%	5,0%	3,6%	4,4%	4,6%	7,2%	5,5%
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	8,8%	19,9%	13,4%	5,6%	20,3%	10,3%	5,1%	13,0%	7,3%	3,1%	6,3%	4,4%	5,8%	14,3%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	19,0%	12,4%	5,6%	16,2%	9,0%	5,1%	12,3%	7,1%	3,1%	6,3%	4,4%	5,5%	13,3%	8,3%
Gêne dans le travail	1,5%	2,1%	1,7%	2,5%	6,8%	3,8%	1,1%	4,3%	2,0%	1,2%	4,5%	2,6%	1,5%	3,4%	2,1%
Consommation médic.	0,5%	0,3%	0,4%	0,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	7,6%	13,5%	10,0%	3,1%	15,1%	6,9%	3,1%	8,7%	4,7%	1,2%	5,4%	2,9%	4,1%	10,1%	6,2%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur															
(l'un des 3 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	17,1%	24,1%	20,0%	13,9%	24,7%	17,3%	12,3%	31,2%	17,6%	10,6%	25,0%	16,5%	12,5%	25,5%	17,2%
Plaintes ou signes cliniques	16,6%	22,7%	19,2%	13,9%	24,7%	17,3%	12,0%	31,2%	17,4%	10,6%	25,0%	16,5%	12,3%	25,1%	16,9%
Gêne dans le travail	10,3%	13,9%	11,8%	11,4%	13,9%	12,2%	8,7%	17,0%	11,0%	5,0%	17,9%	10,3%	7,7%	15,1%	10,3%
Consommation médic.	3,0%	8,6%	5,3%	1,3%	8,2%	3,5%	3,9%	9,0%	5,3%	4,4%	15,2%	8,8%	2,5%	8,6%	4,6%
Pathologie diagnostiquée	6,9%	15,9%	10,7%	7,0%	15,1%	9,5%	6,5%	14,8%	8,8%	6,3%	15,2%	9,9%	5,9%	15,0%	9,1%
➤ Epaule															
Existence d'un problème	8,8%	14,5%	11,2%	7,5%	17,6%	10,7%	7,3%	22,3%	11,5%	6,2%	18,8%	11,3%	6,8%	16,8%	10,4%
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	13,9%	10,8%	7,5%	17,6%	10,7%	7,3%	21,6%	11,3%	6,2%	18,8%	11,3%	6,7%	16,4%	10,2%
Gêne dans le travail	5,1%	8,1%	6,4%	5,6%	6,8%	6,0%	4,5%	10,9%	6,3%	3,1%	13,4%	7,3%	3,9%	9,5%	5,9%
Consommation médic.	2,7%	5,1%	3,7%	1,3%	6,8%	3,0%	2,5%	5,1%	3,2%	2,5%	10,7%	5,8%	1,8%	5,7%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	8,1%	4,8%	3,1%	10,8%	5,6%	3,1%	8,8%	4,7%	2,5%	10,7%	5,8%	2,6%	8,5%	4,7%
➤ Coude															
Existence d'un problème	3,4%	8,4%	5,5%	5,0%	6,8%	5,6%	3,1%	7,2%	4,2%	1,2%	3,6%	2,2%	2,7%	6,5%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	8,1%	5,1%	5,0%	6,8%	5,6%	3,1%	7,2%	4,2%	1,2%	2,7%	1,8%	2,5%	6,3%	3,9%
Gêne dans le travail	2,4%	5,4%	3,7%	3,8%	5,5%	4,3%	2,8%	6,5%	3,8%	1,2%	2,7%	1,8%	2,0%	4,6%	2,9%
Consommation médic.	0,5%	2,7%	1,4%	0,6%	1,4%	0,9%	1,1%	2,2%	1,4%	0,6%	1,8%	1,1%	0,6%	1,9%	1,1%
Pathologie diagnostiquée	0,7%	5,7%	2,8%	2,5%	1,4%	2,2%	2,2%	3,6%	2,6%	1,2%	1,8%	1,5%	1,5%	3,7%	2,3%
➤ Poignet															
Existence d'un problème	8,8%	9,9%	9,2%	6,2%	5,5%	6,0%	4,8%	13,8%	7,3%	5,0%	12,5%	8,1%	5,8%	10,5%	7,5%
Plaintes ou signes cliniques	8,5%	9,2%	8,8%	6,2%	5,5%	6,0%	4,5%	13,8%	7,1%	5,0%	12,5%	8,1%	5,7%	10,3%	7,3%
Gêne dans le travail	4,6%	5,1%	4,8%	6,2%	2,8%	5,2%	3,1%	7,3%	4,3%	1,9%	8,0%	4,4%	3,4%	5,8%	4,3%
Consommation médic.	0,2%	2,7%	1,3%	1,2%	1,4%	1,3%	1,4%	4,4%	2,2%	1,9%	7,1%	4,0%	0,8%	3,4%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	4,4%	6,1%	5,1%	3,1%	4,2%	3,4%	2,8%	6,6%	3,9%	3,1%	6,3%	4,4%	2,9%	6,3%	4,1%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=415	≥45ans n=302	Ens. n=717	<45ans n=163	≥45ans n=74*	Ens. n=237	<45ans n=361	≥45ans n=140	Ens. n=501	<45ans n=165	≥45ans n=114	Ens. n=279	<45ans n=1736	≥45ans n=977	Ens. n=2713
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	8,5%	11,8%	9,9%	6,8%	13,7%	9,0%	10,4%	21,9%	13,6%	6,8%	17,0%	11,0%	7,6%	14,1%	10,0%
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	11,1%	9,5%	6,8%	13,7%	9,0%	10,1%	21,9%	13,4%	6,8%	17,0%	11,0%	7,5%	13,7%	9,8%
Gêne dans le travail	3,7%	6,8%	5,0%	5,6%	12,3%	7,7%	5,6%	11,8%	7,3%	5,0%	8,0%	6,2%	4,2%	7,2%	5,3%
Consommation médic.	2,2%	4,1%	3,0%	1,2%	6,8%	3,0%	1,4%	5,2%	2,5%	1,9%	8,0%	4,4%	1,6%	5,3%	2,9%
Pathologie diagnostiquée	4,6%	7,8%	5,9%	3,1%	11,0%	5,6%	6,5%	10,9%	7,7%	3,1%	13,4%	7,3%	4,2%	9,3%	6,0%
Troubles ostéoarticulaires du rachis															
(l'un des 2 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	21,3%	34,1%	26,6%	22,9%	45,9%	30,3%	29,9%	43,4%	33,6%	32,3%	33,6%	32,8%	23,6%	35,5%	27,9%
Plaintes ou signes cliniques	21,1%	31,8%	25,5%	22,9%	45,9%	30,3%	29,6%	43,4%	33,4%	32,3%	33,6%	32,8%	23,4%	34,6%	27,4%
Gêne dans le travail	13,8%	20,6%	16,6%	12,9%	32,4%	19,2%	17,8%	24,2%	19,5%	17,1%	23,9%	19,9%	13,8%	21,0%	16,4%
Consommation médic.	5,7%	10,9%	7,8%	2,6%	16,4%	7,0%	6,8%	13,5%	8,6%	8,9%	13,8%	10,9%	5,4%	11,8%	7,7%
Pathologie diagnostiquée	7,9%	18,8%	12,4%	8,3%	23,3%	13,1%	8,8%	16,3%	10,9%	14,6%	17,6%	15,8%	8,6%	18,4%	12,1%
➤ Vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	9,5%	11,9%	10,5%	5,0%	18,9%	9,4%	11,7%	23,7%	15,0%	12,0%	19,6%	15,2%	8,5%	15,5%	11,0%
Plaintes ou signes cliniques	9,3%	11,3%	10,1%	5,0%	18,9%	9,4%	11,7%	23,7%	15,0%	12,0%	19,6%	15,2%	8,5%	15,3%	10,9%
Gêne dans le travail	4,7%	7,5%	5,9%	1,9%	12,2%	5,1%	6,7%	13,5%	8,6%	5,7%	10,8%	7,8%	4,3%	9,2%	6,1%
Consommation médic.	2,7%	2,4%	2,6%	0,0%	6,8%	2,1%	3,1%	8,2%	4,5%	4,4%	7,2%	5,6%	2,2%	4,5%	3,0%
Pathologie diagnostiquée	2,9%	4,1%	3,4%	1,3%	8,2%	3,4%	3,7%	8,2%	4,9%	7,6%	4,5%	6,3%	2,9%	6,3%	4,1%
➤ Vertèbres dorsolumbaires															
Existence d'un problème	16,4%	26,3%	20,5%	21,0%	37,8%	26,4%	23,4%	33,6%	26,2%	25,0%	23,6%	24,4%	19,0%	27,9%	22,2%
Plaintes ou signes cliniques	16,2%	24,6%	19,7%	21,0%	37,8%	26,4%	23,1%	33,6%	26,0%	25,0%	22,9%	24,2%	18,8%	27,0%	21,8%
Gêne dans le travail	11,3%	14,9%	12,8%	12,9%	25,7%	17,0%	14,4%	17,9%	15,3%	14,4%	19,3%	16,4%	11,6%	16,0%	13,2%
Consommation médic.	4,5%	9,1%	6,4%	2,5%	11,1%	5,2%	4,5%	10,4%	6,1%	6,9%	11,0%	8,6%	3,9%	9,4%	5,9%
Pathologie diagnostiquée	6,2%	15,6%	10,1%	7,0%	16,4%	10,0%	6,5%	13,9%	8,6%	8,1%	15,6%	11,2%	6,5%	15,2%	9,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence