



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2009-2010

Région Ile-de-France

Juin 2011

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2009-2010 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Ile de France

L'exploitation des données de la région Ile de France a porté sur **1 690 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2009 (n=863) et 2010 (n=827).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Evrest est assez éloigné de la répartition des salariés de la région Ile de France, que ce soit pour les salariés du privé (Unedic) ou ceux du privé et du public (DADS) ; ceci est lié à la participation très inégale des médecins du travail sur le territoire régional. On observe ainsi une surreprésentation des hommes, des salariés des secteurs de l'industrie et du commerce, au détriment des secteurs de la construction et des services (tableau 1).

Les données globales concernant la région doivent donc être lues avec une grande prudence, et ne peuvent être utilisées comme « référence » ; on leur préfèrera, pour les données régionales, les données par secteur d'activité ou par catégories socioprofessionnelles.

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

En ce qui concerne les secteurs d'activité, seuls 2 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles, Activités spécialisées, scientifiques et techniques (tableau 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Ile de France 2009-2010 aux données Insee (DADS 2008) et Unedic (2009).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Ile de France 2009-2010 (n=1690)	Données INSEE 2008 (DADS)	Données UNEDIC 2009
	%	%	%
Sexe			
Hommes	58,3	53,4	55,4
Femmes	41,7	46,6	44,6
Age			
≤ 24 ans	9,3	14,1	-
25-34 ans	28,8	27,6	-
35-44 ans	29,1	25,6	-
45- 54 ans	24,9	21,4	-
55 ans et plus	8,0	11,3	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,7	0,8	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	27,1	24,5	-
Professions intermédiaires	24,6	25,1	-
Employés	29,3	30,6	-
Ouvriers	18,3	19,1	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,0	0,0%
Industrie	17,9	9,6	10,6%
Construction	2,4	5,3	6,6%
Commerce	23,1	14,3	16,8%
Services	56,6	70,8	66,0%

- : informations non disponibles

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Ile de France 2009-2010 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	11	0,7
Cadres et professions intellectuelles supérieures	458	27,1
Professions intermédiaires	416	24,6
Employés	496	29,3
Ouvriers	309	18,3
Total général	1690	100,0

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Ile de France 2009-2010 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	0	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
INDUSTRIE	293	17,3
B. Industries extractives	0	0,0
C. Industrie manufacturière	166	9,8
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	118	7,0
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	9	0,5
CONSTRUCTION	39	2,3
F. Construction	39	2,3
COMMERCE	377	22,3
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	377	22,3
SERVICES	925	54,7
H. Transports et entreposage	121	7,2
I. Hébergement et restauration	66	3,9
J. Information et communication	100	5,9
K. Activités financières et d'assurance	58	3,4
L. Activités immobilières	25	1,5
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	239	14,1
N. Activités de services administratifs et de soutien	108	6,4
O. Administration publique	59	3,5
P. Enseignement	23	1,4
Q. Santé humaine et action sociale	84	5,0
R. Arts, spectacles et activités récréatives	1	0,1
S. Autres activités de services	41	2,4
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférencierées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0	0,0
Données manquantes	56	3,3
Total général	1 690	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=986	Femmes n=704	Ensemble n=1690
≤24ans	8,4%	10,7%	9,3%
25-34ans	28,7%	28,8%	28,8%
35-44ans	30,3%	27,3%	29,1%
45-54ans	24,3%	25,6%	24,9%
≥55ans	8,2%	7,7%	8,0%
Cadres	32,3%	19,9%	27,1%
Intermédiaires	24,8%	24,3%	24,6%
Employés	14,5%	50,1%	29,3%
Ouvriers	27,5%	5,4%	18,3%
Agriculture	0,0%	0,0%	0,0%
Industrie	12,2%	22,0%	17,9%
Construction	0,6%	3,7%	2,4%
Commerce	25,8%	21,1%	23,1%
Services	61,4%	53,2%	56,6%

Conditions de travail	Hommes n=986	Femmes n=704	Ensemble n=1690
Changement de travail depuis 1an :			
Non	83,2%	80,9%	82,2%
Oui, raison médicale	1,0%	1,7%	1,3%
Oui, autre raison	15,4%	17,4%	16,2%
Oui, raison non précisée	0,4%	0,0%	0,2%
Personnes travaillant à temps plein	93,9%	78,6%	87,5%
Travail en journée normale	82,3%	88,6%	84,9%
Coupures de plus de 2 heures	8,8%	8,5%	8,6%
Horaires décalés	26,3%	15,3%	21,8%
Horaires irréguliers ou alternés	22,8%	17,7%	20,7%
Travail de nuit	11,4%	3,3%	8,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	15,9%	5,2%	11,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	54,3%	57,6%	55,7%
Parmi eux :			
➤ Perturbe le travail	57,3%	58,0%	57,6%
➤ Sans conséquence	43,2%	45,4%	44,2%
➤ Aspect positif sur le travail	39,2%	42,7%	40,7%
Dépasser ses horaires normaux	48,0%	43,2%	46,0%
Sauter le repas ou la pause	25,6%	28,9%	27,0%
Traiter trop vite une opération	26,3%	24,9%	25,7%
Travail ne permet pas d'apprendre	19,8%	21,4%	20,4%
Travail pas varié	22,7%	21,1%	22,1%
Pas de choix dans la façon de procéder	25,2%	29,7%	27,1%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	19,8%	21,7%	20,6%
Travail pas reconnu	23,5%	25,5%	24,3%
Formations et informations insuffisantes	22,9%	24,9%	23,8%
Objectifs et consignes pas clairement définis	21,4%	21,3%	21,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	39,8%	40,7%	40,2%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=986	Femmes n=704	Ensemble n=1690
Postures contraignantes :			
Non	55,6%	64,2%	59,2%
Oui, difficile ou pénible	23,5%	21,3%	22,6%
Oui, pas difficile ou pénible	19,4%	13,4%	16,9%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,5%	1,0%	1,3%
Effort, Port de charges lourdes :			
Non	60,4%	68,2%	63,7%
Oui, difficile ou pénible	19,4%	21,1%	20,1%
Oui, pas difficile ou pénible	18,3%	10,3%	15,0%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,8%	0,4%	1,3%
Gestes répétitifs :			
Non	49,6%	43,1%	46,9%
Oui, difficile ou pénible	14,7%	19,1%	16,5%
Oui, pas difficile ou pénible	33,6%	35,9%	34,5%
Oui, difficile ou pénible non précisé	2,1%	1,9%	2,0%
Importants déplacements à pieds :			
Non	61,2%	76,4%	67,6%
Oui, difficile ou pénible	12,0%	9,1%	10,8%
Oui, pas difficile ou pénible	24,8%	13,5%	20,1%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,9%	1,0%	1,5%
Station debout prolongée :			
Non	55,3%	66,3%	59,9%
Oui, difficile ou pénible	15,3%	16,0%	15,6%
Oui, pas difficile ou pénible	27,0%	16,5%	22,7%
Oui, difficile ou pénible non précisé	2,3%	1,2%	1,9%

Expositions	Hommes n=986	Femmes n=704	Ensemble n=1690
Produits chimiques	19,3%	8,8%	14,9%
Poussières, fumées	31,6%	11,6%	23,2%
Rx ionisants	1,9%	0,3%	1,2%
Vibrations	19,9%	2,1%	12,5%
Gêne sonore	38,0%	27,1%	33,4%
Bruit > 80db	18,8%	4,8%	12,9%
Contrainte visuelle	36,3%	40,1%	37,9%
Conduite routière prolongée	18,8%	2,6%	12,0%
Chaleur intense	12,5%	8,3%	10,8%
Froid intense	12,3%	6,9%	10,0%
Intempéries	15,7%	2,4%	10,2%
Pression psychologique	28,4%	26,5%	27,6%
Agent biologique	4,4%	6,2%	5,1%
Contact avec le public	56,4%	56,2%	56,3%

Formation	Hommes n=986	Femmes n=704	Ensemble n=1690
A bénéficié d'une formation depuis un an	47,2%	45,8%	46,6%
Parmi eux :			
➤ En rapport avec le travail actuel	89,6%	85,9%	88,1%
➤ En rapport avec le travail futur	18,6%	17,3%	18,1%
➤ Formation d'intérêt général	44,7%	55,0%	48,7%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	30,7%	26,6%	29,0%

Mode de vie	Hommes n=986	Femmes n=704	Ensemble n=1690
Activité sportive régulière	51,4%	38,1%	45,9%
Consommation de tabac	34,0%	31,7%	33,0%
Consommation de tabac>15 cig / jour	7,5%	5,0%	6,5%
Consommation de café	81,3%	70,0%	76,6%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	14,9%	10,7%	13,2%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	32,9%	28,7%	31,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1690
	Hommes n=665	Femmes n=470	Ensemble n=1135	Hommes n=321	Femmes n=234	Ensemble n=555	
Indice de masse corporelle							
➤ Normaux ou maigres	60,3%	73,2%	65,6%	40,8%	58,0%	48,0%	59,8%
➤ Surpoids	32,0%	17,9%	26,2%	46,2%	27,4%	38,3%	30,2%
➤ Obèses	7,7%	8,8%	8,2%	13,1%	14,6%	13,7%	10,0%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	2,1%	4,3%	3,0%	6,9%	5,7%	6,4%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	4,1%	2,9%	5,3%	5,2%	5,3%	3,7%
Gêne dans le travail	0,5%	1,3%	0,8%	1,3%	2,6%	1,8%	1,1%
Consommation médicamenteuse	1,8%	3,7%	2,6%	3,8%	4,4%	4,0%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	2,0%	3,9%	2,8%	5,4%	4,8%	5,1%	3,5%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	1,5%	2,6%	2,0%	6,9%	9,2%	7,9%	3,9%
Plaintes ou signes cliniques	1,1%	2,4%	1,6%	4,4%	7,9%	5,9%	3,0%
Gêne dans le travail	0,2%	1,1%	0,5%	1,9%	3,1%	2,4%	1,1%
Consommation médicamenteuse	0,2%	0,7%	0,4%	5,3%	4,8%	5,1%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	2,2%	1,6%	6,6%	7,0%	6,8%	3,3%
HTA							
Existence d'un problème	3,1%	1,7%	2,5%	19,7%	18,3%	19,1%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	0,9%	1,7%	12,4%	12,6%	12,5%	5,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	2,6%	1,5%	0,5%
Consommation médicamenteuse	0,9%	1,5%	1,2%	13,5%	14,3%	13,8%	5,3%
Pathologie diagnostiquée	1,6%	1,5%	1,5%	15,0%	14,8%	14,9%	5,9%
➤ Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	17,2%	27,9%	21,6%	22,9%	37,7%	29,1%	24,1%
Plaintes ou signes cliniques	16,5%	27,9%	21,2%	22,3%	37,7%	28,8%	23,7%
Gêne dans le travail	8,4%	13,0%	10,3%	12,4%	22,8%	16,8%	12,4%
Consommation médicamenteuse	0,8%	2,4%	1,4%	1,0%	7,5%	3,7%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	0,9%	4,3%	2,3%	4,1%	10,1%	6,7%	3,8%
➤ Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	15,7%	23,5%	19,0%	20,0%	33,6%	25,7%	21,2%
Plaintes ou signes cliniques	15,1%	23,4%	18,5%	19,7%	33,2%	25,4%	20,8%
Gêne dans le travail	6,6%	11,9%	8,8%	10,5%	14,5%	12,2%	9,9%
Consommation médicamenteuse	1,4%	3,2%	2,2%	4,1%	9,2%	6,3%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	5,0%	3,3%	5,7%	11,0%	7,9%	4,8%
➤ Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	11,5%	18,7%	14,5%	22,4%	36,7%	28,4%	19,1%
Plaintes ou signes cliniques	11,4%	18,3%	14,3%	22,1%	36,7%	28,3%	18,9%
Gêne dans le travail	4,4%	7,9%	5,8%	8,0%	16,4%	11,5%	7,7%
Consommation médicamenteuse	0,8%	3,3%	1,8%	3,9%	8,8%	6,0%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	1,6%	4,4%	2,7%	6,8%	11,6%	8,8%	4,7%
Troubles neuro psychiques							
(les 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	3,6%	8,9%	5,8%	7,6%	17,9%	11,9%	7,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	8,7%	5,5%	6,3%	17,9%	11,2%	7,4%
Gêne dans le travail	1,8%	3,5%	2,5%	3,8%	7,9%	5,5%	3,5%
Consommation médicamenteuse	0,2%	0,4%	0,3%	0,6%	1,8%	1,1%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	0,3%	1,3%	0,7%	2,2%	4,4%	3,1%	1,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1690
	Hommes n=665	Femmes n=470	Ensemble n=1135	Hommes n=321	Femmes n=234	Ensemble n=555	
Digestif							
Existence d'un problème	7,4%	10,2%	8,5%	8,4%	11,4%	9,7%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	10,2%	8,2%	8,1%	11,0%	9,3%	8,6%
Gêne dans le travail	1,2%	2,2%	1,6%	1,0%	4,4%	2,4%	1,9%
Consommation médicamenteuse	2,0%	3,8%	2,7%	2,9%	5,7%	4,1%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	5,8%	4,6%	5,8%	5,7%	5,8%	5,0%
Dermatologie							
Existence d'un problème	5,4%	6,1%	5,7%	4,4%	11,4%	7,4%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	5,9%	5,3%	4,4%	10,9%	7,2%	5,9%
Gêne dans le travail	0,2%	1,1%	0,5%	1,0%	2,2%	1,5%	0,8%
Consommation médicamenteuse	1,4%	2,6%	1,9%	1,9%	3,9%	2,8%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	4,0%	4,1%	4,0%	3,2%	7,0%	4,8%	4,3%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	3,2%	4,8%	3,9%	7,9%	5,8%	7,0%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,8%	4,5%	3,5%	7,3%	5,8%	6,7%	4,5%
Gêne dans le travail	0,8%	1,7%	1,2%	1,6%	3,5%	2,4%	1,6%
Consommation médicamenteuse	0,2%	0,4%	0,3%	0,3%	0,9%	0,6%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	2,2%	2,0%	4,8%	3,5%	4,3%	2,7%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur							
(l'un des 3 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	6,9%	10,8%	8,6%	15,2%	32,3%	22,4%	13,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	10,8%	8,4%	14,9%	32,3%	22,2%	12,9%
Gêne dans le travail	2,6%	8,0%	4,9%	7,3%	20,6%	12,9%	7,5%
Consommation médicamenteuse	1,4%	3,5%	2,3%	3,2%	13,5%	7,5%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	4,8%	3,5%	8,2%	20,3%	13,3%	6,7%
➤ Epaule							
Existence d'un problème	3,5%	7,8%	5,3%	11,0%	21,1%	15,2%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	7,8%	5,3%	10,7%	21,1%	15,0%	8,5%
Gêne dans le travail	0,9%	5,2%	2,7%	5,0%	13,2%	8,4%	4,6%
Consommation médicamenteuse	0,2%	2,6%	1,2%	2,8%	8,8%	5,3%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	0,6%	3,0%	1,6%	6,6%	13,2%	9,4%	4,2%
➤ Coude							
Existence d'un problème	2,3%	2,4%	2,3%	3,1%	7,5%	4,9%	3,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	2,4%	2,2%	3,1%	7,5%	4,9%	3,1%
Gêne dans le travail	0,9%	1,9%	1,3%	1,6%	4,8%	2,9%	1,9%
Consommation médicamenteuse	0,9%	1,1%	1,0%	0,6%	5,3%	2,6%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	1,7%	1,6%	1,6%	5,7%	3,3%	2,2%
➤ Poignet							
Existence d'un problème	2,0%	5,2%	3,3%	3,5%	17,1%	9,2%	5,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	5,0%	3,1%	3,5%	17,1%	9,2%	5,1%
Gêne dans le travail	1,1%	3,9%	2,2%	2,2%	11,8%	6,2%	3,6%
Consommation médicamenteuse	0,5%	1,7%	1,0%	0,6%	7,5%	3,5%	1,8%
Pathologie diagnostiquée	0,6%	2,8%	1,5%	0,9%	9,7%	4,6%	2,5%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=1690
	Hommes n=665	Femmes n=470	Ensemble n=1135	Hommes n=321	Femmes n=234	Ensemble n=555	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	6,9%	8,9%	7,7%	8,9%	17,4%	12,5%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	8,7%	7,6%	8,6%	17,4%	12,3%	9,2%
Gêne dans le travail	2,3%	3,5%	2,8%	3,5%	10,4%	6,4%	4,0%
Consommation médicamenteuse	1,5%	3,1%	2,2%	2,5%	9,1%	5,3%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	5,2%	4,1%	5,1%	13,5%	8,6%	5,6%
Troubles ostéoarticulaires du rachis							
(l'un des 2 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	20,7%	26,1%	22,9%	24,9%	40,4%	31,4%	25,7%
Plaintes ou signes cliniques	20,4%	25,7%	22,6%	24,3%	39,9%	30,9%	25,3%
Gêne dans le travail	10,7%	14,4%	12,3%	13,4%	23,9%	17,8%	14,1%
Consommation médicamenteuse	5,1%	7,9%	6,3%	7,4%	19,0%	12,3%	8,2%
Pathologie diagnostiquée	8,1%	10,5%	9,1%	14,1%	24,6%	18,4%	12,2%
➤ Vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	5,8%	13,6%	9,1%	9,5%	24,1%	15,6%	11,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	13,6%	9,1%	9,2%	23,7%	15,3%	11,1%
Gêne dans le travail	2,4%	8,2%	4,8%	4,7%	11,8%	7,7%	5,8%
Consommation médicamenteuse	1,7%	3,2%	2,3%	3,2%	12,3%	7,0%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	5,6%	3,2%	4,7%	13,7%	8,5%	5,0%
➤ Vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	16,4%	18,5%	17,3%	19,7%	32,5%	25,0%	19,8%
Plaintes ou signes cliniques	16,1%	18,0%	16,9%	19,4%	32,5%	24,9%	19,6%
Gêne dans le travail	8,5%	9,3%	8,9%	10,2%	21,1%	14,7%	10,8%
Consommation médicamenteuse	3,7%	5,4%	4,4%	6,3%	15,4%	10,1%	6,3%
Pathologie diagnostiquée	6,7%	7,4%	7,0%	11,4%	20,4%	15,2%	9,7%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=263	Intermédiaires n=566	Employés n=892	Ouvriers n=1014	Région n=2752
Répartition homme/femme	69,4%/30,6%	58,9%/41,1%	28,8%/71,2%	87,7%/12,3%	58,3%/41,7%
≤24ans	3,5%	6,3%	15,9%	12,0%	9,3%
25-34ans	30,6%	30,8%	26,6%	27,2%	28,8%
35-44ans	33,2%	27,2%	25,6%	31,1%	29,1%
45-54ans	24,2%	27,2%	23,8%	23,6%	24,9%
≥55ans	8,5%	8,7%	8,1%	6,1%	8,0%
Agriculture	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Industrie	22,1%	23,4%	5,6%	23,9%	17,9%
Construction	1,9%	3,2%	0,6%	4,9%	2,4%
Commerce	16,6%	18,4%	34,2%	20,3%	23,1%
Services	59,4%	55,0%	59,7%	51,0%	56,6%

Conditions de travail	Cadres n=458	Intermédiaires n=416	Employés n=496	Ouvriers n=309	Région n=1690
Changement de travail depuis 1an :					
Non	77,9%	81,3%	85,1%	85,3%	82,2%
Oui, raison médicale	0,9%	1,2%	1,0%	2,6%	1,3%
Oui, autre raison	21,2%	17,3%	13,8%	11,1%	16,2%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,2%	0,0%	1,0%	0,2%
Personnes travaillant à temps plein	93,6%	90,6%	76,8%	91,1%	87,5%
Travail en journée normale	95,1%	85,6%	83,3%	71,0%	84,9%
Coupures de plus de 2 heures	5,9%	6,7%	12,8%	8,7%	8,6%
Horaires décalés	15,2%	20,8%	21,0%	33,8%	21,8%
Horaires irréguliers ou alternés	11,2%	20,0%	23,7%	31,1%	20,7%
Travail de nuit	1,6%	8,1%	9,2%	16,1%	8,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	24,6%	10,0%	2,7%	7,6%	11,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	69,5%	61,2%	47,4%	40,4%	55,7%
Parmi eux :					
➤ Perturbe le travail	57,7%	59,7%	55,9%	58,8%	57,6%
➤ Sans conséquence	43,2%	43,0%	48,0%	40,7%	44,2%
➤ Aspect positif sur le travail	41,7%	37,2%	38,9%	45,2%	40,7%
Dépasser ses horaires normaux	71,7%	47,6%	28,9%	32,1%	46,0%
Sauter le repas ou la pause	32,7%	27,3%	22,0%	25,2%	27,0%
Traiter trop vite une opération	33,3%	26,5%	19,8%	22,2%	25,7%
Travail ne permet pas d'apprendre	7,0%	14,2%	31,4%	31,7%	20,4%
Travail pas varié	10,7%	14,9%	31,2%	34,3%	22,1%
Pas de choix dans la façon de procéder	14,0%	24,0%	36,1%	37,1%	27,1%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	18,2%	15,0%	24,9%	25,3%	20,6%
Travail pas reconnu	17,4%	24,4%	28,9%	27,7%	24,3%
Formations et informations insuffisantes	22,3%	25,2%	24,6%	23,1%	23,8%
Objectifs et consignes pas clairement définis	24,6%	22,8%	18,6%	19,5%	21,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	50,0%	40,1%	34,1%	36,1%	40,2%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=458	Intermédiaires n=416	Employés n=496	Ouvriers n=309	Région n=1690
Postures contraignantes :					
Non	82,1%	60,2%	54,5%	30,3%	59,2%
Oui, difficile ou pénible	7,9%	18,1%	26,2%	45,3%	22,6%
Oui, pas difficile ou pénible	9,4%	20,2%	17,5%	23,1%	16,9%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,7%	1,4%	1,8%	1,3%	1,3%
Effort, Port de charges lourdes :					
Non	90,6%	64,5%	57,7%	31,2%	63,7%
Oui, difficile ou pénible	3,5%	17,6%	25,0%	40,9%	20,1%
Oui, pas difficile ou pénible	5,7%	16,6%	15,7%	25,6%	15,0%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,2%	1,2%	1,6%	2,3%	1,3%
Gestes répétitifs :					
Non	73,8%	53,3%	32,5%	20,7%	46,9%
Oui, difficile ou pénible	3,5%	12,8%	22,1%	32,5%	16,5%
Oui, pas difficile ou pénible	21,8%	32,0%	42,2%	44,9%	34,5%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,9%	1,9%	3,2%	2,0%	2,0%
Importants déplacements à pieds :					
Non	85,6%	66,1%	68,8%	40,2%	67,6%
Oui, difficile ou pénible	1,8%	9,7%	11,8%	24,5%	10,8%
Oui, pas difficile ou pénible	12,3%	22,5%	17,6%	32,7%	20,1%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,4%	1,7%	1,8%	2,6%	1,5%
Station debout prolongée :					
Non	84,8%	62,4%	53,8%	29,0%	59,9%
Oui, difficile ou pénible	4,0%	12,3%	20,4%	30,0%	15,6%
Oui, pas difficile ou pénible	10,4%	24,1%	23,5%	37,5%	22,7%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,9%	1,2%	2,2%	3,6%	1,9%

Expositions	Cadres n=458	Intermédiaires n=416	Employés n=496	Ouvriers n=309	Région n=1690
Produits chimiques	4,1%	16,3%	11,3%	35,5%	14,9%
Poussières, fumées	7,3%	22,3%	15,8%	60,7%	23,2%
Rx ionisants	1,5%	1,7%	0,4%	1,3%	1,2%
Vibrations	2,2%	10,6%	2,2%	47,4%	12,5%
Gêne sonore	21,0%	33,5%	26,7%	63,4%	33,4%
Bruit > 80db	3,5%	15,4%	5,5%	36,1%	12,9%
Contrainte visuelle	43,1%	37,6%	34,0%	37,4%	37,9%
Conduite routière prolongée	11,2%	15,7%	2,4%	22,8%	12,0%
Chaleur intense	2,9%	10,4%	11,0%	23,0%	10,8%
Froid intense	2,2%	8,0%	9,8%	25,2%	10,0%
Intempéries	2,9%	11,8%	5,5%	26,9%	10,2%
Pression psychologique	31,9%	28,7%	23,8%	26,3%	27,6%
Agent biologique	1,1%	7,1%	7,0%	5,4%	5,1%
Contact avec le public	43,0%	62,3%	66,9%	50,0%	56,3%

Formation	Cadres n=458	Intermédiaires n=416	Employés n=496	Ouvriers n=309	Région n=1690
A bénéficié d'une formation depuis un an	51,8%	53,6%	42,6%	36,3%	46,6%
Parmi eux :					
➤ En rapport avec le travail actuel	89,6%	92,3%	83,4%	85,3%	88,1%
➤ En rapport avec le travail futur	24,3%	13,3%	15,5%	18,0%	18,1%
➤ Formation d'intérêt général	51,6%	47,2%	50,8%	42,6%	48,7%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	41,0%	29,3%	20,7%	22,8%	29,0%

Mode de vie	Cadres n=458	Intermédiaires n=416	Employés n=496	Ouvriers n=309	Région n=1690
Activité sportive régulière	53,9%	46,8%	37,6%	45,4%	45,9%
Consommation de tabac	25,4%	35,1%	33,7%	41,2%	33,0%
Consommation de tabac>15 cig / jour	2,9%	7,8%	6,3%	10,2%	6,5%
Consommation de café	83,8%	76,4%	67,4%	81,2%	76,6%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	13,5%	12,4%	9,7%	19,1%	13,2%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	35,7%	34,5%	26,9%	26,5%	31,1%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=308	≥45ans n=150	Ens. n=458	<45ans n=267	≥45ans n=149	Ens. n=416	<45ans n=338	≥45ans n=158	Ens. n=496	<45ans n=217	≥45ans n=92*	Ens. n=309	<45ans n=1135	≥45ans n=555	Ens. n=1690
Indice de masse corporelle															
➤ Normaux ou maigres	69,0%	49,0%	62,5%	66,2%	51,7%	61,0%	66,0%	46,5%	59,7%	60,5%	43,8%	55,5%	65,6%	48,0%	59,8%
➤ Surpoids	25,7%	41,4%	30,8%	26,6%	34,5%	29,4%	23,1%	37,4%	27,8%	30,0%	39,3%	32,8%	26,2%	38,3%	30,2%
➤ Obèses	5,3%	9,7%	6,7%	7,2%	13,8%	9,6%	10,8%	16,1%	12,5%	9,5%	16,9%	11,7%	8,2%	13,7%	10,0%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	3,6%	3,4%	3,5%	1,5%	7,6%	3,7%	4,5%	7,0%	5,3%	1,4%	8,8%	3,6%	3,0%	6,4%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	2,7%	3,3%	1,5%	6,2%	3,2%	4,2%	5,7%	4,7%	1,4%	7,7%	3,3%	2,9%	5,3%	3,7%
Gêne dans le travail	1,0%	0,7%	0,9%	0,0%	2,1%	0,7%	1,8%	1,9%	1,8%	0,0%	3,3%	1,0%	0,8%	1,8%	1,1%
Consommation médic.	3,3%	1,4%	2,6%	1,5%	4,8%	2,7%	3,6%	4,5%	3,9%	0,9%	6,6%	2,6%	2,6%	4,0%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	3,6%	1,4%	2,9%	1,5%	6,9%	3,4%	3,9%	5,1%	4,3%	1,4%	8,8%	3,6%	2,8%	5,1%	3,5%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	1,3%	6,1%	2,9%	1,5%	6,8%	3,4%	3,9%	11,0%	6,2%	0,5%	7,7%	2,7%	2,0%	7,9%	3,9%
Plaintes ou signes cliniques	0,7%	4,7%	2,0%	1,5%	5,5%	2,9%	3,3%	7,2%	4,6%	0,5%	6,6%	2,3%	1,6%	5,9%	3,0%
Gêne dans le travail	0,0%	2,0%	0,7%	0,8%	1,4%	1,0%	1,2%	3,9%	2,1%	0,0%	2,2%	0,7%	0,5%	2,4%	1,1%
Consommation médic.	0,0%	4,1%	1,3%	0,0%	4,1%	1,5%	0,9%	6,5%	2,7%	0,5%	6,6%	2,3%	0,4%	5,1%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	1,0%	4,7%	2,2%	1,5%	6,2%	3,2%	3,0%	9,7%	5,2%	0,5%	6,6%	2,3%	1,6%	6,8%	3,3%
HTA															
Existence d'un problème	3,0%	14,2%	6,7%	1,9%	17,8%	7,6%	3,1%	23,2%	9,6%	1,9%	23,3%	8,4%	2,5%	19,1%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	8,8%	4,4%	0,8%	10,3%	4,2%	2,1%	16,8%	6,9%	1,4%	15,6%	5,7%	1,7%	12,5%	5,3%
Gêne dans le travail	0,0%	1,4%	0,4%	0,0%	1,4%	0,5%	0,0%	1,3%	0,4%	0,0%	2,2%	0,7%	0,0%	1,5%	0,5%
Consommation médic.	0,3%	8,9%	3,1%	1,5%	12,3%	5,4%	1,8%	18,2%	7,1%	1,0%	17,8%	6,0%	1,2%	13,8%	5,3%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	9,5%	4,2%	1,5%	14,4%	6,1%	1,8%	19,4%	7,5%	1,0%	17,8%	6,1%	1,5%	14,9%	5,9%
➤ Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	16,1%	27,9%	20,0%	22,3%	29,2%	24,7%	25,1%	32,3%	27,4%	23,5%	25,3%	24,0%	21,6%	29,1%	24,1%
Plaintes ou signes cliniques	15,8%	27,4%	19,6%	22,3%	28,5%	24,4%	24,8%	32,3%	27,2%	22,3%	25,3%	23,2%	21,2%	28,8%	23,7%
Gêne dans le travail	7,9%	17,1%	10,9%	9,8%	16,0%	12,0%	12,4%	18,7%	14,4%	11,0%	13,2%	11,6%	10,3%	16,8%	12,4%
Consommation médic.	2,0%	2,7%	2,2%	1,1%	3,5%	2,0%	1,5%	6,5%	3,1%	0,9%	1,1%	1,0%	1,4%	3,7%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	3,0%	6,2%	4,0%	3,0%	5,6%	3,9%	2,4%	11,0%	5,2%	0,5%	2,2%	1,0%	2,3%	6,7%	3,8%
➤ Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	19,3%	25,9%	21,4%	16,2%	25,5%	19,5%	21,7%	29,3%	24,1%	17,6%	18,0%	17,7%	19,0%	25,7%	21,2%
Plaintes ou signes cliniques	19,3%	25,9%	21,4%	15,8%	24,8%	19,0%	21,4%	28,7%	23,7%	16,3%	18,0%	16,8%	18,5%	25,4%	20,8%
Gêne dans le travail	9,5%	15,6%	11,5%	6,8%	12,4%	8,8%	10,8%	10,9%	10,9%	6,7%	8,0%	7,0%	8,8%	12,2%	9,9%
Consommation médic.	1,6%	4,1%	2,4%	2,3%	4,1%	2,9%	3,0%	12,1%	5,9%	1,4%	3,4%	2,0%	2,2%	6,3%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	5,4%	4,4%	3,0%	6,9%	4,4%	3,9%	14,1%	7,2%	2,0%	3,4%	2,4%	3,3%	7,9%	4,8%
➤ Trouble du sommeil															
Existence d'un problème	11,0%	28,1%	16,6%	17,2%	26,6%	20,5%	16,5%	32,7%	21,7%	12,6%	25,3%	16,3%	14,5%	28,4%	19,1%
Plaintes ou signes cliniques	10,6%	27,4%	16,1%	17,2%	26,6%	20,5%	16,2%	32,7%	21,5%	12,1%	25,3%	16,0%	14,3%	28,3%	18,9%
Gêne dans le travail	5,0%	10,3%	6,7%	6,1%	10,5%	7,7%	6,1%	14,7%	8,9%	5,8%	10,3%	7,2%	5,8%	11,5%	7,7%
Consommation médic.	2,0%	3,4%	2,5%	1,2%	4,9%	2,5%	2,4%	10,9%	5,2%	1,4%	3,5%	2,0%	1,8%	6,0%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,0%	8,9%	4,9%	3,4%	8,5%	5,2%	3,4%	12,2%	6,2%	0,5%	3,5%	1,4%	2,7%	8,8%	4,7%
Troubles neuro psychiques															
(les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	3,6%	12,2%	6,4%	6,4%	10,4%	7,8%	7,3%	15,9%	10,1%	5,6%	7,8%	6,3%	5,8%	11,9%	7,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	10,9%	6,0%	6,4%	9,7%	7,6%	7,3%	15,3%	9,9%	4,2%	7,8%	5,3%	5,5%	11,2%	7,4%
Gêne dans le travail	2,6%	6,1%	3,7%	2,3%	4,8%	3,2%	3,0%	7,0%	4,3%	1,4%	3,3%	2,0%	2,5%	5,5%	3,5%
Consommation médic.	0,3%	1,4%	0,7%	0,0%	0,7%	0,2%	0,3%	1,9%	0,8%	0,5%	0,0%	0,3%	0,3%	1,1%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	1,0%	2,7%	1,5%	1,1%	2,1%	1,5%	0,3%	5,7%	2,0%	0,5%	1,1%	0,7%	0,7%	3,1%	1,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=308	≥45ans n=150	Ens. n=458	<45ans n=267	≥45ans n=149	Ens. n=416	<45ans n=338	≥45ans n=158	Ens. n=496	<45ans n=217	≥45ans n=92*	Ens. n=309	<45ans n=1135	≥45ans n=555	Ens. n=1690
Digestif															
Existence d'un problème	8,1%	12,2%	9,5%	7,6%	7,9%	7,7%	10,7%	9,7%	10,4%	7,1%	7,7%	7,3%	8,5%	9,7%	8,9%
Plaintes, signes cliniques	8,1%	11,0%	9,1%	7,6%	7,9%	7,7%	10,1%	9,7%	10,0%	6,2%	7,7%	6,6%	8,2%	9,3%	8,6%
Gêne dans le travail	3,1%	4,1%	3,4%	0,4%	0,7%	0,5%	1,8%	2,6%	2,1%	0,9%	2,2%	1,3%	1,6%	2,4%	1,9%
Consommation médic.	2,4%	4,1%	2,9%	1,1%	3,6%	2,0%	4,0%	4,5%	4,2%	3,3%	4,4%	3,6%	2,7%	4,1%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	7,5%	4,3%	4,6%	6,5%	5,2%	7,0%	5,2%	6,4%	3,8%	3,3%	3,6%	4,6%	5,8%	5,0%
Dermatologie															
Existence d'un problème	5,6%	7,4%	6,2%	4,9%	5,5%	5,1%	7,3%	11,6%	8,7%	3,8%	3,3%	3,7%	5,7%	7,4%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	7,4%	6,2%	4,9%	5,5%	5,1%	6,7%	11,0%	8,0%	2,8%	3,3%	3,0%	5,3%	7,2%	5,9%
Gêne dans le travail	0,3%	1,4%	0,7%	0,4%	0,7%	0,5%	0,9%	1,9%	1,2%	0,5%	2,2%	1,0%	0,5%	1,5%	0,8%
Consommation médic.	1,3%	2,0%	1,6%	1,5%	2,1%	1,7%	2,4%	5,2%	3,3%	1,9%	1,1%	1,7%	1,9%	2,8%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	4,3%	4,7%	4,4%	3,8%	4,1%	3,9%	5,2%	7,1%	5,8%	2,4%	2,2%	2,3%	4,0%	4,8%	4,3%
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	2,7%	3,4%	2,9%	3,0%	7,0%	4,4%	5,1%	7,7%	6,0%	4,7%	12,2%	7,0%	3,9%	7,0%	4,9%
Plaintes, signes cliniques	2,7%	3,4%	2,9%	2,6%	6,3%	3,9%	5,1%	7,1%	5,8%	3,3%	12,2%	6,0%	3,5%	6,7%	4,5%
Gêne dans le travail	1,3%	1,4%	1,3%	0,8%	2,1%	1,2%	1,5%	3,9%	2,3%	0,9%	2,2%	1,3%	1,2%	2,4%	1,6%
Consommation médic.	0,0%	0,7%	0,2%	0,4%	0,7%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,6%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	2,0%	1,6%	1,5%	2,8%	2,0%	2,4%	5,8%	3,5%	2,8%	7,8%	4,3%	2,0%	4,3%	2,7%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	5,3%	19,6%	10,0%	8,7%	14,6%	10,8%	9,1%	33,3%	16,8%	11,8%	20,9%	14,6%	8,6%	22,4%	13,1%
Plaintes, signes cliniques	5,3%	19,6%	10,0%	8,4%	13,9%	10,3%	9,1%	33,3%	16,8%	11,4%	20,9%	14,2%	8,4%	22,2%	12,9%
Gêne dans le travail	2,3%	6,1%	3,6%	3,4%	8,3%	5,2%	7,9%	21,8%	12,3%	5,7%	15,4%	8,6%	4,9%	12,9%	7,5%
Consommation médic.	1,3%	5,4%	2,7%	1,1%	3,5%	2,0%	3,6%	16,0%	7,6%	2,9%	3,3%	3,0%	2,3%	7,5%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	11,5%	5,6%	3,1%	8,3%	4,9%	4,2%	20,8%	9,5%	4,3%	12,1%	6,7%	3,5%	13,3%	6,7%
➤ Epaule															
Existence d'un problème	2,6%	13,5%	6,2%	6,4%	9,7%	7,6%	6,3%	21,9%	11,3%	6,1%	15,4%	8,9%	5,3%	15,2%	8,5%
Plaintes, signes cliniques	2,6%	13,5%	6,2%	6,4%	9,0%	7,3%	6,3%	21,9%	11,3%	6,1%	15,4%	8,9%	5,3%	15,0%	8,5%
Gêne dans le travail	0,3%	2,7%	1,1%	2,6%	6,9%	4,1%	5,1%	14,2%	8,0%	2,4%	9,9%	4,6%	2,7%	8,4%	4,6%
Consommation médic.	0,7%	2,7%	1,3%	0,8%	3,4%	1,7%	2,7%	11,0%	5,3%	0,0%	3,3%	1,0%	1,2%	5,3%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	8,8%	3,8%	1,9%	6,2%	3,4%	2,4%	12,9%	5,7%	0,5%	9,9%	3,3%	1,6%	9,4%	4,2%
➤ Coude															
Existence d'un problème	1,6%	1,4%	1,5%	2,3%	3,4%	2,7%	2,1%	9,7%	4,5%	3,3%	5,5%	4,0%	2,3%	4,9%	3,2%
Plaintes, signes cliniques	1,6%	1,4%	1,5%	1,9%	3,4%	2,4%	2,1%	9,7%	4,5%	3,3%	5,5%	4,0%	2,2%	4,9%	3,1%
Gêne dans le travail	0,7%	0,7%	0,7%	1,1%	1,4%	1,2%	1,8%	6,5%	3,3%	1,9%	3,3%	2,3%	1,3%	2,9%	1,9%
Consommation médic.	1,0%	1,4%	1,1%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	6,5%	2,5%	1,9%	1,1%	1,7%	1,0%	2,6%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	1,0%	1,4%	1,1%	1,9%	1,4%	1,7%	1,5%	7,7%	3,5%	2,4%	2,2%	2,3%	1,6%	3,3%	2,2%
➤ Poignet															
Existence d'un problème	2,3%	7,5%	4,0%	3,0%	2,8%	2,9%	4,2%	16,7%	8,2%	3,8%	9,9%	5,6%	3,3%	9,2%	5,2%
Plaintes, signes cliniques	2,0%	7,5%	3,8%	2,7%	2,8%	2,7%	4,2%	16,7%	8,2%	3,3%	9,9%	5,3%	3,1%	9,2%	5,1%
Gêne dans le travail	1,7%	4,1%	2,4%	0,8%	1,4%	1,0%	4,2%	11,5%	6,6%	1,9%	8,8%	4,0%	2,2%	6,2%	3,6%
Consommation médic.	1,0%	3,4%	1,8%	0,8%	0,0%	0,5%	0,9%	7,7%	3,1%	1,4%	2,2%	1,7%	1,0%	3,5%	1,8%
Pathologie diagnostiquée	1,6%	3,4%	2,2%	1,1%	1,4%	1,2%	1,5%	9,7%	4,1%	1,9%	3,3%	2,3%	1,5%	4,6%	2,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=308	≥45ans n=150	Ens. n=458	<45ans n=267	≥45ans n=149	Ens. n=416	<45ans n=338	≥45ans n=158	Ens. n=496	<45ans n=217	≥45ans n=92*	Ens. n=309	<45ans n=1135	≥45ans n=555	Ens. n=1690
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	5,6%	10,1%	7,1%	4,9%	6,3%	5,4%	9,6%	21,2%	13,3%	11,3%	11,0%	11,2%	7,7%	12,5%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	10,1%	7,1%	4,9%	6,3%	5,4%	9,4%	21,2%	13,1%	11,3%	10,0%	10,9%	7,6%	12,3%	9,2%
Gêne dans le travail	0,7%	4,1%	1,8%	2,3%	2,8%	2,5%	3,0%	12,8%	6,1%	6,1%	5,5%	5,9%	2,8%	6,4%	4,0%
Consommation médic.	0,7%	4,1%	1,8%	2,3%	2,8%	2,5%	2,7%	10,3%	5,1%	3,3%	2,2%	3,0%	2,2%	5,3%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,6%	7,4%	4,9%	3,0%	4,2%	3,4%	5,1%	15,4%	8,4%	4,7%	5,5%	5,0%	4,1%	8,6%	5,6%
Troubles ostéoarticulaires du rachis															
(l'un des 2 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	18,3%	26,5%	21,0%	19,9%	28,3%	22,9%	25,4%	37,7%	29,3%	29,2%	35,2%	31,0%	22,9%	31,4%	25,7%
Plaintes ou signes cliniques	17,7%	25,9%	20,4%	19,9%	28,3%	22,9%	25,1%	36,4%	28,7%	28,8%	35,2%	30,8%	22,6%	30,9%	25,3%
Gêne dans le travail	6,0%	13,7%	8,5%	9,6%	15,9%	11,9%	13,5%	22,2%	16,3%	22,5%	20,9%	22,0%	12,3%	17,8%	14,1%
Consommation médic.	3,7%	8,2%	5,1%	3,1%	11,7%	6,2%	8,6%	19,0%	11,9%	10,1%	8,9%	9,7%	6,3%	12,3%	8,2%
Pathologie diagnostiquée	6,6%	15,1%	9,4%	8,5%	16,6%	11,4%	8,6%	23,8%	13,5%	14,4%	18,7%	15,7%	9,1%	18,4%	12,2%
➤ Vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	7,2%	16,4%	10,2%	10,2%	12,3%	11,0%	10,3%	22,4%	14,2%	8,0%	8,8%	8,3%	9,1%	15,6%	11,2%
Plaintes ou signes cliniques	7,2%	16,4%	10,2%	10,2%	12,3%	11,0%	10,3%	21,2%	13,8%	8,0%	8,8%	8,3%	9,1%	15,3%	11,1%
Gêne dans le travail	2,6%	10,3%	5,1%	5,3%	5,5%	5,4%	5,7%	9,6%	7,0%	5,7%	4,4%	5,3%	4,8%	7,7%	5,8%
Consommation médic.	1,3%	6,2%	2,9%	1,1%	4,8%	2,4%	3,6%	12,2%	6,4%	3,3%	3,3%	3,3%	2,3%	7,0%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	1,6%	7,5%	3,6%	4,5%	6,2%	5,1%	4,0%	14,8%	7,4%	2,8%	3,3%	3,0%	3,2%	8,5%	5,0%
➤ Vertèbres dorsolumbaires															
Existence d'un problème	13,2%	18,9%	15,1%	13,4%	20,7%	16,0%	19,9%	32,5%	23,9%	23,9%	30,8%	26,0%	17,3%	25,0%	19,8%
Plaintes ou signes cliniques	12,6%	18,2%	14,4%	13,4%	20,7%	16,0%	19,6%	32,5%	23,7%	23,6%	30,8%	25,8%	16,9%	24,9%	19,6%
Gêne dans le travail	3,6%	8,1%	5,1%	5,7%	13,1%	8,4%	10,7%	20,8%	13,9%	17,7%	18,7%	18,0%	8,9%	14,7%	10,8%
Consommation médic.	2,3%	6,1%	3,5%	2,3%	9,0%	4,7%	5,8%	16,2%	9,1%	7,7%	8,8%	8,0%	4,4%	10,1%	6,3%
Pathologie diagnostiquée	5,6%	10,8%	7,3%	6,1%	13,8%	8,9%	5,8%	19,7%	10,2%	12,0%	17,6%	13,7%	7,0%	15,2%	9,7%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles n=377	Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=239	Région n=1690
Répartition homme/femme	53,6%/46,4%	64,0%/36,0%	58,3%/41,7%
≤24ans	15,6%	8,8%	9,3%
25-34ans	25,2%	37,2%	28,8%
35-44ans	28,1%	28,0%	29,1%
45-54ans	24,1%	18,4%	24,9%
≥55ans	6,9%	7,5%	8,0%
Cadres	18,8%	61,9%	27,1%
Intermédiaires	19,6%	23,4%	24,6%
Employés	44,0%	10,0%	29,3%
Ouvriers	16,4%	4,6%	18,3%

Conditions de travail	Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles n=377	Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=239	Région n=1690
Changement de travail depuis 1an :			
Non	83,7%	83,3%	82,2%
Oui, raison médicale	1,1%	0,0%	1,3%
Oui, autre raison	15,2%	16,7%	16,2%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,0%	0,2%
Personnes travaillant à temps plein	85,4%	93,7%	87,5%
Travail en journée normale	86,7%	95,7%	84,9%
Coupures de plus de 2 heures	8,8%	4,9%	8,6%
Horaires décalés	23,7%	8,6%	21,8%
Horaires irréguliers ou alternés	24,6%	5,4%	20,7%
Travail de nuit	6,6%	0,9%	8,1%
Déplacements professionnels de plus de 24h	14,5%	15,0%	11,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	59,8%	66,4%	55,7%
Parmi eux :			
➤ Perturbe le travail	58,4%	51,0%	57,6%
➤ Sans conséquence	43,0%	49,7%	44,2%
➤ Aspect positif sur le travail	40,3%	42,7%	40,7%
Dépasser ses horaires normaux	46,4%	59,7%	46,0%
Sauter le repas ou la pause	24,1%	24,3%	27,0%
Traiter trop vite une opération	25,1%	25,6%	25,7%
Travail ne permet pas d'apprendre	26,1%	10,9%	20,4%
Travail pas varié	23,2%	18,8%	22,1%
Pas de choix dans la façon de procéder	29,1%	19,4%	27,1%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	22,9%	17,2%	20,6%
Travail pas reconnu	26,8%	20,9%	24,3%
Formations et informations insuffisantes	24,7%	28,9%	23,8%
Objectifs et consignes pas clairement définis	21,5%	26,6%	21,4%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	38,7%	46,2%	40,2%

Charge physique du poste de travail	Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles n=377	Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=239	Région n=1690
Postures contraignantes :			
Non	53,2%	79,1%	59,2%
Oui, difficile ou pénible	27,3%	8,8%	22,6%
Oui, pas difficile ou pénible	19,5%	10,5%	16,9%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,0%	1,7%	1,3%
Effort, Port de charges lourdes :			
Non	50,4%	88,2%	63,7%
Oui, difficile ou pénible	27,2%	4,2%	20,1%
Oui, pas difficile ou pénible	22,1%	6,7%	15,0%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,3%	0,8%	1,3%
Gestes répétitifs :			
Non	39,4%	72,0%	46,9%
Oui, difficile ou pénible	21,5%	5,0%	16,5%
Oui, pas difficile ou pénible	38,6%	21,8%	34,5%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,5%	1,3%	2,0%
Importants déplacements à pieds :			
Non	65,0%	82,8%	67,6%
Oui, difficile ou pénible	11,9%	2,5%	10,8%
Oui, pas difficile ou pénible	22,0%	14,3%	20,1%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,1%	0,4%	1,5%
Station debout prolongée :			
Non	48,3%	85,7%	59,9%
Oui, difficile ou pénible	21,0%	2,5%	15,6%
Oui, pas difficile ou pénible	29,2%	10,5%	22,7%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,6%	1,3%	1,9%

Expositions	Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles n=377	Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=239	Région n=1690
Produits chimiques	13,5%	7,5%	14,9%
Poussières, fumées	29,7%	11,1%	23,2%
Rx ionisants	0,5%	3,4%	1,2%
Vibrations	11,2%	4,6%	12,5%
Gêne sonore	35,7%	22,5%	33,4%
Bruit > 80db	15,3%	5,1%	12,9%
Contrainte visuelle	29,6%	49,2%	37,9%
Conduite routière prolongée	12,3%	6,8%	12,0%
Chaleur intense	11,2%	6,0%	10,8%
Froid intense	16,5%	3,0%	10,0%
Intempéries	7,5%	3,8%	10,2%
Pression psychologique	22,3%	34,7%	27,6%
Agent biologique	4,3%	0,4%	5,1%
Contact avec le public	69,2%	48,1%	56,3%

Formation	Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles n=377	Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=239	Région n=1690
A bénéficié d'une formation depuis un an	50,4%	47,7%	46,6%
Parmi eux :			
➤ En rapport avec le travail actuel	82,3%	88,3%	88,1%
➤ En rapport avec le travail futur	14,4%	24,5%	18,1%
➤ Formation d'intérêt général	47,3%	43,9%	48,7%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	29,5%	30,7%	29,0%

Mode de vie	Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles n=377	Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=239	Région n=1690
Activité sportive régulière	43,8%	53,6%	45,9%
Consommation de tabac	33,5%	33,2%	33,0%
Consommation de tabac>15 cig / jour	8,6%	2,5%	6,5%
Consommation de café	74,3%	80,4%	76,6%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	14,4%	9,4%	13,2%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	28,1%	38,7%	31,1%

Etat de santé	Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Activités spécialisées, scientifiques et techniques			Région		
	<45ans n=260	≥45ans n=117	Ens. n=377	<45ans n=177	≥45ans n=62*	Ens. n=239	<45ans n=1135	≥45ans n=555	Ens. n=1690
Indice de masse corporelle									
➤ Normaux ou maigres	65,6%	50,4%	61,0%	70,2%	49,2%	64,7%	65,6%	48,0%	59,8%
➤ Surpoids	27,0%	39,8%	30,9%	23,4%	41,0%	28,0%	26,2%	38,3%	30,2%
➤ Obèses	7,4%	9,7%	8,1%	6,4%	9,8%	7,3%	8,2%	13,7%	10,0%
Appareil respiratoire									
Existence d'un problème	1,9%	6,1%	3,2%	2,3%	1,6%	2,1%	3,0%	6,4%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	4,3%	2,7%	2,3%	1,6%	2,1%	2,9%	5,3%	3,7%
Gêne dans le travail	1,2%	0,9%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	1,8%	1,1%
Consommation médic.	1,9%	4,3%	2,7%	1,7%	0,0%	1,3%	2,6%	4,0%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	1,9%	5,2%	2,9%	1,7%	0,0%	1,3%	2,8%	5,1%	3,5%
Appareil cardio vasculaire									
Existence d'un problème	0,4%	3,5%	1,4%	2,3%	9,7%	4,2%	2,0%	7,9%	3,9%
Plaintes ou signes cliniques	0,4%	1,8%	0,8%	1,7%	8,1%	3,4%	1,6%	5,9%	3,0%
Gêne dans le travail	0,0%	1,8%	0,5%	0,6%	3,2%	1,3%	0,5%	2,4%	1,1%
Consommation médic.	0,0%	3,5%	1,1%	0,0%	4,8%	1,3%	0,4%	5,1%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	0,4%	3,5%	1,4%	2,3%	8,1%	3,8%	1,6%	6,8%	3,3%
HTA									
Existence d'un problème	1,6%	13,0%	5,1%	1,7%	9,7%	3,8%	2,5%	19,1%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,2%	7,8%	3,2%	1,1%	6,5%	2,5%	1,7%	12,5%	5,3%
Gêne dans le travail	0,0%	0,9%	0,3%	0,0%	1,6%	0,4%	0,0%	1,5%	0,5%
Consommation médic.	1,2%	9,6%	3,8%	0,0%	3,2%	0,8%	1,2%	13,8%	5,3%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	8,7%	3,5%	0,6%	6,5%	2,1%	1,5%	14,9%	5,9%
➤ Lassitude, fatigue									
Existence d'un problème	19,5%	26,3%	21,6%	16,5%	23,0%	18,1%	21,6%	29,1%	24,1%
Plaintes ou signes cliniques	19,5%	26,3%	21,6%	16,5%	23,0%	18,1%	21,2%	28,8%	23,7%
Gêne dans le travail	8,2%	13,2%	9,7%	6,8%	18,0%	9,7%	10,3%	16,8%	12,4%
Consommation médic.	0,8%	3,5%	1,6%	0,6%	3,3%	1,3%	1,4%	3,7%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	2,0%	5,3%	3,0%	1,7%	8,2%	3,4%	2,3%	6,7%	3,8%
➤ Anxiété, nervosité									
Existence d'un problème	14,3%	20,9%	16,4%	17,7%	29,0%	20,7%	19,0%	25,7%	21,2%
Plaintes ou signes cliniques	14,3%	20,9%	16,4%	17,7%	29,0%	20,7%	18,5%	25,4%	20,8%
Gêne dans le travail	7,0%	9,6%	7,8%	10,9%	19,4%	13,1%	8,8%	12,2%	9,9%
Consommation médic.	2,3%	6,1%	3,5%	1,7%	6,5%	3,0%	2,2%	6,3%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	5,2%	3,8%	4,6%	11,3%	6,4%	3,3%	7,9%	4,8%
➤ Trouble du sommeil									
Existence d'un problème	12,4%	25,0%	16,2%	7,5%	22,6%	11,5%	14,5%	28,4%	19,1%
Plaintes ou signes cliniques	12,4%	25,0%	16,2%	7,5%	22,6%	11,5%	14,3%	28,3%	18,9%
Gêne dans le travail	4,3%	9,8%	6,0%	3,5%	12,9%	6,0%	5,8%	11,5%	7,7%
Consommation médic.	1,9%	6,3%	3,2%	1,7%	3,2%	2,1%	1,8%	6,0%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	7,1%	4,3%	2,9%	4,8%	3,4%	2,7%	8,8%	4,7%
Troubles neuro psychiques									
(les 3 signes ci-dessus)									
Existence d'un problème	3,9%	7,8%	5,1%	2,8%	9,7%	4,6%	5,8%	11,9%	7,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	7,8%	5,1%	2,8%	9,7%	4,6%	5,5%	11,2%	7,4%
Gêne dans le travail	0,8%	3,5%	1,6%	2,3%	6,5%	3,4%	2,5%	5,5%	3,5%
Consommation médic.	0,0%	0,9%	0,3%	0,6%	0,0%	0,4%	0,3%	1,1%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	2,6%	0,8%	1,1%	1,6%	1,3%	0,7%	3,1%	1,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Activités spécialisées, scientifiques et techniques			Région		
	<45ans n=260	≥45ans n=117	Ens. n=377	<45ans n=177	≥45ans n=62*	Ens. n=239	<45ans n=1135	≥45ans n=555	Ens. n=1690
Digestif									
Existence d'un problème	8,2%	9,6%	8,6%	6,9%	4,9%	6,4%	8,5%	9,7%	8,9%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	8,8%	8,4%	6,9%	4,9%	6,4%	8,2%	9,3%	8,6%
Gêne dans le travail	1,2%	1,8%	1,3%	2,9%	1,6%	2,6%	1,6%	2,4%	1,9%
Consommation médic.	1,9%	3,5%	2,4%	2,3%	0,0%	1,7%	2,7%	4,1%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	5,4%	4,4%	5,1%	2,9%	1,6%	2,6%	4,6%	5,8%	5,0%
Dermatologie									
Existence d'un problème	7,5%	5,2%	6,8%	3,4%	3,2%	3,4%	5,7%	7,4%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	4,3%	5,9%	3,4%	3,2%	3,4%	5,3%	7,2%	5,9%
Gêne dans le travail	0,4%	0,9%	0,5%	0,6%	1,6%	0,8%	0,5%	1,5%	0,8%
Consommation médic.	2,7%	0,9%	2,2%	0,0%	1,6%	0,4%	1,9%	2,8%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	5,5%	2,6%	4,6%	2,9%	1,6%	2,5%	4,0%	4,8%	4,3%
Troubles de l'audition									
Existence d'un problème	3,1%	7,9%	4,6%	1,2%	3,3%	1,7%	3,9%	7,0%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	7,9%	4,3%	1,2%	3,3%	1,7%	3,5%	6,7%	4,5%
Gêne dans le travail	1,2%	2,6%	1,6%	0,6%	3,3%	1,3%	1,2%	2,4%	1,6%
Consommation médic.	0,4%	1,8%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,6%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	2,0%	7,0%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	4,3%	2,7%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur									
(l'un des 3 signes ci-dessous)									
Existence d'un problème	6,8%	28,1%	13,4%	4,0%	6,6%	4,7%	8,6%	22,4%	13,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	28,1%	13,4%	4,0%	6,6%	4,7%	8,4%	22,2%	12,9%
Gêne dans le travail	4,8%	15,0%	8,0%	2,9%	3,3%	3,0%	4,9%	12,9%	7,5%
Consommation médic.	3,2%	8,8%	4,9%	1,1%	1,6%	1,3%	2,3%	7,5%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	4,8%	12,5%	7,2%	1,7%	1,6%	1,7%	3,5%	13,3%	6,7%
➤ Epaule									
Existence d'un problème	2,7%	16,7%	7,0%	2,3%	3,3%	2,5%	5,3%	15,2%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	16,7%	7,0%	2,3%	3,3%	2,5%	5,3%	15,0%	8,5%
Gêne dans le travail	2,0%	9,6%	4,3%	1,1%	1,6%	1,3%	2,7%	8,4%	4,6%
Consommation médic.	2,0%	4,4%	2,7%	0,6%	0,0%	0,4%	1,2%	5,3%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	2,0%	7,9%	3,8%	0,6%	0,0%	0,4%	1,6%	9,4%	4,2%
➤ Coude									
Existence d'un problème	3,9%	7,9%	5,1%	0,6%	0,0%	0,4%	2,3%	4,9%	3,2%
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	7,9%	5,1%	0,6%	0,0%	0,4%	2,2%	4,9%	3,1%
Gêne dans le travail	2,0%	5,3%	3,0%	0,6%	0,0%	0,4%	1,3%	2,9%	1,9%
Consommation médic.	2,0%	5,3%	3,0%	0,6%	0,0%	0,4%	1,0%	2,6%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	5,3%	3,8%	0,6%	0,0%	0,4%	1,6%	3,3%	2,2%
➤ Poignet									
Existence d'un problème	3,5%	11,5%	6,0%	2,3%	3,2%	2,5%	3,3%	9,2%	5,2%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	11,5%	5,7%	2,3%	3,2%	2,5%	3,1%	9,2%	5,1%
Gêne dans le travail	2,3%	5,3%	3,3%	1,7%	1,6%	1,7%	2,2%	6,2%	3,6%
Consommation médic.	1,2%	3,5%	1,9%	1,1%	1,6%	1,3%	1,0%	3,5%	1,8%
Pathologie diagnostiquée	2,3%	3,6%	2,7%	1,7%	1,6%	1,7%	1,5%	4,6%	2,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			Activités spécialisées, scientifiques et techniques			Région		
	<45ans n=260	≥45ans n=117	Ens. n=377	<45ans n=177	≥45ans n=62*	Ens. n=239	<45ans n=1135	≥45ans n=555	Ens. n=1690
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur									
Existence d'un problème	9,3%	11,3%	9,9%	2,9%	9,7%	4,7%	7,7%	12,5%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	9,3%	11,3%	9,9%	2,9%	9,7%	4,7%	7,6%	12,3%	9,2%
Gêne dans le travail	1,9%	7,0%	3,5%	0,0%	3,2%	0,9%	2,8%	6,4%	4,0%
Consommation médicamenteuse	1,9%	5,2%	3,0%	0,6%	3,2%	1,3%	2,2%	5,3%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	5,4%	7,0%	5,9%	1,2%	8,1%	3,0%	4,1%	8,6%	5,6%
Troubles ostéoarticulaires du rachis									
(l'un des 2 signes ci-dessous)									
Existence d'un problème	24,6%	36,3%	28,2%	14,3%	21,0%	16,0%	22,9%	31,4%	25,7%
Plaintes ou signes cliniques	24,6%	36,3%	28,2%	14,3%	19,4%	15,6%	22,6%	30,9%	25,3%
Gêne dans le travail	14,3%	19,5%	15,9%	5,7%	12,9%	7,6%	12,3%	17,8%	14,1%
Consommation médicamenteuse	7,5%	13,3%	9,3%	1,7%	9,7%	3,8%	6,3%	12,3%	8,2%
Pathologie diagnostiquée	9,9%	21,4%	13,5%	5,7%	11,3%	7,2%	9,1%	18,4%	12,2%
➤ Vertèbres cervicales									
Existence d'un problème	4,7%	15,7%	8,1%	8,0%	9,7%	8,4%	9,1%	15,6%	11,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	15,7%	8,1%	8,0%	8,1%	8,0%	9,1%	15,3%	11,1%
Gêne dans le travail	2,3%	7,0%	3,8%	4,0%	4,8%	4,2%	4,8%	7,7%	5,8%
Consommation médicamenteuse	1,2%	8,7%	3,5%	1,1%	3,2%	1,7%	2,3%	7,0%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	7,9%	3,2%	2,3%	6,5%	3,4%	3,2%	8,5%	5,0%
➤ Vertèbres dorsolumbaires									
Existence d'un problème	21,8%	31,9%	24,9%	8,0%	16,1%	10,1%	17,3%	25,0%	19,8%
Plaintes ou signes cliniques	21,8%	31,9%	24,9%	8,0%	16,1%	10,1%	16,9%	24,9%	19,6%
Gêne dans le travail	12,7%	17,7%	14,2%	2,3%	9,7%	4,2%	8,9%	14,7%	10,8%
Consommation médicamenteuse	7,1%	12,4%	8,8%	0,6%	6,5%	2,1%	4,4%	10,1%	6,3%
Pathologie diagnostiquée	9,1%	19,6%	12,4%	4,0%	6,5%	4,6%	7,0%	15,2%	9,7%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence