



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2009-2010

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Juin 2011



Lille 2
Université du Droit
et de la Santé

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2009-2010 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Provence-Alpes-Côte d'Azur

L'exploitation des données de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a porté sur **4 026 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2009 (n=1828) et 2010 (n=2198).

Au niveau de la région, l'échantillon de salariés ayant participé à Evrest est plus proche du champ des salariés du privé (données Unedic) ou de celui public et privé (données DADS, INSEE) ; on peut toutefois noter que le secteur de la construction est nettement sous-représenté, quelle que soit la comparaison choisie (tableau 1).

Tableau 1 : Comparaison de la répartition de l'échantillon régional PACA 2009-2010 aux données Insee (DADS 2008) et Unedic (2009).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon PACA 2009-2010 (n=4026) %	Données INSEE 2008 (DADS) %	Données UNEDIC 2009 %
Sexe			
Hommes	55,7	52,8	54,4
Femmes	44,3	47,2	45,6
Age			
≤ 24 ans	11,5	16,4	-
25-34 ans	27,6	23,9	-
35-44 ans	27,8	25,7	-
45- 54 ans	24,3	22,8	-
55 ans et plus	8,8	11,3	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,9	0,6	-
Cadres et professions intellectuelles supérieures	17,5	11,0	-
Professions intermédiaires	20,4	21,8	-
Employés	36,7	40,0	-
Ouvriers	24,5	26,7	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,0	0,0%
Industrie	16,2	10,2	11,9%
Construction	3,8	7,6	9,5%
Commerce	19,6	16,7	20,0%
Services	60,4	65,5	58,5%

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional PACA 2009-2010 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Agriculteurs	1	0,0
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	35	0,9
Cadres et professions intellectuelles supérieures	703	17,5
Professions intermédiaires	823	20,4
Employés	1479	36,7
Ouvriers	985	24,5
Total général	4 026	100,0

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 8 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Commerce - réparations d'automobile et de motocycles, Transports et entreposage, Hébergement et restauration, Activités financières et d'assurance, Activités spécialisées scientifiques et techniques, Activités de services administratifs et de soutien, Santé humaine et action sociale (tableau 3).

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional PACA 2009-2010 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	1	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	1	0,0
INDUSTRIE	643	16,0
B. Industries extractives	2	0,0
C. Industrie manufacturière	472	11,7
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	120	3,0
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	49	1,2
CONSTRUCTION	152	3,8
F. Construction	152	3,8
COMMERCE	778	19,3
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	778	19,3
SERVICES	2403	59,7
H. Transports et entreposage	298	7,4
I. Hébergement et restauration	283	7,0
J. Information et communication	180	4,5
K. Activités financières et d'assurance	221	5,5
L. Activités immobilières	68	1,7
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	285	7,1
N. Activités de services administratifs et de soutien	302	7,5
O. Administration publique	105	2,6
P. Enseignement	76	1,9
Q. Santé humaine et action sociale	383	9,5
R. Arts, spectacles et activités récréatives	48	1,2
S. Autres activités de services	149	3,7
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	5	0,1
Données manquantes	49	1,2
Total général	4026	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=2243	Femmes n=1783	Ensemble n=4026
≤24ans	12,0%	10,8%	11,5%
25-34ans	26,1%	29,4%	27,6%
35-44ans	28,9%	26,4%	27,8%
45-54ans	24,2%	24,5%	24,3%
≥55ans	8,8%	8,9%	8,8%
Cadres	21,3%	12,6%	17,5%
Intermédiaires	19,9%	21,1%	20,4%
Employés	20,1%	57,7%	36,7%
Ouvriers	37,4%	8,2%	24,5%
Agriculture	0,0%	0,0%	0,0%
Industrie	21,4%	9,5%	16,2%
Construction	6,2%	0,8%	3,8%
Commerce	19,4%	19,8%	19,6%
Services	52,9%	69,9%	60,4%

Conditions de travail	Hommes n=2243	Femmes n=1783	Ensemble n=4026
Changement de travail depuis 1an :			
Non	85,2%	84,1%	84,7%
Oui, raison médicale	0,9%	0,8%	0,9%
Oui, autre raison	13,6%	14,5%	14,0%
Oui, raison non précisée	0,3%	0,6%	0,4%
Personnes travaillant à temps plein	91,3%	71,6%	82,6%
Travail en journée normale	77,4%	80,3%	78,7%
Coupures de plus de 2 heures	17,6%	16,4%	17,1%
Horaires décalés	33,7%	23,0%	29,0%
Horaires irréguliers ou alternés	29,2%	25,0%	27,3%
Travail de nuit	15,9%	4,3%	10,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	12,6%	3,9%	8,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	52,2%	51,9%	52,1%
Parmi eux :			
➤ Perturbe le travail	56,3%	59,4%	57,7%
➤ Sans conséquence	39,6%	37,9%	38,8%
➤ Aspect positif sur le travail	37,5%	35,7%	36,7%
Dépasser ses horaires normaux	46,7%	37,5%	42,6%
Sauter le repas ou la pause	27,7%	25,7%	26,8%
Traiter trop vite une opération	27,7%	24,6%	26,3%
Travail ne permet pas d'apprendre	20,0%	20,5%	20,2%
Travail pas varié	21,3%	22,7%	21,9%
Pas de choix dans la façon de procéder	22,1%	25,3%	23,6%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	17,4%	17,8%	17,6%
Travail pas reconnu	23,3%	22,3%	22,9%
Formations et informations insuffisantes	19,5%	18,1%	18,9%
Objectifs et consignes pas clairement définis	18,5%	17,6%	18,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	39,7%	34,9%	37,6%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=2243	Femmes n=1783	Ensemble n=4026
Postures contraignantes :			
Non	40,8%	47,0%	43,5%
Oui, difficile ou pénible	27,1%	25,1%	26,2%
Oui, pas difficile ou pénible	28,2%	24,9%	26,7%
Oui, difficile ou pénible non précisé	3,9%	3,0%	3,5%
Effort, Port de charges lourdes :			
Non	46,4%	57,3%	51,3%
Oui, difficile ou pénible	23,9%	22,2%	23,2%
Oui, pas difficile ou pénible	26,4%	17,7%	22,6%
Oui, difficile ou pénible non précisé	3,2%	2,8%	3,0%
Gestes répétitifs :			
Non	39,9%	34,8%	37,6%
Oui, difficile ou pénible	17,9%	18,3%	18,1%
Oui, pas difficile ou pénible	37,8%	42,6%	39,9%
Oui, difficile ou pénible non précisé	4,5%	4,3%	4,4%
Importants déplacements à pieds :			
Non	53,6%	67,8%	59,9%
Oui, difficile ou pénible	12,0%	9,2%	10,7%
Oui, pas difficile ou pénible	31,1%	21,3%	26,8%
Oui, difficile ou pénible non précisé	3,2%	1,8%	2,6%
Station debout prolongée :			
Non	40,9%	49,2%	44,6%
Oui, difficile ou pénible	19,7%	21,3%	20,4%
Oui, pas difficile ou pénible	36,0%	26,6%	31,8%
Oui, difficile ou pénible non précisé	3,5%	2,9%	3,2%

Expositions	Hommes n=2243	Femmes n=1783	Ensemble n=4026
Produits chimiques	26,5%	17,8%	22,6%
Poussières, fumées	39,5%	18,9%	30,4%
Rx ionisants	2,8%	2,3%	2,6%
Vibrations	22,3%	3,3%	13,9%
Gêne sonore	41,5%	26,4%	34,8%
Bruit > 80db	29,7%	11,5%	21,7%
Contrainte visuelle	29,2%	27,9%	28,6%
Conduite routière prolongée	20,4%	5,6%	13,9%
Chaleur intense	19,3%	9,9%	15,1%
Froid intense	17,7%	7,2%	13,0%
Intempéries	25,0%	4,5%	15,9%
Pression psychologique	28,9%	24,1%	26,7%
Agent biologique	6,2%	9,1%	7,5%
Contact avec le public	64,0%	70,6%	66,9%

Formation	Hommes n=2243	Femmes n=1783	Ensemble n=4026
A bénéficié d'une formation depuis un an	46,6%	45,9%	46,3%
Parmi eux :			
➤ En rapport avec le travail actuel	87,0%	86,0%	86,5%
➤ En rapport avec le travail futur	16,7%	12,2%	14,8%
➤ Formation d'intérêt général	50,0%	48,1%	49,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	28,6%	22,6%	26,0%

Mode de vie	Hommes n=2243	Femmes n=1783	Ensemble n=4026
Activité sportive régulière	54,4%	47,6%	51,4%
Consommation de tabac	40,2%	34,8%	37,8%
Consommation de tabac > 15 cig / jour	11,5%	5,9%	9,0%
Consommation de café	83,6%	70,5%	77,8%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	12,5%	8,4%	10,7%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,7%	17,1%	17,4%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=4026
	Hommes n=1503	Femmes n=1189	Ensemble n=2692	Hommes n=740	Femmes n=594	Ensemble n=1334	
Indice de masse corporelle							
➤ Normaux ou maigres	61,1%	78,6%	68,8%	43,7%	66,7%	54,0%	63,9%
➤ Surpoids	30,7%	14,4%	23,5%	42,0%	24,2%	34,1%	27,0%
➤ Obèses	8,2%	7,0%	7,7%	14,2%	9,1%	11,9%	9,1%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	3,0%	2,3%	2,7%	4,2%	3,2%	3,8%	3,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	2,1%	2,4%	4,1%	3,0%	3,6%	2,8%
Gêne dans le travail	0,3%	0,6%	0,5%	0,4%	0,8%	0,6%	0,5%
Consommation médicamenteuse	1,9%	2,0%	1,9%	1,6%	2,5%	2,0%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	2,3%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	1,6%	2,6%	2,1%	6,6%	3,7%	5,3%	3,1%
Plaintes ou signes cliniques	1,3%	2,5%	1,8%	5,2%	3,7%	4,5%	2,7%
Gêne dans le travail	0,2%	0,8%	0,5%	0,5%	1,4%	0,9%	0,6%
Consommation médicamenteuse	0,3%	0,6%	0,4%	4,6%	1,7%	3,3%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	2,0%	1,4%	5,3%	3,2%	4,4%	2,4%
HTA							
Existence d'un problème	2,8%	0,9%	1,9%	14,6%	12,2%	13,5%	5,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	0,8%	1,7%	11,0%	9,4%	10,3%	4,6%
Gêne dans le travail	0,1%	0,1%	0,1%	0,6%	1,0%	0,8%	0,3%
Consommation médicamenteuse	0,7%	0,6%	0,7%	10,1%	9,7%	9,9%	3,7%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	0,6%	0,9%	10,9%	10,5%	10,7%	4,2%
➤ Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	8,0%	11,4%	9,5%	12,5%	19,8%	15,8%	11,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,7%	11,4%	9,3%	12,3%	19,6%	15,5%	11,4%
Gêne dans le travail	4,2%	6,4%	5,2%	5,6%	10,4%	7,7%	6,0%
Consommation médicamenteuse	0,8%	1,9%	1,3%	2,2%	5,1%	3,5%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	4,3%	3,2%	4,3%	9,0%	6,4%	4,3%
➤ Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	9,0%	11,2%	9,9%	11,7%	18,0%	14,5%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	10,9%	9,7%	11,4%	17,8%	14,3%	11,2%
Gêne dans le travail	4,2%	4,5%	4,3%	4,2%	8,3%	6,1%	4,9%
Consommation médicamenteuse	1,7%	3,1%	2,3%	3,1%	7,0%	4,9%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	4,5%	3,9%	4,4%	9,9%	6,8%	4,9%
➤ Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	7,3%	9,7%	8,4%	12,4%	19,7%	15,7%	10,8%
Plaintes ou signes cliniques	7,2%	9,7%	8,3%	12,2%	19,5%	15,4%	10,7%
Gêne dans le travail	3,1%	4,3%	3,6%	4,8%	6,0%	5,3%	4,2%
Consommation médicamenteuse	1,4%	2,1%	1,7%	2,7%	6,0%	4,2%	2,6%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	3,6%	3,0%	4,1%	8,7%	6,1%	4,0%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	2,2%	3,2%	2,6%	3,8%	6,9%	5,2%	3,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	3,1%	2,6%	3,5%	6,6%	4,9%	3,3%
Gêne dans le travail	0,9%	1,5%	1,2%	1,4%	3,0%	2,1%	1,5%
Consommation médicamenteuse	0,3%	0,8%	0,5%	0,8%	1,4%	1,1%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	0,7%	1,4%	1,0%	1,1%	3,4%	2,1%	1,4%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=4026
	Hommes n=1503	Femmes n=1189	Ensemble n=2692	Hommes n=740	Femmes n=594	Ensemble n=1334	
Digestif							
Existence d'un problème	5,4%	6,7%	6,0%	8,1%	7,5%	7,8%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	6,7%	5,9%	7,7%	7,5%	7,6%	6,5%
Gêne dans le travail	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%	1,9%	1,1%	1,1%
Consommation médicamenteuse	2,3%	3,2%	2,7%	3,0%	3,2%	3,1%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	3,9%	3,6%	4,8%	5,0%	4,9%	4,0%
Dermatologie							
Existence d'un problème	5,7%	4,1%	5,0%	4,3%	4,1%	4,2%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	3,9%	4,9%	4,1%	4,1%	4,1%	4,6%
Gêne dans le travail	0,8%	0,3%	0,6%	0,3%	0,9%	0,5%	0,6%
Consommation médicamenteuse	2,7%	1,5%	2,2%	1,5%	1,2%	1,4%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	4,4%	3,0%	3,8%	2,9%	3,3%	3,1%	3,6%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	3,5%	1,9%	2,8%	10,8%	4,5%	8,0%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	1,8%	2,5%	9,7%	4,5%	7,4%	4,1%
Gêne dans le travail	0,9%	1,1%	1,0%	2,9%	1,7%	2,4%	1,5%
Consommation médicamenteuse	0,5%	0,3%	0,4%	0,6%	0,2%	0,4%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	2,8%	1,0%	2,0%	8,2%	2,2%	5,5%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur							
(l'un des 3 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	8,0%	7,3%	7,7%	13,3%	20,4%	16,5%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	7,3%	7,6%	13,1%	20,1%	16,2%	10,5%
Gêne dans le travail	4,6%	4,0%	4,3%	7,0%	12,3%	9,4%	6,0%
Consommation médicamenteuse	1,4%	1,4%	1,4%	3,6%	7,9%	5,5%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	4,7%	4,0%	4,4%	8,0%	14,9%	11,1%	6,6%
➤ Epaule							
Existence d'un problème	4,1%	3,9%	4,0%	8,1%	11,3%	9,5%	5,9%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	3,9%	4,0%	7,8%	11,2%	9,3%	5,7%
Gêne dans le travail	2,1%	2,1%	2,1%	4,0%	7,2%	5,4%	3,2%
Consommation médicamenteuse	0,7%	0,6%	0,7%	2,5%	5,6%	3,9%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	2,1%	2,1%	4,4%	8,0%	6,0%	3,4%
➤ Coude							
Existence d'un problème	1,3%	1,1%	1,2%	3,3%	5,1%	4,1%	2,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,3%	1,1%	1,2%	3,2%	4,6%	3,8%	2,1%
Gêne dans le travail	0,8%	0,5%	0,7%	1,6%	2,7%	2,1%	1,2%
Consommation médicamenteuse	0,2%	0,4%	0,3%	1,0%	1,5%	1,2%	0,6%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	0,5%	0,7%	2,1%	3,4%	2,7%	1,3%
➤ Poignet							
Existence d'un problème	3,5%	3,3%	3,4%	4,2%	9,5%	6,6%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	3,3%	3,4%	4,1%	9,3%	6,4%	4,4%
Gêne dans le travail	2,2%	2,0%	2,1%	2,2%	5,8%	3,8%	2,7%
Consommation médicamenteuse	0,7%	0,9%	0,8%	1,2%	3,4%	2,2%	1,2%
Pathologie diagnostiquée	1,9%	2,1%	2,0%	2,6%	7,1%	4,6%	2,9%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=4026
	Hommes n=1503	Femmes n=1189	Ensemble n=2692	Hommes n=740	Femmes n=594	Ensemble n=1334	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	6,5%	4,4%	5,6%	10,4%	8,0%	9,3%	6,8%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	4,4%	5,4%	10,1%	8,0%	9,2%	6,7%
Gêne dans le travail	2,4%	2,2%	2,3%	3,7%	3,9%	3,8%	2,8%
Consommation médicamenteuse	1,4%	1,5%	1,4%	2,9%	3,4%	3,1%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	4,5%	3,4%	4,0%	7,9%	6,1%	7,1%	5,0%
Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	20,9%	19,2%	20,1%	23,8%	25,2%	24,4%	21,6%
Plaintes ou signes cliniques	20,5%	18,9%	19,7%	23,0%	24,9%	23,9%	21,1%
Gêne dans le travail	10,5%	10,1%	10,3%	12,2%	14,5%	13,2%	11,3%
Consommation médicamenteuse	4,5%	4,9%	4,7%	8,8%	10,9%	9,7%	6,4%
Pathologie diagnostiquée	12,0%	11,2%	11,7%	14,0%	17,3%	15,5%	12,9%
➤ Vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	6,2%	7,2%	6,7%	6,8%	11,4%	8,9%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	7,2%	6,6%	6,7%	11,4%	8,8%	7,3%
Gêne dans le travail	3,4%	3,8%	3,6%	3,4%	5,8%	4,5%	3,9%
Consommation médicamenteuse	1,6%	2,1%	1,8%	2,7%	4,4%	3,5%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	3,5%	3,7%	3,6%	3,6%	7,0%	5,1%	4,1%
➤ Vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	17,6%	15,3%	16,6%	19,9%	18,5%	19,3%	17,5%
Plaintes ou signes cliniques	17,2%	15,1%	16,2%	19,1%	18,2%	18,7%	17,1%
Gêne dans le travail	8,3%	7,6%	8,0%	10,1%	11,6%	10,8%	8,9%
Consommation médicamenteuse	3,8%	3,9%	3,9%	7,3%	8,2%	7,7%	5,2%
Pathologie diagnostiquée	9,8%	9,1%	9,5%	11,6%	12,5%	12,0%	10,3%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=703	Intermédiaires n=823	Employés n=1479	Ouvriers n=985	Région n=4026
Répartition homme/femme	68,0%/32,0%	54,3%/45,7%	30,4%/69,6%	85,2%/14,8%	55,7%/44,3%
≤24ans	3,1%	7,3%	15,7%	14,8%	11,5%
25-34ans	28,6%	29,6%	28,8%	24,0%	27,6%
35-44ans	34,7%	26,2%	24,3%	29,2%	27,8%
45-54ans	22,5%	29,6%	22,4%	23,8%	24,3%
≥55ans	11,1%	7,2%	8,8%	8,2%	8,8%
Agriculture	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Industrie	22,1%	21,9%	4,1%	25,6%	16,2%
Construction	1,1%	2,7%	0,7%	10,7%	3,8%
Commerce	7,9%	16,2%	28,1%	17,7%	19,6%
Services	68,8%	59,3%	67,2%	45,9%	60,4%

Conditions de travail	Cadres n=703	Intermédiaires n=823	Employés n=1479	Ouvriers n=985	Région n=4026
Changement de travail depuis 1an :					
Non	85,5%	84,9%	83,8%	85,1%	84,7%
Oui, raison médicale	0,3%	0,9%	1,1%	1,1%	0,9%
Oui, autre raison	13,7%	13,9%	14,9%	13,2%	14,0%
Oui, raison non précisée	0,6%	0,4%	0,3%	0,5%	0,4%
Personnes travaillant à temps plein	89,2%	84,3%	75,0%	87,7%	82,6%
Travail en journée normale	91,3%	82,6%	75,8%	70,1%	78,7%
Coupures de plus de 2 heures	11,3%	13,8%	18,4%	21,9%	17,1%
Horaires décalés	21,9%	21,6%	29,8%	38,7%	29,0%
Horaires irréguliers ou alternés	17,5%	24,9%	29,8%	32,1%	27,3%
Travail de nuit	4,9%	7,9%	9,6%	19,4%	10,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	26,2%	9,0%	1,9%	5,8%	8,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	69,8%	63,1%	47,2%	37,0%	52,1%
Parmi eux :					
➤ Perturbe le travail	63,3%	62,6%	53,5%	52,3%	57,7%
➤ Sans conséquence	33,6%	36,4%	42,9%	41,0%	38,8%
➤ Aspect positif sur le travail	40,6%	31,9%	38,1%	34,9%	36,7%
Dépasser ses horaires normaux	71,5%	52,4%	30,5%	30,3%	42,6%
Sauter le repas ou la pause	39,7%	30,0%	21,5%	22,2%	26,8%
Traiter trop vite une opération	40,4%	32,8%	20,3%	19,6%	26,3%
Travail ne permet pas d'apprendre	7,4%	12,1%	24,2%	30,7%	20,2%
Travail pas varié	9,8%	12,1%	26,2%	33,0%	21,9%
Pas de choix dans la façon de procéder	11,9%	20,1%	28,8%	27,7%	23,6%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	15,1%	16,1%	17,4%	21,1%	17,6%
Travail pas reconnu	18,1%	20,4%	23,7%	27,5%	22,9%
Formations et informations insuffisantes	17,0%	18,5%	19,3%	20,0%	18,9%
Objectifs et consignes pas clairement définis	21,0%	19,8%	16,6%	17,1%	18,1%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	48,8%	42,4%	32,4%	32,9%	37,6%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=703	Intermédiaires n=823	Employés n=1479	Ouvriers n=985	Région n=4026
Postures contraignantes :					
Non	74,6%	46,7%	42,7%	19,7%	43,5%
Oui, difficile ou pénible	8,3%	24,4%	26,8%	40,2%	26,2%
Oui, pas difficile ou pénible	15,7%	25,8%	27,5%	34,0%	26,7%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,4%	3,2%	3,0%	6,1%	3,5%
Effort, Port de charges lourdes :					
Non	83,3%	53,7%	51,3%	25,8%	51,3%
Oui, difficile ou pénible	5,1%	20,9%	23,7%	37,7%	23,2%
Oui, pas difficile ou pénible	10,7%	23,3%	22,0%	31,3%	22,6%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,9%	2,2%	3,0%	5,2%	3,0%
Gestes répétitifs :					
Non	71,8%	50,3%	28,4%	16,0%	37,6%
Oui, difficile ou pénible	5,3%	12,1%	19,6%	30,2%	18,1%
Oui, pas difficile ou pénible	21,0%	34,8%	47,2%	46,9%	39,9%
Oui, difficile ou pénible non précisé	2,0%	2,7%	4,8%	6,9%	4,4%
Importants déplacements à pieds :					
Non	84,0%	58,0%	60,0%	44,3%	59,9%
Oui, difficile ou pénible	2,3%	9,5%	11,3%	17,2%	10,7%
Oui, pas difficile ou pénible	12,8%	29,6%	26,5%	34,4%	26,8%
Oui, difficile ou pénible non précisé	0,9%	2,8%	2,3%	4,1%	2,6%
Station debout prolongée :					
Non	76,5%	49,3%	41,3%	22,8%	44,6%
Oui, difficile ou pénible	5,1%	17,2%	23,4%	29,6%	20,4%
Oui, pas difficile ou pénible	16,8%	31,5%	32,0%	42,2%	31,8%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,6%	2,0%	3,2%	5,4%	3,2%

Expositions	Cadres n=703	Intermédiaires n=823	Employés n=1479	Ouvriers n=985	Région n=4026
Produits chimiques	8,1%	21,6%	18,6%	40,1%	22,6%
Poussières, fumées	9,2%	23,5%	23,5%	61,7%	30,4%
Rx ionisants	3,1%	3,8%	1,6%	2,5%	2,6%
Vibrations	2,9%	11,8%	3,6%	39,0%	13,9%
Gêne sonore	18,0%	33,5%	28,3%	57,8%	34,8%
Bruit > 80db	8,5%	21,1%	13,0%	44,7%	21,7%
Contrainte visuelle	32,5%	37,1%	23,2%	27,0%	28,6%
Conduite routière prolongée	17,6%	18,5%	4,4%	21,4%	13,9%
Chaleur intense	5,0%	12,3%	12,7%	28,2%	15,1%
Froid intense	3,3%	11,3%	9,8%	26,5%	13,0%
Intempéries	5,6%	14,8%	7,3%	37,0%	15,9%
Pression psychologique	33,5%	30,4%	24,2%	22,2%	26,7%
Agent biologique	2,9%	9,3%	9,1%	7,2%	7,5%
Contact avec le public	47,9%	70,6%	79,1%	58,6%	66,9%

Formation	Cadres n=703	Intermédiaires n=823	Employés n=1479	Ouvriers n=985	Région n=4026
A bénéficié d'une formation depuis un an	54,9%	54,6%	43,3%	37,9%	46,3%
Parmi eux :					
➤ En rapport avec le travail actuel	85,6%	88,7%	87,5%	83,1%	86,5%
➤ En rapport avec le travail futur	14,0%	13,4%	14,2%	18,6%	14,8%
➤ Formation d'intérêt général	52,9%	47,7%	48,9%	47,4%	49,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	38,1%	35,9%	19,7%	17,0%	26,0%

Mode de vie	Cadres n=703	Intermédiaires n=823	Employés n=1479	Ouvriers n=985	Région n=4026
Activité sportive régulière	57,9%	52,1%	49,9%	48,3%	51,4%
Consommation de tabac	25,4%	33,9%	40,4%	46,1%	37,8%
Consommation de tabac>15 cig / jour	5,6%	8,3%	8,6%	12,3%	9,0%
Consommation de café	79,8%	78,1%	73,8%	81,8%	77,8%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	11,3%	8,3%	10,2%	12,4%	10,7%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	21,1%	21,0%	15,4%	15,1%	17,4%

Rapport Evrest 2009-2010 – Région PACA

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=467	≥45ans n=236	Ens. n=703	<45ans n=520	≥45ans n=303	Ens. n=823	<45ans n=1018	≥45ans n=461	Ens. n=1479	<45ans n=670	≥45ans n=315	Ens. n=985	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Indice de masse corporelle															
➤ Normaux ou maigres	71,0%	52,0%	64,6%	68,5%	58,5%	64,8%	74,2%	57,7%	69,1%	59,6%	46,1%	55,3%	68,8%	54,0%	63,9%
➤ Surpoids	23,5%	39,7%	28,9%	23,2%	32,7%	26,7%	18,6%	29,7%	22,1%	31,1%	37,9%	33,3%	23,5%	34,1%	27,0%
➤ Obèses	5,5%	8,3%	6,4%	8,3%	8,8%	8,5%	7,1%	12,6%	8,8%	9,2%	16,0%	11,4%	7,7%	11,9%	9,1%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	2,4%	2,6%	2,4%	3,1%	4,3%	3,5%	2,7%	5,0%	3,4%	2,4%	2,6%	2,5%	2,7%	3,8%	3,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	2,6%	2,3%	2,9%	4,0%	3,3%	2,5%	4,8%	3,2%	2,0%	2,6%	2,2%	2,4%	3,6%	2,8%
Gêne dans le travail	0,0%	0,9%	0,3%	1,0%	1,0%	1,0%	0,6%	0,4%	0,5%	0,2%	0,3%	0,2%	0,5%	0,6%	0,5%
Consommation médic.	1,7%	0,9%	1,4%	1,7%	2,3%	2,0%	2,3%	2,8%	2,5%	1,5%	1,6%	1,5%	1,9%	2,0%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	1,3%	1,9%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	3,7%	2,9%	2,1%	1,6%	2,0%	2,4%	2,5%	2,4%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	2,4%	5,1%	3,3%	1,2%	5,3%	2,7%	3,1%	4,6%	3,5%	1,1%	6,8%	2,9%	2,1%	5,3%	3,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	4,3%	2,9%	1,0%	4,3%	2,2%	2,8%	4,4%	3,3%	0,9%	5,5%	2,4%	1,8%	4,5%	2,7%
Gêne dans le travail	0,0%	0,4%	0,1%	0,4%	0,7%	0,5%	0,9%	1,3%	1,0%	0,2%	1,0%	0,4%	0,5%	0,9%	0,6%
Consommation médic.	0,2%	3,0%	1,1%	0,0%	3,3%	1,2%	0,8%	2,8%	1,4%	0,3%	4,5%	1,6%	0,4%	3,3%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	4,3%	2,3%	0,6%	4,3%	2,0%	2,1%	4,4%	2,8%	0,9%	4,8%	2,2%	1,4%	4,4%	2,4%
HTA															
Existence d'un problème	2,2%	13,8%	6,1%	2,5%	11,9%	6,0%	1,3%	12,2%	4,7%	2,3%	16,2%	6,7%	1,9%	13,5%	5,8%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	9,9%	4,5%	2,3%	8,6%	4,7%	1,2%	9,2%	3,7%	2,1%	13,3%	5,7%	1,7%	10,3%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,7%	0,2%	0,1%	1,3%	0,5%	0,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,8%	0,3%
Consommation médic.	0,7%	8,7%	3,3%	0,6%	9,6%	3,9%	0,7%	10,9%	3,9%	0,8%	9,4%	3,5%	0,7%	9,9%	3,7%
Pathologie diagnostiquée	0,9%	9,5%	3,8%	1,2%	9,3%	4,2%	0,7%	11,4%	4,1%	1,2%	11,4%	4,4%	0,9%	10,7%	4,2%
➤ Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	11,4%	14,5%	12,5%	11,3%	20,2%	14,6%	9,4%	14,6%	11,1%	6,5%	14,4%	9,1%	9,5%	15,8%	11,6%
Plaintes ou signes cliniques	10,8%	13,6%	11,8%	11,3%	20,2%	14,6%	9,4%	14,4%	11,0%	6,2%	14,4%	8,9%	9,3%	15,5%	11,4%
Gêne dans le travail	5,7%	6,0%	5,8%	5,7%	10,9%	7,6%	5,7%	8,1%	6,4%	3,6%	5,5%	4,2%	5,2%	7,7%	6,0%
Consommation médic.	1,5%	2,1%	1,7%	1,8%	5,0%	3,0%	1,4%	4,0%	2,2%	0,5%	2,6%	1,1%	1,3%	3,5%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	5,2%	4,3%	3,7%	8,0%	5,3%	3,5%	7,0%	4,6%	1,8%	4,5%	2,7%	3,2%	6,4%	4,3%
➤ Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	11,3%	10,6%	11,0%	10,7%	19,5%	13,9%	10,6%	15,9%	12,3%	7,4%	10,3%	8,3%	9,9%	14,5%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	10,6%	10,2%	10,5%	10,5%	19,2%	13,7%	10,4%	15,7%	12,1%	7,4%	10,3%	8,3%	9,7%	14,3%	11,2%
Gêne dans le travail	6,3%	3,4%	5,3%	3,5%	7,9%	5,2%	4,3%	7,9%	5,4%	3,6%	3,5%	3,6%	4,3%	6,1%	4,9%
Consommation médic.	2,4%	1,7%	2,2%	3,1%	6,3%	4,3%	2,7%	8,1%	4,4%	1,1%	1,3%	1,1%	2,3%	4,9%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	4,6%	3,0%	4,0%	4,3%	9,7%	6,3%	4,0%	9,9%	5,9%	2,9%	2,3%	2,7%	3,9%	6,8%	4,9%
➤ Trouble du sommeil															
Existence d'un problème	9,5%	16,6%	11,9%	8,6%	20,7%	13,0%	9,4%	15,9%	11,5%	5,6%	10,3%	7,1%	8,4%	15,7%	10,8%
Plaintes ou signes cliniques	9,3%	15,7%	11,5%	8,4%	20,7%	12,9%	9,4%	15,9%	11,5%	5,6%	10,0%	7,0%	8,3%	15,4%	10,7%
Gêne dans le travail	3,9%	5,6%	4,5%	3,3%	7,3%	4,8%	4,1%	5,3%	4,5%	2,6%	3,5%	2,9%	3,6%	5,3%	4,2%
Consommation médic.	1,7%	3,8%	2,5%	1,6%	5,7%	3,1%	1,9%	5,7%	3,1%	1,4%	1,0%	1,2%	1,7%	4,2%	2,6%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	5,1%	3,8%	3,3%	9,7%	5,7%	3,3%	7,4%	4,6%	2,1%	1,6%	2,0%	3,0%	6,1%	4,0%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	3,7%	4,7%	4,0%	3,3%	7,9%	5,0%	2,6%	4,8%	3,3%	1,2%	3,9%	2,1%	2,6%	5,2%	3,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,5%	3,8%	3,6%	3,3%	7,9%	5,0%	2,5%	4,6%	3,1%	1,2%	3,5%	2,0%	2,6%	4,9%	3,3%
Gêne dans le travail	1,9%	1,7%	1,9%	1,0%	2,6%	1,6%	1,3%	2,6%	1,7%	0,6%	1,3%	0,8%	1,2%	2,1%	1,5%
Consommation médic.	0,6%	1,3%	0,9%	0,8%	1,7%	1,1%	0,7%	1,1%	0,8%	0,0%	0,3%	0,1%	0,5%	1,1%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	1,9%	1,7%	1,9%	0,6%	4,0%	1,8%	1,2%	2,6%	1,6%	0,5%	0,0%	0,3%	1,0%	2,1%	1,4%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=467	≥45ans n=236	Ens. n=703	<45ans n=520	≥45ans n=303	Ens. n=823	<45ans n=1018	≥45ans n=461	Ens. n=1479	<45ans n=670	≥45ans n=315	Ens. n=985	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Digestif															
Existence d'un problème	5,7%	9,1%	6,8%	7,2%	9,7%	8,1%	6,3%	7,4%	6,7%	4,6%	5,2%	4,8%	6,0%	7,8%	6,6%
Plaintes, signes cliniques	5,5%	8,2%	6,4%	7,2%	9,7%	8,1%	6,3%	7,4%	6,7%	4,4%	4,9%	4,6%	5,9%	7,6%	6,5%
Gêne dans le travail	0,7%	0,4%	0,6%	1,0%	1,3%	1,1%	1,4%	2,2%	1,6%	1,1%	0,0%	0,7%	1,1%	1,1%	1,1%
Consommation médic.	2,6%	2,6%	2,6%	3,5%	4,0%	3,7%	3,2%	3,5%	3,3%	1,4%	1,6%	1,4%	2,7%	3,1%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	3,5%	5,7%	4,2%	4,3%	6,7%	5,2%	4,2%	5,1%	4,5%	2,3%	1,9%	2,2%	3,6%	4,9%	4,0%
Dermatologie															
Existence d'un problème	6,1%	4,8%	5,7%	4,3%	5,0%	4,6%	4,4%	3,8%	4,2%	5,5%	3,5%	4,9%	5,0%	4,2%	4,7%
Plaintes, signes cliniques	5,9%	4,8%	5,5%	4,3%	4,7%	4,4%	4,3%	3,8%	4,1%	5,4%	3,5%	4,8%	4,9%	4,1%	4,6%
Gêne dans le travail	0,2%	0,0%	0,1%	0,2%	0,7%	0,4%	0,6%	0,7%	0,6%	1,1%	0,3%	0,8%	0,6%	0,5%	0,6%
Consommation médic.	2,0%	1,3%	1,7%	2,2%	2,0%	2,1%	1,7%	1,3%	1,6%	3,1%	1,0%	2,4%	2,2%	1,4%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	4,1%	3,0%	3,8%	3,5%	3,7%	3,6%	3,2%	3,1%	3,2%	4,6%	2,3%	3,9%	3,8%	3,1%	3,6%
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	2,2%	6,5%	3,6%	3,2%	10,1%	5,7%	2,0%	4,2%	2,7%	4,0%	12,3%	6,7%	2,8%	8,0%	4,5%
Plaintes, signes cliniques	1,8%	6,5%	3,3%	3,2%	9,7%	5,6%	1,8%	4,2%	2,6%	3,4%	10,0%	5,5%	2,5%	7,4%	4,1%
Gêne dans le travail	0,4%	2,6%	1,2%	1,2%	4,4%	2,4%	1,0%	2,0%	1,3%	0,9%	0,6%	0,8%	1,0%	2,4%	1,5%
Consommation médic.	0,4%	0,9%	0,6%	0,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,4%	0,1%	0,6%	0,3%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	3,4%	2,3%	2,2%	6,7%	3,9%	1,1%	2,9%	1,7%	3,2%	9,4%	5,2%	2,0%	5,5%	3,2%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	4,1%	9,5%	5,9%	5,3%	17,0%	9,6%	8,6%	17,6%	11,4%	10,5%	20,3%	13,6%	7,7%	16,5%	10,6%
Plaintes, signes cliniques	3,9%	9,1%	5,6%	5,3%	16,3%	9,3%	8,6%	17,4%	11,4%	10,3%	20,3%	13,5%	7,6%	16,2%	10,5%
Gêne dans le travail	1,1%	3,0%	1,7%	2,9%	8,7%	5,0%	4,9%	11,1%	6,8%	7,0%	12,9%	8,9%	4,3%	9,4%	6,0%
Consommation médic.	0,2%	1,7%	0,7%	0,8%	5,7%	2,6%	1,9%	7,5%	3,7%	2,0%	5,5%	3,1%	1,4%	5,5%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	6,1%	3,0%	3,5%	11,7%	6,5%	5,3%	12,6%	7,6%	5,6%	12,3%	7,8%	4,4%	11,1%	6,6%
➤ Epaule															
Existence d'un problème	2,4%	5,1%	3,3%	2,9%	10,7%	5,8%	4,4%	10,5%	6,3%	5,6%	10,6%	7,2%	4,0%	9,5%	5,9%
Plaintes, signes cliniques	2,2%	4,7%	3,0%	2,9%	10,0%	5,5%	4,4%	10,5%	6,3%	5,5%	10,6%	7,1%	4,0%	9,3%	5,7%
Gêne dans le travail	0,4%	1,3%	0,7%	1,4%	6,0%	3,1%	2,5%	6,4%	3,7%	3,3%	6,8%	4,4%	2,1%	5,4%	3,2%
Consommation médic.	0,2%	1,7%	0,7%	0,6%	4,3%	2,0%	0,7%	5,0%	2,1%	1,1%	3,6%	1,9%	0,7%	3,9%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	0,9%	3,9%	1,9%	1,7%	7,0%	3,7%	2,9%	7,2%	4,2%	2,3%	4,9%	3,1%	2,1%	6,0%	3,4%
➤ Coude															
Existence d'un problème	0,4%	3,5%	1,4%	0,8%	3,0%	1,6%	1,2%	4,0%	2,1%	2,1%	6,1%	3,4%	1,2%	4,1%	2,2%
Plaintes, signes cliniques	0,4%	2,6%	1,2%	0,8%	2,7%	1,5%	1,2%	3,7%	2,0%	2,1%	6,1%	3,4%	1,2%	3,8%	2,1%
Gêne dans le travail	0,0%	0,9%	0,3%	0,6%	1,3%	0,9%	0,5%	2,2%	1,0%	1,5%	3,9%	2,3%	0,7%	2,1%	1,2%
Consommation médic.	0,0%	1,3%	0,4%	0,4%	0,7%	0,5%	0,4%	1,3%	0,7%	0,3%	1,6%	0,7%	0,3%	1,2%	0,6%
Pathologie diagnostiquée	0,2%	1,7%	0,7%	0,6%	1,7%	1,0%	0,6%	3,1%	1,4%	1,2%	3,9%	2,1%	0,7%	2,7%	1,3%
➤ Poignet															
Existence d'un problème	1,9%	5,1%	3,0%	1,9%	5,0%	3,1%	3,7%	8,5%	5,2%	5,0%	6,7%	5,6%	3,4%	6,6%	4,5%
Plaintes, signes cliniques	1,9%	4,7%	2,9%	1,9%	5,0%	3,1%	3,7%	8,3%	5,1%	5,0%	6,7%	5,6%	3,4%	6,4%	4,4%
Gêne dans le travail	0,9%	1,7%	1,1%	1,4%	1,7%	1,5%	2,3%	6,3%	3,6%	3,5%	3,8%	3,6%	2,1%	3,8%	2,7%
Consommation médic.	0,0%	1,3%	0,4%	0,2%	0,7%	0,4%	1,2%	4,4%	2,2%	1,1%	1,3%	1,1%	0,8%	2,2%	1,2%
Pathologie diagnostiquée	0,4%	3,4%	1,4%	1,6%	3,3%	2,2%	2,3%	6,6%	3,6%	2,9%	4,2%	3,3%	2,0%	4,6%	2,9%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=467	≥45ans n=236	Ens. n=703	<45ans n=520	≥45ans n=303	Ens. n=823	<45ans n=1018	≥45ans n=461	Ens. n=1479	<45ans n=670	≥45ans n=315	Ens. n=985	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	5,4%	6,4%	5,7%	6,6%	11,6%	8,4%	5,4%	9,4%	6,6%	5,1%	9,0%	6,4%	5,6%	9,3%	6,8%
Plaintes, signes cliniques	5,2%	6,0%	5,4%	6,4%	11,6%	8,3%	5,4%	9,4%	6,6%	4,7%	8,7%	6,0%	5,4%	9,2%	6,7%
Gêne dans le travail	0,9%	0,9%	0,9%	3,1%	4,3%	3,5%	3,0%	4,4%	3,4%	1,8%	4,5%	2,7%	2,3%	3,8%	2,8%
Consommation médic	1,3%	2,1%	1,6%	1,4%	3,7%	2,2%	1,6%	3,5%	2,2%	1,4%	2,6%	1,7%	1,4%	3,1%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	5,1%	4,3%	5,4%	8,3%	6,5%	3,7%	7,0%	4,7%	3,3%	7,4%	4,6%	4,0%	7,1%	5,0%
Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	17,7%	19,8%	18,4%	21,7%	27,0%	23,6%	19,8%	24,7%	21,3%	21,3%	25,1%	22,5%	20,1%	24,4%	21,6%
Plaintes, signes cliniques	17,3%	19,0%	17,9%	21,3%	26,0%	23,1%	19,2%	24,5%	20,9%	21,1%	24,5%	22,2%	19,7%	23,9%	21,1%
Gêne dans le travail	5,1%	7,0%	5,7%	12,1%	13,2%	12,5%	10,3%	14,6%	11,7%	12,7%	16,6%	13,9%	10,3%	13,2%	11,3%
Consommation médic	2,4%	8,3%	4,4%	3,9%	9,5%	6,0%	5,1%	11,8%	7,2%	6,4%	7,8%	6,8%	4,7%	9,7%	6,4%
Pathologie diagnostiquée	10,1%	10,1%	10,1%	12,2%	18,4%	14,5%	10,8%	18,1%	13,1%	13,8%	12,7%	13,4%	11,7%	15,5%	12,9%
➤ Vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	6,5%	8,5%	7,2%	8,0%	10,0%	8,7%	6,7%	10,0%	7,7%	5,8%	6,4%	6,0%	6,7%	8,9%	7,4%
Plaintes, signes cliniques	6,3%	8,1%	6,9%	8,0%	10,0%	8,7%	6,6%	10,0%	7,7%	5,8%	6,4%	6,0%	6,6%	8,8%	7,3%
Gêne dans le travail	2,2%	2,1%	2,2%	5,0%	5,7%	5,3%	3,6%	5,5%	4,2%	3,4%	3,9%	3,5%	3,6%	4,5%	3,9%
Consommation médic	1,3%	2,2%	1,6%	1,9%	3,7%	2,6%	2,0%	4,6%	2,8%	1,8%	2,9%	2,2%	1,8%	3,5%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	2,8%	2,6%	2,7%	5,0%	6,4%	5,5%	3,4%	7,0%	4,5%	3,4%	3,2%	3,3%	3,6%	5,1%	4,1%
➤ Vertèbres dorsolombaires															
Existence d'un problème	14,7%	12,9%	14,1%	17,7%	22,0%	19,3%	15,9%	19,1%	16,9%	18,1%	21,9%	19,3%	16,6%	19,3%	17,5%
Plaintes, signes cliniques	14,4%	12,1%	13,6%	17,4%	21,0%	18,7%	15,4%	18,9%	16,5%	17,9%	21,3%	19,0%	16,2%	18,7%	17,1%
Gêne dans le travail	3,5%	5,2%	4,1%	9,6%	9,7%	9,6%	7,8%	12,6%	9,3%	10,2%	14,0%	11,4%	8,0%	10,8%	8,9%
Consommation médic.	2,0%	6,5%	3,5%	3,3%	8,1%	5,1%	3,9%	9,1%	5,5%	5,7%	6,1%	5,8%	3,9%	7,7%	5,2%
Pathologie diagnostiquée	8,6%	7,8%	8,3%	9,8%	14,2%	11,4%	8,6%	13,7%	10,2%	11,4%	10,4%	11,1%	9,5%	12,0%	10,3%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=472	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=778	H. Transports et entreposage n=298	I. Hébergement et restauration n=283	K. Activités financières et d'assurance n=221	M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=285	N. Activités de services administratifs et de soutien n=302	Q. Santé humaine et action sociale n=383	Région n=4026
Répartition homme/femme	70,3%/29,7%	55,4%/44,6%	72,5%/27,5%	49,5%/50,5%	40,7%/59,3%	55,8%/44,2%	55,0%/45,0%	26,1%/73,9%	55,7%/44,3%
≤24ans	6,4%	18,4%	7,0%	26,1%	4,1%	7,7%	15,6%	6,3%	11,5%
25-34ans	26,7%	28,0%	21,5%	29,3%	30,8%	34,0%	34,1%	24,8%	27,6%
35-44ans	30,5%	26,3%	36,6%	19,8%	21,7%	32,6%	26,2%	24,8%	27,8%
45-54ans	29,2%	20,7%	27,5%	18,4%	25,8%	19,3%	19,5%	32,6%	24,3%
≥55ans	7,2%	6,6%	7,4%	6,4%	17,6%	6,3%	4,6%	11,5%	8,8%
Cadres	23,7%	7,1%	8,4%	3,9%	26,2%	44,6%	6,6%	5,7%	17,5%
Intermédiaires	23,1%	16,8%	7,0%	11,0%	23,1%	23,5%	11,3%	34,5%	20,4%
Employés	11,0%	52,6%	28,5%	66,4%	49,8%	24,6%	34,8%	50,9%	36,7%
Ouvriers	41,7%	22,2%	55,4%	17,7%	0,9%	6,7%	47,0%	8,1%	24,5%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=472	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=778	H. Transports et entrepasage n=298	I. Hébergement et restauration n=283	K. Activités financières et d'assurance n=221	M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=285	N. Activités de services administratifs et de soutien n=302	Q. Santé humaine et action sociale n=383	Région n=4026
Changement de travail depuis 1an :									
Non	88,9%	85,2%	86,9%	79,9%	83,6%	84,9%	73,8%	87,7%	84,7%
Oui, raison médicale	0,6%	1,0%	1,0%	1,8%	0,9%	0,4%	1,7%	1,0%	0,9%
Oui, autre raison	10,2%	13,5%	11,4%	18,0%	15,5%	14,7%	23,8%	11,3%	14,0%
Oui, raison non précisée	0,2%	0,3%	0,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,4%
Personnes travaillant à temps plein	90,3%	82,3%	88,2%	76,2%	87,2%	87,9%	79,8%	69,2%	82,6%
Travail en journée normale	70,7%	81,2%	68,2%	67,7%	89,9%	92,1%	67,5%	70,3%	78,7%
Coupures de plus de 2 heures	9,7%	18,4%	21,8%	42,5%	6,5%	11,7%	19,9%	19,6%	17,1%
Horaires décalés	34,1%	25,7%	49,7%	46,5%	16,3%	15,4%	37,6%	31,5%	29,0%
Horaires irréguliers ou alternés	26,7%	28,1%	44,9%	36,6%	12,5%	15,2%	30,5%	34,3%	27,3%
Travail de nuit	20,1%	4,4%	20,9%	14,7%	0,5%	3,1%	18,4%	11,8%	10,8%
Déplacements professionnels > 24h	12,5%	5,4%	7,6%	1,5%	7,3%	15,0%	6,7%	3,2%	8,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	61,5%	49,9%	41,8%	47,1%	63,3%	61,8%	44,7%	46,6%	52,1%
Parmi eux :									
➤ Perturbe travail	60,0%	54,5%	50,4%	44,1%	69,4%	56,1%	51,5%	63,6%	57,7%
➤ Sans conséquence	37,1%	42,9%	41,8%	45,9%	31,2%	38,0%	38,4%	36,3%	38,8%
➤ Aspect positif sur travail	35,3%	38,3%	36,4%	44,4%	27,8%	42,3%	44,4%	29,3%	36,7%
Dépasser horaires normaux	43,8%	34,9%	43,2%	38,7%	47,3%	59,4%	36,2%	35,0%	42,6%
Sauter repas ou pas de pause	28,4%	18,5%	34,5%	27,9%	25,7%	26,6%	26,5%	31,7%	26,8%
Traiter trop vite une opération	33,3%	24,8%	24,4%	17,5%	29,2%	25,9%	22,6%	29,1%	26,3%
Travail ne permet pas d'apprendre	16,7%	23,3%	29,9%	26,8%	13,1%	7,7%	35,8%	14,2%	20,2%
Travail pas varié	20,8%	23,8%	28,3%	29,7%	20,5%	13,7%	35,7%	19,7%	21,9%
Pas de choix dans la façon de procéder	23,3%	24,3%	34,7%	23,4%	36,7%	18,0%	33,6%	20,1%	23,6%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	17,2%	17,8%	16,2%	16,8%	21,7%	11,7%	31,5%	17,5%	17,6%
Travail pas reconnu	29,1%	22,0%	26,2%	19,3%	26,9%	18,7%	27,9%	19,9%	22,9%
Formations et informations insuffisantes	21,3%	20,8%	16,8%	12,5%	16,8%	16,0%	23,2%	16,4%	18,9%
Objectifs, consignes pas clairement définis	20,0%	14,8%	17,8%	12,5%	17,3%	18,3%	18,0%	17,4%	18,1%
Pression temporelle forte (>5)	44,6%	33,8%	38,2%	30,2%	45,0%	38,7%	31,8%	38,7%	37,6%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=472	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=778	H. Transports et entreposage n=298	I. Hébergement et restauration n=283	K. Activités financières et d'assurance n=221	M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=285	N. Activités de services administratifs et de soutien n=302	Q. Santé humaine et action sociale n=383	Région n=4026
Postures contraignantes :									
Non	42,1%	31,0%	38,7%	32,9%	70,6%	63,3%	38,7%	29,7%	43,5%
Oui, difficile ou pénible	26,4%	34,8%	27,6%	30,4%	12,2%	14,5%	29,7%	33,6%	26,2%
Oui, pas difficile ou pénible	28,5%	31,0%	29,3%	33,9%	16,7%	19,4%	26,7%	32,0%	26,7%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,0%	3,2%	4,4%	2,9%	0,5%	2,8%	5,0%	4,7%	3,5%
Effort, Port de charges lourdes :									
Non	49,6%	31,2%	53,0%	30,8%	82,8%	76,7%	52,0%	37,5%	51,3%
Oui, difficile ou pénible	25,4%	34,2%	19,9%	26,9%	6,3%	10,6%	23,5%	35,6%	23,2%
Oui, pas difficile ou pénible	21,6%	30,9%	23,3%	39,1%	10,0%	11,0%	20,5%	23,7%	22,6%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,4%	3,6%	3,7%	3,2%	0,9%	1,8%	4,0%	3,2%	3,0%
Gestes répétitifs :									
Non	41,2%	27,8%	27,3%	19,9%	54,8%	55,1%	28,3%	30,0%	37,6%
Oui, difficile ou pénible	22,0%	20,9%	21,9%	20,6%	7,7%	6,3%	25,3%	23,2%	18,1%
Oui, pas difficile ou pénible	31,8%	47,1%	45,1%	56,0%	34,4%	37,2%	39,7%	42,6%	39,9%
Oui, difficile ou pénible non précisée	4,9%	4,2%	5,7%	3,6%	3,2%	1,4%	6,7%	4,2%	4,4%
Importants déplacements à pieds :									
Non	55,0%	48,6%	65,3%	47,5%	89,5%	73,2%	48,5%	51,7%	59,9%
Oui, difficile ou pénible	16,2%	16,2%	6,1%	14,7%	0,9%	2,1%	14,8%	14,7%	10,7%
Oui, pas difficile ou pénible	25,8%	32,1%	26,3%	34,9%	9,1%	23,6%	33,0%	31,2%	26,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,0%	3,1%	2,4%	2,9%	0,5%	1,1%	3,7%	2,4%	2,6%
Station debout prolongée :									
Non	41,2%	27,8%	55,0%	13,9%	87,7%	71,5%	33,8%	31,8%	44,6%
Oui, difficile ou pénible	22,1%	29,7%	14,4%	33,6%	3,7%	6,3%	28,4%	26,8%	20,4%
Oui, pas difficile ou pénible	33,3%	39,4%	27,1%	49,3%	8,2%	20,4%	32,4%	38,1%	31,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,4%	3,1%	3,4%	3,2%	0,5%	1,8%	5,4%	3,4%	3,2%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=472	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=778	H. Transports et entreposage n=298	I. Hébergement et restauration n=283	K. Activités financières et d'assurance n=221	M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=285	N. Activités de services administratifs et de soutien n=302	Q. Santé humaine et action sociale n=383	Région n=4026
Produits chimiques	34,4%	19,0%	14,9%	37,9%	2,7%	13,3%	27,8%	30,9%	22,6%
Poussières, fumées	39,3%	34,3%	36,0%	32,6%	7,7%	14,5%	48,0%	18,4%	30,4%
Rx ionisants	4,7%	0,3%	1,7%	0,4%	0,9%	4,9%	4,1%	5,8%	2,6%
Vibrations	21,0%	12,4%	31,2%	3,3%	2,3%	6,3%	17,8%	4,8%	13,9%
Gêne sonore	52,7%	33,1%	48,0%	29,5%	19,5%	22,2%	37,1%	23,7%	34,8%
Bruit > 80db	40,7%	19,2%	22,7%	17,3%	4,2%	12,8%	22,9%	12,5%	21,7%
Contrainte visuelle	36,4%	20,4%	41,9%	9,7%	43,2%	33,0%	25,3%	17,7%	28,6%
Conduite routière prolongée	10,6%	10,6%	31,1%	0,7%	10,5%	17,7%	14,4%	11,4%	13,9%
Chaleur intense	21,2%	12,6%	16,9%	30,7%	4,5%	7,8%	17,4%	12,9%	15,1%
Froid intense	14,0%	18,9%	24,0%	12,9%	1,8%	6,0%	15,8%	5,1%	13,0%
Intempéries	13,7%	9,3%	42,1%	6,1%	0,9%	8,9%	27,7%	8,2%	15,9%
Pression psychologique	31,9%	21,8%	32,2%	23,0%	32,4%	23,7%	21,1%	32,1%	26,7%
Agent biologique	7,1%	3,1%	5,1%	8,1%	0,5%	6,7%	9,1%	29,0%	7,5%
Contact avec public	37,8%	82,0%	73,5%	80,8%	58,9%	45,7%	66,2%	87,5%	66,9%

Formation	C. Industrie manufacturière n=472	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=778	H. Transports et entreposage n=298	I. Hébergement et restauration n=283	K. Activités financières et d'assurance n=221	M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=285	N. Activités de services administratifs et de soutien n=302	Q. Santé humaine et action sociale n=383	Région n=4026
A bénéficié d'une formation depuis un an	48,4%	44,9%	48,0%	33,9%	57,3%	52,7%	38,1%	49,5%	46,3%
Parmi eux :									
➤ En rapport avec travail actuel	85,1%	86,4%	84,3%	79,6%	92,8%	86,8%	85,5%	89,0%	86,5%
➤ En rapport avec travail futur	21,0%	11,7%	13,7%	21,4%	13,3%	12,5%	24,5%	13,0%	14,8%
➤ Formation d'intérêt général	49,5%	50,5%	48,2%	49,5%	45,1%	51,4%	51,9%	45,6%	49,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	32,4%	21,9%	19,9%	23,4%	25,7%	28,3%	21,2%	30,0%	26,0%

Mode de vie	C. Industrie manufacturière n=472	G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles n=778	H. Transports et entreposage n=298	I. Hébergement et restauration n=283	K. Activités financières et d'assurance n=221	M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=285	N. Activités de services administratifs et de soutien n=302	Q. Santé humaine et action sociale n=383	Région n=4026
Activité sportive régulière	54,6%	47,9%	55,1%	45,1%	49,1%	61,5%	48,3%	51,3%	51,4%
Consommation de tabac	32,8%	39,1%	40,5%	52,9%	34,8%	29,1%	47,2%	37,7%	37,8%
Consommation de tabac > 15 cig / j	7,9%	9,6%	9,3%	15,5%	7,7%	6,0%	10,6%	9,2%	9,0%
Consommation de café	79,5%	74,7%	83,0%	77,1%	78,2%	78,2%	75,3%	74,9%	77,8%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	12,0%	9,2%	12,8%	14,0%	5,1%	9,2%	12,5%	13,4%	10,7%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	19,6%	16,3%	17,2%	9,8%	19,5%	21,8%	21,4%	18,5%	17,4%

Rapport Evrest 2009-2010 – Région PACA

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles			H. Transports et entreposage			I. Hébergement et restauration			Région		
	<45ans n=300	≥45ans n=172	Ens. n=472	<45ans n=566	≥45ans n=212	Ens. n=778	<45ans n=194	≥45ans n=104	Ens. n=298	<45ans n=213	≥45ans n=70*	Ens. n=283	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Indice de masse corporelle															
➤ Normaux ou maigres	68,3%	48,2%	61,0%	69,0%	51,5%	64,2%	68,4%	52,0%	62,6%	65,8%	58,8%	64,1%	68,8%	54,0%	63,9%
➤ Surpoids	24,2%	41,7%	30,6%	22,9%	35,4%	26,3%	21,9%	39,2%	28,0%	25,2%	25,0%	25,2%	23,5%	34,1%	27,0%
➤ Obèses	7,5%	10,1%	8,5%	8,1%	13,1%	9,4%	9,6%	8,8%	9,3%	8,9%	16,2%	10,7%	7,7%	11,9%	9,1%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	3,4%	2,3%	3,0%	2,5%	6,2%	3,5%	1,6%	0,0%	1,0%	2,4%	4,3%	2,9%	2,7%	3,8%	3,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	2,3%	3,0%	2,5%	6,2%	3,5%	0,5%	0,0%	0,3%	2,4%	4,3%	2,9%	2,4%	3,6%	2,8%
Gêne dans le travail	1,0%	0,6%	0,9%	0,4%	0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%
Consommation médicamenteuse	1,7%	1,7%	1,7%	2,3%	2,4%	2,3%	1,0%	0,0%	0,7%	1,9%	1,4%	1,8%	1,9%	2,0%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	1,7%	2,4%	2,3%	3,3%	2,6%	1,6%	0,0%	1,0%	2,4%	2,9%	2,5%	2,4%	2,5%	2,4%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	1,4%	5,8%	3,0%	1,8%	6,1%	3,0%	2,1%	4,9%	3,1%	2,9%	8,6%	4,3%	2,1%	5,3%	3,1%
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	5,8%	3,0%	1,8%	5,2%	2,7%	2,1%	3,9%	2,7%	2,9%	5,7%	3,6%	1,8%	4,5%	2,7%
Gêne dans le travail	0,0%	0,6%	0,2%	0,9%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	4,3%	1,8%	0,5%	0,9%	0,6%
Consommation médicamenteuse	0,0%	4,7%	1,7%	0,9%	4,7%	1,9%	0,5%	3,9%	1,7%	1,0%	4,3%	1,8%	0,4%	3,3%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	0,3%	5,3%	2,1%	1,8%	5,7%	2,8%	1,6%	3,9%	2,4%	1,5%	8,6%	3,3%	1,4%	4,4%	2,4%
HTA															
Existence d'un problème	2,7%	13,5%	6,7%	1,8%	15,3%	5,5%	2,1%	12,7%	5,8%	0,0%	10,0%	2,5%	1,9%	13,5%	5,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	11,7%	6,0%	1,4%	11,1%	4,1%	2,1%	9,8%	4,8%	0,0%	7,1%	1,8%	1,7%	10,3%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	1,8%	0,6%	0,2%	0,5%	0,3%	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,8%	0,3%
Consommation médicamenteuse	1,0%	11,7%	5,0%	0,7%	12,0%	3,8%	0,0%	6,9%	2,4%	0,0%	7,1%	1,8%	0,7%	9,9%	3,7%
Pathologie diagnostiquée	1,0%	10,5%	4,5%	0,9%	13,0%	4,2%	0,5%	8,9%	3,4%	0,0%	8,6%	2,2%	0,9%	10,7%	4,2%
Digestif															
Existence d'un problème	8,2%	10,7%	9,1%	5,0%	7,6%	5,7%	5,8%	5,8%	5,8%	4,9%	4,3%	4,7%	6,0%	7,8%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	9,5%	8,7%	5,0%	7,6%	5,7%	5,8%	5,8%	5,8%	4,9%	4,3%	4,7%	5,9%	7,6%	6,5%
Gêne dans le travail	1,4%	0,0%	0,9%	1,6%	1,0%	1,4%	1,1%	0,0%	0,7%	1,5%	0,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Consommation médicamenteuse	3,4%	4,1%	3,7%	2,0%	3,3%	2,3%	2,6%	1,9%	2,4%	2,9%	2,9%	2,9%	2,7%	3,1%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	5,1%	5,9%	5,4%	2,7%	5,2%	3,4%	4,2%	1,0%	3,1%	2,0%	4,3%	2,5%	3,6%	4,9%	4,0%
Dermatologie															
Existence d'un problème	6,9%	2,9%	5,4%	5,8%	4,3%	5,4%	3,7%	3,9%	3,8%	4,4%	2,9%	4,0%	5,0%	4,2%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,9%	2,9%	5,4%	5,8%	4,3%	5,4%	3,2%	3,9%	3,4%	4,4%	2,9%	4,0%	4,9%	4,1%	4,6%
Gêne dans le travail	1,0%	0,6%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,5%	0,0%	0,3%	0,5%	0,0%	0,4%	0,6%	0,5%	0,6%
Consommation médicamenteuse	3,8%	1,2%	2,8%	2,7%	1,0%	2,2%	2,6%	0,0%	1,7%	2,9%	0,0%	2,2%	2,2%	1,4%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	5,9%	1,8%	4,3%	5,2%	3,8%	4,8%	3,2%	2,9%	3,1%	3,9%	1,5%	3,3%	3,8%	3,1%	3,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Evrest 2009-2010 – Région PACA

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles			H. Transports et entreposage			I. Hébergement et restauration			Région		
	<45ans n=300	≥45ans n=172	Ens. n=472	<45ans n=566	≥45ans n=212	Ens. n=778	<45ans n=194	≥45ans n=104	Ens. n=298	<45ans n=213	≥45ans n=70*	Ens. n=283	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	3,5%	14,6%	7,7%	2,9%	8,2%	4,3%	4,7%	6,8%	5,5%	2,5%	0,0%	1,9%	2,8%	8,0%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	12,9%	6,8%	2,7%	8,2%	4,2%	4,2%	6,8%	5,1%	2,5%	0,0%	1,9%	2,5%	7,4%	4,1%
Gêne dans le travail	0,4%	2,9%	1,3%	1,1%	2,4%	1,4%	0,5%	1,9%	1,0%	1,5%	0,0%	1,1%	1,0%	2,4%	1,5%
Consommation médicamenteuse	0,4%	0,6%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	10,6%	4,8%	2,5%	6,3%	3,5%	4,2%	1,9%	3,4%	2,0%	0,0%	1,5%	2,0%	5,5%	3,2%
➤ Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	11,6%	20,3%	14,8%	8,6%	15,1%	10,4%	11,5%	13,6%	12,2%	6,3%	8,6%	6,9%	9,5%	15,8%	11,6%
Plaintes ou signes cliniques	11,3%	20,3%	14,7%	8,6%	14,6%	10,2%	11,1%	13,6%	11,9%	6,3%	8,6%	6,9%	9,3%	15,5%	11,4%
Gêne dans le travail	6,8%	8,7%	7,5%	4,3%	7,1%	5,1%	7,3%	4,9%	6,5%	4,4%	5,7%	4,7%	5,2%	7,7%	6,0%
Consommation médicamenteuse	1,4%	1,8%	1,5%	1,1%	1,4%	1,2%	1,6%	4,9%	2,7%	0,5%	2,9%	1,1%	1,3%	3,5%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	3,5%	2,8%	3,4%	5,2%	3,9%	3,7%	7,8%	5,1%	1,0%	4,3%	1,8%	3,2%	6,4%	4,3%
➤ Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	13,3%	14,5%	13,7%	9,4%	13,8%	10,6%	7,3%	14,6%	9,9%	7,3%	11,4%	8,3%	9,9%	14,5%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	12,9%	14,5%	13,5%	9,2%	13,8%	10,5%	7,3%	14,6%	9,9%	7,3%	11,4%	8,3%	9,7%	14,3%	11,2%
Gêne dans le travail	5,5%	7,6%	6,3%	4,2%	5,3%	4,5%	4,2%	6,8%	5,1%	3,9%	5,7%	4,3%	4,3%	6,1%	4,9%
Consommation médicamenteuse	1,0%	2,3%	1,5%	2,0%	3,8%	2,5%	1,6%	5,8%	3,1%	1,5%	7,1%	2,9%	2,3%	4,9%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,8%	3,5%	3,7%	2,9%	6,7%	3,9%	2,6%	5,8%	3,8%	2,9%	8,6%	4,4%	3,9%	6,8%	4,9%
➤ Trouble du sommeil															
Existence d'un problème	8,8%	18,0%	12,2%	7,0%	14,3%	9,0%	11,1%	10,8%	11,0%	6,8%	7,1%	6,9%	8,4%	15,7%	10,8%
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	18,0%	12,2%	7,0%	14,3%	9,0%	11,1%	10,8%	11,0%	6,8%	7,1%	6,9%	8,3%	15,4%	10,7%
Gêne dans le travail	4,4%	6,4%	5,2%	3,2%	4,8%	3,7%	3,7%	3,9%	3,8%	3,4%	2,9%	3,2%	3,6%	5,3%	4,2%
Consommation médicamenteuse	1,7%	1,7%	1,7%	1,3%	4,8%	2,2%	1,1%	5,9%	2,7%	1,0%	2,9%	1,4%	1,7%	4,2%	2,6%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	4,7%	2,8%	3,1%	6,7%	4,0%	2,1%	5,9%	3,4%	1,9%	4,3%	2,5%	3,0%	6,1%	4,0%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	2,7%	7,0%	4,3%	1,6%	2,4%	1,8%	1,6%	3,9%	2,4%	1,4%	2,9%	1,8%	2,6%	5,2%	3,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	7,0%	4,3%	1,6%	1,9%	1,7%	1,6%	3,9%	2,4%	1,4%	2,9%	1,8%	2,6%	4,9%	3,3%
Gêne dans le travail	1,0%	2,9%	1,7%	0,9%	1,4%	1,0%	1,0%	2,9%	1,7%	1,0%	1,4%	1,1%	1,2%	2,1%	1,5%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,6%	0,2%	0,5%	0,0%	0,4%	0,5%	1,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	1,1%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	0,3%	1,7%	0,9%	0,7%	0,5%	0,6%	0,5%	1,9%	1,0%	0,5%	0,0%	0,4%	1,0%	2,1%	1,4%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles			H. Transports et entreposage			I. Hébergement et restauration			Région		
	<45ans n=300	≥45ans n=172	Ens. n=472	<45ans n=566	≥45ans n=212	Ens. n=778	<45ans n=194	≥45ans n=104	Ens. n=298	<45ans n=213	≥45ans n=70*	Ens. n=283	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessous)</i>															
Existence d'un problème	8,2%	18,7%	12,1%	9,7%	22,2%	13,1%	9,6%	14,9%	11,4%	5,9%	10,0%	6,9%	7,7%	16,5%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	18,1%	11,9%	9,7%	21,7%	12,9%	9,6%	14,9%	11,4%	5,9%	10,0%	6,9%	7,6%	16,2%	10,5%
Gêne dans le travail	5,8%	11,7%	8,0%	5,5%	14,6%	8,0%	4,3%	8,9%	5,9%	3,0%	7,1%	4,0%	4,3%	9,4%	6,0%
Consommation médicamenteuse	1,7%	5,8%	3,2%	1,4%	8,3%	3,3%	1,1%	4,0%	2,1%	1,5%	5,7%	2,6%	1,4%	5,5%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	11,7%	6,3%	5,9%	16,5%	8,8%	5,3%	10,9%	7,3%	3,4%	5,7%	4,0%	4,4%	11,1%	6,6%
➤ Epaule															
Existence d'un problème	4,8%	10,5%	6,9%	3,9%	13,3%	6,5%	5,8%	5,9%	5,9%	2,9%	4,3%	3,3%	4,0%	9,5%	5,9%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	9,9%	6,7%	3,9%	13,3%	6,5%	5,8%	5,9%	5,9%	2,9%	4,3%	3,3%	4,0%	9,3%	5,7%
Gêne dans le travail	3,4%	5,8%	4,3%	2,0%	10,0%	4,2%	2,1%	3,0%	2,4%	1,0%	1,4%	1,1%	2,1%	5,4%	3,2%
Consommation médicamenteuse	0,7%	4,7%	2,2%	0,5%	6,2%	2,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,5%	1,4%	0,7%	0,7%	3,9%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	6,4%	3,2%	2,1%	10,0%	4,3%	2,1%	3,0%	2,4%	1,5%	1,4%	1,5%	2,1%	6,0%	3,4%
➤ Coude															
Existence d'un problème	0,3%	4,1%	1,7%	1,8%	5,3%	2,7%	1,1%	6,8%	3,1%	1,0%	0,0%	0,7%	1,2%	4,1%	2,2%
Plaintes ou signes cliniques	0,3%	3,5%	1,5%	1,8%	5,3%	2,7%	1,1%	6,8%	3,1%	1,0%	0,0%	0,7%	1,2%	3,8%	2,1%
Gêne dans le travail	0,0%	3,5%	1,3%	1,1%	4,3%	2,0%	0,5%	2,9%	1,4%	0,5%	0,0%	0,4%	0,7%	2,1%	1,2%
Consommation médicamenteuse	0,0%	1,2%	0,4%	0,2%	1,9%	0,7%	0,0%	1,0%	0,3%	0,5%	0,0%	0,4%	0,3%	1,2%	0,6%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	4,1%	1,5%	0,9%	4,3%	1,8%	1,1%	4,9%	2,4%	0,5%	0,0%	0,4%	0,7%	2,7%	1,3%
➤ Poignet															
Existence d'un problème	4,1%	6,4%	4,9%	5,5%	10,5%	6,9%	3,2%	3,9%	3,4%	2,9%	5,7%	3,6%	3,4%	6,6%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	4,1%	6,4%	4,9%	5,5%	10,0%	6,7%	3,2%	3,9%	3,4%	2,9%	5,7%	3,6%	3,4%	6,4%	4,4%
Gêne dans le travail	3,1%	3,5%	3,2%	3,7%	6,2%	4,4%	2,1%	2,9%	2,4%	1,5%	5,7%	2,5%	2,1%	3,8%	2,7%
Consommation médicamenteuse	1,4%	0,0%	0,9%	1,3%	4,8%	2,2%	0,0%	1,9%	0,7%	0,5%	4,3%	1,5%	0,8%	2,2%	1,2%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	2,3%	2,4%	3,4%	7,1%	4,4%	2,1%	2,9%	2,4%	1,5%	4,3%	2,2%	2,0%	4,6%	2,9%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles			H. Transports et entreposage			I. Hébergement et restauration			Région		
	<45ans n=300	≥45ans n=172	Ens. n=472	<45ans n=566	≥45ans n=212	Ens. n=778	<45ans n=194	≥45ans n=104	Ens. n=298	<45ans n=213	≥45ans n=70*	Ens. n=283	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	6,1%	9,9%	7,5%	6,1%	10,5%	7,3%	5,8%	7,8%	6,5%	3,9%	1,4%	3,3%	5,6%	9,3%	6,8%
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	9,9%	7,5%	5,9%	10,5%	7,1%	5,2%	7,8%	6,1%	3,9%	1,4%	3,3%	5,4%	9,2%	6,7%
Gêne dans le travail	3,1%	4,1%	3,4%	3,2%	5,7%	3,9%	1,6%	1,0%	1,4%	2,0%	1,4%	1,8%	2,3%	3,8%	2,8%
Consommation médicamenteuse	1,0%	1,2%	1,1%	1,8%	5,2%	2,7%	1,0%	1,9%	1,4%	0,5%	1,4%	0,7%	1,4%	3,1%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	5,2%	3,9%	4,3%	8,6%	5,4%	5,2%	4,9%	5,1%	2,0%	1,4%	1,8%	4,0%	7,1%	5,0%
Troubles ostéoarticulaires du rachis															
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>															
Existence d'un problème	22,4%	22,2%	22,4%	26,6%	31,0%	27,8%	18,3%	23,3%	20,1%	14,8%	18,8%	15,8%	20,1%	24,4%	21,6%
Plaintes ou signes cliniques	22,4%	21,2%	22,0%	26,1%	30,5%	27,3%	18,3%	23,3%	20,1%	12,8%	17,6%	14,0%	19,7%	23,9%	21,1%
Gêne dans le travail	12,2%	12,4%	12,3%	14,8%	19,1%	16,0%	10,3%	10,8%	10,5%	7,4%	10,3%	8,1%	10,3%	13,2%	11,3%
Consommation médicamenteuse	4,8%	7,6%	5,8%	6,7%	14,8%	8,9%	7,6%	4,9%	6,6%	3,0%	7,4%	4,1%	4,7%	9,7%	6,4%
Pathologie diagnostiquée	12,6%	11,8%	12,3%	15,4%	22,4%	17,3%	12,0%	10,8%	11,5%	6,9%	13,2%	8,5%	11,7%	15,5%	12,9%
➤ Vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	9,2%	7,0%	8,4%	7,2%	10,9%	8,2%	9,0%	10,7%	9,6%	3,4%	5,7%	4,0%	6,7%	8,9%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	9,2%	7,0%	8,4%	7,2%	10,9%	8,2%	9,0%	10,7%	9,6%	3,4%	5,7%	4,0%	6,6%	8,8%	7,3%
Gêne dans le travail	5,1%	4,7%	4,9%	4,3%	6,6%	4,9%	4,8%	4,9%	4,8%	1,5%	1,4%	1,5%	3,6%	4,5%	3,9%
Consommation médicamenteuse	2,0%	2,9%	2,4%	2,3%	5,7%	3,2%	3,2%	2,9%	3,1%	1,0%	1,4%	1,1%	1,8%	3,5%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	3,7%	4,1%	3,9%	4,5%	7,6%	5,3%	5,3%	3,9%	4,8%	1,0%	4,3%	1,8%	3,6%	5,1%	4,1%
➤ Vertèbres dorsolombaires															
Existence d'un problème	18,3%	18,7%	18,5%	21,9%	26,2%	23,1%	14,4%	14,6%	14,4%	14,3%	13,0%	14,0%	16,6%	19,3%	17,5%
Plaintes ou signes cliniques	18,3%	17,6%	18,1%	21,4%	25,7%	22,6%	14,4%	14,6%	14,4%	12,3%	11,8%	12,2%	16,2%	18,7%	17,1%
Gêne dans le travail	9,5%	8,8%	9,2%	11,9%	16,7%	13,2%	6,5%	6,9%	6,6%	7,4%	8,8%	7,8%	8,0%	10,8%	8,9%
Consommation médicamenteuse	4,1%	5,9%	4,7%	5,0%	12,9%	7,2%	7,0%	2,9%	5,5%	3,0%	5,9%	3,7%	3,9%	7,7%	5,2%
Pathologie diagnostiquée	10,5%	9,4%	10,1%	12,3%	18,1%	13,9%	9,1%	7,8%	8,7%	6,4%	8,8%	7,0%	9,5%	12,0%	10,3%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	K. Activités financières et d'assurance			M. Activités spécialisées scientifiques et techniques			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=125	≥45ans n=96*	Ens. n=221	<45ans n=212	≥45ans n=73*	Ens. n=285	<45ans n=229	≥45ans n=73*	Ens. n=302	<45ans n=214	≥45ans n=169	Ens. n=383	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Indice de masse corporelle															
➤ Normaux ou maigres	76,0%	55,1%	67,1%	76,6%	58,3%	71,8%	68,0%	50,0%	63,6%	68,2%	63,4%	66,1%	68,8%	54,0%	63,9%
➤ Surpoids	19,8%	33,7%	25,7%	17,1%	33,3%	21,3%	25,1%	36,1%	27,8%	20,9%	23,8%	22,1%	23,5%	34,1%	27,0%
➤ Obèses	4,1%	11,2%	7,1%	6,3%	8,3%	6,9%	6,8%	13,9%	8,6%	10,9%	12,8%	11,7%	7,7%	11,9%	9,1%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	4,8%	6,3%	5,5%	2,8%	4,1%	3,2%	3,9%	2,7%	3,7%	0,9%	3,6%	2,1%	2,7%	3,8%	3,0%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	6,3%	5,0%	2,4%	2,7%	2,5%	3,1%	2,7%	3,0%	0,9%	3,0%	1,8%	2,4%	3,6%	2,8%
Gêne dans le travail	0,8%	1,1%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,6%	0,5%
Consommation médicamenteuse	4,0%	3,2%	3,6%	1,9%	1,4%	1,8%	2,2%	0,0%	1,7%	0,5%	2,4%	1,3%	1,9%	2,0%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	4,8%	4,3%	4,6%	2,4%	2,7%	2,5%	3,5%	0,0%	2,7%	0,9%	3,6%	2,1%	2,4%	2,5%	2,4%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	5,6%	7,4%	6,4%	1,9%	2,7%	2,1%	1,3%	5,5%	2,3%	1,4%	6,6%	3,7%	2,1%	5,3%	3,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	6,3%	5,5%	1,9%	2,7%	2,1%	1,3%	4,1%	2,0%	0,9%	6,0%	3,2%	1,8%	4,5%	2,7%
Gêne dans le travail	0,0%	1,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,4%	0,7%	0,5%	1,8%	1,1%	0,5%	0,9%	0,6%
Consommation médicamenteuse	0,0%	6,3%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	2,7%	1,0%	0,0%	4,2%	1,9%	0,4%	3,3%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	6,3%	4,1%	1,4%	1,4%	1,4%	0,9%	2,7%	1,3%	0,9%	6,0%	3,2%	1,4%	4,4%	2,4%
HTA															
Existence d'un problème	4,8%	16,8%	10,0%	2,9%	13,7%	5,7%	2,6%	11,0%	4,7%	1,4%	9,0%	4,8%	1,9%	13,5%	5,8%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	15,8%	9,1%	2,9%	11,0%	5,0%	2,6%	8,2%	4,0%	0,9%	7,8%	4,0%	1,7%	10,3%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	3,2%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,3%	0,0%	0,6%	0,3%	0,1%	0,8%	0,3%
Consommation médicamenteuse	1,6%	12,6%	6,4%	1,4%	9,7%	3,6%	1,3%	8,2%	3,0%	0,9%	7,3%	3,7%	0,7%	9,9%	3,7%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	11,6%	6,4%	1,4%	11,1%	3,9%	2,6%	8,2%	4,0%	0,9%	7,2%	3,7%	0,9%	10,7%	4,2%
Digestif															
Existence d'un problème	4,8%	12,6%	8,2%	7,1%	8,2%	7,4%	5,7%	11,0%	7,0%	7,2%	6,6%	6,9%	6,0%	7,8%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	12,6%	8,2%	6,7%	6,8%	6,7%	5,7%	11,0%	7,0%	7,2%	6,6%	6,9%	5,9%	7,6%	6,5%
Gêne dans le travail	0,0%	2,1%	0,9%	1,0%	1,4%	1,1%	1,3%	0,0%	1,0%	0,5%	1,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Consommation médicamenteuse	2,4%	3,2%	2,8%	3,8%	2,7%	3,5%	2,6%	5,6%	3,3%	3,3%	3,0%	3,2%	2,7%	3,1%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	4,0%	8,5%	6,0%	3,3%	5,5%	3,9%	3,9%	4,2%	4,0%	4,8%	4,8%	4,8%	3,6%	4,9%	4,0%
Dermatologie															
Existence d'un problème	4,0%	5,4%	4,6%	2,8%	8,3%	4,2%	5,3%	1,4%	4,4%	4,8%	5,4%	5,1%	5,0%	4,2%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	5,4%	4,1%	2,8%	8,3%	4,2%	5,3%	1,4%	4,4%	4,8%	5,4%	5,1%	4,9%	4,1%	4,6%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,7%	0,0%	1,2%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%
Consommation médicamenteuse	0,8%	3,3%	1,9%	1,0%	4,2%	1,8%	0,9%	0,0%	0,7%	2,4%	1,2%	1,9%	2,2%	1,4%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	1,6%	3,3%	2,3%	1,9%	6,9%	3,2%	3,6%	0,0%	2,7%	2,4%	3,6%	2,9%	3,8%	3,1%	3,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	K. Activités financières et d'assurance			M. Activités spécialisées scientifiques et techniques			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=125	≥45ans n=96*	Ens. n=221	<45ans n=212	≥45ans n=73*	Ens. n=285	<45ans n=229	≥45ans n=73*	Ens. n=302	<45ans n=214	≥45ans n=169	Ens. n=383	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	0,0%	3,2%	1,4%	2,4%	8,5%	3,9%	2,3%	6,8%	3,4%	4,3%	3,1%	3,8%	2,8%	8,0%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	0,0%	3,2%	1,4%	1,9%	8,5%	3,6%	1,8%	6,8%	3,1%	3,9%	3,1%	3,5%	2,5%	7,4%	4,1%
Gêne dans le travail	0,0%	1,1%	0,5%	1,0%	2,8%	1,4%	0,5%	2,7%	1,0%	1,5%	1,8%	1,6%	1,0%	2,4%	1,5%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,4%	0,0%	1,4%	0,3%	0,5%	0,0%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	1,1%	0,5%	2,4%	5,6%	3,2%	1,8%	4,1%	2,4%	1,5%	1,8%	1,6%	2,0%	5,5%	3,2%
➤ Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	8,8%	18,9%	13,2%	8,5%	11,0%	9,1%	8,8%	12,3%	9,7%	10,0%	17,3%	13,2%	9,5%	15,8%	11,6%
Plaintes ou signes cliniques	8,1%	18,9%	12,8%	8,5%	11,0%	9,1%	8,8%	12,3%	9,7%	10,0%	17,3%	13,2%	9,3%	15,5%	11,4%
Gêne dans le travail	2,4%	12,8%	6,9%	4,7%	5,5%	4,9%	4,0%	4,2%	4,0%	6,2%	9,6%	7,7%	5,2%	7,7%	6,0%
Consommation médicamenteuse	0,8%	5,3%	2,8%	0,5%	1,4%	0,7%	1,3%	2,9%	1,7%	2,4%	6,6%	4,2%	1,3%	3,5%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	12,8%	7,3%	2,4%	5,5%	3,2%	3,6%	5,7%	4,1%	5,2%	9,0%	6,9%	3,2%	6,4%	4,3%
➤ Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	11,2%	16,8%	13,6%	9,0%	12,3%	9,8%	12,8%	9,6%	12,0%	7,6%	11,9%	9,5%	9,9%	14,5%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	9,7%	16,8%	12,8%	9,0%	12,3%	9,8%	12,4%	8,2%	11,4%	7,6%	11,3%	9,2%	9,7%	14,3%	11,2%
Gêne dans le travail	3,2%	9,5%	5,9%	2,4%	4,1%	2,8%	4,4%	2,7%	4,0%	2,9%	6,0%	4,2%	4,3%	6,1%	4,9%
Consommation médicamenteuse	3,2%	7,4%	5,0%	2,4%	1,4%	2,1%	3,6%	5,6%	4,1%	2,4%	4,8%	3,4%	2,3%	4,9%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	4,9%	12,6%	8,3%	4,7%	4,2%	4,6%	6,7%	2,8%	5,7%	2,9%	7,2%	4,8%	3,9%	6,8%	4,9%
➤ Trouble du sommeil															
Existence d'un problème	10,4%	17,9%	13,6%	6,1%	17,8%	9,1%	10,6%	6,8%	9,7%	7,2%	16,7%	11,4%	8,4%	15,7%	10,8%
Plaintes ou signes cliniques	9,7%	17,9%	13,2%	5,7%	17,8%	8,8%	10,6%	5,5%	9,3%	7,2%	16,7%	11,4%	8,3%	15,4%	10,7%
Gêne dans le travail	1,6%	8,4%	4,6%	1,9%	4,1%	2,5%	4,8%	0,0%	3,7%	2,4%	6,6%	4,3%	3,6%	5,3%	4,2%
Consommation médicamenteuse	0,8%	9,5%	4,6%	0,9%	1,4%	1,1%	4,8%	0,0%	3,7%	2,4%	6,0%	4,0%	1,7%	4,2%	2,6%
Pathologie diagnostiquée	3,3%	6,3%	4,6%	0,9%	2,7%	1,4%	5,3%	1,4%	4,4%	3,4%	8,4%	5,6%	3,0%	6,1%	4,0%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	4,0%	8,4%	5,9%	1,4%	2,7%	1,8%	3,1%	1,4%	2,7%	2,8%	4,2%	3,4%	2,6%	5,2%	3,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	8,4%	5,5%	1,4%	2,7%	1,8%	3,1%	0,0%	2,3%	2,8%	4,2%	3,4%	2,6%	4,9%	3,3%
Gêne dans le travail	1,6%	5,3%	3,2%	0,9%	1,4%	1,1%	1,3%	0,0%	1,0%	0,9%	2,4%	1,6%	1,2%	2,1%	1,5%
Consommation médicamenteuse	0,8%	3,2%	1,8%	0,5%	0,0%	0,4%	0,9%	0,0%	0,7%	0,9%	1,8%	1,3%	0,5%	1,1%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	6,3%	3,2%	0,9%	1,4%	1,1%	1,8%	0,0%	1,3%	1,4%	2,4%	1,8%	1,0%	2,1%	1,4%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	K. Activités financières et d'assurance			M. Activités spécialisées scientifiques et techniques			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=125	≥45ans n=96*	Ens. n=221	<45ans n=212	≥45ans n=73*	Ens. n=285	<45ans n=229	≥45ans n=73*	Ens. n=302	<45ans n=214	≥45ans n=169	Ens. n=383	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur															
<i>(l'un des 3 signes ci-dessous)</i>															
Existence d'un problème	3,2%	11,6%	6,8%	5,2%	12,3%	7,1%	7,5%	13,7%	9,0%	9,0%	19,8%	13,8%	7,7%	16,5%	10,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	11,6%	6,8%	4,8%	11,0%	6,4%	7,5%	13,7%	9,0%	9,0%	19,8%	13,8%	7,6%	16,2%	10,5%
Gêne dans le travail	2,4%	4,2%	3,2%	1,9%	9,6%	3,9%	4,0%	6,8%	4,7%	6,2%	12,2%	8,8%	4,3%	9,4%	6,0%
Consommation médicamenteuse	0,8%	2,1%	1,4%	0,5%	5,5%	1,8%	1,3%	4,1%	2,0%	1,9%	8,5%	4,8%	1,4%	5,5%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	7,4%	3,6%	3,3%	9,6%	4,9%	5,3%	6,8%	5,7%	6,2%	14,5%	9,9%	4,4%	11,1%	6,6%
➤ Epaule															
Existence d'un problème	2,4%	4,2%	3,2%	1,4%	8,2%	3,2%	3,9%	8,2%	5,0%	5,7%	11,9%	8,4%	4,0%	9,5%	5,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,4%	4,2%	3,2%	1,0%	6,8%	2,5%	3,9%	8,2%	5,0%	5,7%	11,9%	8,4%	4,0%	9,3%	5,7%
Gêne dans le travail	1,6%	3,2%	2,3%	0,5%	5,5%	1,8%	1,8%	4,1%	2,3%	3,3%	7,3%	5,1%	2,1%	5,4%	3,2%
Consommation médicamenteuse	0,8%	2,1%	1,4%	0,0%	4,1%	1,1%	0,4%	2,7%	1,0%	0,9%	5,4%	2,9%	0,7%	3,9%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	4,2%	2,3%	1,4%	6,8%	2,8%	2,6%	2,7%	2,7%	4,3%	7,8%	5,8%	2,1%	6,0%	3,4%
➤ Coude															
Existence d'un problème	0,0%	4,2%	1,8%	0,9%	4,1%	1,8%	1,8%	2,7%	2,0%	1,4%	4,2%	2,7%	1,2%	4,1%	2,2%
Plaintes ou signes cliniques	0,0%	4,2%	1,8%	0,9%	2,7%	1,4%	1,8%	2,7%	2,0%	1,4%	4,2%	2,7%	1,2%	3,8%	2,1%
Gêne dans le travail	0,0%	1,1%	0,5%	0,5%	2,7%	1,1%	1,3%	1,4%	1,3%	1,4%	2,4%	1,9%	0,7%	2,1%	1,2%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,7%	0,7%	0,4%	0,0%	0,3%	0,5%	1,8%	1,1%	0,3%	1,2%	0,6%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	2,1%	0,9%	0,5%	4,1%	1,4%	1,3%	0,0%	1,0%	0,9%	3,0%	1,9%	0,7%	2,7%	1,3%
➤ Poignet															
Existence d'un problème	1,6%	5,3%	3,2%	3,3%	5,5%	3,9%	4,0%	6,8%	4,7%	2,4%	7,1%	4,5%	3,4%	6,6%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	1,6%	5,3%	3,2%	3,3%	4,1%	3,5%	4,0%	6,8%	4,7%	2,4%	7,1%	4,5%	3,4%	6,4%	4,4%
Gêne dans le travail	0,8%	2,1%	1,4%	0,9%	4,1%	1,8%	2,2%	2,7%	2,3%	1,9%	4,2%	2,9%	2,1%	3,8%	2,7%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	2,7%	1,1%	0,9%	1,4%	1,0%	0,5%	3,0%	1,6%	0,8%	2,2%	1,2%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	3,2%	1,4%	1,4%	4,1%	2,1%	2,6%	4,1%	3,0%	1,0%	6,5%	3,4%	2,0%	4,6%	2,9%
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	4,0%	11,6%	7,3%	5,2%	4,1%	4,9%	4,4%	5,5%	4,7%	3,8%	12,0%	7,4%	5,6%	9,3%	6,8%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	11,6%	7,3%	4,8%	2,7%	4,2%	4,4%	5,5%	4,7%	3,8%	12,0%	7,4%	5,4%	9,2%	6,7%
Gêne dans le travail	2,4%	2,1%	2,3%	0,5%	0,0%	0,4%	1,8%	2,7%	2,0%	2,4%	7,8%	4,8%	2,3%	3,8%	2,8%
Consommation médicamenteuse	1,6%	3,2%	2,3%	0,0%	1,4%	0,4%	1,3%	0,0%	1,0%	1,4%	4,8%	2,9%	1,4%	3,1%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	9,6%	5,9%	3,3%	4,1%	3,5%	3,5%	4,1%	3,7%	2,8%	10,8%	6,4%	4,0%	7,1%	5,0%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	K. Activités financières et d'assurance			M. Activités spécialisées scientifiques et techniques			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=125	≥45ans n=96	Ens. n=221	<45ans n=212	≥45ans n=73*	Ens. n=285	<45ans n=229	≥45ans n=73*	Ens. n=302	<45ans n=214	≥45ans n=169	Ens. n=383	<45ans n=2692	≥45ans n=1334	Ens. n=4026
Troubles ostéoarticulaires du rachis															
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>															
Existence d'un problème	12,9%	19,4%	15,7%	19,9%	22,2%	20,5%	18,0%	17,8%	17,9%	21,0%	28,6%	24,3%	20,1%	24,4%	21,6%
Plaintes ou signes cliniques	12,9%	19,4%	15,7%	19,5%	20,8%	19,9%	17,6%	17,8%	17,7%	21,0%	28,0%	24,1%	19,7%	23,9%	21,1%
Gêne dans le travail	8,1%	10,8%	9,2%	4,9%	7,1%	5,5%	9,7%	6,8%	9,0%	11,1%	17,5%	13,9%	10,3%	13,2%	11,3%
Consommation médicamenteuse	2,4%	10,8%	6,0%	3,9%	7,1%	4,8%	3,1%	5,6%	3,7%	4,3%	14,5%	8,8%	4,7%	9,7%	6,4%
Pathologie diagnostiquée	8,9%	16,1%	12,0%	10,7%	11,4%	10,9%	11,5%	8,3%	10,7%	12,0%	21,2%	16,1%	11,7%	15,5%	12,9%
➤ Vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	4,0%	7,4%	5,5%	5,2%	9,6%	6,3%	6,1%	5,5%	6,0%	8,1%	7,7%	7,9%	6,7%	8,9%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	7,4%	5,5%	4,8%	8,2%	5,7%	6,1%	5,5%	6,0%	8,1%	7,7%	7,9%	6,6%	8,8%	7,3%
Gêne dans le travail	2,4%	3,2%	2,8%	2,4%	4,1%	2,8%	3,9%	2,7%	3,7%	3,8%	3,0%	3,4%	3,6%	4,5%	3,9%
Consommation médicamenteuse	0,8%	3,2%	1,8%	1,4%	2,7%	1,8%	0,4%	1,4%	0,7%	3,3%	3,0%	3,2%	1,8%	3,5%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	6,4%	4,6%	2,8%	4,1%	3,2%	2,6%	2,7%	2,7%	5,7%	5,4%	5,6%	3,6%	5,1%	4,1%
➤ Vertèbres dorsolombaires															
Existence d'un problème	11,3%	14,9%	12,8%	17,0%	18,3%	17,3%	14,9%	15,1%	15,0%	15,7%	23,8%	19,3%	16,6%	19,3%	17,5%
Plaintes ou signes cliniques	11,3%	14,9%	12,8%	17,0%	16,9%	17,0%	14,5%	15,1%	14,7%	15,7%	23,2%	19,0%	16,2%	18,7%	17,1%
Gêne dans le travail	7,3%	10,6%	8,7%	2,4%	7,1%	3,6%	7,5%	5,5%	7,0%	8,2%	15,7%	11,5%	8,0%	10,8%	8,9%
Consommation médicamenteuse	2,4%	8,5%	5,0%	3,9%	7,1%	4,7%	3,1%	5,6%	3,7%	1,9%	12,1%	6,4%	3,9%	7,7%	5,2%
Pathologie diagnostiquée	7,3%	12,8%	9,7%	9,2%	11,4%	9,8%	10,1%	6,9%	9,4%	7,7%	17,0%	11,8%	9,5%	12,0%	10,3%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence