



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2008-2009

Région Bourgogne

Juin 2010

afssset



Institut de Santé au Travail
du Nord de la France
Nord - Pas de Calais / Picardie



Université Lille 2
Droit et Santé

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2008-2009 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Bourgogne

L'exploitation des données de la région Bourgogne a porté sur **2 655 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2008 (n=989) et 2009 (n=1666).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Everest semble nettement plus proche du champ des salariés de l'Unedic (secteur privé) que de celui des salariés du champ des DADS (secteurs privés et public) (tableau 1).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Bourgogne 2008-2009 aux données Insee (DADS 2007) et Unedic (2008).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Bourgogne 2008-2009 (n=2 655)	Données INSEE 2007 (DADS)	Données UNEDIC 2008
	%	%	%
Sexe			
Hommes	55,3	53,3	55,3
Femmes	44,7	46,7	44,7
Age			
≤ 24 ans	13,4	16,7	-
25-34 ans	23,7	23,1	-
35-44 ans	28,4	25,6	-
45- 54 ans	26,1	24,0	-
55 ans et plus	8,4	10,7	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Salariés de leur entreprise	0,6	0,5	-
Chef d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures	7,6	7,8	-
Professions intermédiaires	20,0	20,6	-
Employés	29,3	33,9	-
Ouvriers	42,4	37,2	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,6	0,0	0,0
Industrie	29,9	21,7	26,6
Construction	7,1	7,2	9,8
Commerce	18,6	15,6	20,1
Services	43,8	55,4	43,5

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Bourgogne 2008-2009 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	15	0,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures	203	7,6
Professions intermédiaires	532	20,0
Employés	778	29,3
Ouvriers	1127	42,4
Total général	2 655	100,0

En ce qui concerne les secteurs d'activité, seuls 4 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Commerce; réparations d'automobile et de motocycles, Activités de services administratifs et de soutien, Santé humaine et action sociale.

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Bourgogne 2008-2009 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	17	0,6
A. Agriculture, sylviculture et pêche	17	0,6
INDUSTRIE	768	29,2
B. Industries extractives	7	0,3
C. Industrie manufacturière	728	27,4
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	10	0,4
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	30	1,1
CONSTRUCTION	184	6,9
F. Construction	184	6,9
COMMERCE	482	18,2
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	482	18,2
SERVICES	1137	42,8
H. Transports et entreposage	172	6,5
I. Hébergement et restauration	91	3,4
J. Information et communication	28	1,1
K. Activités financières et d'assurance	91	3,4
L. Activités immobilières	10	0,4
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	117	4,4
N. Activités de services administratifs et de soutien	196	7,4
O. Administration publique	33	1,2
P. Enseignement	28	1,1
Q. Santé humaine et action sociale	271	10,2
R. Arts, spectacles et activités récréatives	13	0,5
S. Autres activités de services	87	3,3
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0	0,0
Données manquantes	60	2,3
Total général	2655	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=1467	Femmes n=1188	Ensemble n=2655
≤24ans	13,8%	12,9%	13,4%
25-34ans	23,0%	24,5%	23,7%
35-44ans	29,7%	26,9%	28,4%
45-54ans	25,0%	27,4%	26,1%
≥55ans	8,4%	8,3%	8,4%
Conditions de travail	Hommes n=1467	Femmes n=1188	Ensemble n=2655
Changement de travail depuis 1an :			
Non	85,1%	85,1%	85,1%
Oui, raison médicale	0,8%	1,2%	0,9%
Oui, autre raison	13,8%	13,0%	13,5%
Oui, raison non précisée	0,3%	0,7%	0,5%
Personnes travaillant à temps plein	93,7%	71,8%	83,9%
Travail en journée normale	74,9%	78,8%	76,6%
Coupures de plus de 2 heures	15,9%	23,9%	19,5%
Horaires décalés	33,7%	23,7%	29,3%
Horaires irréguliers ou alternés	31,2%	26,6%	29,2%
Travail de nuit	15,6%	7,0%	11,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	13,2%	2,1%	8,3%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	48,9%	51,1%	49,9%
Parmi eux :			
➤ Perturbe travail	51,5%	56,0%	53,5%
➤ Sans conséquence	45,8%	39,1%	42,7%
➤ Aspect positif sur travail	39,0%	42,1%	40,4%
Dépasser horaires normaux	37,4%	31,4%	34,7%
Sauter repas ou pas de pause	20,7%	17,7%	19,3%
Traiter trop vite une opération	21,7%	23,2%	22,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	20,0%	20,8%	20,4%
Travail pas varié	17,5%	20,8%	19,0%
Pas de choix dans la façon de procéder	24,9%	27,4%	26,0%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	14,8%	19,7%	17,0%
Travail pas reconnu	21,8%	26,4%	23,9%
Formations et informations insuffisantes	18,7%	22,2%	20,3%
Objectifs et consignes pas clairement définis	16,4%	18,6%	17,4%
Pression temporelle forte (>5)	38,7%	35,2%	37,1%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=1467	Femmes n=1188	Ensemble n=2655
Postures contraignantes :			
Non	36,6%	45,2%	40,5%
Oui, difficile ou pénible	33,2%	30,5%	32,0%
Oui, pas difficile ou pénible	28,9%	22,7%	26,1%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,3%	1,5%	1,4%
Effort, Port de charges lourdes :			
Non	41,2%	54,7%	47,2%
Oui, difficile ou pénible	29,9%	28,5%	29,3%
Oui, pas difficile ou pénible	27,7%	15,6%	22,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,2%	1,1%	1,1%
Gestes répétitifs :			
Non	39,4%	34,2%	37,1%
Oui, difficile ou pénible	21,3%	24,1%	22,6%
Oui, pas difficile ou pénible	38,0%	39,7%	38,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,3%	1,9%	1,6%
Importants déplacements à pieds :			
Non	51,2%	66,2%	57,9%
Oui, difficile ou pénible	13,2%	11,6%	12,5%
Oui, pas difficile ou pénible	34,0%	21,3%	28,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,6%	0,9%	1,3%
Station debout prolongée :			
Non	35,2%	44,1%	39,2%
Oui, difficile ou pénible	22,7%	27,5%	24,8%
Oui, pas difficile ou pénible	40,4%	27,2%	34,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,7%	1,2%	1,5%

Expositions	Hommes n=1467	Femmes n=1188	Ensemble n=2655
Produits chimiques	31,8%	20,9%	26,9%
Poussières, fumées	50,0%	18,2%	35,8%
Rx ionisants	2,6%	2,3%	2,5%
Vibrations	31,6%	4,9%	19,6%
Gêne sonore	51,8%	28,0%	41,1%
Bruit > 80db	38,6%	10,4%	26,0%
Contrainte visuelle	29,3%	31,4%	30,3%
Conduite routière prolongée	22,7%	5,1%	14,8%
Chaleur intense	17,4%	11,5%	14,8%
Froid intense	13,3%	7,2%	10,6%
Intempéries	24,6%	3,5%	15,2%
Pression psychologique	23,5%	25,5%	24,4%
Agent biologique	7,2%	13,8%	10,1%
Contact avec public	59,6%	70,0%	64,3%

Formation	Hommes n=1467	Femmes n=1188	Ensemble n=2655
A bénéficié d'une formation depuis un an	43,8%	41,6%	42,8%
Parmi eux :			
➤ En rapport avec travail actuel	89,8%	91,5%	90,6%
➤ En rapport avec travail futur	17,9%	16,0%	17,1%
➤ Formation d'intérêt général	45,0%	43,1%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	26,8%	23,3%	25,2%

Mode de vie	Hommes n=1467	Femmes n=1188	Ensemble n=2655
Activité sportive régulière	44,6%	45,3%	44,9%
Consommation de tabac	42,4%	31,0%	37,3%
Consommation de tabac>15 cig / j	12,0%	5,6%	9,1%
Consommation de café	84,5%	72,1%	78,9%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	18,1%	9,0%	14,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,1%	13,3%	13,7%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2655
	Hommes n=977	Femmes n=763	Ensemble n=1740	Hommes n=490	Femmes n=425	Ensemble n=915	
Indice de masse corporelle							
➤ Normaux ou maigres	54,9%	68,4%	60,8%	35,1%	57,8%	45,6%	55,6%
➤ Surpoids	32,6%	20,7%	27,4%	43,7%	26,3%	35,7%	30,2%
➤ Obèses	12,5%	10,9%	11,8%	21,2%	15,9%	18,7%	14,2%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	4,0%	3,2%	3,6%	7,8%	5,0%	6,5%	4,6%
Plaîntes ou signes cliniques	3,7%	2,6%	3,2%	7,4%	4,3%	5,9%	4,2%
Gêne dans le travail	0,6%	0,8%	0,7%	1,2%	0,7%	1,0%	0,8%
Consommation médicamenteuse	2,2%	2,6%	2,4%	3,3%	3,3%	3,3%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	3,0%	2,6%	2,8%	4,7%	3,8%	4,3%	3,3%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	2,8%	3,2%	3,0%	9,2%	4,8%	7,1%	4,4%
Plaîntes ou signes cliniques	1,8%	2,9%	2,3%	7,6%	4,3%	6,0%	3,6%
Gêne dans le travail	0,3%	1,6%	0,9%	0,8%	1,7%	1,2%	1,0%
Consommation médicamenteuse	1,2%	0,9%	1,1%	5,1%	2,4%	3,9%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	2,6%	2,1%	7,0%	3,3%	5,3%	3,2%
HTA							
Existence d'un problème	4,1%	2,4%	3,3%	19,3%	13,7%	16,7%	8,0%
Plaîntes ou signes cliniques	3,3%	1,5%	2,5%	14,0%	9,6%	12,0%	5,7%
Gêne dans le travail	0,2%	0,3%	0,2%	0,6%	1,2%	0,9%	0,5%
Consommation médicamenteuse	1,7%	1,5%	1,6%	14,0%	11,3%	12,7%	5,4%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	1,5%	2,0%	16,0%	11,8%	14,1%	6,2%
➤ Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	12,4%	22,3%	16,8%	19,6%	30,5%	24,6%	19,5%
Plaîntes ou signes cliniques	12,2%	22,2%	16,6%	19,6%	30,1%	24,4%	19,3%
Gêne dans le travail	5,3%	10,1%	7,4%	8,0%	14,9%	11,2%	8,7%
Consommation médicamenteuse	1,3%	4,5%	2,7%	1,6%	4,6%	3,0%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	4,9%	3,5%	3,1%	8,7%	5,6%	4,2%
➤ Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	16,1%	24,7%	19,9%	19,0%	32,1%	25,1%	21,7%
Plaîntes ou signes cliniques	16,0%	24,4%	19,7%	18,5%	31,4%	24,4%	21,3%
Gêne dans le travail	6,3%	10,1%	7,9%	7,0%	14,7%	10,5%	8,8%
Consommation médicamenteuse	2,1%	4,0%	2,9%	3,1%	9,3%	5,9%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	5,6%	4,6%	3,7%	10,3%	6,7%	5,3%
➤ Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	13,2%	19,9%	16,1%	20,5%	35,0%	27,2%	20,0%
Plaîntes ou signes cliniques	13,2%	19,9%	16,1%	20,1%	34,1%	26,5%	19,7%
Gêne dans le travail	4,8%	6,9%	5,8%	5,8%	7,8%	6,7%	6,1%
Consommation médicamenteuse	0,9%	3,1%	1,9%	4,9%	11,4%	7,9%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	2,0%	4,0%	2,9%	5,5%	8,9%	7,1%	4,3%
Troubles neuro psychiques							
(les 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	3,3%	7,9%	5,3%	5,9%	14,9%	10,1%	7,0%
Plaîntes ou signes cliniques	3,2%	7,8%	5,2%	5,9%	13,9%	9,6%	6,7%
Gêne dans le travail	1,1%	2,0%	1,5%	1,8%	4,1%	2,9%	2,0%
Consommation médicamenteuse	0,2%	0,9%	0,5%	0,4%	2,4%	1,3%	0,8%
Pathologie diagnostiquée	0,3%	1,3%	0,8%	1,4%	3,6%	2,4%	1,3%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2655
	Hommes n=977	Femmes n=763	Ensemble n=1740	Hommes n=490	Femmes n=425	Ensemble n=915	
Digestif							
Existence d'un problème	4,5%	5,5%	4,9%	10,2%	13,1%	11,5%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	5,5%	4,9%	8,7%	12,6%	10,6%	6,9%
Gêne dans le travail	0,9%	0,7%	0,8%	1,2%	2,2%	1,7%	1,1%
Consommation médicamenteuse	1,9%	1,7%	1,8%	4,6%	6,7%	5,6%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	2,5%	2,5%	6,5%	8,6%	7,5%	4,2%
Dermatologie							
Existence d'un problème	6,3%	7,4%	6,8%	11,0%	5,8%	8,6%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	7,0%	6,5%	10,6%	5,8%	8,4%	7,2%
Gêne dans le travail	1,2%	1,6%	1,3%	1,2%	0,7%	1,0%	1,2%
Consommation médicamenteuse	2,9%	3,6%	3,2%	4,3%	3,1%	3,8%	3,4%
Pathologie diagnostiquée	4,4%	5,4%	4,8%	8,8%	4,6%	6,9%	5,5%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	7,8%	3,7%	6,0%	21,2%	5,3%	13,9%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	3,7%	5,6%	19,2%	5,3%	12,8%	8,1%
Gêne dans le travail	1,3%	1,2%	1,2%	3,5%	2,6%	3,1%	1,9%
Consommation médicamenteuse	0,4%	0,4%	0,4%	0,8%	0,7%	0,8%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	5,5%	2,2%	4,1%	13,9%	3,4%	9,1%	5,8%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	10,6%	12,1%	11,3%	21,7%	32,5%	26,7%	16,6%
Plaintes ou signes cliniques	10,6%	11,9%	11,1%	21,3%	31,7%	26,1%	16,3%
Gêne dans le travail	6,0%	6,6%	6,3%	10,3%	19,9%	14,7%	9,2%
Consommation médicamenteuse	2,0%	2,6%	2,3%	4,5%	12,4%	8,1%	4,3%
Pathologie diagnostiquée	5,1%	5,3%	5,2%	12,1%	20,1%	15,8%	8,8%
➤ Epaule							
Existence d'un problème	5,8%	7,4%	6,5%	13,5%	21,4%	17,2%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	7,2%	6,4%	13,3%	21,0%	16,8%	10,0%
Gêne dans le travail	3,4%	4,1%	3,7%	6,1%	12,5%	9,1%	5,6%
Consommation médicamenteuse	1,2%	1,8%	1,5%	2,7%	8,4%	5,3%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	2,8%	2,7%	7,8%	11,5%	9,5%	5,1%
➤ Coude							
Existence d'un problème	2,5%	3,0%	2,7%	7,8%	8,8%	8,3%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	2,9%	2,7%	7,8%	8,6%	8,2%	4,6%
Gêne dans le travail	1,5%	2,4%	1,9%	4,5%	5,5%	5,0%	2,9%
Consommation médicamenteuse	0,6%	1,1%	0,8%	2,3%	3,1%	2,7%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	1,0%	1,7%	1,3%	3,5%	5,5%	4,4%	2,4%
➤ Poignet							
Existence d'un problème	4,1%	5,1%	4,6%	7,8%	14,3%	10,8%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,1%	5,0%	4,5%	7,6%	13,8%	10,5%	6,6%
Gêne dans le travail	2,5%	2,6%	2,6%	3,3%	8,4%	5,6%	3,6%
Consommation médicamenteuse	0,5%	1,1%	0,8%	1,6%	4,6%	3,0%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	2,0%	2,6%	2,3%	4,5%	7,9%	6,1%	3,6%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2655
	Hommes n=977	Femmes n=763	Ensemble n=1740	Hommes n=490	Femmes n=425	Ensemble n=915	
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	9,1%	9,4%	9,2%	15,6%	17,1%	16,3%	11,7%
Plaintes ou signes cliniques	9,1%	9,2%	9,2%	15,2%	16,9%	16,0%	11,5%
Gêne dans le travail	5,1%	4,7%	4,9%	8,0%	6,3%	7,2%	5,7%
Consommation médicamenteuse	1,5%	2,1%	1,7%	4,9%	6,3%	5,5%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	5,4%	4,6%	5,1%	8,6%	10,0%	9,3%	6,5%
Troubles ostéoarticulaires du rachis							
(l'un des 2 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	22,3%	25,4%	23,7%	35,2%	39,1%	37,0%	28,3%
Plaintes ou signes cliniques	22,2%	25,1%	23,5%	33,6%	38,8%	36,0%	27,8%
Gêne dans le travail	12,8%	14,2%	13,4%	21,9%	20,7%	21,3%	16,1%
Consommation médicamenteuse	5,0%	7,4%	6,0%	10,7%	16,4%	13,3%	8,5%
Pathologie diagnostiquée	8,6%	8,7%	8,6%	19,3%	21,2%	20,2%	12,6%
➤ Vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	7,0%	11,8%	9,1%	12,9%	25,5%	18,7%	12,4%
Plaintes ou signes cliniques	7,0%	11,8%	9,1%	12,7%	25,5%	18,7%	12,4%
Gêne dans le travail	3,2%	7,1%	5,0%	7,6%	12,5%	9,9%	6,6%
Consommation médicamenteuse	1,3%	3,7%	2,3%	3,1%	9,4%	6,0%	3,6%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	3,7%	3,0%	5,8%	11,8%	8,6%	4,9%
➤ Vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	19,3%	18,9%	19,1%	29,3%	27,8%	28,6%	22,4%
Plaintes ou signes cliniques	19,2%	18,6%	18,9%	27,6%	27,5%	27,6%	21,9%
Gêne dans le travail	11,5%	9,6%	10,6%	17,3%	15,2%	16,3%	12,6%
Consommation médicamenteuse	4,0%	5,5%	4,6%	8,6%	12,7%	10,5%	6,7%
Pathologie diagnostiquée	6,9%	6,3%	6,6%	16,0%	15,6%	15,8%	9,8%

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles

Description de la population	Cadres n=203	Intermédiaires n=532	Employés n=778	Ouvriers n=1127	Ensemble (region) n=2655
C Industrie manufacturière	27,6%	28,2%	6,2%	41,8%	27,4%
G Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles	15,8%	17,5%	29,2%	11,2%	18,2%
Q Santé humaine et action sociale	5,4%	16,7%	19,8%	1,4%	10,2%
Répartition homme/femme	66%/34,0%	51,1%/48,9%	18,6%/81,4%	79,9%/20,1%	55,3%/44,7%
≤24ans	1,5%	10,3%	17,4%	14,5%	13,4%
25-34ans	27,6%	29,9%	24,6%	19,6%	23,7%
35-44ans	34,5%	29,3%	24,2%	29,9%	28,4%
45-54ans	28,6%	22,4%	25,7%	27,5%	26,1%
≥55ans	7,9%	8,1%	8,2%	8,5%	8,4%

Conditions de travail	Cadres n=203	Intermédiaires n=532	Employés n=778	Ouvriers n=1127	Ensemble (region) n=2655
Changement de travail depuis 1an :					
Non	82,8%	88,5%	84,7%	84,3%	85,1%
Oui, raison médicale	2,0%	0,0%	0,3%	1,7%	0,9%
Oui, autre raison	14,8%	11,3%	14,5%	13,4%	13,5%
Oui, raison non précisée	0,5%	0,2%	0,5%	0,6%	0,5%
Personnes travaillant à temps plein	89,4%	88,3%	68,4%	91,3%	83,9%
Travail en journée normale	90,3%	86,3%	79,7%	67,3%	76,6%
Coupures de plus de 2 heures	20,7%	14,7%	29,8%	14,6%	19,5%
Horaires décalés	22,6%	18,3%	25,3%	38,3%	29,3%
Horaires irréguliers ou alternés	18,3%	17,6%	30,2%	36,0%	29,2%
Travail de nuit	3,0%	6,6%	7,5%	18,8%	11,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	24,3%	9,7%	1,6%	8,5%	8,3%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	73,3%	61,7%	51,0%	38,8%	49,9%
Parmi eux :					
➤ Perturbe travail	59,3%	61,2%	50,3%	49,1%	53,5%
➤ Sans conséquence	41,8%	40,4%	41,6%	45,4%	42,7%
➤ Aspect positif sur travail	48,6%	40,1%	42,0%	35,8%	40,4%
Dépasser horaires normaux	71,8%	50,0%	29,6%	23,6%	34,7%
Sauter repas ou pas de pause	31,2%	27,7%	16,4%	14,9%	19,3%
Traiter trop vite une opération	38,6%	28,2%	19,8%	18,0%	22,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	4,5%	8,6%	18,8%	30,0%	20,4%
Travail pas varié	6,4%	8,3%	22,6%	24,1%	19,0%
Pas de choix dans la façon de procéder	8,5%	17,8%	27,5%	32,1%	26,0%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	13,6%	14,7%	19,0%	17,3%	17,0%
Travail pas reconnu	13,5%	22,5%	24,0%	26,6%	23,9%
Formations et informations insuffisantes	14,9%	21,7%	19,9%	21,1%	20,3%
Objectifs et consignes pas clairement définis	19,9%	21,4%	15,8%	16,3%	17,4%
Pression temporelle forte (>5)	56,9%	42,0%	32,1%	34,7%	37,1%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=203	Intermédiaires n=532	Employés n=778	Ouvriers n=1127	Ensemble (region) n=2655
Postures contraignantes :					
Non	71,6%	56,1%	43,5%	24,9%	40,5%
Oui, difficile ou pénible	9,5%	19,8%	33,2%	41,3%	32,0%
Oui, pas difficile ou pénible	16,4%	23,4%	21,6%	32,5%	26,1%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,5%	0,8%	1,7%	1,3%	1,4%
Effort, Port de charges lourdes :					
Non	82,0%	59,9%	52,1%	31,1%	47,2%
Oui, difficile ou pénible	6,5%	19,8%	28,6%	38,6%	29,3%
Oui, pas difficile ou pénible	10,5%	19,3%	18,0%	29,1%	22,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,0%	0,9%	1,3%	1,2%	1,1%
Gestes répétitifs :					
Non	75,6%	60,9%	30,4%	22,8%	37,1%
Oui, difficile ou pénible	4,5%	11,1%	24,6%	30,1%	22,6%
Oui, pas difficile ou pénible	19,4%	26,9%	42,6%	45,7%	38,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	0,5%	1,1%	2,4%	1,4%	1,6%
Importants déplacements à pieds :					
Non	79,4%	64,5%	61,7%	48,2%	57,9%
Oui, difficile ou pénible	1,5%	9,6%	13,3%	15,3%	12,5%
Oui, pas difficile ou pénible	18,6%	24,6%	24,1%	34,7%	28,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	0,5%	1,3%	0,9%	1,8%	1,3%
Station debout prolongée :					
Non	73,5%	52,8%	39,9%	25,7%	39,2%
Oui, difficile ou pénible	7,0%	17,7%	27,4%	29,8%	24,8%
Oui, pas difficile ou pénible	18,5%	27,7%	31,4%	42,8%	34,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,0%	1,7%	1,3%	1,6%	1,5%

Expositions	Cadres n=203	Intermédiaires n=532	Employés n=778	Ouvriers n=1127	Région n=2655
Produits chimiques	9,9%	21,2%	18,8%	38,5%	26,9%
Poussières, fumées	9,0%	22,2%	14,4%	62,1%	35,8%
Rx ionisants	1,5%	4,0%	2,4%	2,0%	2,5%
Vibrations	4,5%	7,7%	3,6%	39,4%	19,6%
Gêne sonore	17,4%	29,0%	21,2%	65,4%	41,1%
Bruit > 80db	7,5%	14,6%	5,1%	49,5%	26,0%
Contrainte visuelle	40,6%	33,8%	25,8%	30,0%	30,3%
Conduite routière prolongée	24,9%	20,3%	4,3%	17,2%	14,8%
Chaleur intense	4,5%	6,8%	12,4%	22,1%	14,8%
Froid intense	2,5%	4,7%	8,0%	16,7%	10,6%
Intempéries	5,0%	10,2%	4,7%	26,5%	15,2%
Pression psychologique	34,8%	30,1%	22,9%	20,6%	24,4%
Agent biologique	3,0%	14,5%	14,5%	6,5%	10,1%
Contact avec public	72,3%	74,0%	84,0%	44,5%	64,3%

Formation	Cadres n=203	Intermédiaires n=532	Employés n=778	Ouvriers n=1127	Région n=2655
A bénéficié d'une formation depuis un an	57,7%	55,6%	40,2%	35,8%	42,8%
Parmi eux :					
➤ En rapport avec travail actuel	91,2%	93,8%	92,9%	86,0%	90,6%
➤ En rapport avec travail futur	22,9%	12,4%	15,4%	20,2%	17,1%
➤ Formation d'intérêt général	50,0%	43,9%	44,8%	41,8%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	49,0%	32,2%	22,6%	18,9%	25,2%

Mode de vie	Cadres n=203	Intermédiaires n=532	Employés n=778	Ouvriers n=1127	Région n=2655
Activité sportive régulière	57,5%	50,2%	44,8%	40,1%	44,9%
Consommation de tabac	23,5%	30,4%	34,1%	45,5%	37,3%
Consommation de tabac>15 cig / j	5,5%	5,2%	7,4%	13,0%	9,1%
Consommation de café	76,5%	79,8%	72,6%	83,2%	78,9%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	13,0%	12,5%	8,3%	18,8%	14,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,1%	18,3%	11,9%	12,1%	13,7%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=129	≥45ans n=74*	Ens. n=203	<45ans n=370	≥45ans n=162	Ens. n=532	<45ans n=514	≥45ans n=264	Ens. n=778	<45ans n=721	≥45ans n=406	Ens. n=1127	<45ans n=1740	≥45ans n=915	Ens. n=2655
Indice de masse corporelle															
➤ Normaux ou maigres	56,2%	42,5%	51,0%	63,5%	49,7%	59,4%	64,8%	57,4%	62,3%	57,5%	37,9%	50,5%	60,8%	45,6%	55,6%
➤ Surpoids	33,1%	37,0%	34,5%	26,5%	35,5%	29,2%	24,6%	29,1%	26,1%	28,6%	38,9%	32,3%	27,4%	35,7%	30,2%
➤ Obèses	10,7%	20,5%	14,4%	9,9%	14,8%	11,4%	10,6%	13,6%	11,6%	13,9%	23,2%	17,3%	11,8%	18,7%	14,2%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	1,6%	4,1%	2,5%	2,2%	3,1%	2,5%	3,7%	7,3%	4,9%	4,8%	7,9%	5,9%	3,6%	6,5%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,6%	4,1%	2,5%	2,2%	3,1%	2,5%	3,1%	6,5%	4,3%	4,2%	7,2%	5,3%	3,2%	5,9%	4,2%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,2%	0,8%	1,1%	0,9%	1,0%	1,5%	1,2%	0,7%	1,0%	0,8%
Consommation médic.	0,8%	4,1%	2,0%	1,4%	1,2%	1,3%	3,5%	3,4%	3,5%	2,4%	4,0%	3,0%	2,4%	3,3%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	4,1%	2,0%	1,4%	1,9%	1,5%	3,3%	5,4%	4,0%	3,6%	4,7%	4,0%	2,8%	4,3%	3,3%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	3,1%	9,5%	5,4%	2,2%	5,6%	3,2%	3,3%	5,7%	4,1%	3,1%	8,4%	5,0%	3,0%	7,1%	4,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	8,1%	5,0%	1,6%	3,7%	2,3%	2,3%	5,3%	3,4%	2,4%	7,2%	4,1%	2,3%	6,0%	3,6%
Gêne dans le travail	1,6%	2,7%	2,0%	0,3%	0,0%	0,2%	1,4%	1,1%	1,3%	0,7%	1,5%	1,0%	0,9%	1,2%	1,0%
Consommation médic.	1,6%	6,8%	3,5%	0,5%	3,7%	1,5%	1,2%	3,4%	1,9%	1,3%	3,7%	2,1%	1,1%	3,9%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	2,3%	6,8%	4,0%	1,6%	4,9%	2,7%	2,5%	4,2%	3,1%	2,1%	6,0%	3,5%	2,1%	5,3%	3,2%
HTA															
Existence d'un problème	2,4%	20,5%	9,0%	1,9%	15,7%	6,1%	4,1%	14,6%	7,7%	3,7%	18,2%	8,9%	3,3%	16,7%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,4%	16,4%	7,5%	0,8%	11,3%	4,0%	3,4%	10,4%	5,7%	2,7%	12,7%	6,3%	2,5%	12,0%	5,7%
Gêne dans le travail	0,0%	2,7%	1,0%	0,0%	1,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,7%	0,5%	0,2%	0,9%	0,5%
Consommation médicamenteuse	0,8%	13,7%	5,5%	1,4%	11,3%	4,4%	1,6%	13,1%	5,5%	1,8%	13,2%	6,0%	1,6%	12,7%	5,4%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	15,1%	5,5%	1,7%	13,2%	5,2%	2,2%	13,1%	5,9%	2,4%	15,2%	7,0%	2,0%	14,1%	6,2%
➤ Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	21,3%	27,0%	23,4%	17,0%	28,4%	20,5%	19,0%	26,2%	21,4%	14,2%	21,5%	16,8%	16,8%	24,6%	19,5%
Plaintes ou signes cliniques	21,3%	27,0%	23,4%	16,4%	27,3%	19,8%	19,0%	26,2%	21,4%	14,0%	21,5%	16,8%	16,6%	24,4%	19,3%
Gêne dans le travail	10,2%	12,2%	10,9%	6,9%	13,1%	8,8%	8,1%	13,1%	9,8%	6,8%	8,7%	7,5%	7,4%	11,2%	8,7%
Consommation médic.	3,9%	5,4%	4,5%	3,0%	3,1%	3,1%	3,8%	3,5%	3,7%	1,6%	2,0%	1,7%	2,7%	3,0%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	7,9%	5,4%	7,0%	4,4%	5,0%	4,6%	2,8%	7,0%	4,2%	2,7%	4,7%	3,4%	3,5%	5,6%	4,2%
➤ Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	20,3%	28,4%	23,3%	23,0%	27,7%	24,4%	19,8%	30,8%	23,5%	18,1%	19,8%	18,7%	19,9%	25,1%	21,7%
Plaintes ou signes cliniques	20,3%	28,4%	23,3%	22,7%	26,6%	23,9%	19,6%	30,0%	23,1%	18,1%	19,4%	18,6%	19,7%	24,4%	21,3%
Gêne dans le travail	9,4%	17,6%	12,4%	8,2%	11,5%	9,2%	7,7%	15,2%	10,2%	7,6%	6,0%	7,0%	7,9%	10,5%	8,8%
Consommation médic.	7,0%	5,4%	6,4%	2,8%	8,9%	4,6%	2,8%	9,0%	4,9%	2,4%	3,0%	2,6%	2,9%	5,9%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	5,5%	5,4%	5,4%	6,0%	8,9%	6,9%	3,2%	9,4%	5,3%	4,7%	4,5%	4,6%	4,6%	6,7%	5,3%
➤ Trouble du sommeil															
Existence d'un problème	15,7%	28,4%	20,4%	16,3%	30,6%	20,7%	17,1%	33,5%	22,7%	15,5%	21,9%	17,8%	16,1%	27,2%	20,0%
Plaintes ou signes cliniques	15,7%	28,4%	20,4%	16,3%	30,0%	20,5%	17,1%	32,3%	22,3%	15,3%	21,4%	17,5%	16,1%	26,5%	19,7%
Gêne dans le travail	5,5%	10,8%	7,5%	5,5%	6,4%	5,8%	5,5%	6,6%	5,9%	6,0%	6,2%	6,1%	5,8%	6,7%	6,1%
Consommation médic.	2,4%	8,1%	4,5%	1,9%	9,4%	4,2%	2,6%	11,3%	5,5%	1,3%	5,0%	2,6%	1,9%	7,9%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	5,4%	3,5%	2,8%	10,1%	5,0%	2,6%	6,6%	3,9%	3,3%	6,7%	4,5%	2,9%	7,1%	4,3%
Troubles neuropsychiques (les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	5,5%	17,6%	9,9%	6,8%	10,0%	7,8%	6,5%	13,5%	8,8%	3,8%	6,7%	4,9%	5,3%	10,1%	7,0%
Plaintes ou signes cliniques	5,5%	17,6%	9,9%	6,3%	9,4%	7,2%	6,5%	12,3%	8,4%	3,8%	6,7%	4,9%	5,2%	9,6%	6,7%
Gêne dans le travail	3,9%	6,8%	5,0%	1,4%	3,1%	1,9%	1,2%	3,8%	2,1%	1,4%	1,5%	1,4%	1,5%	2,9%	2,0%
Consommation médic.	1,6%	2,7%	2,0%	0,5%	1,9%	1,0%	0,6%	1,9%	1,0%	0,3%	0,5%	0,4%	0,5%	1,3%	0,8%
Pathologie diagnostiquée	1,6%	4,1%	2,5%	1,1%	2,5%	1,5%	0,6%	3,1%	1,4%	0,6%	1,7%	1,0%	0,8%	2,4%	1,3%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=129	≥45ans n=74*	Ens. n=203	<45ans n=370	≥45ans n=162	Ens. n=532	<45ans n=514	≥45ans n=264	Ens. n=778	<45ans n=721	≥45ans n=406	Ens. n=1127	<45ans n=1740	≥45ans n=915	Ens. n=2655
Digestif															
Existence d'un problème	8,1%	13,5%	10,1%	4,7%	14,9%	7,9%	4,3%	11,5%	6,7%	4,8%	9,8%	6,6%	4,9%	11,5%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,1%	12,2%	9,6%	4,7%	14,9%	7,9%	4,3%	11,1%	6,6%	4,8%	8,1%	6,0%	4,9%	10,6%	6,9%
Gêne dans le travail	0,0%	2,7%	1,0%	1,4%	1,9%	1,5%	0,8%	1,9%	1,2%	0,6%	1,3%	0,8%	0,8%	1,7%	1,1%
Consommation médic.	0,8%	9,5%	4,1%	2,5%	6,9%	3,9%	1,8%	5,7%	3,1%	1,7%	4,3%	2,6%	1,8%	5,6%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	4,1%	9,5%	6,1%	3,1%	10,6%	5,4%	1,8%	6,9%	3,5%	2,5%	6,1%	3,8%	2,5%	7,5%	4,2%
Dermatologie															
Existence d'un problème	8,0%	9,5%	8,5%	8,5%	5,0%	7,5%	6,3%	8,0%	6,9%	6,0%	10,0%	7,5%	6,8%	8,6%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	7,2%	9,5%	8,0%	8,2%	5,0%	7,3%	6,3%	8,0%	6,9%	5,8%	9,5%	7,1%	6,5%	8,4%	7,2%
Gêne dans le travail	1,6%	0,0%	1,0%	1,1%	1,3%	1,1%	1,8%	0,8%	1,4%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%
Consommation médic.	4,8%	2,7%	4,0%	4,4%	1,9%	3,6%	3,3%	4,6%	3,8%	2,3%	4,2%	3,0%	3,2%	3,8%	3,4%
Pathologie diagnostiquée	5,6%	8,1%	6,5%	6,6%	4,4%	5,9%	4,3%	6,5%	5,1%	4,2%	8,0%	5,6%	4,8%	6,9%	5,5%
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	4,0%	8,1%	5,5%	5,5%	12,6%	7,6%	3,1%	5,4%	3,9%	8,8%	20,8%	13,1%	6,0%	13,9%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	6,8%	5,0%	5,5%	11,9%	7,5%	3,1%	5,0%	3,8%	7,8%	19,1%	11,9%	5,6%	12,8%	8,1%
Gêne dans le travail	3,2%	1,4%	2,5%	1,4%	4,4%	2,3%	1,0%	2,3%	1,4%	1,0%	3,0%	1,7%	1,2%	3,1%	1,9%
Consommation médic.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	0,4%	0,4%	0,8%	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,4%	0,8%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	2,7%	2,5%	4,7%	6,3%	5,2%	1,6%	3,4%	2,2%	5,9%	14,7%	9,1%	4,1%	9,1%	5,8%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	7,9%	13,5%	10,0%	9,9%	16,8%	12,0%	9,6%	33,0%	17,5%	13,9%	29,3%	19,4%	11,3%	26,7%	16,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	13,5%	10,0%	9,9%	16,8%	12,0%	9,2%	32,6%	17,1%	13,9%	28,3%	19,1%	11,1%	26,1%	16,3%
Gêne dans le travail	3,1%	2,7%	3,0%	4,1%	9,4%	5,7%	5,3%	19,1%	9,9%	8,7%	16,5%	11,5%	6,3%	14,7%	9,2%
Consommation médic.	1,6%	2,7%	2,0%	1,1%	6,2%	2,7%	2,0%	11,6%	5,2%	3,2%	7,8%	4,9%	2,3%	8,1%	4,3%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	8,1%	4,5%	4,1%	12,4%	6,7%	4,7%	19,8%	9,8%	6,6%	16,3%	10,1%	5,2%	15,8%	8,8%
➤ Epaule															
Existence d'un problème	7,0%	9,5%	7,9%	5,5%	10,6%	7,0%	4,7%	21,8%	10,5%	8,3%	18,4%	11,9%	6,5%	17,2%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	7,0%	9,5%	7,9%	5,5%	10,6%	7,0%	4,5%	21,0%	10,1%	8,3%	18,1%	11,8%	6,4%	16,8%	10,0%
Gêne dans le travail	3,1%	2,7%	3,0%	2,5%	4,4%	3,0%	2,5%	11,9%	5,7%	5,3%	10,5%	7,2%	3,7%	9,1%	5,6%
Consommation médic.	1,6%	2,7%	2,0%	0,5%	3,7%	1,5%	1,2%	8,8%	3,8%	2,2%	4,3%	3,0%	1,5%	5,3%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	2,3%	5,4%	3,5%	2,2%	6,2%	3,4%	2,4%	11,5%	5,5%	3,4%	10,5%	5,9%	2,7%	9,5%	5,1%
➤ Coude															
Existence d'un problème	2,3%	4,1%	3,0%	1,4%	5,6%	2,7%	2,7%	7,3%	4,3%	3,5%	10,9%	6,2%	2,7%	8,3%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,6%	4,1%	2,5%	1,4%	5,6%	2,7%	2,7%	7,3%	4,3%	3,5%	10,7%	6,1%	2,7%	8,2%	4,6%
Gêne dans le travail	0,8%	1,4%	1,0%	0,5%	3,1%	1,3%	2,3%	4,6%	3,1%	2,4%	6,7%	4,0%	1,9%	5,0%	2,9%
Consommation médic.	0,8%	0,0%	0,5%	0,3%	1,3%	0,6%	1,0%	3,1%	1,7%	1,0%	3,5%	1,9%	0,8%	2,7%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	2,7%	1,5%	0,0%	3,1%	1,0%	2,0%	4,6%	2,8%	1,7%	5,2%	3,0%	1,3%	4,4%	2,4%
➤ Poignet															
Existence d'un problème	1,6%	2,7%	2,0%	3,8%	10,6%	5,9%	4,5%	13,7%	7,6%	5,6%	10,7%	7,4%	4,6%	10,8%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	1,6%	2,7%	2,0%	3,8%	10,6%	5,9%	4,3%	13,7%	7,5%	5,6%	10,0%	7,2%	4,5%	10,5%	6,6%
Gêne dans le travail	0,8%	0,0%	0,5%	1,1%	6,3%	2,7%	2,3%	6,9%	3,9%	3,8%	5,8%	4,5%	2,6%	5,6%	3,6%
Consommation médic.	0,8%	0,0%	0,5%	0,5%	3,1%	1,3%	0,8%	3,4%	1,7%	0,8%	3,3%	1,7%	0,8%	3,0%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	1,6%	1,4%	1,5%	1,9%	6,3%	3,2%	2,0%	7,7%	3,9%	2,8%	6,0%	3,9%	2,3%	6,1%	3,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=129	≥45ans n=74*	Ens. n=203	<45ans n=370	≥45ans n=162	Ens. n=532	<45ans n=514	≥45ans n=264	Ens. n=778	<45ans n=721	≥45ans n=406	Ens. n=1127	<45ans n=1740	≥45ans n=915	Ens. n=2655
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	8,6%	11,0%	9,5%	10,4%	18,0%	12,7%	7,2%	17,6%	10,8%	10,1%	15,6%	12,1%	9,2%	16,3%	11,7%
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	11,0%	9,5%	10,4%	18,0%	12,7%	7,0%	17,2%	10,5%	10,1%	15,1%	11,9%	9,2%	16,0%	11,5%
Gêne dans le travail	3,9%	1,4%	3,0%	4,6%	5,6%	4,9%	3,5%	6,9%	4,7%	6,2%	9,0%	7,2%	4,9%	7,2%	5,7%
Consommation médic.	0,8%	1,4%	1,0%	1,9%	3,8%	2,5%	1,2%	7,7%	3,4%	2,1%	5,7%	3,4%	1,7%	5,5%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	4,7%	6,8%	5,5%	5,5%	8,1%	6,3%	4,3%	10,8%	6,5%	5,3%	9,2%	6,7%	5,1%	9,3%	6,5%
Troubles ostéoarticulaires du rachis															
(l'un des 2 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	20,8%	28,8%	23,7%	24,5%	36,7%	28,2%	23,1%	40,7%	29,1%	24,2%	36,6%	28,7%	23,7%	37,0%	28,3%
Plaintes ou signes cliniques	20,2%	28,8%	23,4%	24,0%	35,4%	27,4%	23,0%	40,3%	28,8%	24,2%	35,2%	28,2%	23,5%	36,0%	27,8%
Gêne dans le travail	14,4%	12,3%	13,6%	12,4%	21,5%	15,2%	13,3%	23,6%	16,8%	13,9%	21,9%	16,8%	13,4%	21,3%	16,1%
Consommation médic.	3,2%	2,7%	3,0%	8,0%	10,3%	8,7%	5,8%	18,1%	9,9%	5,8%	13,2%	8,5%	6,0%	13,3%	8,5%
Pathologie diagnostiquée	8,8%	15,3%	11,2%	10,5%	21,7%	13,9%	6,3%	21,7%	11,5%	9,3%	19,5%	13,0%	8,6%	20,2%	12,6%
➤ Vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	8,7%	11,1%	9,6%	10,4%	20,5%	13,5%	10,1%	26,1%	15,5%	7,9%	14,9%	10,4%	9,1%	18,7%	12,4%
Plaintes ou signes cliniques	8,7%	11,1%	9,6%	10,4%	20,5%	13,5%	10,1%	26,1%	15,5%	7,9%	14,6%	10,3%	9,1%	18,7%	12,4%
Gêne dans le travail	5,6%	6,9%	6,1%	5,5%	10,6%	7,0%	6,3%	14,3%	9,0%	3,7%	7,5%	5,0%	5,0%	9,9%	6,6%
Consommation médic.	2,4%	1,4%	2,0%	3,6%	4,4%	3,8%	2,3%	10,4%	5,1%	1,7%	4,5%	2,7%	2,3%	6,0%	3,6%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	5,6%	4,0%	4,1%	10,0%	5,9%	2,1%	12,0%	5,5%	3,0%	6,3%	4,1%	3,0%	8,6%	4,9%
➤ Vertèbres dorsolombaires															
Existence d'un problème	16,7%	23,3%	19,1%	18,7%	27,4%	21,3%	18,0%	28,0%	21,4%	20,6%	30,8%	24,3%	19,1%	28,6%	22,4%
Plaintes ou signes cliniques	16,0%	23,3%	18,7%	18,1%	26,1%	20,5%	17,8%	27,6%	21,1%	20,6%	29,3%	23,8%	18,9%	27,6%	21,9%
Gêne dans le travail	11,9%	8,2%	10,6%	8,5%	15,3%	10,6%	9,9%	16,9%	12,3%	12,2%	18,1%	14,3%	10,6%	16,3%	12,6%
Consommation médic.	1,6%	2,7%	2,0%	5,8%	8,3%	6,5%	4,8%	13,4%	7,6%	4,6%	10,9%	6,9%	4,6%	10,5%	6,7%
Pathologie diagnostiquée	6,3%	12,5%	8,6%	7,7%	17,3%	10,6%	5,1%	15,7%	8,7%	7,3%	15,9%	10,4%	6,6%	15,8%	9,8%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=728	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=482	N. Activités de services administratifs et de soutien n=196	Q. Santé humaine et action sociale n=271	Région n=2655
Cadres	7,7%	6,6%	1,5%	4,1%	7,6%
Intermédiaires	20,6%	19,3%	9,7%	32,8%	20,0%
Employés	6,6%	47,1%	23,0%	56,8%	29,3%
Ouvriers	64,7%	26,1%	65,3%	5,9%	42,4%
Répartition homme/femme	69,4%/30,6%	47,7%/52,3%	56,6%/43,4%	17,7%/82,3%	55,3%/44,7%
≤24ans	9,8%	17,8%	20,9%	8,1%	13,4%
25-34ans	20,2%	27,2%	25,0%	23,6%	23,7%
35-44ans	30,9%	29,0%	29,6%	26,9%	28,4%
45-54ans	28,8%	21,8%	17,9%	31,7%	26,1%
≥55ans	10,3%	4,1%	6,6%	9,6%	8,4%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=728	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=482	N. Activités de services administratifs et de soutien n=196	Q. Santé humaine et action sociale n=271	Région n=2655
Changement de travail depuis 1an :					
Non	89,0%	85,4%	63,4%	88,8%	85,1%
Oui, raisons médicales	1,0%	0,8%	3,1%	0,0%	0,9%
Oui, autres raisons	9,7%	13,2%	32,0%	10,8%	13,5%
Oui, raisons non précisée	0,4%	0,6%	1,5%	0,4%	0,5%
Personnes travaillant à temps plein	92,1%	82,8%	69,4%	72,9%	83,9%
Travail en journée normale	66,1%	81,7%	68,2%	73,4%	76,6%
Coupures de plus de 2 heures	8,4%	29,8%	22,0%	21,1%	19,5%
Horaires décalés	36,6%	23,5%	45,3%	27,8%	29,3%
Horaires irréguliers ou alternés	33,9%	28,2%	40,8%	31,8%	29,2%
Travail de nuit	16,8%	3,9%	19,4%	14,6%	11,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	8,3%	5,1%	8,2%	1,5%	8,3%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	55,7%	54,7%	31,3%	47,2%	49,9%
Parmi eux :					
➤ Perturbe travail	55,5%	50,0%	33,9%	63,4%	53,5%
➤ Sans conséquence	41,1%	43,8%	54,2%	35,8%	42,7%
➤ Aspect positif sur travail	43,0%	42,4%	35,6%	34,5%	40,4%
Dépasser horaires normaux	33,7%	32,5%	28,2%	35,1%	34,7%
Sauter repas ou pas de pause	14,7%	16,4%	17,1%	25,2%	19,3%
Traiter trop vite une opération	24,7%	21,0%	19,5%	28,3%	22,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	24,1%	19,3%	29,6%	14,8%	20,4%
Travail pas varié	20,3%	18,5%	29,2%	18,2%	19,0%
Pas de choix dans la façon de procéder	27,3%	24,6%	32,0%	26,0%	26,0%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	18,1%	13,0%	20,1%	19,8%	17,0%
Travail pas reconnu	31,0%	20,0%	16,8%	31,1%	23,9%
Formations et informations insuffisantes	23,7%	21,0%	16,8%	22,8%	20,3%
Objectifs et consignes pas clairement définis	19,4%	17,2%	10,7%	20,4%	17,4%
Pression temporelle forte (>5)	43,3%	30,8%	25,5%	37,7%	37,1%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=728	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=482	N. Activités de services administratifs et de soutien n=196	Q. Santé humaine et action sociale n=271	Région n=2655
Postures contraignantes :					
Non	39,0%	37,8%	37,8%	30,3%	40,5%
Oui, difficile ou pénible	33,7%	34,3%	30,6%	38,7%	32,0%
Oui, pas difficile ou pénible	25,6%	26,0%	31,1%	29,5%	26,1%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,7%	1,9%	0,5%	1,5%	1,4%
Effort, Port de charges lourdes :					
Non	44,7%	36,1%	46,9%	34,3%	47,2%
Oui, difficile ou pénible	31,0%	33,8%	26,5%	42,4%	29,3%
Oui, pas difficile ou pénible	22,7%	28,7%	25,5%	21,8%	22,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,5%	1,5%	1,0%	1,5%	1,1%
Gestes répétitifs :					
Non	36,5%	35,5%	25,5%	35,4%	37,1%
Oui, difficile ou pénible	25,2%	23,7%	22,4%	23,6%	22,6%
Oui, pas difficile ou pénible	37,2%	38,0%	50,5%	38,4%	38,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,1%	2,9%	1,5%	2,6%	1,6%
Importants déplacements à pieds :					
Non	51,4%	52,0%	53,6%	52,6%	57,9%
Oui, difficile ou pénible	13,7%	15,7%	10,7%	16,8%	12,5%
Oui, pas difficile ou pénible	33,1%	31,5%	34,2%	29,1%	28,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,8%	0,8%	1,5%	1,5%	1,3%
Station debout prolongée :					
Non	34,5%	27,4%	28,6%	28,8%	39,2%
Oui, difficile ou pénible	28,4%	30,8%	21,4%	31,0%	24,8%
Oui, pas difficile ou pénible	35,5%	40,1%	49,0%	38,4%	34,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,7%	1,7%	1,0%	1,8%	1,5%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=728	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=482	N. Activités de services administratifs et de soutien n=196	Q. Santé humaine et action sociale n=271	Région n=2655
Produits chimiques	33,5%	22,7%	32,8%	27,7%	26,9%
Poussières, fumées	49,7%	26,1%	50,5%	11,4%	35,8%
Rx ionisants	1,9%	0,4%	1,5%	6,6%	2,5%
Vibrations	21,8%	9,0%	25,1%	3,0%	19,6%
Gêne sonore	60,5%	28,6%	47,2%	21,9%	41,1%
Bruit > 80db	49,2%	15,2%	30,2%	6,3%	26,0%
Contrainte visuelle	35,3%	23,2%	27,3%	17,0%	30,3%
Conduite routière prolongée	10,3%	12,0%	9,2%	8,9%	14,8%
Chaleur intense	21,0%	7,9%	15,3%	16,7%	14,8%
Froid intense	12,8%	15,2%	12,4%	3,7%	10,6%
Intempéries	8,4%	7,7%	24,5%	5,2%	15,2%
Pression psychologique	24,8%	20,1%	15,8%	35,4%	24,4%
Agent biologique	4,4%	4,0%	9,7%	47,2%	10,1%
Contact avec public	34,9%	82,0%	47,4%	86,3%	64,3%

Formation	C. Industrie manufacturière n=728	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=482	N. Activités de services administratifs et de soutien n=196	Q. Santé humaine et action sociale n=271	Région n=2655
A bénéficié d'une formation depuis un an	43,2%	45,8%	28,1%	46,7%	42,8%
Parmi eux :					
➤ En rapport avec travail actuel	82,1%	93,6%	85,2%	88,9%	90,6%
➤ En rapport avec travail futur	19,5%	19,3%	28,0%	11,9%	17,1%
➤ Formation d'intérêt général	50,3%	45,1%	40,0%	49,2%	44,2%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	26,5%	29,6%	15,0%	27,5%	25,2%

Mode de vie	C. Industrie manufacturière n=728	G. Commerce, réparation d'automobiles et motocycles n=482	N. Activités de services administratifs et de soutien n=196	Q. Santé humaine et action sociale n=271	Région n=2655
Activité sportive régulière	46,0%	45,0%	41,3%	51,5%	44,9%
Consommation de tabac	38,9%	33,1%	47,9%	28,8%	37,3%
Consommation de tabac > 15 cig / j	9,6%	6,5%	10,3%	6,7%	9,1%
Consommation de café	80,9%	75,9%	79,2%	71,4%	78,9%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	17,5%	11,4%	11,5%	9,7%	14,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,2%	13,7%	18,6%	13,9%	13,7%

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=443	≥45ans n=285	Ens. n=728	<45ans n=357	≥45ans n=125	Ens. n=482	<45ans n=148	≥45ans n=48*	Ens. n=196	<45ans n=159	≥45ans n=112	Ens. n=271	<45ans n=1740	≥45ans n=915	Ens. n=2655
Indice de masse corporelle															
➤ Normaux ou maigres	57,6%	44,0%	52,3%	63,3%	45,2%	58,6%	68,9%	31,9%	60,0%	59,7%	58,5%	59,2%	60,8%	45,6%	55,6%
➤ Surpoids	30,3%	37,5%	33,1%	27,2%	33,9%	29,0%	19,6%	36,2%	23,6%	24,7%	30,2%	26,9%	27,4%	35,7%	30,2%
➤ Obèses	12,0%	18,5%	14,6%	9,5%	21,0%	12,5%	11,5%	31,9%	16,4%	15,6%	11,3%	13,8%	11,8%	18,7%	14,2%
Appareil respiratoire															
Existence d'un problème	4,6%	5,6%	5,0%	5,1%	5,6%	5,2%	4,1%	10,6%	5,6%	0,6%	6,3%	3,0%	3,6%	6,5%	4,6%
Plaîntes ou signes cliniques	4,1%	4,6%	4,3%	4,5%	5,6%	4,8%	2,7%	10,6%	4,6%	0,6%	4,5%	2,2%	3,2%	5,9%	4,2%
Gêne dans le travail	0,5%	0,7%	0,6%	0,6%	1,6%	0,8%	0,0%	2,1%	0,5%	0,6%	1,8%	1,1%	0,7%	1,0%	0,8%
Consommation médic.	3,0%	2,8%	2,9%	3,4%	3,2%	3,3%	2,7%	2,1%	2,6%	0,6%	3,6%	1,9%	2,4%	3,3%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	3,5%	3,3%	4,8%	3,2%	4,4%	3,4%	4,3%	3,6%	0,6%	5,4%	2,6%	2,8%	4,3%	3,3%
Appareil cardio vasculaire															
Existence d'un problème	2,7%	6,0%	4,0%	3,7%	8,1%	4,8%	2,7%	12,8%	5,1%	2,5%	6,3%	4,1%	3,0%	7,1%	4,4%
Plaîntes ou signes cliniques	2,1%	4,6%	3,1%	3,1%	6,5%	4,0%	2,0%	12,8%	4,6%	1,9%	6,3%	3,7%	2,3%	6,0%	3,6%
Gêne dans le travail	1,1%	1,8%	1,4%	1,1%	0,0%	0,8%	0,0%	2,1%	0,5%	0,6%	1,8%	1,1%	0,9%	1,2%	1,0%
Consommation médic.	1,6%	2,8%	2,1%	0,8%	6,5%	2,3%	0,7%	6,4%	2,1%	0,6%	3,6%	1,9%	1,1%	3,9%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	2,3%	3,9%	2,9%	2,2%	7,3%	3,5%	2,0%	12,8%	4,6%	1,9%	3,6%	2,6%	2,1%	5,3%	3,2%
HTA															
Existence d'un problème	3,7%	19,1%	9,8%	2,8%	17,7%	6,7%	2,1%	26,1%	7,8%	4,5%	9,3%	6,4%	3,3%	16,7%	8,0%
Plaîntes ou signes cliniques	2,8%	12,7%	6,7%	2,5%	16,9%	6,3%	1,4%	19,6%	5,7%	4,5%	5,6%	4,9%	2,5%	12,0%	5,7%
Gêne dans le travail	0,2%	0,7%	0,4%	0,3%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,9%	0,8%	0,2%	0,9%	0,5%
Consommation médic.	1,4%	13,4%	6,2%	1,4%	14,5%	4,8%	1,4%	15,2%	4,7%	1,9%	9,3%	4,9%	1,6%	12,7%	5,4%
Pathologie diagnostiquée	2,1%	15,9%	7,6%	2,0%	16,1%	5,6%	0,7%	19,6%	5,2%	2,6%	7,4%	4,5%	2,0%	14,1%	6,2%
➤ Lassitude, fatigue															
Existence d'un problème	16,7%	23,6%	19,4%	15,7%	25,0%	18,1%	10,2%	28,3%	14,5%	19,4%	30,9%	24,2%	16,8%	24,6%	19,5%
Plaîntes ou signes cliniques	16,7%	23,3%	19,3%	15,4%	25,0%	17,9%	8,8%	28,3%	13,5%	19,4%	30,0%	23,8%	16,6%	24,4%	19,3%
Gêne dans le travail	7,9%	11,3%	9,2%	7,9%	15,3%	9,8%	3,5%	15,2%	6,3%	5,8%	16,4%	10,2%	7,4%	11,2%	8,7%
Consommation médic.	3,0%	2,8%	2,9%	2,3%	4,8%	2,9%	3,5%	4,3%	3,7%	3,2%	4,5%	3,8%	2,7%	3,0%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	4,2%	5,7%	4,8%	3,7%	4,1%	3,8%	4,1%	6,5%	4,7%	2,6%	7,3%	4,5%	3,5%	5,6%	4,2%
➤ Anxiété, nervosité															
Existence d'un problème	18,9%	26,1%	21,8%	19,4%	26,7%	21,3%	16,3%	27,7%	19,1%	24,4%	24,3%	24,3%	19,9%	25,1%	21,7%
Plaîntes ou signes cliniques	18,7%	25,2%	21,3%	19,4%	26,7%	21,3%	16,3%	27,7%	19,1%	24,4%	23,4%	24,0%	19,7%	24,4%	21,3%
Gêne dans le travail	9,6%	9,3%	9,5%	9,3%	13,6%	10,4%	4,1%	6,4%	4,7%	7,7%	13,6%	10,2%	7,9%	10,5%	8,8%
Consommation médic.	2,5%	5,0%	3,5%	2,0%	8,5%	3,6%	2,8%	6,4%	3,6%	1,9%	10,0%	5,3%	2,9%	5,9%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	5,7%	6,1%	5,9%	4,0%	6,8%	4,7%	4,1%	8,5%	5,2%	5,1%	10,8%	7,5%	4,6%	6,7%	5,3%
➤ Trouble du sommeil															
Existence d'un problème	16,8%	24,6%	19,9%	13,4%	30,1%	17,7%	13,6%	27,7%	17,0%	22,4%	38,2%	28,9%	16,1%	27,2%	20,0%
Plaîntes ou signes cliniques	16,8%	23,8%	19,6%	13,4%	30,1%	17,7%	13,0%	27,7%	16,6%	22,4%	37,3%	28,6%	16,1%	26,5%	19,7%
Gêne dans le travail	7,7%	6,8%	7,3%	4,8%	9,9%	6,1%	2,7%	4,3%	3,1%	7,7%	8,2%	7,9%	5,8%	6,7%	6,1%
Consommation médic.	2,5%	6,4%	4,1%	0,6%	9,1%	2,8%	2,7%	10,6%	4,7%	2,6%	10,9%	6,0%	1,9%	7,9%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	4,4%	6,4%	5,2%	1,7%	5,7%	2,7%	2,8%	10,6%	4,7%	3,8%	8,2%	5,6%	2,9%	7,1%	4,3%
Troubles neuro psychiques															
(les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	5,5%	9,6%	7,1%	5,4%	11,4%	6,9%	3,4%	8,7%	4,7%	6,4%	12,7%	9,0%	5,3%	10,1%	7,0%
Plaîntes ou signes cliniques	5,5%	9,3%	7,0%	5,1%	11,4%	6,7%	2,7%	8,7%	4,1%	6,4%	11,8%	8,6%	5,2%	9,6%	6,7%
Gêne dans le travail	2,7%	2,2%	2,5%	1,4%	5,6%	2,5%	1,4%	4,3%	2,1%	0,0%	2,7%	1,1%	1,5%	2,9%	2,0%
Consommation médic.	0,7%	0,4%	0,6%	0,3%	2,4%	0,8%	1,4%	4,3%	2,1%	0,0%	2,7%	1,1%	0,5%	1,3%	0,8%
Pathologie diagnostiquée	1,1%	1,4%	1,3%	0,6%	2,4%	1,0%	1,4%	4,3%	2,1%	0,6%	3,6%	1,9%	0,8%	2,4%	1,3%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=443	≥45ans n=285	Ens. n=728	<45ans n=357	≥45ans n=125	Ens. n=482	<45ans n=148	≥45ans n=48*	Ens. n=196	<45ans n=159	≥45ans n=112	Ens. n=271	<45ans n=1740	≥45ans n=915	Ens. n=2655
Digestif															
Existence d'un problème	6,7%	10,1%	8,1%	4,2%	8,1%	5,2%	1,4%	10,6%	3,6%	6,4%	15,3%	10,1%	4,9%	11,5%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	9,8%	7,9%	4,2%	8,1%	5,2%	1,4%	6,5%	2,6%	6,4%	15,3%	10,1%	4,9%	10,6%	6,9%
Gêne dans le travail	0,9%	1,5%	1,1%	0,3%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	4,5%	3,0%	0,8%	1,7%	1,1%
Consommation médic.	2,8%	4,7%	3,5%	1,4%	4,8%	2,3%	0,7%	4,3%	1,6%	1,9%	5,4%	3,4%	1,8%	5,6%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	6,2%	4,4%	2,3%	5,6%	3,1%	0,0%	4,3%	1,0%	3,8%	8,1%	5,6%	2,5%	7,5%	4,2%
Dermatologie															
Existence d'un problème	6,4%	10,0%	7,8%	7,1%	8,1%	7,3%	5,4%	6,4%	5,7%	9,0%	9,0%	9,0%	6,8%	8,6%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	9,6%	7,3%	6,8%	8,1%	7,1%	5,4%	6,4%	5,7%	9,0%	9,0%	9,0%	6,5%	8,4%	7,2%
Gêne dans le travail	0,9%	1,8%	1,3%	1,1%	0,8%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	0,9%	1,5%	1,3%	1,0%	1,2%
Consommation médic.	2,3%	4,6%	3,2%	4,5%	4,9%	4,6%	3,4%	0,0%	2,6%	3,9%	1,8%	3,0%	3,2%	3,8%	3,4%
Pathologie diagnostiquée	4,6%	8,6%	6,1%	5,9%	5,7%	5,9%	4,8%	6,4%	5,2%	7,1%	5,4%	6,4%	4,8%	6,9%	5,5%
Troubles de l'audition															
Existence d'un problème	9,0%	19,5%	13,2%	5,1%	15,3%	7,7%	3,4%	10,6%	5,2%	4,5%	6,3%	5,2%	6,0%	13,9%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	18,4%	12,3%	4,8%	15,3%	7,5%	3,4%	10,6%	5,2%	4,5%	6,3%	5,2%	5,6%	12,8%	8,1%
Gêne dans le travail	1,2%	2,5%	1,7%	2,0%	5,6%	2,9%	0,0%	2,1%	0,5%	0,6%	3,6%	1,9%	1,2%	3,1%	1,9%
Consommation médic.	0,7%	1,4%	1,0%	0,3%	0,8%	0,4%	0,0%	2,1%	0,5%	0,0%	0,9%	0,4%	0,4%	0,8%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	6,5%	12,8%	9,0%	3,9%	9,7%	5,4%	2,1%	8,5%	3,6%	1,3%	3,6%	2,2%	4,1%	9,1%	5,8%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	15,5%	29,1%	20,8%	10,7%	31,5%	16,1%	8,8%	21,3%	11,8%	8,4%	26,1%	15,8%	11,3%	26,7%	16,6%
Plaintes ou signes cliniques	15,5%	27,7%	20,3%	10,1%	31,5%	15,7%	8,8%	21,3%	11,8%	8,4%	26,1%	15,8%	11,1%	26,1%	16,3%
Gêne dans le travail	8,3%	16,1%	11,3%	5,9%	16,4%	8,6%	3,4%	12,8%	5,6%	3,2%	17,1%	9,0%	6,3%	14,7%	9,2%
Consommation médic.	3,4%	7,6%	5,1%	2,3%	9,0%	4,0%	2,7%	10,6%	4,6%	1,9%	11,7%	6,0%	2,3%	8,1%	4,3%
Pathologie diagnostiquée	7,6%	16,8%	11,2%	4,8%	15,6%	7,6%	5,4%	15,2%	7,7%	3,9%	18,9%	10,2%	5,2%	15,8%	8,8%
➤ Epaule															
Existence d'un problème	8,2%	15,2%	11,0%	6,2%	20,2%	9,8%	6,8%	14,9%	8,7%	4,5%	22,5%	11,9%	6,5%	17,2%	10,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	14,9%	10,8%	5,9%	20,2%	9,6%	6,8%	14,9%	8,7%	4,5%	21,6%	11,6%	6,4%	16,8%	10,0%
Gêne dans le travail	4,6%	8,9%	6,3%	3,7%	9,8%	5,2%	3,4%	8,5%	4,6%	1,9%	13,5%	6,7%	3,7%	9,1%	5,6%
Consommation médic.	2,3%	3,6%	2,8%	1,7%	5,7%	2,7%	2,0%	6,4%	3,1%	0,0%	10,8%	4,5%	1,5%	5,3%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	8,5%	5,3%	3,4%	6,5%	4,2%	3,4%	10,9%	5,2%	1,3%	15,3%	7,1%	2,7%	9,5%	5,1%
➤ Coude															
Existence d'un problème	3,7%	11,0%	6,5%	2,5%	8,9%	4,2%	2,0%	10,6%	4,1%	1,9%	4,5%	3,0%	2,7%	8,3%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,7%	10,7%	6,4%	2,5%	8,9%	4,2%	2,0%	10,6%	4,1%	1,9%	4,5%	3,0%	2,7%	8,2%	4,6%
Gêne dans le travail	2,5%	6,1%	3,9%	1,4%	6,5%	2,7%	1,4%	8,5%	3,1%	1,3%	2,7%	1,9%	1,9%	5,0%	2,9%
Consommation médic.	1,1%	2,2%	1,5%	0,3%	3,2%	1,0%	1,4%	8,5%	3,1%	0,6%	0,9%	0,7%	0,8%	2,7%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	4,3%	2,5%	0,8%	6,5%	2,3%	1,4%	8,5%	3,1%	1,3%	2,7%	1,9%	1,3%	4,4%	2,4%
➤ Poignet															
Existence d'un problème	6,2%	13,5%	9,0%	3,9%	13,7%	6,5%	4,1%	6,4%	4,6%	2,6%	9,9%	5,6%	4,6%	10,8%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	12,5%	8,6%	3,7%	13,7%	6,3%	4,1%	6,4%	4,6%	2,6%	9,9%	5,6%	4,5%	10,5%	6,6%
Gêne dans le travail	2,5%	6,8%	4,2%	1,7%	7,3%	3,1%	2,0%	4,3%	2,6%	0,6%	6,3%	3,0%	2,6%	5,6%	3,6%
Consommation médic.	0,5%	3,6%	1,7%	0,6%	4,1%	1,5%	0,7%	0,0%	0,5%	1,3%	4,5%	2,6%	0,8%	3,0%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	7,5%	5,3%	1,1%	4,9%	2,1%	3,4%	4,3%	3,6%	1,9%	6,3%	3,8%	2,3%	6,1%	3,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			G. Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45ans n=443	≥45ans n=285	Ens. n=728	<45ans n=357	≥45ans n=125	Ens. n=482	<45ans n=148	≥45ans n=48*	Ens. n=196	<45ans n=159	≥45ans n=112	Ens. n=271	<45ans n=1740	≥45ans n=915	Ens. n=2655
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur															
Existence d'un problème	10,3%	13,8%	11,7%	12,7%	24,6%	15,8%	4,1%	19,1%	7,7%	11,5%	19,8%	14,9%	9,2%	16,3%	11,7%
Plaintes ou signes cliniques	10,3%	13,1%	11,4%	12,4%	24,6%	15,5%	4,1%	17,0%	7,2%	11,5%	19,8%	14,9%	9,2%	16,0%	11,5%
Gêne dans le travail	5,5%	6,4%	5,8%	6,5%	13,2%	8,2%	4,1%	8,5%	5,1%	6,4%	5,4%	6,0%	4,9%	7,2%	5,7%
Consommation médic.	2,5%	4,3%	3,2%	2,5%	5,8%	3,4%	1,4%	8,5%	3,1%	1,9%	8,1%	4,5%	1,7%	5,5%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	5,5%	7,8%	6,4%	8,5%	11,5%	9,3%	3,4%	10,6%	5,1%	6,4%	13,5%	9,3%	5,1%	9,3%	6,5%
Troubles ostéoarticulaires du rachis															
(l'un des 2 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	25,5%	37,5%	30,2%	27,6%	43,0%	31,5%	15,6%	39,1%	21,2%	27,1%	36,7%	31,1%	23,7%	37,0%	28,3%
Plaintes ou signes cliniques	25,5%	35,1%	29,3%	27,1%	43,0%	31,1%	14,4%	39,1%	20,3%	27,1%	36,7%	31,1%	23,5%	36,0%	27,8%
Gêne dans le travail	15,3%	20,7%	17,4%	13,1%	22,9%	15,6%	10,3%	30,4%	15,1%	16,1%	22,9%	18,9%	13,4%	21,3%	16,1%
Consommation médic.	7,5%	12,5%	9,5%	6,6%	15,1%	8,7%	5,5%	15,2%	7,8%	7,1%	20,4%	12,5%	6,0%	13,3%	8,5%
Pathologie diagnostiquée	10,3%	21,0%	14,4%	7,7%	22,5%	11,5%	9,5%	17,8%	11,5%	9,7%	24,1%	15,6%	8,6%	20,2%	12,6%
➤ Vertèbres cervicales															
Existence d'un problème	10,8%	17,4%	13,4%	11,0%	23,0%	14,0%	2,7%	19,1%	6,7%	10,9%	27,0%	17,6%	9,1%	18,7%	12,4%
Plaintes ou signes cliniques	10,8%	17,1%	13,3%	11,0%	23,0%	14,0%	2,7%	19,1%	6,7%	10,9%	27,0%	17,6%	9,1%	18,7%	12,4%
Gêne dans le travail	5,5%	8,2%	6,6%	6,2%	11,7%	7,6%	1,4%	10,6%	3,6%	6,4%	14,4%	9,7%	5,0%	9,9%	6,6%
Consommation médic.	3,7%	4,3%	3,9%	2,5%	9,9%	4,4%	0,7%	4,3%	1,5%	2,6%	11,7%	6,4%	2,3%	6,0%	3,6%
Pathologie diagnostiquée	5,1%	6,1%	5,5%	2,3%	11,6%	4,6%	1,4%	6,4%	2,6%	3,2%	13,6%	7,5%	3,0%	8,6%	4,9%
➤ Vertèbres dorsolombaires															
Existence d'un problème	19,6%	29,1%	23,3%	22,4%	34,7%	25,6%	14,3%	30,4%	18,1%	21,3%	24,1%	22,4%	19,1%	28,6%	22,4%
Plaintes ou signes cliniques	19,6%	26,6%	22,4%	21,9%	34,7%	25,2%	13,0%	30,4%	17,2%	21,3%	24,1%	22,4%	18,9%	27,6%	21,9%
Gêne dans le travail	10,9%	14,9%	12,5%	10,5%	18,5%	12,5%	9,6%	23,9%	13,0%	13,5%	17,6%	15,2%	10,6%	16,3%	12,6%
Consommation médic.	4,7%	9,9%	6,7%	5,1%	11,8%	6,8%	5,5%	13,0%	7,3%	7,1%	14,8%	10,3%	4,6%	10,5%	6,7%
Pathologie diagnostiquée	6,5%	16,8%	10,5%	6,3%	17,4%	9,1%	8,8%	13,3%	9,9%	7,7%	17,8%	11,8%	6,6%	15,8%	9,8%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence