



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2008-2009

Région Franche Comté

Juin 2010

))) afsset •)))



Université Lille 2
Droit et Santé

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2008-2009 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Franche Comté

L'exploitation des données de la région Franche Comté a porté sur **439 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2008 (n=12) et 2009 (n=427), puis saisies dans la base de données Evrest.

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Evrest est plutôt plus proche de la répartition des salariés du champ des DADS (salariés du privé et du public), que de celle des salariés du champ de l'Unedic (salariés du secteur privé) (tableau 1).

Néanmoins, le faible effectif et le fait que les données aient été recueillies essentiellement sur l'année 2009 doivent inciter à lire et interpréter des données de la région avec une grande prudence ; à des fins de comparaison, on préfèrera utiliser des données nationales par secteur d'activité par exemple.

Le nombre de fiches 2008-2009 de la région ne permet pas de fournir des résultats par catégories socioprofessionnelles et par secteurs d'activité (tableaux 2 et 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Franche Comté 2008-2009 aux données Insee (DADS 2007) et Unedic (2008).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Franche Comté 2008-2009 (n=439)	Données INSEE 2007 (DADS) %	Données UNEDIC 2008 %
	%		
Sexe			
Hommes	56,5	54,5	56,8
Femmes	43,5	45,5	43,2
Age			
≤ 24 ans	12,5	16,3	-
25-34 ans	25,1	23,4	-
35-44 ans	27,1	25,8	-
45- 54 ans	26,0	23,6	-
55 ans et plus	9,3	10,9	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Salariés de leur entreprise	0,5	0,6	-
Chef d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures	6,8	8,2	-
Professions intermédiaires	17,1	20,0	-
Employés	30,3	30,8	-
Ouvriers	45,3	40,3	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0,0	0,0	0,0
Industrie	26,1	27,4	34,0
Construction	8,8	6,9	8,8
Commerce	18,9	13,6	16,6
Services	46,2	52,2	40,6

- : informations non disponibles

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Franche Comté 2008-2009 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	2	0,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures	30	6,8
Professions intermédiaires	75	17,1
Employés	133	30,3
Ouvriers	199	45,3
Total général	439	100,0

Tableau 3: Descriptif de l'échantillon régional Franche Comté 2008-2009 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
AGRICULTURE	0	0,0
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
INDUSTRIE	113	25,7
B. Industries extractives	3	0,7
C. Industrie manufacturière	104	23,7
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	0	0,0
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	6	1,4
CONSTRUCTION	38	8,7
F. Construction	38	8,7
COMMERCE	82	18,7
G. Commerce; réparations automobile et de motocycles	82	18,7
SERVICES	200	45,6
H. Transports et entreposage	34	7,7
I. Hébergement et restauration	12	2,7
J. Information et communication	4	0,9
K. Activités financières et d'assurance	7	1,6
L. Activités immobilières	8	1,8
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	12	2,7
N. Activités de services administratifs et de soutien	16	3,6
O. Administration publique	16	3,6
P. Enseignement	2	0,5
Q. Santé humaine et action sociale	70	15,9
R. Arts, spectacles et activités récréatives	0	0,0
S. Autres activités de services	19	4,3
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0	0,0
Données manquantes	6	1,4
Total général	439	100,0

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=248	Femmes n=191	Ensemble n=439
≤24ans	14,9%	9,4%	12,5%
25-34ans	25,4%	24,6%	25,1%
35-44ans	26,2%	28,3%	27,1%
45-54ans	24,2%	28,3%	26,0%
≥55ans	9,3%	9,4%	9,3%
Conditions de travail			
Hommes n=248	Femmes n=191	Ensemble n=439	
Changement de travail depuis 1an :			
Non	87,9%	85,9%	87,0%
Oui, raison médicale	1,6%	1,0%	1,4%
Oui, autre raison	10,1%	13,1%	11,4%
Oui, raison non précisée	0,4%	0,0%	0,2%
Personnes travaillant à temps plein			
Travail en journée normale	94,0%	65,4%	81,5%
Coupures de plus de 2 heures	76,5%	75,8%	76,2%
Horaires décalés	15,9%	29,3%	21,7%
Horaires irréguliers ou alternés	29,0%	25,1%	27,4%
Travail de nuit	25,0%	31,4%	27,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	14,0%	7,2%	11,0%
Déplacements professionnels de plus de 24h	9,4%	1,6%	6,0%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	51,2%	41,7%	47,1%
Parmi eux :			
➤ Perturbe travail	58,1%	59,0%	58,4%
➤ Sans conséquence	45,5%	34,2%	41,1%
➤ Aspect positif sur travail	33,1%	32,0%	32,7%
Dépasser horaires normaux			
Sauter repas ou pas de pause	37,7%	25,4%	32,3%
Traiter trop vite une opération	21,7%	12,1%	17,5%
Travail ne permet pas d'apprendre	25,4%	23,3%	24,5%
Travail ne permet pas d'apprendre	17,9%	21,6%	19,5%
Travail pas varié	15,4%	18,8%	16,9%
Pas de choix dans la façon de procéder	21,1%	28,7%	24,4%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	14,6%	22,8%	18,1%
Travail pas reconnu	23,7%	29,1%	26,0%
Formations et informations insuffisantes	18,6%	22,2%	20,2%
Objectifs et consignes pas clairement définis	20,3%	20,2%	20,3%
Pression temporelle forte (>5)	39,1%	38,2%	38,7%

Charge physique du poste de travail	Hommes n=248	Femmes n=191	Ensemble n=439
Postures contraignantes :			
Non	33,9%	36,8%	35,2%
Oui, difficile ou pénible	36,7%	37,4%	37,0%
Oui, pas difficile ou pénible	28,2%	25,3%	26,9%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,2%	0,5%	0,9%
Effort, Port de charges lourdes :			
Non	36,1%	47,6%	41,1%
Oui, difficile ou pénible	35,2%	34,4%	34,9%
Oui, pas difficile ou pénible	28,7%	18,0%	24,0%
Oui, difficile ou pénible non précisée	0,0%	0,0%	0,0%
Gestes répétitifs :			
Non	39,7%	32,5%	36,5%
Oui, difficile ou pénible	28,7%	29,8%	29,2%
Oui, pas difficile ou pénible	30,8%	37,2%	33,6%
Oui, difficile ou pénible non précisée	0,8%	0,5%	0,7%
Importants déplacements à pieds :			
Non	54,3%	61,8%	57,5%
Oui, difficile ou pénible	19,0%	11,5%	15,8%
Oui, pas difficile ou pénible	25,9%	25,7%	25,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	0,8%	1,0%	0,9%
Station debout prolongée :			
Non	34,3%	34,0%	34,2%
Oui, difficile ou pénible	26,2%	33,0%	29,2%
Oui, pas difficile ou pénible	38,3%	32,5%	35,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,2%	0,5%	0,9%

Expositions	Hommes n=248	Femmes n=191	Ensemble n=439
Produits chimiques	39,9%	29,3%	35,3%
Poussières, fumées	55,6%	22,1%	41,1%
Rx ionisants	0,8%	0,5%	0,7%
Vibrations	41,5%	3,2%	24,9%
Gêne sonore	58,9%	27,9%	45,4%
Bruit > 80db	48,2%	12,2%	32,6%
Contrainte visuelle	30,6%	31,2%	30,9%
Conduite routière prolongée	20,6%	4,8%	13,8%
Chaleur intense	21,8%	15,4%	19,0%
Froid intense	18,5%	8,5%	14,2%
Intempéries	24,2%	4,3%	15,6%
Pression psychologique	27,0%	35,4%	30,7%
Agent biologique	5,3%	24,7%	13,8%
Contact avec public	66,5%	75,3%	70,3%

Formation	Hommes n=248	Femmes n=191	Ensemble n=439
A bénéficié d'une formation depuis un an	43,5%	47,1%	45,1%
Parmi eux :			
➤ En rapport avec travail actuel	91,3%	97,7%	94,2%
➤ En rapport avec travail futur	15,4%	15,0%	15,2%
➤ Formation d'intérêt général	37,2%	46,8%	41,6%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	33,2%	23,2%	28,8%

Mode de vie	Hommes n=248	Femmes n=191	Ensemble n=439
Activité sportive régulière	45,9%	33,3%	40,5%
Consommation de tabac	42,9%	31,4%	37,9%
Consommation de tabac>15 cig / j	18,0%	4,8%	12,2%
Consommation de café	82,7%	75,1%	79,4%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	23,0%	16,9%	20,4%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	12,8%	8,0%	10,8%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=439
	Hommes n=165	Femmes n=119	Ensemble n=284	Hommes n=83*	Femmes n=72*	Ensemble n=155	
Indice de masse corporelle							
➤ Normaux ou maigres	54,9%	61,3%	57,7%	41,5%	69,4%	54,5%	56,6%
➤ Surpoids	29,6%	21,8%	26,3%	41,5%	20,8%	31,8%	28,3%
➤ Obèses	15,4%	16,8%	16,0%	17,1%	9,7%	13,6%	15,2%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	1,8%	4,2%	2,8%	4,9%	7,1%	5,9%	3,9%
Plaintes ou signes cliniques	1,2%	4,2%	2,5%	4,9%	7,1%	5,9%	3,7%
Gêne dans le travail	0,0%	0,8%	0,4%	2,4%	0,0%	1,3%	0,7%
Consommation médicamenteuse	1,2%	2,5%	1,8%	1,2%	2,9%	2,0%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	3,4%	2,5%	1,2%	7,1%	3,9%	3,0%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	1,2%	2,5%	1,8%	4,9%	2,9%	3,9%	2,5%
Plaintes ou signes cliniques	0,6%	1,7%	1,1%	3,7%	2,9%	3,3%	1,9%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Consommation médicamenteuse	0,6%	0,0%	0,4%	3,7%	0,0%	2,0%	0,9%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	1,7%	1,4%	4,9%	1,4%	3,3%	2,1%
HTA							
Existence d'un problème	3,7%	1,7%	2,9%	14,8%	20,0%	17,2%	7,9%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	1,7%	2,5%	13,6%	15,7%	14,6%	6,7%
Gêne dans le travail	0,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Consommation médicamenteuse	2,5%	0,8%	1,8%	11,1%	17,1%	13,9%	6,0%
Pathologie diagnostiquée	1,9%	0,8%	1,4%	9,9%	17,1%	13,2%	5,6%
➤ Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	14,1%	25,2%	18,8%	24,4%	34,7%	29,2%	22,5%
Plaintes ou signes cliniques	14,1%	25,2%	18,8%	24,4%	34,7%	29,2%	22,5%
Gêne dans le travail	5,6%	12,6%	8,5%	12,2%	16,7%	14,3%	10,6%
Consommation médicamenteuse	1,2%	5,0%	2,8%	1,2%	9,7%	5,2%	3,7%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	5,0%	2,9%	1,2%	5,6%	3,3%	3,0%
➤ Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	20,2%	28,0%	23,5%	30,5%	30,6%	30,5%	26,0%
Plaintes ou signes cliniques	19,6%	28,0%	23,1%	30,5%	29,2%	29,9%	25,5%
Gêne dans le travail	4,3%	11,9%	7,5%	14,6%	13,9%	14,3%	9,9%
Consommation médicamenteuse	3,1%	8,5%	5,3%	4,9%	9,7%	7,1%	6,0%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	5,1%	3,9%	2,4%	9,9%	5,9%	4,6%
➤ Trouble du sommeil							
Existence d'un problème	11,7%	23,7%	16,8%	24,4%	29,2%	26,6%	20,3%
Plaintes ou signes cliniques	11,1%	23,7%	16,4%	24,4%	29,2%	26,6%	20,0%
Gêne dans le travail	3,7%	8,5%	5,7%	6,1%	11,1%	8,4%	6,7%
Consommation médicamenteuse	2,5%	7,6%	4,6%	3,7%	9,7%	6,5%	5,3%
Pathologie diagnostiquée	0,6%	3,4%	1,8%	3,7%	5,6%	4,6%	2,8%
Troubles neuro psychiques							
(les 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	3,1%	9,3%	5,7%	9,8%	18,1%	13,6%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	9,3%	5,3%	9,8%	18,1%	13,6%	8,3%
Gêne dans le travail	1,2%	1,7%	1,4%	2,4%	5,6%	3,9%	2,3%
Consommation médicamenteuse	0,6%	1,7%	1,1%	0,0%	5,6%	2,6%	1,6%
Pathologie diagnostiquée	0,6%	1,7%	1,1%	1,2%	1,4%	1,3%	1,2%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=439
	Hommes n=165	Femmes n=119	Ensemble n=284	Hommes n=83*	Femmes n=72*	Ensemble n=155	
Digestif							
Existence d'un problème	7,4%	9,6%	8,3%	7,3%	18,8%	12,6%	9,8%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	9,6%	7,9%	7,3%	17,4%	11,9%	9,3%
Gêne dans le travail	0,0%	3,5%	1,4%	1,2%	4,3%	2,6%	1,9%
Consommation médicamenteuse	2,5%	2,6%	2,5%	3,7%	10,1%	6,6%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	3,5%	3,3%	6,1%	10,1%	7,9%	4,9%
Dermatologie							
Existence d'un problème	6,2%	7,6%	6,8%	4,9%	9,7%	7,1%	6,9%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	7,6%	6,8%	4,9%	9,7%	7,1%	6,9%
Gêne dans le travail	0,0%	1,7%	0,7%	2,4%	1,4%	1,9%	1,1%
Consommation médicamenteuse	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	1,4%	1,9%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	4,3%	5,1%	4,6%	3,7%	6,9%	5,2%	4,8%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	6,2%	0,8%	3,9%	24,4%	1,4%	13,6%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	0,8%	2,8%	23,2%	1,4%	13,0%	6,4%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	8,5%	0,0%	4,5%	1,6%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,6%	0,2%
Pathologie diagnostiquée	5,6%	0,8%	3,6%	11,0%	1,4%	6,5%	4,6%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur							
(l'un des 3 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	9,3%	13,4%	11,0%	26,8%	27,8%	27,3%	16,8%
Plaintes ou signes cliniques	9,3%	12,6%	10,7%	26,8%	27,8%	27,3%	16,6%
Gêne dans le travail	4,9%	5,1%	5,0%	15,9%	18,1%	16,9%	9,2%
Consommation médicamenteuse	2,5%	0,8%	1,8%	7,3%	8,5%	7,8%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	4,3%	5,1%	4,6%	13,4%	21,1%	17,0%	9,0%
➤ Epaule							
Existence d'un problème	4,9%	5,0%	5,0%	19,5%	19,4%	19,5%	10,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	5,0%	5,0%	19,5%	19,4%	19,5%	10,1%
Gêne dans le travail	3,1%	2,5%	2,8%	8,5%	13,9%	11,0%	5,7%
Consommation médicamenteuse	0,6%	0,0%	0,4%	4,9%	6,9%	5,8%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	1,7%	2,1%	8,5%	15,5%	11,8%	5,5%
➤ Coude							
Existence d'un problème	3,1%	1,7%	2,5%	11,0%	6,9%	9,1%	4,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	1,7%	2,5%	11,0%	6,9%	9,1%	4,8%
Gêne dans le travail	1,8%	0,8%	1,4%	9,8%	5,6%	7,8%	3,7%
Consommation médicamenteuse	1,8%	0,0%	1,1%	6,1%	5,6%	5,8%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	0,8%	1,4%	6,1%	5,6%	5,8%	3,0%
➤ Poignet							
Existence d'un problème	3,1%	7,6%	5,0%	3,7%	8,3%	5,8%	5,3%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	6,7%	4,6%	3,7%	8,3%	5,8%	5,0%
Gêne dans le travail	1,2%	2,5%	1,8%	3,7%	5,6%	4,5%	2,8%
Consommation médicamenteuse	0,6%	0,8%	0,7%	2,4%	1,4%	2,0%	1,1%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	2,5%	1,8%	2,4%	6,9%	4,5%	2,8%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=439	
	Hommes n=165	Femmes n=119	Ensemble n=284	Hommes n=83*	Femmes n=72*	Ensemble n=155		
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur								
(Existence d'un problème)								
Existence d'un problème	9,2%	9,2%	9,2%	23,2%	21,1%	22,2%	13,8%	
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	9,2%	8,9%	23,2%	19,7%	21,6%	13,3%	
Gêne dans le travail	4,3%	5,0%	4,6%	12,2%	9,9%	11,1%	6,9%	
Consommation médicamenteuse	1,8%	2,5%	2,1%	7,3%	7,0%	7,2%	3,9%	
Pathologie diagnostiquée	4,9%	5,0%	5,0%	12,2%	14,1%	13,1%	7,8%	
Troubles ostéoarticulaires du rachis								
(l'un des 2 signes ci-dessous)								
Existence d'un problème	21,0%	32,5%	25,8%	33,3%	40,8%	36,8%	29,7%	
Plaintes ou signes cliniques	18,5%	32,5%	24,4%	33,3%	40,8%	36,8%	28,8%	
Gêne dans le travail	11,1%	23,3%	16,2%	16,3%	22,9%	19,3%	17,3%	
Consommation médicamenteuse	6,8%	6,9%	6,8%	10,0%	8,7%	9,4%	7,7%	
Pathologie diagnostiquée	8,6%	11,2%	9,7%	13,8%	15,7%	14,7%	11,4%	
➤ Vertèbres cervicales								
Existence d'un problème	8,6%	13,6%	10,7%	13,6%	25,4%	19,1%	13,7%	
Plaintes ou signes cliniques	8,6%	13,6%	10,7%	13,6%	25,4%	19,1%	13,7%	
Gêne dans le travail	4,3%	10,2%	6,8%	4,9%	14,1%	9,2%	7,6%	
Consommation médicamenteuse	3,7%	3,4%	3,6%	3,7%	7,0%	5,3%	4,2%	
Pathologie diagnostiquée	3,1%	5,1%	3,9%	4,9%	14,3%	9,3%	5,8%	
➤ Vertèbres dorsolumbaires								
Existence d'un problème	17,9%	23,9%	20,4%	23,2%	25,7%	24,3%	21,8%	
Plaintes ou signes cliniques	15,4%	23,9%	19,0%	23,2%	25,7%	24,3%	20,9%	
Gêne dans le travail	8,0%	16,4%	11,5%	12,3%	11,4%	11,9%	11,7%	
Consommation médicamenteuse	4,9%	5,2%	5,0%	7,4%	4,3%	6,0%	5,4%	
Pathologie diagnostiquée	7,4%	7,8%	7,6%	9,9%	7,1%	8,6%	7,9%	

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence