



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2008-2009

**Région Lorraine**

**Juin 2010**

---

))) afsset • )))



Institut de Santé au Travail  
du Nord de la France  
Nord - Pas de Calais / Picardie



Université Lille 2  
Droit et Santé

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Everest 2008-2009 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

## Descriptif de l'échantillon Lorraine

L'exploitation des données de la région Lorraine a porté sur **2 319 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2008 (n=958) et 2009 (n=1361).

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Everest semble plus proche, en ce qui concerne le secteur d'activité, du champ des salariés des DADS, comprenant les secteurs publics et privés que du champ des salariés du privé seul (Unedic) (tableau 1).

Tableau 1 : Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Lorraine 2008-2009 aux données Insee (DADS 2007) et Unedic (2008).

Caractéristiques générales des salariés	Echantillon Lorraine 2008-2009 (n=2319)	Données INSEE 2007 (DADS)	Données UNEDIC 2008
	%	%	%
<b>Sexe</b>			
Hommes	56,8	54,5	55,8
Femmes	43,2	45,5	44,2
<b>Age</b>			
≤ 24 ans	11,8	16,7	-
25-34 ans	25,5	23,5	-
35-44 ans	28,3	25,2	-
45- 54 ans	26,1	24,5	-
55 ans et plus	8,3	10,1	-
<b>Catégorie socioprofessionnelle</b>			
Salariés de leur entreprise	1,2	0,6	-
Chef d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures	9,8	8,1	-
Professions intermédiaires	22,1	21,0	-
Employés	30,6	33,1	-
Ouvriers	36,3	37,1	-
<b>Secteur d'activité</b>			
Agriculture	0,0	0,0	0,0
Industrie	19,6	21,3	25,6
Construction	8,4	7,8	9,8
Commerce	18,8	15,1	18,8
Services	53,2	55,9	45,8

- : informations non disponibles

Les effectifs par catégories socioprofessionnelles permettent de fournir des résultats pour les Cadres, les Professions intermédiaires, les Employés et les Ouvriers (tableau 2).

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional Lorraine 2008-2009 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003)	Effectifs	%
<b>Artisans, commerçants et chefs d'entreprises</b>	<b>28</b>	<b>1,2</b>
<b>Cadres et professions intellectuelles supérieures</b>	<b>227</b>	<b>9,8</b>
<b>Professions intermédiaires</b>	<b>512</b>	<b>22,1</b>
<b>Employés</b>	<b>709</b>	<b>30,6</b>
<b>Ouvriers</b>	<b>841</b>	<b>36,3</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>2</b>	<b>0,1</b>
<b>Total général</b>	<b>2319</b>	<b>100,0</b>

En ce qui concerne les secteurs d'activité, 5 sont suffisamment représentés pour faire l'objet d'un descriptif détaillé : Industrie manufacturière, Construction, Commerce; réparations d'automobile et de motocycles, Activités de services administratifs et de soutien, Santé humaine et action sociale (néanmoins, 2 d'entre eux ont des effectifs inférieurs à 200, et nécessitent d'être utilisés avec prudence) (tableau 3).

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional Lorraine 2008-2009 selon les secteurs d'activité

Activité économique NAF 2008	Effectifs	%
<b>AGRICULTURE</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A. Agriculture, sylviculture et pêche	0	0,0
<b>INDUSTRIE</b>	<b>449</b>	<b>19,4</b>
B. Industries extractives	9	0,4
<b>C. Industrie manufacturière</b>	<b>379</b>	<b>16,3</b>
D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné	14	0,6
E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	47	2,0
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>193</b>	<b>8,3</b>
<b>F. Construction</b>	<b>193</b>	<b>8,3</b>
<b>COMMERCE</b>	<b>431</b>	<b>18,6</b>
<b>G. Commerce; réparations automobile et de motocycles</b>	<b>431</b>	<b>18,6</b>
<b>SERVICES</b>	<b>1221</b>	<b>52,7</b>
H. Transports et entreposage	149	6,4
I. Hébergement et restauration	67	2,9
J. Information et communication	81	3,5
K. Activités financières et d'assurance	75	53,2
L. Activités immobilières	21	0,9
M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques	99	4,3
<b>N. Activités de services administratifs et de soutien</b>	<b>191</b>	<b>8,2</b>
O. Administration publique	104	4,5
P. Enseignement	37	1,6
<b>Q. Santé humaine et action sociale</b>	<b>318</b>	<b>13,7</b>
R. Arts, spectacles et activités récréatives	22	0,9
S. Autres activités de services	57	2,5
T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0	0,0
Données manquantes	25	1,1
<b>Total général</b>	<b>2319</b>	<b>100,0</b>

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

Description de la population	Hommes n=1318	Femmes n=1001	Ensemble n=2319
≤24ans	10,8%	13,1%	11,8%
25-34ans	26,2%	24,6%	25,5%
35-44ans	30,0%	26,0%	28,3%
45-54ans	25,1%	27,5%	26,1%
≥55ans	7,8%	8,9%	8,3%
Conditions de travail	Hommes n=1318	Femmes n=1001	Ensemble n=2319
Changement de travail depuis 1an :			
Non	90,1%	88,3%	89,3%
Oui, raison médicale	0,8%	0,5%	0,6%
Oui, autre raison	8,7%	10,9%	9,7%
Oui, raison non précisée	0,4%	0,3%	0,3%
Personnes travaillant à temps plein	92,3%	68,7%	82,1%
Travail en journée normale	76,9%	79,4%	78,0%
Coupures de plus de 2 heures	16,4%	20,4%	18,1%
Horaires décalés	32,0%	25,3%	29,1%
Horaires irréguliers ou alternés	31,1%	34,0%	32,3%
Travail de nuit	19,9%	10,6%	15,9%
Déplacements professionnels de plus de 24h	14,9%	3,0%	9,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	50,8%	53,6%	52,0%
Parmi eux :			
➤ Perturbe travail	56,5%	59,6%	57,9%
➤ Sans conséquence	46,0%	43,1%	44,7%
➤ Aspect positif sur travail	38,2%	39,2%	38,7%
Dépasser horaires normaux	42,3%	32,1%	37,9%
Sauter repas ou pas de pause	25,7%	24,9%	25,3%
Traiter trop vite une opération	21,9%	25,4%	23,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	19,9%	20,2%	20,0%
Travail pas varié	19,0%	22,7%	20,6%
Pas de choix dans la façon de procéder	21,5%	27,3%	24,0%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	16,3%	18,9%	17,4%
Travail pas reconnu	23,1%	27,3%	24,9%
Formations et informations insuffisantes	18,7%	20,6%	19,5%
Objectifs et consignes pas clairement définis	16,8%	17,2%	17,0%
Pression temporelle forte (>5)	41,9%	36,9%	39,7%

<b>Charge physique du poste de travail</b>	<b>Hommes n=1318</b>	<b>Femmes n=1001</b>	<b>Ensemble n=2319</b>
<b>Postures contraignantes :</b>			
Non	32,1%	41,8%	36,3%
Oui, difficile ou pénible	35,0%	30,8%	33,2%
Oui, pas difficile ou pénible	30,7%	25,3%	28,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,2%	2,1%	2,2%
<b>Effort, Port de charges lourdes :</b>			
Non	37,5%	49,3%	42,6%
Oui, difficile ou pénible	33,5%	30,1%	32,0%
Oui, pas difficile ou pénible	26,7%	18,9%	23,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,3%	1,7%	2,0%
<b>Gestes répétitifs :</b>			
Non	33,4%	32,3%	32,9%
Oui, difficile ou pénible	23,4%	23,7%	23,5%
Oui, pas difficile ou pénible	39,9%	40,3%	40,1%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,3%	3,7%	3,5%
<b>Importants déplacements à pieds :</b>			
Non	45,8%	61,7%	52,7%
Oui, difficile ou pénible	15,6%	13,7%	14,8%
Oui, pas difficile ou pénible	36,0%	23,1%	30,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,6%	1,5%	2,1%
<b>Station debout prolongée :</b>			
Non	35,9%	42,6%	38,8%
Oui, difficile ou pénible	25,0%	28,1%	26,3%
Oui, pas difficile ou pénible	36,4%	27,4%	32,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,7%	1,8%	2,3%

<b>Expositions</b>	<b>Hommes n=1318</b>	<b>Femmes n=1001</b>	<b>Ensemble n=2319</b>
Produits chimiques	33,0%	18,9%	26,4%
Poussières, fumées	49,2%	19,2%	35,2%
Rx ionisants	2,0%	1,6%	1,8%
Vibrations	30,2%	4,9%	18,4%
Gêne sonore	49,8%	29,6%	40,4%
Bruit > 80db	36,7%	9,4%	24,0%
Contrainte visuelle	30,3%	35,5%	32,7%
Conduite routière prolongée	18,8%	4,5%	12,1%
Chaleur intense	19,1%	10,9%	15,3%
Froid intense	14,3%	8,2%	11,4%
Intempéries	20,1%	3,8%	12,5%
Pression psychologique	24,9%	26,3%	25,5%
Agent biologique	5,5%	9,1%	7,2%
Contact avec public	57,9%	63,0%	60,3%

<b>Formation</b>	<b>Hommes n=1318</b>	<b>Femmes n=1001</b>	<b>Ensemble n=2319</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	47,2%	47,7%	47,4%
Parmi eux :			
➤ En rapport avec travail actuel	91,9%	88,6%	90,5%
➤ En rapport avec travail futur	15,4%	11,8%	13,9%
➤ Formation d'intérêt général	54,8%	54,6%	54,7%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	31,0%	24,0%	28,0%

  

<b>Mode de vie</b>	<b>Hommes n=1318</b>	<b>Femmes n=1001</b>	<b>Ensemble n=2319</b>
Activité sportive régulière	50,4%	44,1%	47,7%
Consommation de tabac	47,1%	34,7%	41,8%
Consommation de tabac>15 cig / j	18,9%	7,5%	14,0%
Consommation de café	85,3%	75,7%	81,2%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	24,5%	18,5%	21,9%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	18,0%	14,8%	16,6%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2319
	Hommes n=884	Femmes n=637	Ensemble n=1521	Hommes n=434	Femmes n=364	Ensemble n=798	
<b>Indice de masse corporelle</b>							
➤ Normaux ou maigres	54,5%	69,4%	60,7%	38,5%	54,7%	45,9%	55,6%
➤ Surpoids	33,9%	19,8%	28,0%	44,0%	29,2%	37,2%	31,1%
➤ Obèses	11,7%	10,9%	11,3%	17,5%	16,1%	16,9%	13,2%
<b>Appareil respiratoire</b>							
Existence d'un problème	4,0%	4,3%	4,1%	4,2%	3,6%	3,9%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	3,8%	3,7%	3,7%	3,4%	3,6%	3,6%
Gêne dans le travail	0,5%	0,3%	0,4%	0,5%	0,8%	0,6%	0,5%
Consommation médicamenteuse	1,8%	2,9%	2,3%	1,9%	1,4%	1,7%	2,1%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	3,5%	2,9%	2,6%	2,5%	2,5%	2,8%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>							
Existence d'un problème	1,6%	4,1%	2,7%	8,4%	7,8%	8,2%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	3,8%	2,4%	7,0%	6,7%	6,9%	3,9%
Gêne dans le travail	0,5%	1,8%	1,0%	1,9%	2,2%	2,0%	1,4%
Consommation médicamenteuse	0,7%	2,2%	1,3%	7,5%	4,7%	6,2%	3,0%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	2,9%	2,0%	8,2%	6,7%	7,5%	3,9%
<b>HTA</b>							
Existence d'un problème	3,3%	2,9%	3,2%	20,4%	13,6%	17,3%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,4%	2,1%	2,3%	13,1%	9,6%	11,5%	5,5%
Gêne dans le travail	0,1%	0,3%	0,2%	1,2%	1,7%	1,4%	0,6%
Consommation médicamenteuse	2,4%	2,4%	2,4%	16,4%	11,6%	14,2%	6,5%
Pathologie diagnostiquée	2,8%	2,3%	2,6%	17,2%	11,9%	14,8%	6,7%
<b>➤ Lassitude, fatigue</b>							
Existence d'un problème	18,4%	24,9%	21,1%	18,0%	35,2%	25,9%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	18,2%	24,4%	20,8%	18,0%	34,4%	25,5%	22,4%
Gêne dans le travail	7,8%	11,2%	9,2%	8,9%	17,7%	12,9%	10,5%
Consommation médicamenteuse	1,4%	3,5%	2,3%	0,5%	5,9%	2,9%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	2,1%	4,3%	3,0%	1,6%	7,3%	4,2%	3,4%
<b>➤ Anxiété, nervosité</b>							
Existence d'un problème	17,2%	24,6%	20,3%	18,5%	29,3%	23,5%	21,4%
Plaintes ou signes cliniques	16,7%	24,3%	19,9%	18,4%	29,1%	23,2%	21,0%
Gêne dans le travail	7,8%	8,7%	8,2%	7,3%	12,6%	9,7%	8,7%
Consommation médicamenteuse	2,0%	6,3%	3,7%	2,1%	8,2%	4,9%	4,1%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	6,1%	4,5%	1,9%	7,8%	4,6%	4,6%
<b>➤ Trouble du sommeil</b>							
Existence d'un problème	15,9%	17,4%	16,5%	17,3%	31,0%	23,6%	18,9%
Plaintes ou signes cliniques	15,4%	17,0%	16,1%	17,1%	30,4%	23,2%	18,5%
Gêne dans le travail	6,9%	6,2%	6,6%	7,3%	11,6%	9,3%	7,5%
Consommation médicamenteuse	3,4%	3,6%	3,5%	4,0%	8,0%	5,8%	4,3%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	2,6%	2,6%	2,9%	8,5%	5,4%	3,6%
<b>Troubles neuro psychiques</b>							
(les 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	5,2%	7,8%	6,3%	4,7%	14,0%	8,9%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	7,8%	6,2%	4,7%	13,4%	8,7%	7,0%
Gêne dans le travail	1,7%	1,9%	1,8%	1,6%	5,6%	3,4%	2,4%
Consommation médicamenteuse	0,8%	0,6%	0,7%	0,2%	2,2%	1,1%	0,9%
Pathologie diagnostiquée	0,6%	1,3%	0,9%	0,5%	3,1%	1,7%	1,1%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2319
	Hommes n=884	Femmes n=637	Ensemble n=1521	Hommes n=434	Femmes n=364	Ensemble n=798	
<b>Digestif</b>							
Existence d'un problème	6,4%	10,8%	8,2%	8,3%	7,7%	8,0%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,2%	10,4%	8,0%	7,4%	7,1%	7,3%	7,7%
Gêne dans le travail	1,1%	2,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Consommation médicamenteuse	3,1%	4,7%	3,8%	4,1%	3,4%	3,8%	3,8%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	6,5%	4,5%	5,3%	3,1%	4,3%	4,5%
<b>Dermatologie</b>							
Existence d'un problème	5,2%	7,9%	6,3%	5,2%	6,7%	5,9%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,8%	7,4%	5,9%	5,2%	6,4%	5,7%	5,8%
Gêne dans le travail	1,1%	1,3%	1,2%	2,1%	1,4%	1,8%	1,4%
Consommation médicamenteuse	2,4%	4,5%	3,3%	1,9%	2,5%	2,2%	2,9%
Pathologie diagnostiquée	3,6%	6,9%	5,0%	4,7%	5,3%	5,0%	5,0%
<b>Troubles de l'audition</b>							
Existence d'un problème	5,2%	1,9%	3,8%	17,1%	5,7%	11,9%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,6%	1,4%	3,3%	15,5%	5,7%	11,0%	6,0%
Gêne dans le travail	0,9%	0,6%	0,8%	3,8%	3,1%	3,5%	1,7%
Consommation médicamenteuse	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	1,4%	0,8%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	1,6%	2,6%	13,6%	3,7%	9,1%	4,9%
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b>							
(l'un des 3 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	13,2%	17,4%	15,0%	23,8%	34,1%	28,5%	19,6%
Plaintes ou signes cliniques	13,0%	17,1%	14,7%	23,3%	33,8%	28,1%	19,3%
Gêne dans le travail	7,6%	12,3%	9,5%	14,6%	23,7%	18,7%	12,7%
Consommation médicamenteuse	2,3%	5,5%	3,6%	5,2%	13,8%	9,1%	5,5%
Pathologie diagnostiquée	6,3%	9,2%	7,5%	13,0%	17,3%	14,9%	10,1%
<b>➤ Epaule</b>							
Existence d'un problème	8,3%	10,7%	9,3%	15,7%	25,4%	20,1%	13,0%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	10,7%	9,2%	15,5%	25,1%	19,8%	12,9%
Gêne dans le travail	4,5%	7,5%	5,8%	9,6%	16,4%	12,7%	8,1%
Consommation médicamenteuse	1,6%	4,3%	2,7%	4,0%	9,9%	6,7%	4,1%
Pathologie diagnostiquée	4,3%	5,8%	4,9%	8,4%	11,4%	9,8%	6,6%
<b>➤ Coude</b>							
Existence d'un problème	3,9%	3,4%	3,7%	7,7%	8,3%	8,0%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	3,2%	3,5%	7,7%	8,3%	8,0%	5,1%
Gêne dans le travail	2,2%	2,6%	2,3%	5,2%	6,3%	5,7%	3,5%
Consommation médicamenteuse	0,9%	1,8%	1,3%	1,4%	3,7%	2,4%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	1,9%	1,8%	4,4%	5,1%	4,8%	2,8%
<b>➤ Poignet</b>							
Existence d'un problème	4,0%	8,4%	5,8%	8,0%	11,9%	9,8%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,0%	8,2%	5,8%	7,8%	11,9%	9,6%	7,1%
Gêne dans le travail	2,6%	6,0%	4,0%	4,2%	9,9%	6,8%	5,0%
Consommation médicamenteuse	0,2%	1,3%	0,7%	0,9%	5,1%	2,8%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	3,5%	2,3%	2,8%	5,6%	4,1%	3,0%

Etat de santé	<45 ans			≥45 ans			Global n=2319
	Hommes n=884	Femmes n=637	Ensemble n=1521	Hommes n=434	Femmes n=364	Ensemble n=798	
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>							
Existence d'un problème	9,3%	8,6%	9,0%	13,6%	15,7%	14,5%	10,9%
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	8,3%	8,6%	13,3%	15,7%	14,4%	10,6%
Gêne dans le travail	5,0%	4,0%	4,6%	7,3%	8,1%	7,7%	5,6%
Consommation médicamenteuse	1,6%	2,6%	2,0%	2,3%	6,2%	4,1%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	5,4%	5,8%	5,6%	7,0%	8,7%	7,8%	6,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>							
(l'un des 2 signes ci-dessous)							
Existence d'un problème	25,0%	32,6%	28,2%	38,5%	46,5%	42,2%	33,0%
Plaintes ou signes cliniques	24,5%	31,8%	27,5%	37,4%	46,3%	41,4%	32,3%
Gêne dans le travail	12,6%	19,7%	15,6%	25,4%	32,2%	28,5%	20,0%
Consommation médicamenteuse	5,4%	11,5%	8,0%	12,3%	21,3%	16,4%	10,9%
Pathologie diagnostiquée	9,6%	14,4%	11,6%	25,1%	28,4%	26,6%	16,7%
➤ <b>Vertèbres cervicales</b>							
Existence d'un problème	8,3%	17,4%	12,1%	12,3%	27,6%	19,3%	14,6%
Plaintes ou signes cliniques	8,3%	17,3%	12,0%	11,6%	27,4%	18,8%	14,3%
Gêne dans le travail	4,5%	11,2%	7,3%	7,3%	18,1%	12,2%	9,0%
Consommation médicamenteuse	1,5%	7,7%	4,1%	4,7%	13,2%	8,6%	5,6%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	7,2%	4,5%	6,9%	16,2%	11,1%	6,7%
➤ <b>Vertèbres dorsolumbaires</b>							
Existence d'un problème	21,0%	22,4%	21,6%	32,5%	34,6%	33,4%	25,7%
Plaintes ou signes cliniques	20,5%	21,6%	21,0%	31,5%	34,6%	32,9%	25,1%
Gêne dans le travail	10,6%	12,4%	11,3%	21,7%	25,0%	23,2%	15,4%
Consommation médicamenteuse	4,7%	6,5%	5,4%	10,1%	15,3%	12,5%	7,9%
Pathologie diagnostiquée	8,1%	9,4%	8,6%	20,3%	20,5%	20,4%	12,6%

**Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles**

Description de la population	Cadres n=227	Intermédiaires n=512	Employés n=709	Ouvriers n=841	Région n=2319
C Industrie manufacturière	13,7%	16,4%	4,1%	27,6%	16,3%
F Construction	6,6%	4,5%	1,7%	16,9%	8,3%
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	12,3%	16,4%	28,5%	12,1%	18,6%
N Activités de services administratifs et de soutien	4,8%	3,9%	5,5%	14,3%	8,2%
Q Santé humaine et action sociale	8,8%	22,9%	21,7%	3,0%	13,7%
Répartition homme/femme	67,4%/32,6%	54,7%/45,3%	19,5%/80,5%	86,0%/14,0%	56,8%/43,2%
≤24ans	4,0%	9,8%	15,4%	12,6%	11,8%
25-34ans	25,6%	29,9%	24,1%	24,3%	25,5%
35-44ans	36,6%	28,5%	24,5%	28,7%	28,3%
45-54ans	22,5%	22,9%	27,9%	27,5%	26,1%
≥55ans	11,5%	9,0%	8,0%	7,0%	8,3%

Conditions de travail	Cadres n=227	Intermédiaires n=512	Employés n=709	Ouvriers n=841	Région n=2319
Changement de travail depuis 1an :					
Non	87,7%	91,2%	88,5%	89,0%	89,3%
Oui, raison médicale	0,0%	0,2%	0,7%	1,1%	0,6%
Oui, autre raison	12,3%	8,4%	10,5%	9,3%	9,7%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,2%	0,3%	0,6%	0,3%
Personnes travaillant à temps plein	90,7%	86,2%	68,0%	89,0%	82,1%
Travail en journée normale	88,8%	85,1%	78,4%	69,7%	78,0%
Coupures de plus de 2 heures	15,4%	15,7%	22,6%	16,2%	18,1%
Horaires décalés	22,3%	24,4%	25,5%	37,5%	29,1%
Horaires irréguliers ou alternés	27,7%	31,4%	34,0%	33,5%	32,3%
Travail de nuit	6,6%	14,4%	11,6%	23,4%	15,9%
Déplacements professionnels de plus de 24h	30,6%	9,5%	1,3%	10,7%	9,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	67,7%	59,7%	53,1%	41,3%	52,0%
Parmi eux :					
➤ Perturbe travail	52,0%	63,6%	58,1%	54,8%	57,9%
➤ Sans conséquence	45,5%	40,5%	42,0%	50,8%	44,7%
➤ Aspect positif sur travail	47,1%	39,4%	36,4%	36,4%	38,7%
Dépasser horaires normaux	68,9%	49,0%	26,4%	31,2%	37,9%
Sauter repas ou pas de pause	38,1%	33,5%	21,1%	20,0%	25,3%
Traiter trop vite une opération	29,2%	26,5%	23,3%	19,6%	23,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	6,6%	10,4%	22,3%	27,8%	20,0%
Travail pas varié	6,2%	12,3%	24,6%	26,5%	20,6%
Pas de choix dans la façon de procéder	6,6%	21,7%	27,6%	27,4%	24,0%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	12,8%	12,8%	20,2%	19,3%	17,4%
Travail pas reconnu	13,4%	21,7%	27,2%	28,3%	24,9%
Formations et informations insuffisantes	12,8%	21,5%	21,4%	18,4%	19,5%
Objectifs et consignes pas clairement définis	15,0%	19,4%	17,1%	15,9%	17,0%
Pression temporelle forte (>5)	48,2%	42,5%	36,2%	38,1%	39,7%

Charge physique du poste de travail	Cadres n=227	Intermédiaires n=512	Employés n=709	Ouvriers n=841	Région n=2319
Postures contraignantes :					
Non	62,6%	43,1%	41,5%	19,7%	36,3%
Oui, difficile ou pénible	12,8%	26,4%	31,6%	44,6%	33,2%
Oui, pas difficile ou pénible	22,9%	29,2%	25,2%	32,5%	28,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,8%	1,4%	1,7%	3,2%	2,2%
Effort, Port de charges lourdes :					
Non	74,2%	52,1%	49,1%	22,4%	42,6%
Oui, difficile ou pénible	9,8%	24,4%	30,0%	44,9%	32,0%
Oui, pas difficile ou pénible	14,2%	22,4%	19,7%	29,2%	23,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,8%	1,2%	1,1%	3,5%	2,0%
Gestes répétitifs :					
Non	67,0%	52,6%	29,1%	14,1%	32,9%
Oui, difficile ou pénible	5,3%	15,5%	25,0%	32,6%	23,5%
Oui, pas difficile ou pénible	24,2%	29,9%	42,8%	48,5%	40,1%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,5%	2,0%	3,1%	4,8%	3,5%
Importants déplacements à pieds :					
Non	77,1%	55,7%	60,4%	37,5%	52,7%
Oui, difficile ou pénible	3,5%	11,6%	14,6%	19,9%	14,8%
Oui, pas difficile ou pénible	17,6%	30,8%	23,9%	39,3%	30,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,8%	2,0%	1,1%	3,2%	2,1%
Station debout prolongée :					
Non	71,2%	45,9%	40,2%	24,3%	38,8%
Oui, difficile ou pénible	5,3%	20,9%	30,6%	32,0%	26,3%
Oui, pas difficile ou pénible	21,2%	32,0%	27,6%	40,1%	32,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,2%	1,2%	1,7%	3,7%	2,3%

Expositions	Cadres n=227	Intermédiaires n=512	Employés n=709	Ouvriers n=841	Région n=2319
Produits chimiques	12,3%	25,0%	20,6%	40,4%	27,8%
Poussières, fumées	16,4%	25,5%	18,8%	68,7%	38,4%
Rx ionisants	1,8%	3,7%	1,7%	2,1%	2,3%
Vibrations	5,8%	12,0%	3,1%	47,9%	21,6%
Gêne sonore	20,8%	37,3%	27,8%	68,1%	43,8%
Bruit > 80db	12,4%	22,0%	6,4%	52,6%	27,2%
Contrainte visuelle	36,0%	35,8%	27,2%	29,5%	30,7%
Conduite routière prolongée	27,7%	20,1%	5,0%	21,5%	16,7%
Chaleur intense	8,5%	11,8%	13,2%	31,2%	18,8%
Froid intense	3,5%	7,9%	7,8%	29,9%	15,3%
Intempéries	7,6%	13,0%	7,7%	36,6%	19,5%
Pression psychologique	27,2%	35,9%	28,0%	25,2%	28,7%
Agent biologique	8,1%	18,5%	14,1%	8,3%	12,2%
Contact avec public	71,4%	78,1%	80,8%	50,3%	68,2%

<b>Formation</b>	<b>Cadres n=227</b>	<b>Intermédiaires n=512</b>	<b>Employés n=709</b>	<b>Ouvriers n=841</b>	<b>Région n=2319</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	62,6%	61,0%	44,8%	37,2%	47,4%
Parmi eux :					
➤ En rapport avec travail actuel	95,6%	93,4%	88,4%	87,2%	90,5%
➤ En rapport avec travail futur	9,9%	11,1%	16,5%	15,3%	13,9%
➤ Formation d'intérêt général	55,7%	58,8%	50,5%	53,2%	54,7%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	54,1%	38,1%	21,0%	19,6%	28,0%

<b>Mode de vie</b>	<b>Cadres n=227</b>	<b>Intermédiaires n=512</b>	<b>Employés n=709</b>	<b>Ouvriers n=841</b>	<b>Région n=2319</b>
Activité sportive régulière	53,2%	55,0%	43,9%	44,2%	47,7%
Consommation de tabac	25,7%	34,0%	36,6%	55,4%	41,8%
Consommation de tabac>15 cig / j	6,8%	8,7%	8,5%	23,8%	14,0%
Consommation de café	81,7%	81,4%	76,1%	85,0%	81,2%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	20,2%	17,8%	19,4%	26,8%	21,9%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	19,4%	19,1%	14,8%	16,0%	16,6%

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=150	≥45ans n=77*	Ens. n=227	<45ans n=349	≥45ans n=163	Ens. n=512	<45ans n=454	≥45ans n=255	Ens. n=709	<45ans n=551	≥45ans n=290	Ens. n=841	<45ans n=1521	≥45ans n=798	Ens. n=2319
<b>Indice de masse corporelle</b>															
➤ Normaux ou maigres	60,3%	49,3%	56,6%	57,9%	46,2%	54,2%	66,6%	50,8%	60,9%	58,4%	40,2%	52,2%	60,7%	45,9%	55,6%
➤ Surpoids	28,1%	38,4%	31,5%	32,4%	44,9%	36,3%	21,1%	31,3%	24,8%	29,7%	38,4%	32,7%	28,0%	37,2%	31,1%
➤ Obèses	11,6%	12,3%	11,9%	9,7%	9,0%	9,5%	12,3%	17,9%	14,3%	11,9%	21,4%	15,1%	11,3%	16,9%	13,2%
<b>Appareil respiratoire</b>															
Existence d'un problème	6,8%	1,3%	4,9%	4,0%	3,8%	4,0%	4,0%	2,8%	3,6%	3,7%	5,9%	4,5%	4,1%	3,9%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	1,3%	4,0%	3,8%	3,1%	3,6%	3,6%	2,4%	3,1%	3,3%	5,6%	4,1%	3,7%	3,6%	3,6%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%	0,7%	1,4%	1,0%	0,4%	0,6%	0,5%
Consommation médic.	4,7%	1,3%	3,6%	2,0%	1,9%	2,0%	2,5%	1,6%	2,1%	1,7%	1,8%	1,7%	2,3%	1,7%	2,1%
Pathologie diagnostiquée	6,1%	1,3%	4,5%	3,2%	2,5%	3,0%	3,6%	2,4%	3,1%	1,5%	3,2%	2,1%	2,9%	2,5%	2,8%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>															
Existence d'un problème	1,4%	8,0%	3,6%	3,2%	4,4%	3,6%	4,5%	9,1%	6,2%	1,3%	9,8%	4,2%	2,7%	8,2%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	6,7%	3,1%	2,9%	3,1%	3,0%	4,3%	7,9%	5,6%	0,9%	8,4%	3,5%	2,4%	6,9%	3,9%
Gêne dans le travail	0,0%	1,3%	0,4%	0,6%	1,3%	0,8%	2,5%	2,4%	2,4%	0,4%	2,5%	1,1%	1,0%	2,0%	1,4%
Consommation médic.	0,7%	8,0%	3,1%	1,2%	3,1%	1,8%	2,7%	5,6%	3,7%	0,6%	8,4%	3,3%	1,3%	6,2%	3,0%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	8,0%	3,6%	2,3%	4,4%	3,0%	3,4%	7,9%	5,0%	0,9%	9,1%	3,8%	2,0%	7,5%	3,9%
<b>HTA</b>															
Existence d'un problème	4,7%	12,0%	7,2%	2,1%	21,5%	8,2%	2,7%	12,0%	6,0%	3,5%	20,8%	9,5%	3,2%	17,3%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	4,1%	10,7%	6,3%	1,5%	11,4%	4,6%	2,2%	8,4%	4,5%	2,0%	14,1%	6,2%	2,3%	11,5%	5,5%
Gêne dans le travail	0,0%	1,3%	0,4%	0,0%	0,6%	0,2%	0,4%	0,8%	0,6%	0,2%	2,5%	1,0%	0,2%	1,4%	0,6%
Consommation médic.	3,4%	12,0%	6,3%	1,8%	18,4%	7,0%	2,2%	9,6%	4,9%	2,4%	16,5%	7,3%	2,4%	14,2%	6,5%
Pathologie diagnostiquée	4,1%	12,0%	6,7%	1,5%	19,0%	7,0%	2,2%	10,0%	5,0%	2,8%	17,4%	7,8%	2,6%	14,8%	6,7%
<b>➤ Lassitude, fatigue</b>															
Existence d'un problème	22,4%	21,3%	22,1%	17,7%	23,3%	19,5%	24,8%	33,7%	28,0%	20,2%	21,3%	20,6%	21,1%	25,9%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	22,4%	21,3%	22,1%	17,7%	22,0%	19,1%	24,1%	33,7%	27,6%	19,9%	21,0%	20,2%	20,8%	25,5%	22,4%
Gêne dans le travail	7,5%	10,7%	8,6%	7,6%	13,8%	9,5%	12,1%	15,6%	13,3%	8,5%	10,8%	9,3%	9,2%	12,9%	10,5%
Consommation médic.	3,4%	1,3%	2,7%	1,7%	1,9%	1,8%	3,1%	6,0%	4,2%	1,7%	1,4%	1,6%	2,3%	2,9%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	4,8%	2,7%	4,1%	4,1%	1,9%	3,4%	2,7%	8,0%	4,6%	2,2%	2,8%	2,4%	3,0%	4,2%	3,4%
<b>➤ Anxiété, nervosité</b>															
Existence d'un problème	23,1%	17,3%	21,2%	17,8%	25,8%	20,4%	25,0%	27,0%	25,7%	17,1%	20,4%	18,2%	20,3%	23,5%	21,4%
Plaintes ou signes cliniques	23,1%	17,3%	21,2%	17,8%	25,2%	20,2%	24,3%	26,7%	25,2%	16,5%	20,4%	17,9%	19,9%	23,2%	21,0%
Gêne dans le travail	10,9%	9,3%	10,4%	7,6%	12,6%	9,2%	8,5%	11,2%	9,5%	7,2%	6,7%	7,0%	8,2%	9,7%	8,7%
Consommation médic.	2,0%	6,7%	3,6%	2,6%	5,1%	3,4%	6,3%	7,2%	6,6%	2,9%	2,5%	2,8%	3,7%	4,9%	4,1%
Pathologie diagnostiquée	5,4%	2,7%	4,5%	3,5%	5,1%	4,0%	6,7%	7,2%	6,9%	3,3%	2,8%	3,1%	4,5%	4,6%	4,6%
<b>➤ Trouble du sommeil</b>															
Existence d'un problème	17,7%	20,5%	18,6%	10,9%	17,7%	13,1%	19,1%	29,2%	22,8%	17,4%	22,3%	19,1%	16,5%	23,6%	18,9%
Plaintes ou signes cliniques	17,7%	20,5%	18,6%	10,6%	17,7%	12,9%	18,7%	28,4%	22,2%	16,8%	21,9%	18,5%	16,1%	23,2%	18,5%
Gêne dans le travail	6,1%	4,1%	5,5%	4,7%	8,9%	6,0%	6,6%	9,7%	7,7%	7,6%	10,2%	8,5%	6,6%	9,3%	7,5%
Consommation médic.	3,4%	5,6%	4,1%	0,9%	3,2%	1,6%	5,0%	8,1%	6,1%	3,7%	5,3%	4,3%	3,5%	5,8%	4,3%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	1,4%	2,7%	0,6%	4,4%	1,8%	3,7%	8,5%	5,4%	2,6%	4,6%	3,3%	2,6%	5,4%	3,6%
<b>Troubles neuro psychiques</b>															
(les 3 signes ci-dessus)															
Existence d'un problème	6,8%	9,3%	7,7%	4,9%	5,7%	5,2%	7,8%	11,5%	9,1%	5,7%	7,4%	6,3%	6,3%	8,9%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	9,3%	7,7%	4,9%	5,7%	5,2%	7,8%	11,5%	9,1%	5,5%	6,7%	5,9%	6,2%	8,7%	7,0%
Gêne dans le travail	2,0%	2,7%	2,3%	1,5%	3,1%	2,0%	2,0%	5,2%	3,1%	1,7%	2,1%	1,8%	1,8%	3,4%	2,4%
Consommation médic.	0,7%	0,0%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	2,4%	1,3%	0,9%	0,7%	0,8%	0,7%	1,1%	0,9%
Pathologie diagnostiquée	0,7%	0,0%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	1,1%	3,6%	2,0%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	1,7%	1,1%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=150	≥45ans n=77*	Ens. n=227	<45ans n=349	≥45ans n=163	Ens. n=512	<45ans n=454	≥45ans n=255	Ens. n=709	<45ans n=551	≥45ans n=290	Ens. n=841	<45ans n=1521	≥45ans n=798	Ens. n=2319
<b>Digestif</b>															
Existence d'un problème	10,0%	8,2%	9,4%	8,6%	7,1%	8,1%	10,3%	6,7%	9,0%	5,9%	9,3%	7,1%	8,2%	8,0%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	10,0%	8,2%	9,4%	8,6%	6,5%	7,9%	9,8%	6,7%	8,7%	5,5%	7,6%	6,2%	8,0%	7,3%	7,7%
Gêne dans le travail	2,1%	1,4%	1,9%	0,9%	2,6%	1,4%	2,8%	1,6%	2,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,7%	1,7%	1,7%
Consommation médic.	5,7%	4,1%	5,2%	4,2%	1,9%	3,5%	3,7%	3,2%	3,5%	3,1%	5,0%	3,7%	3,8%	3,8%	3,8%
Pathologie diagnostiquée	4,3%	5,5%	4,7%	5,9%	2,6%	4,9%	5,5%	3,6%	4,8%	2,9%	5,8%	3,9%	4,5%	4,3%	4,5%
<b>Dermatologie</b>															
Existence d'un problème	6,1%	5,4%	5,9%	5,9%	3,8%	5,2%	7,8%	7,5%	7,7%	5,4%	5,3%	5,3%	6,3%	5,9%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	5,4%	5,9%	5,3%	3,8%	4,8%	7,6%	7,5%	7,6%	4,8%	5,3%	5,0%	5,9%	5,7%	5,8%
Gêne dans le travail	0,0%	1,4%	0,5%	0,9%	0,6%	0,8%	1,8%	2,0%	1,9%	1,3%	2,5%	1,7%	1,2%	1,8%	1,4%
Consommation médic.	4,1%	2,7%	3,6%	3,5%	0,0%	2,4%	4,3%	2,8%	3,7%	2,2%	2,8%	2,4%	3,3%	2,2%	2,9%
Pathologie diagnostiquée	6,1%	5,4%	5,9%	4,1%	3,1%	3,8%	6,5%	6,0%	6,3%	3,9%	4,6%	4,1%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>Troubles de l'audition</b>															
Existence d'un problème	1,4%	4,1%	2,3%	3,2%	7,0%	4,4%	1,8%	4,4%	2,7%	6,7%	22,5%	12,2%	3,8%	11,9%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	2,7%	1,8%	2,6%	7,0%	4,0%	1,6%	4,4%	2,6%	5,8%	20,4%	10,8%	3,3%	11,0%	6,0%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	2,5%	1,4%	0,9%	1,2%	1,0%	0,9%	6,0%	2,7%	0,8%	3,5%	1,7%
Consommation médic.	0,7%	0,0%	0,5%	0,6%	1,3%	0,8%	0,0%	0,8%	0,3%	0,2%	0,4%	0,2%	0,3%	0,8%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	4,1%	2,3%	2,4%	5,1%	3,2%	1,3%	3,2%	2,0%	4,3%	17,3%	8,8%	2,6%	9,1%	4,9%
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)</b>															
Existence d'un problème	11,6%	16,0%	13,1%	11,4%	22,3%	14,9%	15,7%	31,2%	21,2%	17,8%	33,5%	23,2%	15,0%	28,5%	19,6%
Plaintes ou signes cliniques	11,6%	16,0%	13,1%	10,9%	21,7%	14,3%	15,7%	30,8%	21,1%	17,4%	33,1%	22,8%	14,7%	28,1%	19,3%
Gêne dans le travail	5,4%	9,3%	6,8%	6,5%	15,3%	9,3%	11,7%	20,0%	14,6%	10,9%	22,5%	14,9%	9,5%	18,7%	12,7%
Consommation médic.	3,4%	4,1%	3,6%	1,8%	8,9%	4,0%	4,3%	12,2%	7,1%	4,3%	8,2%	5,6%	3,6%	9,1%	5,5%
Pathologie diagnostiquée	6,1%	10,7%	7,7%	5,9%	12,7%	8,0%	8,1%	15,2%	10,6%	8,7%	17,7%	11,8%	7,5%	14,9%	10,1%
<b>➤ Epaule</b>															
Existence d'un problème	8,2%	9,3%	8,6%	7,3%	11,3%	8,6%	10,1%	23,9%	15,1%	10,4%	24,6%	15,3%	9,3%	20,1%	13,0%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	9,3%	8,6%	7,0%	10,7%	8,2%	10,1%	23,5%	14,9%	10,4%	24,6%	15,3%	9,2%	19,8%	12,9%
Gêne dans le travail	4,1%	4,0%	4,1%	3,8%	6,9%	4,8%	7,6%	14,4%	10,1%	5,9%	16,9%	9,7%	5,8%	12,7%	8,1%
Consommation médic.	2,0%	2,7%	2,3%	1,7%	6,3%	3,2%	3,4%	9,6%	5,6%	3,0%	5,6%	3,9%	2,7%	6,7%	4,1%
Pathologie diagnostiquée	4,8%	6,7%	5,4%	3,8%	7,5%	5,0%	5,2%	10,5%	7,1%	5,5%	11,6%	7,6%	4,9%	9,8%	6,6%
<b>➤ Coude</b>															
Existence d'un problème	0,7%	5,3%	2,3%	2,0%	8,2%	4,0%	3,8%	7,2%	5,0%	5,4%	9,5%	6,8%	3,7%	8,0%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	0,7%	5,3%	2,3%	1,8%	8,2%	3,8%	3,8%	7,2%	5,0%	5,2%	9,5%	6,7%	3,5%	8,0%	5,1%
Gêne dans le travail	0,7%	2,7%	1,4%	0,9%	6,3%	2,6%	2,9%	4,4%	3,4%	3,1%	7,4%	4,6%	2,3%	5,7%	3,5%
Consommation médic.	0,7%	0,0%	0,5%	0,0%	3,8%	1,2%	1,3%	2,4%	1,7%	2,0%	2,5%	2,2%	1,3%	2,4%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	0,7%	2,7%	1,4%	0,3%	4,4%	1,6%	2,0%	4,0%	2,7%	3,0%	6,4%	4,1%	1,8%	4,8%	2,8%
<b>➤ Poignet</b>															
Existence d'un problème	3,4%	4,0%	3,6%	4,4%	10,1%	6,2%	7,0%	8,1%	7,3%	6,5%	13,0%	8,7%	5,8%	9,8%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	4,0%	3,6%	4,4%	10,1%	6,2%	7,0%	8,1%	7,3%	6,3%	12,7%	8,5%	5,8%	9,6%	7,1%
Gêne dans le travail	1,4%	2,7%	1,8%	3,5%	6,3%	4,4%	4,7%	6,9%	5,5%	4,4%	8,5%	5,8%	4,0%	6,8%	5,0%
Consommation médic.	1,4%	1,4%	1,4%	0,3%	3,2%	1,2%	0,7%	3,2%	1,6%	0,6%	2,8%	1,3%	0,7%	2,8%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	4,0%	2,3%	2,1%	4,4%	2,8%	2,5%	2,8%	2,6%	2,8%	5,3%	3,6%	2,3%	4,1%	3,0%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	Cadres			Intermédiaires			Employés			Ouvriers			Région		
	<45ans n=150	≥45ans n=77*	Ens. n=227	<45ans n=349	≥45ans n=163	Ens. n=512	<45ans n=454	≥45ans n=255	Ens. n=709	<45ans n=551	≥45ans n=290	Ens. n=841	<45ans n=1521	≥45ans n=798	Ens. n=2319
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>															
Existence d'un problème	8,1%	8,0%	8,1%	9,1%	13,2%	10,4%	9,2%	14,2%	11,0%	8,8%	17,3%	11,7%	9,0%	14,5%	10,9%
Plaintes ou signes cliniques	8,1%	8,0%	8,1%	8,2%	12,6%	9,6%	8,9%	14,2%	10,9%	8,3%	17,3%	11,4%	8,6%	14,4%	10,6%
Gêne dans le travail	4,1%	2,7%	3,6%	4,1%	6,9%	5,0%	3,8%	7,5%	5,2%	5,3%	9,5%	6,8%	4,6%	7,7%	5,6%
Consommation médic.	0,7%	1,3%	0,9%	2,6%	4,4%	3,2%	1,8%	5,2%	3,0%	1,8%	3,9%	2,5%	2,0%	4,1%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	2,7%	3,1%	6,2%	8,8%	7,0%	5,6%	7,9%	6,4%	5,3%	8,9%	6,5%	5,6%	7,8%	6,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>															
(l'un des 2 signes ci-dessous)															
Existence d'un problème	27,2%	32,0%	28,8%	25,1%	41,0%	30,1%	31,7%	47,6%	37,4%	27,8%	40,8%	32,3%	28,2%	42,2%	33,0%
Plaintes ou signes cliniques	27,2%	32,0%	28,8%	24,6%	39,7%	29,3%	30,8%	47,0%	36,6%	27,2%	40,1%	31,7%	27,5%	41,4%	32,3%
Gêne dans le travail	17,0%	16,2%	16,7%	12,3%	27,1%	16,9%	20,0%	31,6%	24,2%	13,9%	30,0%	19,4%	15,6%	28,5%	20,0%
Consommation médic.	8,2%	9,3%	8,6%	6,2%	18,1%	9,9%	9,6%	22,6%	14,3%	7,8%	11,7%	9,1%	8,0%	16,4%	10,9%
Pathologie diagnostiquée	13,6%	21,3%	16,2%	9,9%	26,5%	15,1%	13,8%	29,0%	19,2%	10,7%	26,1%	16,0%	11,6%	26,6%	16,7%
<b>➤ Vertèbres cervicales</b>															
Existence d'un problème	17,6%	14,7%	16,6%	12,2%	17,4%	13,9%	14,2%	23,8%	17,6%	8,8%	17,3%	11,7%	12,1%	19,3%	14,6%
Plaintes ou signes cliniques	17,6%	14,7%	16,6%	12,2%	16,8%	13,7%	14,0%	23,1%	17,3%	8,8%	17,0%	11,6%	12,0%	18,8%	14,3%
Gêne dans le travail	11,5%	6,8%	9,9%	7,0%	9,7%	7,8%	10,1%	14,7%	11,8%	4,1%	13,1%	7,1%	7,3%	12,2%	9,0%
Consommation médic.	6,1%	6,7%	6,3%	3,5%	9,0%	5,2%	5,4%	11,9%	7,8%	2,8%	6,0%	3,9%	4,1%	8,6%	5,6%
Pathologie diagnostiquée	8,1%	12,0%	9,4%	4,1%	10,4%	6,0%	6,3%	13,2%	8,8%	2,4%	9,6%	4,8%	4,5%	11,1%	6,7%
<b>➤ Vertèbres dorsolumbaires</b>															
Existence d'un problème	19,0%	24,0%	20,7%	18,1%	31,0%	22,2%	23,1%	37,8%	28,5%	23,6%	33,5%	27,0%	21,6%	33,4%	25,7%
Plaintes ou signes cliniques	19,0%	24,0%	20,7%	17,5%	30,4%	21,6%	22,2%	37,5%	27,7%	23,0%	32,7%	26,3%	21,0%	32,9%	25,1%
Gêne dans le travail	10,9%	12,0%	11,3%	7,9%	21,5%	12,2%	13,8%	26,7%	18,5%	11,8%	24,0%	16,0%	11,3%	23,2%	15,4%
Consommation médic.	5,4%	6,7%	5,9%	4,1%	13,9%	7,2%	5,7%	16,9%	9,7%	6,1%	9,2%	7,2%	5,4%	12,5%	7,9%
Pathologie diagnostiquée	9,5%	14,7%	11,3%	7,0%	21,5%	11,6%	9,3%	22,4%	14,0%	9,1%	19,7%	12,7%	8,6%	20,4%	12,6%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

## Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités

Description de la population	C. Industrie manufacturière n=379	F. Construction n=193	G. Commerce ; réparation d'automobiles et motocycles n=431	N. Activités de services administratifs et de soutien n=191	Q. Santé humaine et action sociale n=318	Région n=2319
Cadres	8,2%	7,8%	6,5%	5,8%	6,3%	9,8%
Intermédiaires	22,2%	11,9%	19,5%	10,5%	36,8%	22,1%
Employés	7,7%	6,2%	46,9%	20,4%	48,4%	30,6%
Ouvriers	61,2%	73,6%	23,7%	62,8%	7,9%	36,3%
Répartition homme/femme	79,2%/20,8%	90,7%/9,3%	47,6%/52,4%	65,4%/34,6%	22,0%/78,0%	56,8%/43,2%
≤24ans	8,7%	11,9%	17,6%	18,3%	7,5%	11,8%
25-34ans	27,7%	24,4%	25,1%	27,7%	20,8%	25,5%
35-44ans	26,9%	34,2%	26,2%	24,6%	28,3%	28,3%
45-54ans	28,8%	24,9%	23,7%	22,0%	30,5%	26,1%
≥55ans	7,9%	4,7%	7,4%	7,3%	12,9%	8,3%

Conditions de travail	C. Industrie manufacturière n=379	F. Construction n=193	G. Commerce ; réparation d'automobiles et motocycles n=431	N. Activités de services administratifs et de soutien n=191	Q. Santé humaine et action sociale n=318	Région n=2319
Changement de travail depuis 1an :						
Non	92,6%	93,2%	91,1%	79,1%	86,8%	89,3%
Oui, raison médicale	0,8%	0,5%	0,7%	0,5%	0,3%	0,6%
Oui, autre raison	6,6%	6,3%	7,9%	18,3%	12,6%	9,7%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,0%	0,2%	2,1%	0,3%	0,3%
Personnes travaillant à temps plein	94,2%	96,9%	74,2%	73,3%	69,9%	82,1%
Travail en journée normale	66,4%	94,1%	82,1%	71,1%	76,3%	78,0%
Coupures de plus de 2 heures	8,3%	3,9%	23,2%	23,8%	18,2%	18,1%
Horaires décalés	32,7%	15,7%	20,7%	38,1%	43,5%	29,1%
Horaires irréguliers ou alternés	36,1%	14,1%	31,2%	29,7%	50,0%	32,3%
Travail de nuit	23,1%	7,4%	5,1%	22,3%	27,3%	15,9%
Déplacements professionnels de plus de 24h	12,4%	24,3%	4,7%	12,9%	2,2%	9,8%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	54,4%	53,1%	57,3%	44,5%	54,3%	52,0%
Parmi eux :						
➤ Perturbe travail	53,5%	67,0%	53,6%	45,1%	68,3%	57,9%
➤ Sans conséquence	46,2%	50,5%	46,2%	51,4%	39,5%	44,7%
➤ Aspect positif sur travail	38,9%	40,2%	37,8%	48,7%	31,2%	38,7%
Dépasser horaires normaux	41,6%	41,6%	35,0%	35,1%	33,0%	37,9%
Sauter repas ou pas de pause	22,6%	17,6%	23,5%	25,7%	40,8%	25,3%
Traiter trop vite une opération	19,4%	22,8%	23,8%	21,5%	32,7%	23,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	23,0%	10,4%	24,8%	27,0%	12,3%	20,0%
Travail pas varié	21,1%	8,8%	20,5%	27,9%	20,8%	20,6%
Pas de choix dans la façon de procéder	22,5%	19,2%	25,3%	21,7%	33,8%	24,0%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	13,3%	13,0%	16,6%	24,6%	18,8%	17,4%
Travail pas reconnu	26,0%	14,3%	27,5%	26,8%	21,9%	24,9%
Formations et informations insuffisantes	20,2%	16,8%	23,0%	13,2%	16,2%	19,5%
Objectifs et consignes pas clairement définis	16,4%	16,0%	14,9%	15,4%	16,0%	17,0%
Pression temporelle forte (>5)	40,5%	42,0%	38,7%	32,3%	41,8%	39,7%

Charge physique du poste de travail	C. Industrie manufacturière n=379	F. Construction n=193	G. Commerce ; réparation d'automobiles et motocycles n=431	N. Activités de services administratifs et de soutien n=191	Q. Santé humaine et action sociale n=318	Région n=2319
<b>Postures contraignantes :</b>						
Non	28,8%	24,4%	31,9%	30,4%	30,6%	36,3%
Oui, difficile ou pénible	38,0%	46,6%	32,4%	36,1%	41,3%	33,2%
Oui, pas difficile ou pénible	30,1%	25,4%	34,0%	29,8%	26,8%	28,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,2%	3,6%	1,6%	3,7%	1,3%	2,2%
<b>Effort, Port de charges lourdes :</b>						
Non	34,0%	25,4%	33,3%	38,9%	31,4%	42,6%
Oui, difficile ou pénible	36,4%	43,5%	33,3%	34,7%	47,1%	32,0%
Oui, pas difficile ou pénible	27,4%	26,4%	31,2%	22,1%	20,2%	23,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,1%	4,7%	2,1%	4,2%	1,3%	2,0%
<b>Gestes répétitifs :</b>						
Non	31,7%	22,4%	27,4%	24,2%	36,4%	32,9%
Oui, difficile ou pénible	26,5%	29,7%	24,1%	28,4%	24,4%	23,5%
Oui, pas difficile ou pénible	38,6%	43,2%	45,0%	41,1%	36,4%	40,1%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,2%	4,7%	3,5%	6,3%	2,8%	3,5%
<b>Importants déplacements à pieds:</b>						
Non	42,3%	33,2%	45,3%	42,9%	48,9%	52,7%
Oui, difficile ou pénible	21,0%	18,7%	16,5%	17,8%	22,1%	14,8%
Oui, pas difficile ou pénible	33,2%	44,6%	35,8%	36,1%	28,1%	30,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,5%	3,6%	2,3%	3,1%	0,9%	2,1%
<b>Station debout prolongée :</b>						
Non	27,2%	24,9%	30,0%	31,4%	28,3%	38,8%
Oui, difficile ou pénible	37,7%	24,4%	30,9%	27,2%	35,2%	26,3%
Oui, pas difficile ou pénible	32,7%	45,6%	36,7%	36,6%	34,9%	32,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,4%	5,2%	2,3%	4,7%	1,6%	2,3%

Expositions	C. Industrie manufacturière n=379	F. Construction n=193	G. Commerce ; réparation d'automobiles et motocycles n=431	N. Activités de services administratifs et de soutien n=191	Q. Santé humaine et action sociale n=318	Région n=2319
Produits chimiques	39,0%	33,2%	16,9%	43,7%	36,9%	27,8%
Poussières, fumées	62,3%	71,5%	29,8%	58,9%	13,6%	38,4%
Rx ionisants	5,6%	1,6%	0,5%	1,6%	5,4%	2,3%
Vibrations	32,8%	59,1%	11,4%	31,4%	3,5%	21,6%
Gêne sonore	67,0%	67,2%	30,8%	54,3%	30,6%	43,8%
Bruit > 80db	57,1%	57,8%	15,0%	38,4%	9,3%	27,2%
Contrainte visuelle	32,0%	29,3%	22,9%	29,9%	25,8%	30,7%
Conduite routière prolongée	16,3%	24,1%	10,0%	24,1%	8,9%	16,7%
Chaleur intense	24,5%	35,2%	10,3%	31,2%	12,4%	18,8%
Froid intense	13,6%	37,3%	15,5%	27,5%	4,2%	15,3%
Intempéries	15,5%	52,6%	10,2%	39,7%	6,4%	19,5%
Pression psychologique	25,9%	24,9%	22,0%	26,6%	43,6%	28,7%
Agent biologique	5,9%	4,2%	4,9%	15,5%	46,9%	12,2%
Contact avec public	41,1%	60,2%	80,1%	54,0%	90,2%	68,2%

Formation	C. Industrie manufacturière n=379	F. Construction n=193	G. Commerce ; réparation d'automobiles et motocycles n=431	N. Activités de services administratifs et de soutien n=191	Q. Santé humaine et action sociale n=318	Région n=2319
A bénéficié d'une formation depuis un an	44,8%	43,2%	45,5%	40,2%	54,6%	47,4%
Parmi eux :						
➤ En rapport avec travail actuel	85,6%	89,9%	90,6%	93,2%	91,7%	90,5%
➤ En rapport avec travail futur	15,7%	12,9%	14,8%	16,7%	8,9%	13,9%
➤ Formation d'intérêt général	55,6%	62,7%	56,3%	35,5%	55,9%	54,7%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	27,3%	26,8%	30,0%	18,5%	30,8%	28,0%

Mode de vie	C. Industrie manufacturière n=379	F. Construction n=193	G. Commerce ; réparation d'automobiles et motocycles n=431	N. Activités de services administratifs et de soutien n=191	Q. Santé humaine et action sociale n=318	Région n=2319
Activité sportive régulière	47,2%	41,0%	49,5%	51,1%	45,2%	47,7%
Consommation de tabac	50,1%	48,1%	38,5%	51,9%	33,9%	41,8%
Consommation de tabac>15 cig / j	16,4%	29,6%	10,5%	22,8%	6,6%	14,0%
Consommation de café	85,6%	90,5%	75,0%	80,4%	79,9%	81,2%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	25,1%	24,9%	21,4%	25,9%	27,1%	21,9%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,3%	24,9%	12,7%	22,5%	15,6%	16,6%

Rapport Evrest 2008-2009 – Région Lorraine

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparation automobiles et motocycles			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45 ans n=240	≥45 ans n=139	Ens. n=379	<45 ans n=136	≥45 ans n=57*	Ens. n=193	<45 ans n=297	≥45 ans n=134	Ens. n=431	<45 ans n=135	≥45 ans n=56*	Ens. n=191	<45 ans n=180	≥45 ans n=138	Ens. n=318	<45 ans n=1521	≥45 ans n=798	Ens. n=2319
<b>Indice de masse corporelle</b>																		
➤ Normaux ou maigres	58,0%	38,6%	51,1%	53,3%	43,6%	50,5%	67,8%	53,1%	63,2%	63,4%	47,3%	58,6%	60,3%	51,9%	56,7%	60,7%	45,9%	55,6%
➤ Surpoids	29,8%	46,2%	35,7%	31,1%	36,4%	32,6%	27,0%	35,4%	29,6%	24,4%	29,1%	25,8%	25,9%	27,8%	26,7%	28,0%	37,2%	31,1%
➤ Obèses	12,2%	15,2%	13,2%	15,6%	20,0%	16,8%	5,2%	11,5%	7,2%	12,2%	23,6%	15,6%	13,8%	20,3%	16,6%	11,3%	16,9%	13,2%
<b>Appareil respiratoire</b>																		
Existence d'un problème	3,8%	5,9%	4,5%	1,5%	7,0%	3,1%	5,5%	2,2%	4,4%	3,8%	3,6%	3,7%	3,4%	4,4%	3,8%	4,1%	3,9%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	5,9%	4,3%	0,7%	5,3%	2,1%	5,1%	2,2%	4,2%	3,8%	3,6%	3,7%	3,4%	2,9%	3,2%	3,7%	3,6%	3,6%
Gêne dans le travail	0,8%	1,5%	1,1%	0,7%	0,0%	0,5%	0,3%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	0,6%	0,4%	0,6%	0,5%
Consommation médic.	2,1%	1,5%	1,9%	0,7%	5,3%	2,1%	2,7%	0,0%	1,9%	0,8%	0,0%	0,5%	2,8%	3,7%	3,2%	2,3%	1,7%	2,1%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	1,5%	2,1%	0,7%	7,0%	2,6%	4,1%	0,7%	3,0%	3,0%	3,6%	3,2%	3,4%	4,4%	3,8%	2,9%	2,5%	2,8%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>																		
Existence d'un problème	1,3%	8,1%	3,7%	2,2%	7,0%	3,6%	4,8%	9,0%	6,1%	0,8%	14,5%	4,8%	5,1%	6,6%	5,8%	2,7%	8,2%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	0,8%	7,4%	3,2%	1,5%	3,5%	2,1%	4,8%	7,5%	5,6%	0,8%	14,5%	4,8%	4,5%	3,7%	4,2%	2,4%	6,9%	3,9%
Gêne dans le travail	0,4%	3,0%	1,3%	0,0%	3,5%	1,0%	2,7%	2,2%	2,6%	0,8%	1,8%	1,1%	1,1%	2,2%	1,6%	1,0%	2,0%	1,4%
Consommation médic.	0,8%	6,7%	2,9%	0,7%	7,0%	2,6%	3,1%	7,5%	4,5%	0,0%	12,7%	3,7%	2,3%	3,7%	2,9%	1,3%	6,2%	3,0%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	7,4%	3,5%	0,7%	7,0%	2,6%	4,1%	9,0%	5,6%	0,8%	12,7%	4,3%	2,9%	5,1%	3,9%	2,0%	7,5%	3,9%
<b>HTA</b>																		
Existence d'un problème	2,5%	19,4%	8,6%	4,6%	19,6%	9,1%	2,7%	11,3%	5,4%	3,0%	26,8%	10,1%	2,9%	17,0%	9,1%	3,2%	17,3%	8,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	10,4%	4,8%	3,1%	7,1%	4,3%	2,4%	3,8%	2,8%	3,0%	25,0%	9,6%	1,1%	12,6%	6,1%	2,3%	11,5%	5,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,7%	0,3%	0,0%	1,8%	0,5%	0,3%	0,0%	0,2%	0,0%	7,1%	2,1%	0,0%	1,5%	0,6%	0,2%	1,4%	0,6%
Consommation médic.	2,1%	15,7%	7,0%	2,3%	16,1%	6,4%	2,0%	9,8%	4,5%	2,3%	23,2%	8,5%	2,9%	14,1%	7,8%	2,4%	14,2%	6,5%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	15,0%	6,5%	3,1%	17,9%	7,5%	2,7%	10,5%	5,2%	2,3%	23,2%	8,5%	2,9%	14,1%	7,8%	2,6%	14,8%	6,7%
<b>Digestif</b>																		
Existence d'un problème	8,2%	6,9%	7,7%	3,9%	7,4%	4,9%	7,7%	7,5%	7,6%	6,6%	14,8%	9,1%	15,4%	9,6%	12,9%	8,2%	8,0%	8,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,2%	6,1%	7,5%	3,1%	5,6%	3,8%	7,3%	6,8%	7,1%	6,6%	13,0%	8,6%	15,4%	8,9%	12,6%	8,0%	7,3%	7,7%
Gêne dans le travail	2,6%	1,5%	2,2%	0,8%	3,7%	1,6%	1,4%	0,8%	1,2%	0,8%	1,9%	1,1%	3,4%	2,2%	2,9%	1,7%	1,7%	1,7%
Consommation médic.	5,2%	5,3%	5,2%	0,8%	3,7%	1,6%	2,1%	1,5%	1,9%	2,5%	7,4%	4,0%	8,6%	6,7%	7,8%	3,8%	3,8%	3,8%
Pathologie diagnostiquée	5,2%	6,1%	5,5%	2,3%	5,6%	3,3%	3,5%	2,3%	3,1%	3,3%	5,6%	4,0%	10,3%	4,5%	7,8%	4,5%	4,3%	4,5%
<b>Dermatologie</b>																		
Existence d'un problème	6,3%	5,2%	5,9%	1,5%	3,6%	2,1%	7,6%	6,0%	7,1%	3,8%	7,3%	4,8%	9,2%	6,6%	8,1%	6,3%	5,9%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	5,2%	5,4%	1,5%	3,6%	2,1%	6,9%	5,2%	6,4%	3,8%	7,3%	4,8%	8,6%	6,6%	7,7%	5,9%	5,7%	5,8%
Gêne dans le travail	1,3%	2,2%	1,6%	0,0%	1,8%	0,5%	2,1%	2,2%	2,1%	0,0%	3,6%	1,1%	1,1%	0,7%	1,0%	1,2%	1,8%	1,4%
Consommation médic.	4,2%	3,0%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%	3,0%	4,0%	3,0%	5,5%	3,7%	4,6%	2,2%	3,6%	3,3%	2,2%	2,9%
Pathologie diagnostiquée	5,4%	4,5%	5,1%	0,7%	1,8%	1,1%	5,8%	6,0%	5,9%	2,3%	7,3%	3,7%	8,0%	5,9%	7,1%	5,0%	5,0%	5,0%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Evrest 2008-2009 – Région Lorraine

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparation automobiles et motocycles			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45 ans n=240	≥45 ans n=139	Ens. n=379	<45 ans n=136	≥45 ans n=57*	Ens. n=193	<45 ans n=297	≥45 ans n=134	Ens. n=431	<45 ans n=135	≥45 ans n=56*	Ens. n=191	<45 ans n=180	≥45 ans n=138	Ens. n=318	<45 ans n=1521	≥45 ans n=798	Ens. n=2319
<b>Troubles de l'audition</b>																		
Existence d'un problème	6,8%	22,4%	12,4%	3,8%	10,5%	5,8%	2,1%	7,6%	3,8%	3,8%	19,6%	8,6%	1,1%	5,2%	2,9%	3,8%	11,9%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,5%	20,1%	10,8%	2,3%	10,5%	4,7%	2,1%	6,8%	3,6%	3,8%	19,6%	8,6%	0,6%	5,2%	2,6%	3,3%	11,0%	6,0%
Gêne dans le travail	2,1%	5,2%	3,2%	0,8%	1,8%	1,1%	0,7%	4,5%	1,9%	0,0%	3,6%	1,1%	0,0%	3,0%	1,3%	0,8%	3,5%	1,7%
Consommation médic.	0,4%	0,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	0,3%	0,8%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	4,2%	16,4%	8,6%	3,8%	8,8%	5,3%	1,0%	5,3%	2,4%	2,3%	14,3%	5,9%	1,1%	3,7%	2,3%	2,6%	9,1%	4,9%
<b>➤ Lassitude, fatigue</b>																		
Existence d'un problème	23,8%	22,2%	23,2%	5,2%	3,6%	4,7%	26,1%	29,1%	27,1%	16,0%	33,9%	21,4%	19,1%	27,9%	22,9%	21,1%	25,9%	22,8%
Plaintes ou signes cliniques	23,3%	21,5%	22,7%	5,2%	3,6%	4,7%	25,8%	29,1%	26,8%	16,0%	33,9%	21,4%	18,0%	26,5%	21,7%	20,8%	25,5%	22,4%
Gêne dans le travail	10,8%	10,4%	10,7%	2,2%	0,0%	1,6%	12,7%	14,9%	13,4%	5,3%	16,1%	8,6%	7,3%	14,8%	10,5%	9,2%	12,9%	10,5%
Consommation médic.	2,9%	1,5%	2,4%	0,7%	0,0%	0,5%	4,5%	4,5%	4,5%	0,8%	3,6%	1,6%	2,8%	3,7%	3,2%	2,3%	2,9%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	3,8%	4,5%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,2%	6,0%	5,4%	0,8%	3,6%	1,6%	2,2%	6,7%	4,2%	3,0%	4,2%	3,4%
<b>➤ Anxiété, nervosité</b>																		
Existence d'un problème	24,3%	28,1%	25,7%	5,9%	5,4%	5,8%	21,6%	23,1%	22,1%	24,4%	25,5%	24,7%	19,2%	24,3%	21,4%	20,3%	23,5%	21,4%
Plaintes ou signes cliniques	23,8%	28,1%	25,4%	5,2%	5,4%	5,2%	21,6%	23,1%	22,1%	24,4%	25,5%	24,7%	18,1%	23,5%	20,4%	19,9%	23,2%	21,0%
Gêne dans le travail	10,5%	10,4%	10,5%	3,7%	1,8%	3,1%	8,3%	9,7%	8,7%	9,2%	7,3%	8,6%	6,2%	11,9%	8,7%	8,2%	9,7%	8,7%
Consommation médic.	4,6%	3,7%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%	3,0%	4,7%	3,1%	1,8%	2,7%	4,5%	6,7%	5,5%	3,7%	4,9%	4,1%
Pathologie diagnostiquée	4,2%	4,5%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	3,8%	5,2%	4,6%	1,9%	3,8%	5,6%	7,4%	6,4%	4,5%	4,6%	4,6%
<b>➤ Trouble du sommeil</b>																		
Existence d'un problème	20,5%	25,2%	22,2%	7,5%	1,9%	5,9%	18,8%	29,5%	22,1%	16,0%	25,0%	18,7%	13,9%	25,9%	19,2%	16,5%	23,6%	18,9%
Plaintes ou signes cliniques	19,7%	25,2%	21,7%	6,7%	1,9%	5,3%	18,4%	29,5%	21,9%	16,0%	23,2%	18,2%	13,3%	24,4%	18,2%	16,1%	23,2%	18,5%
Gêne dans le travail	9,2%	11,9%	10,2%	3,0%	0,0%	2,1%	4,9%	9,8%	6,4%	5,3%	5,4%	5,3%	8,1%	11,2%	9,4%	6,6%	9,3%	7,5%
Consommation médic.	5,5%	7,4%	6,2%	0,8%	0,0%	0,5%	4,2%	8,4%	5,5%	1,5%	1,8%	1,6%	3,5%	8,2%	5,5%	3,5%	5,8%	4,3%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	4,5%	3,8%	0,8%	0,0%	0,5%	4,5%	8,4%	5,7%	1,5%	5,4%	2,7%	1,7%	8,1%	4,5%	2,6%	5,4%	3,6%
<b>Troubles neuropsychiques (les 3 signes ci-dessus)</b>																		
Existence d'un problème	8,3%	8,1%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	6,9%	12,7%	8,7%	3,8%	8,9%	5,3%	5,6%	10,3%	7,6%	6,3%	8,9%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	7,4%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	6,9%	12,7%	8,7%	3,8%	7,1%	4,8%	5,6%	10,3%	7,6%	6,2%	8,7%	7,0%
Gêne dans le travail	3,3%	3,0%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	4,5%	2,6%	0,0%	1,8%	0,5%	1,1%	5,2%	2,9%	1,8%	3,4%	2,4%
Consommation médic.	1,7%	0,7%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,8%	0,9%	0,0%	1,8%	0,5%	0,6%	1,5%	1,0%	0,7%	1,1%	0,9%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	1,5%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	3,0%	1,9%	0,8%	1,8%	1,1%	0,6%	1,5%	1,0%	0,9%	1,7%	1,1%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Evrest 2008-2009 – Région Lorraine

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparation automobiles et motocycles			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45 ans n=240	≥45 ans n=139	Ens. n=379	<45 ans n=136	≥45 ans n=57*	Ens. n=193	<45 ans n=297	≥45 ans n=134	Ens. n=431	<45 ans n=135	≥45 ans n=56*	Ens. n=191	<45 ans n=180	≥45 ans n=138	Ens. n=318	<45 ans n=1521	≥45 ans n=798	Ens. n=2319
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)</b>																		
Existence d'un problème	19,1%	39,8%	26,6%	5,9%	16,4%	8,9%	16,5%	27,1%	19,8%	14,0%	30,4%	18,9%	14,1%	29,9%	20,9%	15,0%	28,5%	19,6%
Plaintes ou signes cliniques	19,1%	39,1%	26,3%	5,9%	16,4%	8,9%	16,2%	26,3%	19,3%	14,0%	28,6%	18,4%	13,1%	29,9%	20,3%	14,7%	28,1%	19,3%
Gêne dans le travail	10,6%	26,3%	16,3%	5,9%	12,7%	7,9%	11,0%	15,0%	12,3%	6,2%	21,4%	10,8%	10,2%	22,6%	15,5%	9,5%	18,7%	12,7%
Consommation médic.	5,1%	9,8%	6,8%	0,7%	1,8%	1,1%	2,1%	9,8%	4,5%	0,8%	3,6%	1,6%	5,6%	15,0%	9,7%	3,6%	9,1%	5,5%
Pathologie diagnostiquée	8,1%	18,8%	11,9%	3,0%	12,7%	5,8%	9,0%	10,8%	9,5%	5,4%	14,5%	8,2%	10,7%	18,0%	13,9%	7,5%	14,9%	10,1%
➤ Epaule																		
Existence d'un problème	8,8%	25,4%	14,8%	3,0%	9,1%	4,7%	10,0%	21,8%	13,7%	7,7%	16,1%	10,2%	11,9%	23,7%	17,0%	9,3%	20,1%	13,0%
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	24,6%	14,5%	3,0%	9,1%	4,7%	10,0%	21,1%	13,4%	7,7%	16,1%	10,2%	11,3%	23,7%	16,7%	9,2%	19,8%	12,9%
Gêne dans le travail	5,5%	16,4%	9,4%	3,0%	9,1%	4,7%	6,9%	12,0%	8,5%	1,5%	10,7%	4,3%	8,5%	17,2%	12,2%	5,8%	12,7%	8,1%
Consommation médic.	2,9%	5,2%	3,8%	0,7%	1,8%	1,1%	1,4%	7,6%	3,3%	0,8%	0,0%	0,5%	5,1%	11,9%	8,0%	2,7%	6,7%	4,1%
Pathologie diagnostiquée	3,8%	10,4%	6,2%	0,7%	9,1%	3,2%	5,8%	9,9%	7,1%	3,8%	5,4%	4,3%	8,5%	12,7%	10,3%	4,9%	9,8%	6,6%
➤ Coude																		
Existence d'un problème	5,5%	14,9%	8,9%	1,5%	7,3%	3,2%	2,7%	4,5%	3,3%	3,1%	10,9%	5,4%	2,3%	6,7%	4,2%	3,7%	8,0%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,5%	14,9%	8,9%	1,5%	7,3%	3,2%	2,4%	4,5%	3,1%	3,1%	10,9%	5,4%	1,7%	6,7%	3,9%	3,5%	8,0%	5,1%
Gêne dans le travail	4,6%	11,9%	7,3%	1,5%	7,3%	3,2%	1,7%	2,3%	1,9%	0,8%	5,5%	2,2%	1,1%	5,2%	2,9%	2,3%	5,7%	3,5%
Consommation médic.	2,1%	4,5%	3,0%	0,0%	1,8%	0,5%	1,0%	2,3%	1,4%	0,0%	1,8%	0,5%	0,6%	3,7%	1,9%	1,3%	2,4%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	10,4%	5,4%	0,7%	7,3%	2,6%	2,1%	1,5%	1,9%	1,5%	3,6%	2,2%	0,6%	4,5%	2,3%	1,8%	4,8%	2,8%
➤ Poignet																		
Existence d'un problème	8,8%	19,5%	12,7%	3,0%	5,5%	3,7%	6,5%	6,1%	6,4%	5,4%	16,1%	8,6%	3,4%	9,6%	6,1%	5,8%	9,8%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	19,5%	12,7%	3,0%	5,5%	3,7%	6,5%	6,1%	6,4%	5,4%	14,3%	8,1%	3,4%	9,6%	6,1%	5,8%	9,6%	7,1%
Gêne dans le travail	3,8%	13,5%	7,3%	3,0%	0,0%	2,1%	5,2%	4,5%	5,0%	3,8%	12,5%	6,5%	2,8%	7,4%	4,8%	4,0%	6,8%	5,0%
Consommation médic.	0,4%	4,5%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	2,3%	0,9%	0,0%	1,8%	0,5%	1,1%	5,9%	3,2%	0,7%	2,8%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	2,9%	7,5%	4,6%	2,2%	0,0%	1,6%	3,4%	0,0%	2,4%	0,8%	7,1%	2,7%	2,8%	5,9%	4,2%	2,3%	4,1%	3,0%
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>																		
Existence d'un problème	9,6%	16,3%	12,0%	4,5%	9,1%	5,8%	10,3%	17,9%	12,7%	6,8%	21,4%	11,2%	10,2%	17,6%	13,4%	9,0%	14,5%	10,9%
Plaintes ou signes cliniques	9,6%	15,6%	11,8%	4,5%	9,1%	5,8%	9,6%	17,9%	12,2%	6,8%	21,4%	11,2%	9,1%	17,6%	12,8%	8,6%	14,4%	10,6%
Gêne dans le travail	6,3%	9,6%	7,5%	3,7%	5,5%	4,2%	5,5%	13,4%	8,0%	2,3%	10,7%	4,8%	5,7%	8,8%	7,1%	4,6%	7,7%	5,6%
Consommation médic.	2,5%	2,2%	2,4%	0,0%	1,8%	0,5%	2,4%	6,0%	3,5%	0,8%	3,6%	1,6%	3,4%	8,2%	5,5%	2,0%	4,1%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	6,3%	8,2%	7,0%	3,7%	1,8%	3,2%	5,5%	11,9%	7,5%	3,8%	8,9%	5,3%	6,8%	11,1%	8,7%	5,6%	7,8%	6,3%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Rapport Evrest 2008-2009 – Région Lorraine

Etat de santé	C. Industrie manufacturière			F. Construction			G. Commerce ; réparation automobiles et motocycles			N. Activités de services administratifs et de soutien			Q. Santé humaine et action sociale			Région		
	<45 ans n=240	≥45 ans n=139	Ens. n=379	<45 ans n=136	≥45 ans n=57*	Ens. n=193	<45 ans n=297	≥45 ans n=134	Ens. n=431	<45 ans n=135	≥45 ans n=56*	Ens. n=191	<45 ans n=180	≥45 ans n=138	Ens. n=318	<45 ans n=1521	≥45 ans n=798	Ens. n=2319
<b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>																		
(l'un des 2 signes ci-dessous)																		
Existence d'un problème	27,7%	45,9%	34,2%	11,9%	23,2%	15,3%	30,6%	51,1%	37,1%	27,5%	41,1%	31,6%	34,7%	48,9%	40,7%	28,2%	42,2%	33,0%
Plaintes ou signes cliniques	27,3%	43,6%	33,2%	11,3%	23,2%	14,8%	30,0%	51,1%	36,7%	26,7%	41,1%	31,0%	34,1%	47,7%	39,9%	27,5%	41,4%	32,3%
Gêne dans le travail	17,6%	32,8%	23,0%	6,0%	14,3%	8,5%	15,3%	34,6%	21,4%	11,5%	33,9%	18,3%	24,0%	36,2%	29,2%	15,6%	28,5%	20,0%
Consommation médic.	9,7%	15,2%	11,6%	2,2%	7,1%	3,7%	7,3%	23,3%	12,4%	3,8%	12,7%	6,5%	12,1%	29,8%	19,7%	8,0%	16,4%	10,9%
Pathologie diagnostiquée	13,0%	30,1%	19,1%	4,5%	8,9%	5,8%	10,1%	31,1%	16,7%	9,2%	26,8%	14,5%	18,8%	37,7%	26,8%	11,6%	26,6%	16,7%
➤ <b>Vertèbres cervicales</b>																		
Existence d'un problème	8,8%	17,4%	11,9%	3,0%	8,9%	4,7%	14,4%	27,1%	18,4%	11,5%	14,3%	12,4%	15,9%	27,8%	21,0%	12,1%	19,3%	14,6%
Plaintes ou signes cliniques	8,8%	16,7%	11,6%	3,0%	8,9%	4,7%	14,1%	27,1%	18,2%	11,5%	14,3%	12,4%	15,9%	26,5%	20,5%	12,0%	18,8%	14,3%
Gêne dans le travail	5,9%	12,9%	8,4%	2,2%	7,1%	3,7%	7,2%	15,8%	9,9%	4,6%	8,9%	5,9%	11,9%	20,5%	15,6%	7,3%	12,2%	9,0%
Consommation médic.	4,6%	6,8%	5,4%	0,7%	5,4%	2,1%	3,8%	12,0%	6,4%	1,5%	3,6%	2,2%	6,8%	18,0%	11,7%	4,1%	8,6%	5,6%
Pathologie diagnostiquée	3,3%	9,8%	5,7%	1,5%	5,4%	2,6%	3,8%	15,2%	7,3%	3,8%	7,1%	4,8%	8,5%	21,2%	14,0%	4,5%	11,1%	6,7%
➤ <b>Vertèbres dorsolumbaires</b>																		
Existence d'un problème	22,7%	36,1%	27,5%	9,7%	19,3%	12,6%	22,8%	38,1%	27,7%	20,5%	33,9%	24,5%	27,7%	40,2%	33,0%	21,6%	33,4%	25,7%
Plaintes ou signes cliniques	22,3%	34,6%	26,7%	9,0%	19,3%	12,1%	22,2%	38,1%	27,3%	19,7%	33,9%	23,9%	27,1%	39,4%	32,4%	21,0%	32,9%	25,1%
Gêne dans le travail	14,7%	25,8%	18,6%	4,5%	12,3%	6,8%	10,8%	27,6%	16,1%	9,1%	26,8%	14,4%	16,9%	30,3%	22,7%	11,3%	23,2%	15,4%
Consommation médic.	6,7%	11,3%	8,4%	1,5%	5,3%	2,6%	3,8%	14,9%	7,3%	3,0%	10,9%	5,3%	9,1%	25,0%	15,9%	5,4%	12,5%	7,9%
Pathologie diagnostiquée	10,9%	23,3%	15,4%	3,0%	7,0%	4,2%	6,6%	21,1%	11,2%	6,8%	19,6%	10,6%	14,1%	30,3%	21,0%	8,6%	20,4%	12,6%

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence