




Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport régional Evrest 2008-2009

Région Rhône - Alpes

Juin 2010

afssset



Institut de Santé au Travail
du Nord de la France
Nord - Pas de Calais / Picardie



Université Lille 2
Droit et Santé

L'ensemble des informations générales figurant dans le rapport national Evrest 2008-2009 ne sont pas reprises dans ce rapport régional (présentation du dispositif, méthodologie, clés de lecture du rapport, ...), seules les informations spécifiques à la région y figurent.

Descriptif de l'échantillon Rhône Alpes

L'exploitation des données de la région Rhône Alpes a porté sur **467 fiches** remplies par les salariés et leurs médecins en 2008 (n=184) et 2009 (n=283), puis saisies dans la base de données Evrest.

Au niveau de la région, l'échantillon des salariés Evrest est assez éloigné de la répartition des salariés de la région Rhône Alpes, que ce soit pour les salariés du privé (Unedic) ou ceux du privé et du public (DADS) (tableau 1). On note en particulier une forte surreprésentation du secteur de l'industrie, avec de ce fait, une plus forte représentation des hommes, ouvriers ou professions intermédiaires ; ceci traduit la participation plus importante des services de santé au travail des zones plus industrielles de la région.

Les données globales concernant la région doivent donc être lues avec une grande prudence, et ne peuvent être utilisées comme « référence » ; on leur préfèrera, pour les données régionales, les données par secteur d'activité ; à des fins de comparaison, on préfèrera utiliser des données nationales par secteur d'activité par exemple.

Le nombre de fiches 2008-2009 de la région ne permet pas de fournir des résultats par catégories socioprofessionnelles et par secteurs d'activité (tableaux 2 et 3).

Tableau 1: Comparaison de la répartition de l'échantillon régional Rhône Alpes 2008-2009 aux données Insee (DADS 2007) et Unedic (2008).

| Caractéristiques générales des salariés | Echantillon Rhône Alpes | Données INSEE 2007 | Données UNEDIC |
|--|-------------------------|--------------------|----------------|
| | 2008-2009 (n=467) | (DADS) | 2008 |
| | % | % | % |
| Sexe | | | |
| Hommes | 58,2 | 54,7 | 56,5 |
| Femmes | 41,8 | 45,3 | 43,5 |
| Age | | | |
| ≤ 24 ans | 10,5 | 16,7 | - |
| 25-34 ans | 23,1 | 25,0 | - |
| 35-44 ans | 34,9 | 25,9 | - |
| 45- 54 ans | 25,5 | 22,2 | - |
| 55 ans et plus | 6,0 | 10,2 | - |
| Catégorie socioprofessionnelle | | | |
| Salariés de leur entreprise | 0,4 | 0,7 | - |
| Chef d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures | 12,4 | 11,8 | - |
| Professions intermédiaires | 27,2 | 22,7 | - |
| Employés | 21,8 | 31,8 | - |
| Ouvriers | 38,1 | 33,0 | - |
| Secteur d'activité | | | |
| Agriculture | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industrie | 38,8 | 20,3 | 24,3 |
| Construction | 3,9 | 7,2 | 9,2 |
| Commerce | 16,2 | 14,7 | 17,3 |
| Services | 41,2 | 57,8 | 49,2 |

- : informations non disponibles

Tableau 2: Descriptif de l'échantillon régional Rhône Alpes 2008-2009 selon les catégories socioprofessionnelles

| Catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) | Effectifs | % |
|---|------------|--------------|
| Artisans, commerçants et chefs d'entreprises | 2 | 0,4 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 58 | 12,4 |
| Professions intermédiaires | 127 | 27,2 |
| Employés | 102 | 21,8 |
| Ouvriers | 178 | 38,1 |
| Total général | 467 | 100,0 |

Tableau 3: Descriptif de l'échantillon régional Rhône Alpes 2008-2009 selon les secteurs d'activité

| Activité économique NAF 2008 | Effectifs | % |
|---|------------|--------------|
| AGRICULTURE | 0 | 0,0 |
| A. Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0,0 |
| INDUSTRIE | 180 | 38,5 |
| B. Industries extractives | 0 | 0,0 |
| C. Industrie manufacturière | 152 | 32,5 |
| D. Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur et d'air conditionné | 21 | 4,5 |
| E. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 7 | 1,5 |
| CONSTRUCTION | 18 | 3,9 |
| F. Construction | 18 | 3,9 |
| COMMERCE | 75 | 16,1 |
| G. Commerce; réparations automobile et de motocycles | 75 | 16,1 |
| SERVICES | 191 | 40,9 |
| H. Transports et entreposage | 38 | 8,1 |
| I. Hébergement et restauration | 7 | 1,5 |
| J. Information et communication | 9 | 1,9 |
| K. Activités financières et d'assurance | 8 | 1,7 |
| L. Activités immobilières | 2 | 0,4 |
| M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 25 | 5,4 |
| N. Activités de services administratifs et de soutien | 23 | 4,9 |
| O. Administration publique | 25 | 5,4 |
| P. Enseignement | 2 | 0,4 |
| Q. Santé humaine et action sociale | 48 | 10,3 |
| R. Arts, spectacles et activités récréatives | 1 | 0,2 |
| S. Autres activités de services | 3 | 0,6 |
| T. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 0 | 0,0 |
| Données manquantes | 3 | 0,6 |
| Total général | 467 | 100,0 |

Descriptifs de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe

| Description de la population | Hommes n=272 | Femmes n=195 | Ensemble n=467 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ≤24ans | 8,5% | 13,3% | 10,5% |
| 25-34ans | 22,4% | 24,1% | 23,1% |
| 35-44ans | 36,0% | 33,3% | 34,9% |
| 45-54ans | 25,7% | 25,1% | 25,5% |
| ≥55ans | 7,4% | 4,1% | 6,0% |
| Conditions de travail | Hommes n=272 | Femmes n=195 | Ensemble n=467 |
| Changement de travail depuis 1an : | | | |
| Non | 89,7% | 83,6% | 87,2% |
| Oui, raison médicale | 1,1% | 0,5% | 0,9% |
| Oui, autre raison | 8,8% | 15,9% | 11,8% |
| Oui, raison non précisée | 0,4% | 0,0% | 0,2% |
| Personnes travaillant à temps plein | 94,1% | 73,4% | 85,5% |
| Travail en journée normale | 77,8% | 81,3% | 79,2% |
| Coupures de plus de 2 heures | 12,9% | 20,5% | 16,1% |
| Horaires décalés | 30,7% | 20,9% | 26,7% |
| Horaires irréguliers ou alternés | 23,9% | 22,8% | 23,5% |
| Travail de nuit | 14,1% | 5,0% | 10,3% |
| Déplacements professionnels de plus de 24h | 15,4% | 5,7% | 11,3% |
| Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue | 50,2% | 47,1% | 48,9% |
| Parmi eux : | | | |
| ➤ Perturbe travail | 53,8% | 68,2% | 59,5% |
| ➤ Sans conséquence | 45,2% | 35,0% | 41,3% |
| ➤ Aspect positif sur travail | 37,5% | 33,8% | 36,0% |
| Dépasser horaires normaux | 45,8% | 27,5% | 38,1% |
| Sauter repas ou pas de pause | 19,6% | 21,0% | 20,2% |
| Traiter trop vite une opération | 19,8% | 22,6% | 21,0% |
| Travail ne permet pas d'apprendre | 22,6% | 19,0% | 21,1% |
| Travail pas varié | 17,8% | 22,1% | 19,6% |
| Pas de choix dans la façon de procéder | 24,8% | 35,1% | 29,1% |
| Pas de possibilité suffisante d'entraide | 12,2% | 15,4% | 13,5% |
| Travail pas reconnu | 21,0% | 23,6% | 22,1% |
| Formations et informations insuffisantes | 20,0% | 19,7% | 19,9% |
| Objectifs et consignes pas clairement définis | 22,0% | 14,7% | 19,0% |
| Pression temporelle forte (>5) | 43,3% | 32,3% | 38,7% |

| Charge physique du poste de travail | Hommes n=272 | Femmes n=195 | Ensemble n=467 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Postures contraignantes : | | | |
| Non | 37,5% | 46,9% | 41,4% |
| Oui, difficile ou pénible | 31,3% | 27,8% | 29,8% |
| Oui, pas difficile ou pénible | 28,7% | 23,7% | 26,6% |
| Oui, difficile ou pénible non précisée | 2,6% | 1,5% | 2,1% |
| Effort, Port de charges lourdes : | | | |
| Non | 47,4% | 54,4% | 50,3% |
| Oui, difficile ou pénible | 24,8% | 21,8% | 23,5% |
| Oui, pas difficile ou pénible | 26,7% | 22,3% | 24,8% |
| Oui, difficile ou pénible non précisée | 1,1% | 1,6% | 1,3% |
| Gestes répétitifs : | | | |
| Non | 48,9% | 40,7% | 45,5% |
| Oui, difficile ou pénible | 18,9% | 18,6% | 18,8% |
| Oui, pas difficile ou pénible | 31,1% | 38,1% | 34,1% |
| Oui, difficile ou pénible non précisée | 1,1% | 2,6% | 1,7% |
| Importants déplacements à pieds : | | | |
| Non | 50,9% | 73,7% | 60,4% |
| Oui, difficile ou pénible | 10,3% | 8,2% | 9,5% |
| Oui, pas difficile ou pénible | 37,6% | 18,0% | 29,5% |
| Oui, difficile ou pénible non précisée | 1,1% | 0,0% | 0,6% |
| Station debout prolongée : | | | |
| Non | 39,0% | 45,1% | 41,5% |
| Oui, difficile ou pénible | 18,8% | 20,5% | 19,5% |
| Oui, pas difficile ou pénible | 40,4% | 32,8% | 37,3% |
| Oui, difficile ou pénible non précisée | 1,8% | 1,5% | 1,7% |

| Expositions | Hommes n=272 | Femmes n=195 | Ensemble n=467 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Produits chimiques | 31,7% | 14,4% | 24,5% |
| Poussières, fumées | 43,5% | 9,8% | 29,5% |
| Rx ionisants | 6,6% | 1,0% | 4,3% |
| Vibrations | 29,6% | 2,6% | 18,3% |
| Gêne sonore | 53,5% | 28,5% | 43,1% |
| Bruit > 80db | 40,3% | 5,2% | 25,7% |
| Contrainte visuelle | 28,8% | 32,5% | 30,3% |
| Conduite routière prolongée | 17,7% | 6,2% | 12,9% |
| Chaleur intense | 20,0% | 5,2% | 13,8% |
| Froid intense | 13,3% | 4,7% | 9,7% |
| Intempéries | 17,1% | 3,2% | 11,3% |
| Pression psychologique | 22,9% | 22,4% | 22,7% |
| Agent biologique | 6,7% | 19,7% | 12,1% |
| Contact avec public | 46,3% | 66,2% | 54,6% |

| Formation | Hommes n=272 | Femmes n=195 | Ensemble n=467 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| A bénéficié d'une formation depuis un an | 47,8% | 45,0% | 46,6% |
| Parmi eux : | | | |
| ➤ En rapport avec travail actuel | 88,2% | 91,6% | 89,5% |
| ➤ En rapport avec travail futur | 16,8% | 18,3% | 17,4% |
| ➤ Formation d'intérêt général | 44,9% | 31,6% | 39,6% |
| Rôle de formateur ou tuteur depuis un an | 33,2% | 20,0% | 27,7% |

| Mode de vie | Hommes n=272 | Femmes n=195 | Ensemble n=467 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Activité sportive régulière | 53,7% | 49,7% | 52,1% |
| Consommation de tabac | 35,4% | 23,8% | 30,6% |
| Consommation de tabac>15 cig / j | 10,4% | 4,7% | 8,0% |
| Consommation de café | 81,2% | 61,9% | 73,0% |
| Consommation de café sup à 4 tasses / j | 15,4% | 7,2% | 12,0% |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 20,7% | 12,1% | 17,1% |

| Etat de santé | <45 ans | | | ≥45 ans | | | Global n=467 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Hommes n=182 | Femmes n=138 | Ensemble n=320 | Hommes n=90* | Femmes n=57* | Ensemble n=147 | |
| Indice de masse corporelle | | | | | | | |
| ➤ Normaux ou maigres | 63,7% | 70,1% | 66,5% | 36,4% | 57,9% | 44,8% | 59,7% |
| ➤ Surpoids | 27,4% | 19,7% | 24,1% | 50,0% | 28,1% | 41,4% | 29,5% |
| ➤ Obèses | 8,9% | 10,2% | 9,5% | 13,6% | 14,0% | 13,8% | 10,8% |
| Appareil respiratoire | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 3,3% | 2,2% | 2,8% | 8,0% | 1,8% | 5,6% | 3,7% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 2,8% | 0,7% | 1,9% | 5,7% | 1,8% | 4,2% | 2,6% |
| Gêne dans le travail | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 2,3% | 0,0% | 1,4% | 0,9% |
| Consommation médicamenteuse | 3,3% | 0,7% | 2,2% | 3,4% | 1,8% | 2,8% | 2,4% |
| Pathologie diagnostiquée | 3,3% | 1,4% | 2,5% | 7,0% | 1,8% | 4,9% | 3,3% |
| Appareil cardio vasculaire | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 0,0% | 2,9% | 1,3% | 12,5% | 3,5% | 9,0% | 3,7% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 0,0% | 2,2% | 0,9% | 6,9% | 1,8% | 4,9% | 2,2% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,7% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| Consommation médicamenteuse | 0,0% | 0,7% | 0,3% | 9,2% | 1,8% | 6,3% | 2,2% |
| Pathologie diagnostiquée | 0,0% | 2,9% | 1,3% | 10,3% | 3,5% | 7,6% | 3,3% |
| HTA | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 2,3% | 3,7% | 2,9% | 14,8% | 15,8% | 15,2% | 6,8% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 0,6% | 2,9% | 1,6% | 11,4% | 8,8% | 10,3% | 4,4% |
| Gêne dans le travail | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Consommation médicamenteuse | 0,6% | 2,9% | 1,6% | 13,6% | 14,0% | 13,8% | 5,5% |
| Pathologie diagnostiquée | 2,3% | 2,9% | 2,6% | 14,8% | 15,8% | 15,2% | 6,6% |
| ➤ Lassitude, fatigue | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 15,6% | 17,8% | 16,5% | 15,9% | 15,8% | 15,9% | 16,3% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 15,6% | 17,8% | 16,5% | 14,8% | 15,8% | 15,2% | 16,1% |
| Gêne dans le travail | 8,3% | 8,1% | 8,3% | 5,7% | 8,8% | 6,9% | 7,8% |
| Consommation médicamenteuse | 0,0% | 1,5% | 0,6% | 1,1% | 5,3% | 2,8% | 1,3% |
| Pathologie diagnostiquée | 2,2% | 1,5% | 1,9% | 1,1% | 5,3% | 2,8% | 2,2% |
| ➤ Anxiété, nervosité | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 15,2% | 15,6% | 15,3% | 22,7% | 24,6% | 23,4% | 17,9% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 15,2% | 14,9% | 15,1% | 22,7% | 24,6% | 23,4% | 17,7% |
| Gêne dans le travail | 7,3% | 6,0% | 6,7% | 8,0% | 7,0% | 7,6% | 7,0% |
| Consommation médicamenteuse | 0,0% | 3,0% | 1,3% | 2,3% | 8,8% | 4,8% | 2,4% |
| Pathologie diagnostiquée | 1,7% | 3,0% | 2,2% | 1,1% | 12,3% | 5,5% | 3,3% |
| ➤ Trouble du sommeil | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 16,2% | 11,2% | 14,1% | 15,9% | 21,1% | 17,9% | 15,3% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 16,2% | 11,2% | 14,1% | 15,9% | 21,1% | 17,9% | 15,3% |
| Gêne dans le travail | 7,3% | 4,5% | 6,1% | 3,4% | 7,0% | 4,8% | 5,7% |
| Consommation médicamenteuse | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 8,8% | 4,1% | 1,3% |
| Pathologie diagnostiquée | 2,8% | 2,2% | 2,6% | 1,1% | 7,0% | 3,4% | 2,8% |
| Troubles neuro psychiques | | | | | | | |
| (les 3 signes ci-dessus) | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 6,1% | 2,9% | 4,7% | 3,4% | 7,0% | 4,8% | 4,8% |
| Plaîntes ou signes cliniques | 6,1% | 2,9% | 4,7% | 3,4% | 7,0% | 4,8% | 4,8% |
| Gêne dans le travail | 3,3% | 0,7% | 2,2% | 2,3% | 3,5% | 2,8% | 2,4% |
| Consommation médicamenteuse | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 3,5% | 2,1% | 0,6% |
| Pathologie diagnostiquée | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 3,5% | 1,4% | 0,9% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé | <45 ans | | | ≥45 ans | | | Global n=467 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Hommes n=182 | Femmes n=138 | Ensemble n=320 | Hommes n=90* | Femmes n=57* | Ensemble n=147 | |
| Digestif | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 7,4% | 6,8% | 7,1% | 9,5% | 7,3% | 8,6% | 7,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 6,7% | 6,8% | 6,8% | 9,5% | 7,3% | 8,6% | 7,4% |
| Gêne dans le travail | 2,5% | 1,5% | 2,0% | 2,4% | 1,8% | 2,2% | 2,1% |
| Consommation médicamenteuse | 0,6% | 3,8% | 2,0% | 6,0% | 3,6% | 5,0% | 3,0% |
| Pathologie diagnostiquée | 2,5% | 3,0% | 2,7% | 7,1% | 3,6% | 5,8% | 3,7% |
| Dermatologie | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 6,7% | 6,5% | 6,6% | 6,8% | 0,0% | 4,1% | 5,8% |
| Plaintes ou signes cliniques | 6,7% | 6,5% | 6,6% | 6,8% | 0,0% | 4,1% | 5,8% |
| Gêne dans le travail | 1,7% | 1,4% | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1% |
| Consommation médicamenteuse | 2,2% | 2,9% | 2,5% | 1,1% | 0,0% | 0,7% | 2,0% |
| Pathologie diagnostiquée | 5,0% | 5,8% | 5,3% | 4,5% | 0,0% | 2,8% | 4,5% |
| Troubles de l'audition | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 7,8% | 2,2% | 5,4% | 18,4% | 3,6% | 12,6% | 7,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 5,6% | 2,2% | 4,1% | 14,9% | 3,6% | 10,5% | 6,1% |
| Gêne dans le travail | 1,7% | 0,0% | 0,9% | 4,6% | 0,0% | 2,8% | 1,5% |
| Consommation médicamenteuse | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,8% | 0,7% | 0,2% |
| Pathologie diagnostiquée | 6,1% | 0,7% | 3,8% | 12,6% | 1,8% | 8,4% | 5,2% |
| Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur | | | | | | | |
| (l'un des 3 signes ci-dessous) | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 10,7% | 11,7% | 11,1% | 20,7% | 25,5% | 22,5% | 14,7% |
| Plaintes ou signes cliniques | 10,7% | 11,7% | 11,1% | 20,7% | 25,5% | 22,5% | 14,7% |
| Gêne dans le travail | 5,6% | 9,6% | 7,3% | 10,5% | 18,2% | 13,5% | 9,2% |
| Consommation médicamenteuse | 1,1% | 2,9% | 1,9% | 9,3% | 7,4% | 8,6% | 4,0% |
| Pathologie diagnostiquée | 3,9% | 5,1% | 4,5% | 8,1% | 9,3% | 8,6% | 5,7% |
| ➤ Epaule | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 8,3% | 6,6% | 7,6% | 14,8% | 15,8% | 15,2% | 10,0% |
| Plaintes ou signes cliniques | 8,3% | 6,6% | 7,6% | 14,8% | 15,8% | 15,2% | 10,0% |
| Gêne dans le travail | 3,3% | 4,4% | 3,8% | 6,9% | 10,5% | 8,3% | 5,2% |
| Consommation médicamenteuse | 0,6% | 1,5% | 0,9% | 6,9% | 3,6% | 5,6% | 2,4% |
| Pathologie diagnostiquée | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 5,7% | 5,4% | 5,6% | 3,3% |
| ➤ Coude | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 1,1% | 2,9% | 1,9% | 3,4% | 5,5% | 4,2% | 2,6% |
| Plaintes ou signes cliniques | 1,1% | 2,9% | 1,9% | 3,4% | 5,5% | 4,2% | 2,6% |
| Gêne dans le travail | 0,6% | 2,9% | 1,6% | 1,1% | 1,9% | 1,4% | 1,5% |
| Consommation médicamenteuse | 0,6% | 1,5% | 1,0% | 0,0% | 1,9% | 0,7% | 0,9% |
| Pathologie diagnostiquée | 0,6% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,9% | 1,4% | 1,1% |
| ➤ Poignet | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 3,9% | 6,6% | 5,0% | 10,3% | 10,9% | 10,6% | 6,8% |
| Plaintes ou signes cliniques | 3,9% | 6,6% | 5,0% | 10,3% | 10,9% | 10,6% | 6,8% |
| Gêne dans le travail | 1,7% | 6,6% | 3,8% | 3,4% | 5,6% | 4,3% | 3,9% |
| Consommation médicamenteuse | 0,0% | 1,5% | 0,6% | 3,4% | 1,9% | 2,8% | 1,3% |
| Pathologie diagnostiquée | 1,1% | 2,9% | 1,9% | 3,4% | 1,9% | 2,8% | 2,2% |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé | <45 ans | | | ≥45 ans | | | Global n=467 | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| | Hommes n=182 | Femmes n=138 | Ensemble n=320 | Hommes n=90* | Femmes n=57* | Ensemble n=147 | | |
| Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur | | | | | | | | |
| (Existence d'un problème) | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 9,4% | 4,4% | 7,3% | 19,3% | 12,3% | 16,6% | 10,2% | |
| Plaintes ou signes cliniques | 9,4% | 3,7% | 7,0% | 17,2% | 12,3% | 15,3% | 9,6% | |
| Gêne dans le travail | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 10,3% | 7,0% | 9,0% | 4,4% | |
| Consommation médicamenteuse | 0,0% | 0,7% | 0,3% | 5,7% | 5,3% | 5,6% | 2,0% | |
| Pathologie diagnostiquée | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 12,6% | 7,0% | 10,4% | 4,8% | |
| Troubles ostéoarticulaires du rachis | | | | | | | | |
| (l'un des 2 signes ci-dessous) | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 31,6% | 29,7% | 30,8% | 31,0% | 32,7% | 31,7% | 31,1% | |
| Plaintes ou signes cliniques | 31,1% | 29,7% | 30,5% | 31,0% | 32,7% | 31,7% | 30,9% | |
| Gêne dans le travail | 15,3% | 19,9% | 17,3% | 19,5% | 7,4% | 14,9% | 16,6% | |
| Consommation médicamenteuse | 5,7% | 9,6% | 7,4% | 12,6% | 5,6% | 9,9% | 8,2% | |
| Pathologie diagnostiquée | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 17,2% | 14,8% | 16,3% | 12,6% | |
| ➤ Vertèbres cervicales | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 9,1% | 14,6% | 11,5% | 11,5% | 19,3% | 14,6% | 12,5% | |
| Plaintes ou signes cliniques | 9,1% | 14,6% | 11,5% | 11,5% | 19,3% | 14,6% | 12,5% | |
| Gêne dans le travail | 5,1% | 10,9% | 7,7% | 4,6% | 5,4% | 4,9% | 6,8% | |
| Consommation médicamenteuse | 2,3% | 5,8% | 3,8% | 2,3% | 1,8% | 2,1% | 3,3% | |
| Pathologie diagnostiquée | 4,5% | 5,8% | 5,1% | 5,7% | 7,1% | 6,3% | 5,5% | |
| ➤ Vertèbres dorsolumbaires | | | | | | | | |
| Existence d'un problème | 28,1% | 21,2% | 25,1% | 25,0% | 21,8% | 23,8% | 24,7% | |
| Plaintes ou signes cliniques | 27,5% | 21,2% | 24,8% | 25,0% | 21,8% | 23,8% | 24,5% | |
| Gêne dans le travail | 13,5% | 12,4% | 13,0% | 18,2% | 5,6% | 13,4% | 13,1% | |
| Consommation médicamenteuse | 4,5% | 5,1% | 4,8% | 12,5% | 3,7% | 9,2% | 6,1% | |
| Pathologie diagnostiquée | 7,9% | 6,6% | 7,3% | 12,5% | 11,1% | 12,0% | 8,8% | |

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence