



## Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

**Le détail du secteur «I. Hébergement et restauration»**

**Juin 2010**



Université Lille 2  
Droit et Santé

Description de la population	56. Restauration n=669	I. Hébergement et restauration n=954
Cadres	3,9%	3,9%
Intermédiaires	8,4%	10,2%
Employés	64,7%	65,8%
Ouvriers	21,8%	19,0%
Répartition homme/femme	48,9%/51,1%	46,8%/53,2%
≤24ans	33,6%	29,2%
25-34ans	25,7%	27,4%
35-44ans	21,2%	22,1%
45-54ans	16,0%	17,1%
≥55ans	3,4%	4,2%

Conditions de travail	56. Restauration n=669	I. Hébergement et restauration n=954
Changement de travail depuis 1an :		
Non	75,0%	75,8%
Oui, raison médicale	1,2%	1,3%
Oui, autre raison	23,2%	22,4%
Oui, raison non précisée	0,6%	0,5%
Personnes travaillant à temps plein	65,0%	68,8%
Travail en journée normale	62,0%	63,3%
Coupures de plus de 2 heures	42,2%	41,1%
Horaires décalés	47,6%	47,4%
Horaires irréguliers ou alternés	37,6%	38,0%
Travail de nuit	13,6%	13,9%
Déplacements professionnels de plus de 24h	1,4%	1,6%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	44,4%	46,7%
Parmi eux :		
➤ Perturbe le travail	40,9%	44,6%
➤ Sans conséquence	51,8%	50,2%
➤ Aspect positif sur le travail	40,5%	40,5%
Dépasser horaires normaux	39,5%	41,2%
Sauter repas ou pas de pause	26,1%	29,4%
Traiter trop vite une opération	19,2%	20,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	26,2%	27,0%
Travail pas varié	26,8%	27,9%
Pas de choix dans la façon de procéder	33,5%	30,8%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	17,7%	18,5%
Travail pas reconnu	23,6%	23,6%
Formations et informations insuffisantes	16,9%	17,0%
Objectifs et consignes pas clairement définis	13,5%	14,7%
Pression temporelle forte (>5)	34,6%	35,1%

<b>Charge physique du poste de travail</b>	<b>56. Restauration n=669</b>	<b>I. Hébergement et restauration n=954</b>
Postures contraignantes :		
Non	33,7%	35,4%
Oui, difficile ou pénible	29,8%	29,8%
Oui, pas difficile ou pénible	33,1%	31,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,5%	3,4%
Effort, Port de charges lourdes :		
Non	29,1%	32,3%
Oui, difficile ou pénible	28,5%	29,3%
Oui, pas difficile ou pénible	38,0%	34,7%
Oui, difficile ou pénible non précisée	4,4%	3,7%
Gestes répétitifs :		
Non	15,0%	18,4%
Oui, difficile ou pénible	22,9%	23,0%
Oui, pas difficile ou pénible	57,7%	54,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	4,4%	4,1%
Importants déplacements à pieds :		
Non	45,8%	46,2%
Oui, difficile ou pénible	18,4%	18,1%
Oui, pas difficile ou pénible	32,5%	32,0%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,3%	3,7%
Station debout prolongée :		
Non	6,5%	11,3%
Oui, difficile ou pénible	39,0%	37,2%
Oui, pas difficile ou pénible	50,0%	46,9%
Oui, difficile ou pénible non précisée	4,5%	4,6%

<b>Expositions</b>	<b>56. Restauration n=669</b>	<b>I. Hébergement et restauration n=954</b>
Produits chimiques	33,9%	34,2%
Poussières, fumées	27,0%	28,8%
Rx ionisants	0,8%	0,7%
Vibrations	2,6%	3,5%
Gêne sonore	42,1%	36,3%
Bruit > 80db	16,3%	13,9%
Contrainte visuelle	8,8%	10,3%
Conduite routière prolongée	4,1%	3,4%
Chaleur intense	44,0%	37,5%
Froid intense	20,4%	17,5%
Intempéries	5,0%	4,9%
Pression psychologique	27,3%	26,3%
Agent biologique	8,1%	8,9%
Contact avec public	80,8%	82,1%

<b>Formation</b>	<b>56. Restauration n=669</b>	<b>I. Hébergement et restauration n=954</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	34,9%	37,5%
Parmi eux :		
➤ En rapport avec travail actuel	86,5%	85,9%
➤ En rapport avec travail futur	24,5%	23,2%
➤ Formation d'intérêt général	41,2%	44,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	27,7%	28,3%

<b>Mode de vie</b>	<b>56. Restauration n=669</b>	<b>I. Hébergement et restauration n=954</b>
Activité sportive régulière	39,0%	38,8%
Consommation de tabac	51,9%	48,0%
Consommation de tabac>15 cig / j	16,8%	15,4%
Consommation de café	75,1%	73,8%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	19,3%	17,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	12,8%	13,6%

Etat de santé	56. Restauration			I. Hébergement et restauration		
	<45 ans n=539	≥45 ans n=130	Ensembles n=669	<45 ans n=751	≥45 ans n=203	Ensembles n=954
<b>Indice de masse corporelle</b>						
➤ Normaux ou maigres	68,5%	59,8%	66,8%	68,0%	59,0%	66,1%
➤ Surpoids	22,1%	26,8%	23,0%	22,6%	26,7%	23,5%
➤ Obèses	9,4%	13,4%	10,1%	9,3%	14,4%	10,4%
<b>Appareil respiratoire</b>						
Existence d'un problème	3,2%	4,6%	3,5%	3,1%	5,0%	3,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,0%	4,6%	3,3%	2,7%	4,5%	3,1%
Gêne dans le travail	0,9%	0,0%	0,8%	0,7%	1,0%	0,7%
Consommation médicamenteuse	2,4%	0,8%	2,1%	2,2%	1,0%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	2,3%	2,6%	2,6%	3,0%	2,7%
<b>Appareil cardiovasculaire</b>						
Existence d'un problème	2,8%	4,7%	3,2%	3,0%	4,5%	3,3%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	2,3%	2,3%	2,6%	2,5%	2,6%
Gêne dans le travail	0,9%	0,8%	0,9%	1,2%	1,5%	1,3%
Consommation médicamenteuse	0,4%	2,3%	0,8%	0,4%	2,5%	0,9%
Pathologie diagnostiquée	2,1%	3,9%	2,4%	1,9%	4,0%	2,3%
<b>HTA</b>						
Existence d'un problème	2,1%	10,0%	3,6%	2,3%	10,9%	4,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	6,2%	2,7%	1,8%	6,5%	2,8%
Gêne dans le travail	0,0%	0,8%	0,2%	0,0%	0,5%	0,1%
Consommation médicamenteuse	0,8%	6,9%	2,0%	1,1%	8,0%	2,6%
Pathologie diagnostiquée	1,1%	9,2%	2,7%	1,4%	10,4%	3,3%
➤ <b>Lassitude, fatigue</b>						
Existence d'un problème	20,5%	20,0%	20,4%	19,7%	19,9%	19,7%
Plaintes ou signes cliniques	19,9%	20,0%	19,9%	19,3%	19,9%	19,4%
Gêne dans le travail	9,1%	12,5%	9,8%	9,4%	13,1%	10,2%
Consommation médicamenteuse	1,1%	2,3%	1,4%	1,8%	5,5%	2,6%
Pathologie diagnostiquée	3,0%	3,1%	3,1%	3,4%	5,1%	3,8%
➤ <b>Anxiété, nervosité</b>						
Existence d'un problème	19,5%	17,7%	19,1%	18,8%	19,0%	18,8%
Plaintes ou signes cliniques	18,4%	17,1%	18,1%	18,0%	18,6%	18,2%
Gêne dans le travail	7,3%	7,7%	7,3%	7,6%	10,0%	8,1%
Consommation médicamenteuse	2,3%	2,3%	2,3%	2,8%	7,0%	3,7%
Pathologie diagnostiquée	4,2%	2,3%	3,8%	4,4%	5,1%	4,6%
➤ <b>Trouble du sommeil</b>						
Existence d'un problème	16,9%	22,7%	18,0%	15,5%	21,1%	16,7%
Plaintes ou signes cliniques	16,5%	22,0%	17,6%	15,2%	20,7%	16,4%
Gêne dans le travail	5,5%	4,8%	5,4%	5,4%	6,1%	5,5%
Consommation médicamenteuse	2,1%	4,7%	2,6%	1,8%	6,1%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	2,9%	4,0%	3,1%	3,1%	5,6%	3,6%
<b>Troubles neuro psychiques</b> (les 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	5,1%	6,9%	5,4%	4,6%	7,5%	5,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	6,9%	5,3%	4,5%	7,5%	5,1%
Gêne dans le travail	0,9%	1,5%	1,1%	0,8%	2,5%	1,2%
Consommation médicamenteuse	0,2%	0,8%	0,3%	0,3%	2,5%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	1,6%	0,9%	0,7%	2,0%	1,0%

Etat de santé	56. Restauration			I. Hébergement et restauration		
	<45 ans n=539	≥45 ans n=130	Ensembles n=669	<45 ans n=751	≥45 ans n=203	Ensembles n=954
<b>Digestif</b>						
Existence d'un problème	5,4%	10,3%	6,3%	5,1%	9,2%	6,0%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	8,7%	5,9%	5,0%	8,2%	5,7%
Gêne dans le travail	1,1%	0,8%	1,1%	1,4%	2,1%	1,5%
Consommation médicamenteuse	1,7%	7,1%	2,8%	1,9%	5,6%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	6,3%	3,2%	2,5%	4,6%	2,9%
<b>Dermatologie</b>						
Existence d'un problème	7,4%	4,6%	6,9%	7,3%	4,0%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,4%	4,6%	6,9%	7,3%	4,0%	6,6%
Gêne dans le travail	1,3%	0,8%	1,2%	1,1%	0,5%	1,0%
Consommation médicamenteuse	2,5%	1,5%	2,3%	2,6%	1,0%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	5,2%	3,8%	4,9%	5,1%	3,0%	4,6%
<b>Troubles de l'audition</b>						
Existence d'un problème	3,6%	2,3%	3,4%	2,9%	3,0%	2,9%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	2,3%	3,4%	2,9%	2,5%	2,8%
Gêne dans le travail	0,8%	0,0%	0,6%	0,7%	1,0%	0,8%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,8%	0,2%	0,0%	0,5%	0,1%
Pathologie diagnostiquée	2,1%	1,6%	2,0%	1,8%	2,0%	1,8%
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b> <i>(l'un des 3 signes ci-dessous)</i>						
Existence d'un problème	9,3%	21,3%	11,6%	8,4%	22,8%	11,5%
Plaintes ou signes cliniques	9,3%	21,3%	11,6%	8,4%	22,8%	11,5%
Gêne dans le travail	6,6%	14,4%	8,1%	6,0%	15,5%	8,0%
Consommation médicamenteuse	2,8%	9,6%	4,1%	2,5%	10,3%	4,1%
Pathologie diagnostiquée	4,5%	13,4%	6,3%	4,4%	14,2%	6,5%
➤ <b>Epaule</b>						
Existence d'un problème	5,8%	10,9%	6,8%	5,0%	11,6%	6,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	10,9%	6,8%	5,0%	11,6%	6,4%
Gêne dans le travail	3,9%	7,8%	4,7%	3,5%	8,1%	4,5%
Consommation médicamenteuse	1,9%	7,0%	2,9%	1,8%	6,6%	2,8%
Pathologie diagnostiquée	2,8%	5,5%	3,3%	2,4%	6,1%	3,2%
➤ <b>Coude</b>						
Existence d'un problème	0,9%	3,1%	1,4%	1,1%	4,5%	1,8%
Plaintes ou signes cliniques	0,9%	3,1%	1,4%	1,1%	4,0%	1,7%
Gêne dans le travail	0,6%	1,6%	0,8%	0,7%	3,1%	1,2%
Consommation médicamenteuse	0,6%	0,8%	0,6%	0,4%	1,5%	0,6%
Pathologie diagnostiquée	0,8%	2,3%	1,1%	0,7%	3,6%	1,3%
➤ <b>Poignet</b>						
Existence d'un problème	3,8%	13,3%	5,6%	3,8%	14,1%	6,0%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	13,3%	5,6%	3,8%	13,6%	5,9%
Gêne dans le travail	2,8%	8,7%	4,0%	2,6%	9,1%	4,0%
Consommation médicamenteuse	0,6%	5,6%	1,5%	0,4%	5,6%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	10,2%	3,4%	1,8%	9,6%	3,4%

Etat de santé	56. Restauration			I. Hébergement et restauration		
	<45 ans n=539	≥45 ans n=130	Ensembles n=669	<45 ans n=751	≥45 ans n=203	Ensembles n=954
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>						
Existence d'un problème	7,4%	12,6%	8,4%	7,5%	15,7%	9,2%
Plaintes ou signes cliniques	7,0%	12,6%	8,1%	7,1%	15,2%	8,8%
Gêne dans le travail	3,6%	7,9%	4,4%	4,1%	8,7%	5,0%
Consommation médicamenteuse	1,1%	4,8%	1,8%	1,2%	7,2%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	3,8%	8,7%	4,7%	3,9%	10,2%	5,2%
<b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>						
Existence d'un problème	25,1%	28,7%	25,8%	22,7%	30,2%	24,3%
Plaintes ou signes cliniques	24,4%	27,9%	25,1%	21,5%	28,3%	23,0%
Gêne dans le travail	13,3%	15,1%	13,6%	12,4%	17,6%	13,5%
Consommation médicamenteuse	5,8%	12,9%	7,1%	5,5%	14,1%	7,3%
Pathologie diagnostiquée	9,1%	17,2%	10,7%	8,6%	18,4%	10,7%
➤ <b>Vertèbres cervicales</b>						
Existence d'un problème	7,8%	12,5%	8,7%	7,0%	13,6%	8,4%
Plaintes ou signes cliniques	7,8%	12,5%	8,7%	7,0%	12,6%	8,2%
Gêne dans le travail	4,6%	5,5%	4,8%	3,8%	6,6%	4,4%
Consommation médicamenteuse	2,3%	6,3%	3,1%	1,8%	7,1%	2,9%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	7,8%	3,7%	2,3%	9,6%	3,9%
➤ <b>Vertèbres dorsolombaires</b>						
Existence d'un problème	20,8%	21,1%	20,9%	19,2%	23,2%	20,1%
Plaintes ou signes cliniques	20,1%	20,3%	20,1%	18,0%	21,8%	18,8%
Gêne dans le travail	10,9%	11,8%	11,1%	10,5%	14,9%	11,4%
Consommation médicamenteuse	4,4%	8,7%	5,2%	4,4%	9,7%	5,5%
Pathologie diagnostiquée	7,5%	11,7%	8,3%	7,2%	12,2%	8,3%