



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «H. Transports et entreposage»

Juin 2010



Université Lille 2
Droit et Santé

Description de la population	49. Transports terrestres et transports par conduites n=864	H. Transports et entreposage n=1389
Cadres	2,2%	4,5%
Intermédiaires	6,4%	9,1%
Employés	8,9%	16,9%
Ouvriers	82,1%	68,9%
Répartition homme/femme	85,2%/14,8%	78,0%/22,0%
≤24ans	6,1%	6,9%
25-34ans	22,8%	23,5%
35-44ans	32,5%	33,5%
45-54ans	29,3%	28,7%
≥55ans	9,3%	7,4%
Conditions de travail	49. Transports terrestres et transports par conduites n=864	H. Transports et entreposage n=1389
Changement de travail depuis 1an :		
Non	85,9%	86,3%
Oui, raison médicale	1,2%	1,2%
Oui, autre raison	12,4%	12,0%
Oui, raison non précisée	0,5%	0,5%
Personnes travaillant à temps plein	89,1%	89,7%
Travail en journée normale	63,4%	64,3%
Coupures de plus de 2 heures	36,5%	27,2%
Horaires décalés	55,8%	49,6%
Horaires irréguliers ou alternés	48,9%	43,5%
Travail de nuit	28,0%	26,0%
Déplacements professionnels de plus de 24h	22,6%	16,7%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	23,0%	32,7%
Parmi eux :		
➤ Perturbe le travail	40,8%	46,7%
➤ Sans conséquence	54,3%	48,4%
➤ Aspect positif sur le travail	53,8%	46,9%
Dépasser horaires normaux	33,3%	37,1%
Sauter repas ou pas de pause	32,9%	30,2%
Traiter trop vite une opération	13,8%	17,8%
Travail ne permet pas d'apprendre	33,5%	32,3%
Travail pas varié	29,6%	29,2%
Pas de choix dans la façon de procéder	38,3%	36,4%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	23,0%	21,4%
Travail pas reconnu	24,4%	25,4%
Formations et informations insuffisantes	14,7%	16,5%
Objectifs et consignes pas clairement définis	12,7%	13,4%
Pression temporelle forte (>5)	29,4%	32,6%

Charge physique du poste de travail	49. Transports terrestres et transports par conduites n=864	H. Transports et entreposage n=1389
Postures contraignantes :		
Non	45,8%	44,6%
Oui, difficile ou pénible	23,1%	26,2%
Oui, pas difficile ou pénible	29,7%	27,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,4%	1,9%
Effort, Port de charges lourdes :		
Non	56,3%	54,0%
Oui, difficile ou pénible	18,9%	21,5%
Oui, pas difficile ou pénible	23,1%	22,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,8%	2,0%
Gestes répétitifs :		
Non	33,3%	34,3%
Oui, difficile ou pénible	16,2%	19,5%
Oui, pas difficile ou pénible	47,1%	43,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,4%	2,9%
Importants déplacements à pieds :		
Non	72,4%	65,9%
Oui, difficile ou pénible	4,8%	7,6%
Oui, pas difficile ou pénible	21,2%	24,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,6%	1,7%
Station debout prolongée :		
Non	71,9%	63,8%
Oui, difficile ou pénible	7,7%	11,8%
Oui, pas difficile ou pénible	18,7%	22,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,6%	1,9%

Expositions	49. Transports terrestres et transports par conduites n=864	H. Transports et entreposage n=1389
Produits chimiques	14,8%	13,0%
Poussières, fumées	36,6%	37,1%
Rx ionisants	0,8%	0,7%
Vibrations	49,4%	41,3%
Gêne sonore	40,9%	40,7%
Bruit > 80db	18,3%	18,4%
Contrainte visuelle	47,1%	43,8%
Conduite routière prolongée	60,0%	43,6%
Chaleur intense	12,9%	13,4%
Froid intense	13,4%	15,5%
Intempéries	34,3%	29,6%
Pression psychologique	27,3%	27,8%
Agent biologique	4,0%	3,5%
Contact avec public	78,2%	69,0%

Formation	49. Transports terrestres et transports par conduites n=864	H. Transports et entreposage n=1389
A bénéficié d'une formation depuis un an	37,8%	41,2%
Parmi eux :		
➤ En rapport avec travail actuel	93,9%	90,1%
➤ En rapport avec travail futur	14,6%	14,3%
➤ Formation d'intérêt général	41,4%	46,4%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	16,4%	19,8%

Mode de vie	49. Transports terrestres et transports par conduites n=864	H. Transports et entreposage n=1389
Activité sportive régulière	43,4%	44,8%
Consommation de tabac	44,7%	44,5%
Consommation de tabac>15 cig / j	15,0%	13,7%
Consommation de café	84,5%	83,7%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	20,9%	20,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	11,6%	13,7%

Etat de santé	49. Transports terrestres et transports par conduites			H. Transports et entreposage		
	<45 ans n=531	≥45 ans n=333	Ensembles n=864	<45 ans n=888	≥45 ans n=501	Ensembles n=1389
Indice de masse corporelle						
➤ Normaux ou maigres	48,4%	32,4%	42,2%	53,8%	37,2%	47,9%
➤ Surpoids	33,1%	41,0%	36,1%	30,1%	39,4%	33,4%
➤ Obèses	18,6%	26,5%	21,6%	16,1%	23,4%	18,7%
Appareil respiratoire						
Existence d'un problème	3,1%	3,9%	3,4%	3,7%	4,6%	4,0%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	3,9%	3,3%	3,3%	4,4%	3,7%
Gêne dans le travail	0,0%	0,3%	0,1%	0,6%	1,0%	0,7%
Consommation médicamenteuse	1,9%	2,1%	2,0%	2,5%	3,0%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	2,7%	2,6%	3,2%	3,4%	3,3%
Appareil cardiovasculaire						
Existence d'un problème	2,7%	7,0%	4,4%	2,7%	6,9%	4,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	5,2%	3,4%	2,5%	5,7%	3,7%
Gêne dans le travail	0,4%	0,3%	0,4%	0,6%	0,8%	0,7%
Consommation médicamenteuse	1,2%	5,5%	2,8%	1,0%	4,9%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	5,8%	3,3%	1,7%	5,9%	3,2%
HTA						
Existence d'un problème	4,7%	18,5%	10,0%	4,7%	17,2%	9,3%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	13,3%	7,0%	3,3%	12,6%	6,7%
Gêne dans le travail	0,4%	0,6%	0,5%	0,3%	0,6%	0,4%
Consommation médicamenteuse	2,1%	13,3%	6,5%	2,3%	12,6%	6,0%
Pathologie diagnostiquée	2,9%	15,2%	7,7%	2,8%	13,8%	6,8%
➤ Lassitude, fatigue						
Existence d'un problème	15,7%	15,5%	15,6%	17,7%	21,2%	19,0%
Plaintes ou signes cliniques	15,3%	15,5%	15,4%	17,5%	21,2%	18,8%
Gêne dans le travail	5,9%	6,7%	6,2%	6,9%	10,1%	8,0%
Consommation médicamenteuse	1,1%	1,2%	1,2%	1,8%	2,6%	2,1%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	3,0%	2,7%	3,0%	4,3%	3,5%
➤ Anxiété, nervosité						
Existence d'un problème	14,0%	16,1%	14,8%	16,8%	20,4%	18,1%
Plaintes ou signes cliniques	13,9%	16,1%	14,7%	16,7%	20,0%	17,9%
Gêne dans le travail	3,5%	6,7%	4,7%	4,8%	10,1%	6,7%
Consommation médicamenteuse	2,1%	3,4%	2,6%	2,4%	4,5%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,3%	4,0%	3,5%	3,8%	4,7%	4,1%
➤ Trouble du sommeil						
Existence d'un problème	12,5%	17,0%	14,3%	13,4%	20,4%	16,0%
Plaintes ou signes cliniques	12,2%	16,4%	13,8%	13,2%	19,8%	15,6%
Gêne dans le travail	5,1%	5,5%	5,3%	5,1%	6,7%	5,7%
Consommation médicamenteuse	1,0%	2,7%	1,7%	1,4%	5,1%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	4,0%	3,1%	2,6%	4,9%	3,4%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	3,6%	4,9%	4,1%	4,3%	7,7%	5,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,1%	4,6%	3,6%	4,0%	7,5%	5,3%
Gêne dans le travail	0,8%	1,5%	1,1%	0,9%	3,6%	1,9%
Consommation médicamenteuse	0,2%	0,6%	0,4%	0,2%	1,4%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	0,4%	1,2%	0,7%	0,5%	2,0%	1,0%

Etat de santé	49. Transports terrestres et transports par conduites			H. Transports et entreposage		
	<45 ans n=531	≥45 ans n=333	Ensembles n=864	<45 ans n=888	≥45 ans n=501	Ensembles n=1389
Digestif						
Existence d'un problème	7,6%	6,4%	7,2%	8,5%	8,2%	8,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	4,6%	6,0%	7,9%	6,7%	7,5%
Gêne dans le travail	1,0%	1,2%	1,1%	1,7%	1,6%	1,7%
Consommation médicamenteuse	3,5%	3,1%	3,3%	3,8%	4,1%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	3,9%	4,3%	4,1%	4,9%	5,3%	5,0%
Dermatologie						
Existence d'un problème	5,6%	5,8%	5,7%	5,0%	5,7%	5,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	5,8%	5,7%	5,0%	5,5%	5,1%
Gêne dans le travail	1,7%	0,6%	1,3%	1,0%	0,6%	0,9%
Consommation médicamenteuse	3,1%	2,7%	3,0%	2,6%	2,4%	2,6%
Pathologie diagnostiquée	4,2%	4,9%	4,5%	3,8%	4,7%	4,1%
Troubles de l'audition						
Existence d'un problème	6,0%	10,6%	7,8%	4,8%	10,1%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	9,1%	6,6%	4,2%	9,1%	6,0%
Gêne dans le travail	0,8%	1,5%	1,1%	0,8%	1,8%	1,2%
Consommation médicamenteuse	0,4%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	3,5%	6,4%	4,6%	2,8%	6,3%	4,1%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)						
Existence d'un problème	9,8%	13,7%	11,3%	10,1%	16,2%	12,3%
Plaintes ou signes cliniques	9,4%	13,4%	11,0%	9,9%	15,6%	12,0%
Gêne dans le travail	4,2%	6,7%	5,2%	5,2%	8,3%	6,3%
Consommation médicamenteuse	2,1%	3,7%	2,7%	2,8%	4,3%	3,3%
Pathologie diagnostiquée	5,2%	7,1%	5,9%	5,4%	8,6%	6,6%
➤ Epaule						
Existence d'un problème	5,4%	8,5%	6,6%	5,0%	10,3%	6,9%
Plaintes ou signes cliniques	5,4%	8,5%	6,6%	5,0%	9,9%	6,8%
Gêne dans le travail	2,3%	3,9%	2,9%	2,4%	4,8%	3,3%
Consommation médicamenteuse	1,1%	1,5%	1,3%	1,5%	2,2%	1,8%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	2,7%	2,6%	2,8%	4,0%	3,2%
➤ Coude						
Existence d'un problème	2,7%	3,9%	3,2%	3,0%	5,2%	3,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	3,6%	3,1%	3,0%	4,8%	3,6%
Gêne dans le travail	1,3%	1,5%	1,4%	1,4%	2,8%	1,9%
Consommation médicamenteuse	1,2%	1,8%	1,4%	1,3%	2,0%	1,5%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	1,2%	1,5%	1,7%	2,2%	1,9%
➤ Poignet						
Existence d'un problème	2,7%	6,4%	4,1%	3,4%	7,1%	4,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	5,8%	3,7%	3,2%	6,5%	4,4%
Gêne dans le travail	1,0%	3,0%	1,8%	1,9%	3,7%	2,6%
Consommation médicamenteuse	0,4%	2,1%	1,1%	0,6%	2,0%	1,1%
Pathologie diagnostiquée	1,4%	4,0%	2,4%	1,5%	4,1%	2,4%

Etat de santé	49.			H.		
	Transports terrestres et transports par conduites			Transports et entreposage		
	<45 ans n=531	≥45 ans n=333	Ensembles n=864	<45 ans n=888	≥45 ans n=501	Ensembles n=1389
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Existence d'un problème	8,1%	12,7%	9,9%	8,2%	13,3%	10,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	12,2%	9,5%	8,1%	12,6%	9,7%
Gêne dans le travail	3,7%	5,2%	4,2%	3,8%	5,5%	4,4%
Consommation médicamenteuse	2,1%	3,4%	2,6%	2,3%	2,6%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	4,0%	8,9%	5,9%	5,3%	7,8%	6,2%
Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>						
Existence d'un problème	21,6%	26,0%	23,3%	23,0%	29,4%	25,3%
Plaintes ou signes cliniques	20,9%	25,2%	22,5%	22,3%	28,4%	24,5%
Gêne dans le travail	9,8%	14,5%	11,7%	12,2%	16,1%	13,6%
Consommation médicamenteuse	3,5%	8,5%	5,5%	5,4%	9,9%	7,1%
Pathologie diagnostiquée	9,2%	14,1%	11,1%	10,0%	15,5%	12,0%
➤ Vertèbres cervicales						
Existence d'un problème	7,1%	9,4%	8,0%	7,9%	12,5%	9,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,1%	8,5%	7,6%	7,9%	11,7%	9,3%
Gêne dans le travail	4,0%	4,9%	4,4%	4,7%	6,1%	5,2%
Consommation médicamenteuse	1,0%	3,6%	2,0%	2,1%	4,3%	2,9%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	5,8%	3,9%	3,0%	6,5%	4,3%
➤ Vertèbres dorsolombaires						
Existence d'un problème	18,4%	23,0%	20,2%	19,8%	24,7%	21,6%
Plaintes ou signes cliniques	17,7%	22,1%	19,4%	19,1%	23,8%	20,8%
Gêne dans le travail	7,0%	12,4%	9,1%	9,5%	13,0%	10,8%
Consommation médicamenteuse	3,3%	7,0%	4,8%	4,4%	8,3%	5,8%
Pathologie diagnostiquée	7,6%	11,9%	9,3%	8,2%	12,8%	9,9%