



Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

Le détail du secteur «Q. Santé humaine et action sociale»

Juin 2010



Université Lille 2
Droit et Santé

Description de la population	86. Activités pour la santé humaine n=1012	87. Hébergement médico-social et social n=664	88. Action sociale sans hébergement n=602	Q. Santé humaine et action sociale n=2280
Cadres	6,2%	3,6%	3,3%	4,7%
Intermédiaires	37,0%	32,7%	31,9%	34,4%
Employés	51,8%	55,6%	50,3%	52,5%
Ouvriers	4,9%	8,0%	14,0%	8,2%
Répartition homme/femme	21,1%/78,9%	19,9%/80,1%	23,4%/76,6%	21,4%/78,6%
≤24ans	5,6%	10,5%	8,0%	7,7%
25-34ans	26,5%	21,2%	23,1%	24,0%
35-44ans	28,4%	31,3%	25,6%	28,5%
45-54ans	31,4%	27,7%	29,9%	30,0%
≥55ans	8,1%	9,2%	13,5%	9,8%

Conditions de travail	86. Activités pour la santé humaine n=1012	87. Hébergement médico-social et social n=664	88. Action sociale sans hébergement n=602	Q. Santé humaine et action sociale n=2280
Changement de travail depuis 1an :				
Non	91,5%	81,1%	85,2%	86,8%
Oui, raison médicale	0,8%	0,8%	1,0%	0,8%
Oui, autre raisons	7,7%	17,5%	13,8%	12,2%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,6%	0,0%	0,2%
Personnes travaillant à temps plein	73,4%	75,2%	61,4%	70,7%
Travail en journée normale	73,6%	65,4%	76,0%	71,8%
Coupures de plus de 2 heures	14,4%	23,9%	26,4%	20,4%
Horaires décalés	37,7%	32,0%	25,0%	32,7%
Horaires irréguliers ou alternés	43,9%	34,5%	31,5%	37,9%
Travail de nuit	22,2%	14,4%	6,6%	15,9%
Déplacements professionnels de plus de 24h	3,0%	1,5%	1,9%	2,3%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	54,5%	48,9%	39,8%	49,0%
Parmi eux :				
➤ Perturbe le travail	68,4%	61,2%	62,3%	65,0%
➤ Sans conséquence	37,4%	29,6%	38,2%	35,3%
➤ Aspect positif sur le travail	32,2%	30,0%	38,9%	33,0%
Dépasser horaires normaux	39,8%	27,7%	27,0%	32,8%
Sauter repas ou pas de pause	35,1%	24,5%	21,7%	28,5%
Traiter trop vite une opération	30,4%	28,9%	20,6%	27,3%
Travail ne permet pas d'apprendre	10,8%	12,5%	14,2%	12,2%
Travail pas varié	16,6%	17,4%	18,0%	17,2%
Pas de choix dans la façon de procéder	31,8%	23,2%	21,7%	26,6%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	16,4%	15,9%	25,0%	18,5%
Travail pas reconnu	25,3%	19,7%	19,8%	22,2%
Formations et informations insuffisantes	17,3%	20,7%	15,9%	17,9%
Objectifs et consignes pas clairement définis	16,1%	20,2%	20,4%	18,4%
Pression temporelle forte (>5)	42,1%	37,6%	33,4%	38,5%

Charge physique du poste de travail	86. Activités pour la santé humaine n=1012	87. Hébergement médico-social et social n=664	88. Action sociale sans hébergement n=602	Q. Santé humaine et action sociale n=2280
Postures contraignantes :				
Non	28,6%	34,2%	37,0%	32,5%
Oui, difficile ou pénible	40,0%	35,2%	32,3%	36,6%
Oui, pas difficile ou pénible	28,9%	28,0%	28,3%	28,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,4%	2,6%	2,5%	2,5%
Effort, Port de charges lourdes :				
Non	35,1%	33,8%	44,4%	37,2%
Oui, difficile ou pénible	41,7%	40,1%	32,6%	38,8%
Oui, pas difficile ou pénible	21,0%	23,3%	20,9%	21,6%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,2%	2,8%	2,0%	2,3%
Gestes répétitifs :				
Non	29,7%	36,5%	40,4%	34,5%
Oui, difficile ou pénible	23,1%	25,1%	21,8%	23,4%
Oui, pas difficile ou pénible	43,8%	34,2%	34,3%	38,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,4%	4,2%	3,5%	3,7%
Importants déplacements à pieds :				
Non	47,1%	45,2%	64,7%	51,1%
Oui, difficile ou pénible	19,7%	20,2%	9,4%	17,1%
Oui, pas difficile ou pénible	31,3%	32,6%	22,8%	29,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,0%	2,1%	3,2%	2,3%
Station debout prolongée :				
Non	28,5%	28,8%	36,3%	30,6%
Oui, difficile ou pénible	34,8%	29,4%	23,6%	30,3%
Oui, pas difficile ou pénible	33,8%	38,6%	36,7%	35,9%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,9%	3,3%	3,4%	3,1%

Expositions	86. Activités pour la santé humaine n=1012	87. Hébergement médico-social et social n=664	88. Action sociale sans hébergement n=602	Q. Santé humaine et action sociale n=2280
Produits chimiques	37,9%	26,6%	25,5%	31,3%
Poussières, fumées	12,2%	15,1%	25,6%	16,5%
Rx ionisants	11,3%	0,5%	0,7%	5,3%
Vibrations	6,8%	3,3%	4,4%	5,1%
Gêne sonore	28,1%	22,9%	23,4%	25,4%
Bruit > 80db	8,5%	9,2%	7,1%	8,4%
Contrainte visuelle	29,3%	8,0%	13,4%	18,9%
Conduite routière prolongée	12,0%	5,2%	9,0%	9,2%
Chaleur intense	12,3%	13,9%	12,0%	12,7%
Froid intense	5,3%	2,9%	4,2%	4,3%
Intempéries	5,7%	3,7%	10,6%	6,4%
Pression psychologique	39,5%	35,4%	32,6%	36,5%
Agent biologique	53,6%	34,7%	22,6%	39,9%
Contact avec public	88,4%	90,4%	83,6%	87,7%

Formation	86. Activités pour la santé humaine n=1012	87. Hébergement médico-social et social n=664	88. Action sociale sans hébergement n=602	Q. Santé humaine et action sociale n=2280
A bénéficié d'une formation depuis un an	46,9%	51,0%	44,2%	47,3%
Parmi eux :				
➤ En rapport avec travail actuel	91,6%	89,3%	91,8%	90,9%
➤ En rapport avec travail futur	10,7%	20,1%	19,3%	15,8%
➤ Formation d'intérêt général	51,5%	42,3%	50,0%	48,3%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	30,1%	25,2%	24,4%	27,2%

Mode de vie	86. Activités pour la santé humaine n=1012	87. Hébergement médico-social et social n=664	88. Action sociale sans hébergement n=602	Q. Santé humaine et action sociale n=2280
Activité sportive régulière	50,7%	44,9%	45,2%	47,6%
Consommation de tabac	30,4%	34,6%	35,6%	33,0%
Consommation de tabac > 15 cig / j	5,3%	6,9%	8,1%	6,5%
Consommation de café	77,4%	75,3%	74,5%	76,0%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	17,4%	16,8%	12,8%	16,0%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	14,3%	15,1%	17,9%	15,5%

Etat de santé	86. Activités pour la santé humaine			87. Hébergement médico-social et social			88. Action sociale sans hébergement			Q. Santé humaine et action sociale		
	<45ans n=612	≥45ans n=400	Ensembles n=1012	<45ans n=419	≥45ans n=245	Ensembles n=664	<45ans n=341	≥45ans n=261	Ensembles n=602	<45ans n=1373	≥45ans n=907	Global n=2280
Indice de masse corporelle												
➤ Normaux ou maigres	68,1%	62,5%	65,9%	63,3%	49,6%	58,2%	57,8%	51,9%	55,2%	64,0%	55,9%	60,8%
➤ Surpoids	21,8%	23,3%	22,4%	22,8%	34,6%	27,2%	23,5%	25,6%	24,4%	22,5%	27,0%	24,3%
➤ Obèses	10,1%	14,2%	11,7%	13,9%	15,8%	14,6%	18,7%	22,5%	20,3%	13,5%	17,0%	14,9%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	2,8%	4,6%	3,5%	3,2%	4,2%	3,6%	4,5%	4,6%	4,5%	3,4%	4,5%	3,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	3,8%	3,1%	2,9%	2,9%	2,9%	4,5%	3,9%	4,2%	3,2%	3,6%	3,4%
Gêne dans le travail	0,7%	1,0%	0,8%	1,0%	0,4%	0,8%	1,8%	0,8%	1,3%	1,0%	0,8%	0,9%
Consommation médic.	1,8%	3,3%	2,4%	2,7%	1,7%	2,3%	3,0%	2,7%	2,9%	2,4%	2,7%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	2,3%	4,3%	3,1%	2,9%	2,1%	2,6%	3,3%	4,2%	3,7%	2,8%	3,7%	3,1%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	4,2%	6,6%	5,2%	3,7%	5,5%	4,3%	3,0%	8,1%	5,2%	3,7%	6,8%	4,9%
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	4,9%	4,3%	3,4%	3,0%	3,3%	3,0%	5,8%	4,2%	3,5%	4,6%	4,0%
Gêne dans le travail	0,3%	1,3%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	1,2%	0,8%	1,0%	0,7%	1,0%	0,8%
Consommation médic.	1,2%	4,1%	2,3%	1,5%	4,2%	2,5%	1,2%	4,7%	2,7%	1,3%	4,3%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	5,6%	3,6%	2,2%	5,1%	3,3%	2,1%	6,2%	3,9%	2,2%	5,6%	3,6%
HTA												
Existence d'un problème	3,2%	14,9%	7,9%	2,5%	16,0%	7,5%	6,0%	18,1%	11,3%	3,7%	16,1%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	10,8%	5,3%	2,2%	9,4%	4,9%	5,1%	13,1%	8,6%	2,7%	11,1%	6,1%
Gêne dans le travail	0,0%	1,8%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,4%	0,5%	0,2%	0,9%	0,5%
Consommation médic.	2,0%	13,1%	6,4%	1,0%	14,3%	5,9%	4,5%	13,9%	8,6%	2,3%	13,7%	6,9%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	12,6%	6,6%	2,0%	13,5%	6,3%	4,2%	13,9%	8,4%	2,8%	13,2%	7,0%
➤ Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	19,3%	23,5%	21,0%	24,4%	26,6%	25,2%	21,7%	27,8%	24,4%	21,5%	25,6%	23,1%
Plaintes ou signes cliniques	19,0%	22,8%	20,5%	24,2%	25,8%	24,8%	21,7%	27,4%	24,2%	21,3%	24,9%	22,7%
Gêne dans le travail	7,4%	11,5%	9,0%	11,0%	13,5%	11,9%	10,7%	14,0%	12,1%	9,3%	12,7%	10,7%
Consommation médic.	1,5%	2,8%	2,0%	4,2%	5,5%	4,7%	4,5%	5,1%	4,8%	3,1%	4,2%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	2,4%	3,8%	2,9%	6,2%	7,3%	6,6%	5,4%	9,8%	7,3%	4,3%	6,5%	5,1%
➤ Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	20,0%	20,6%	20,2%	21,4%	23,5%	22,2%	23,7%	27,5%	25,3%	21,3%	23,3%	22,1%
Plaintes ou signes cliniques	19,6%	20,3%	19,9%	20,9%	22,8%	21,6%	23,7%	26,7%	25,0%	21,0%	22,8%	21,7%
Gêne dans le travail	7,2%	9,4%	8,1%	8,8%	9,3%	9,0%	8,1%	10,9%	9,4%	7,9%	9,8%	8,7%
Consommation médic.	3,5%	5,6%	4,4%	4,4%	5,5%	4,8%	6,3%	6,7%	6,5%	4,5%	5,9%	5,0%
Pathologie diagnostiquée	4,9%	6,1%	5,4%	6,9%	6,8%	6,9%	8,7%	10,6%	9,6%	6,5%	7,6%	6,9%
➤ Trouble du sommeil												
Existence d'un problème	14,2%	24,0%	18,1%	19,5%	30,3%	23,4%	18,1%	27,6%	22,3%	16,8%	26,7%	20,7%
Plaintes ou signes cliniques	13,9%	23,5%	17,7%	19,3%	28,8%	22,8%	18,1%	26,5%	21,8%	16,6%	25,8%	20,2%
Gêne dans le travail	5,1%	7,2%	5,9%	8,4%	11,8%	9,6%	7,3%	9,8%	8,3%	6,6%	9,2%	7,6%
Consommation médic.	2,9%	6,2%	4,2%	5,2%	10,6%	7,2%	4,2%	7,8%	5,8%	3,9%	7,8%	5,5%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	5,4%	3,8%	6,4%	10,2%	7,8%	6,0%	9,8%	7,7%	4,7%	8,0%	6,0%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	5,4%	7,9%	6,4%	6,6%	11,8%	8,5%	6,0%	11,6%	8,4%	5,9%	10,0%	7,5%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	7,9%	6,3%	6,6%	10,6%	8,1%	6,0%	11,6%	8,4%	5,8%	9,7%	7,4%
Gêne dans le travail	1,2%	2,8%	1,8%	2,2%	2,5%	2,3%	1,5%	4,2%	2,7%	1,6%	3,1%	2,2%
Consommation médic.	0,5%	1,0%	0,7%	1,0%	1,3%	1,1%	1,2%	1,9%	1,5%	0,8%	1,3%	1,0%
Pathologie diagnostiquée	0,7%	0,8%	0,7%	2,2%	2,5%	2,3%	2,4%	4,3%	3,2%	1,6%	2,2%	1,8%

Etat de santé	86. Activités pour la santé humaine			87. Hébergement médico-social et social			88. Action sociale sans hébergement			Q. Santé humaine et action sociale		
	<45ans n=612	≥45ans n=400	Ensembles n=1012	<45ans n=419	≥45ans n=245	Ensembles n=664	<45ans n=341	≥45ans n=261	Ensembles n=602	<45ans n=1373	≥45ans n=907	Global n=2280
Digestif												
Existence d'un problème	9,2%	8,2%	8,8%	7,9%	12,9%	9,7%	9,1%	12,0%	10,4%	8,8%	10,6%	9,5%
Plaintes ou signes cliniques	9,2%	7,7%	8,6%	7,9%	12,4%	9,6%	8,8%	11,2%	9,9%	8,7%	10,0%	9,2%
Gêne dans le travail	2,1%	1,3%	1,8%	1,0%	3,4%	1,9%	2,1%	2,3%	2,2%	1,7%	2,2%	1,9%
Consommation médic.	3,8%	4,5%	4,1%	3,2%	6,0%	4,2%	4,5%	6,6%	5,5%	3,8%	5,5%	4,5%
Pathologie diagnostiquée	4,8%	4,2%	4,6%	3,5%	6,9%	4,7%	5,2%	7,8%	6,3%	4,5%	6,0%	5,1%
Dermatologie												
Existence d'un problème	9,9%	6,1%	8,4%	4,4%	6,7%	5,3%	10,5%	7,4%	9,1%	8,4%	6,6%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	9,9%	6,1%	8,4%	4,2%	5,9%	4,8%	10,2%	7,4%	9,0%	8,3%	6,4%	7,5%
Gêne dans le travail	2,0%	2,0%	2,0%	0,2%	0,4%	0,3%	2,4%	1,6%	2,0%	1,6%	1,5%	1,5%
Consommation médic.	4,1%	1,8%	3,2%	1,2%	2,5%	1,7%	5,4%	3,5%	4,6%	3,5%	2,5%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	6,8%	4,6%	5,9%	3,7%	4,6%	4,0%	9,3%	6,6%	8,1%	6,5%	5,2%	5,9%
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	2,0%	3,3%	2,6%	3,7%	5,1%	4,2%	1,5%	7,0%	3,9%	2,4%	4,9%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	3,3%	2,4%	3,5%	5,1%	4,0%	1,5%	6,6%	3,7%	2,3%	4,8%	3,3%
Gêne dans le travail	1,2%	1,5%	1,3%	0,5%	3,4%	1,6%	0,3%	5,1%	2,4%	0,8%	3,1%	1,7%
Consommation médic.	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	1,3%	0,6%	0,3%	1,2%	0,7%	0,2%	0,8%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	2,1%	1,5%	1,7%	3,0%	2,2%	1,2%	5,5%	3,1%	1,4%	3,3%	2,1%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur <i>(l'un des 3 signes ci-dessous)</i>												
Existence d'un problème	11,1%	22,6%	15,7%	11,5%	21,5%	15,2%	11,8%	23,9%	17,1%	11,4%	22,7%	15,9%
Plaintes ou signes cliniques	10,6%	22,6%	15,4%	11,0%	21,2%	14,8%	11,8%	23,6%	17,0%	11,0%	22,5%	15,6%
Gêne dans le travail	7,1%	14,9%	10,2%	4,2%	16,0%	8,5%	7,0%	15,1%	10,6%	6,2%	15,3%	9,8%
Consommation médic.	3,0%	11,3%	6,3%	2,9%	11,4%	6,0%	3,0%	10,9%	6,5%	3,0%	11,2%	6,3%
Pathologie diagnostiquée	6,9%	14,4%	9,9%	5,1%	14,4%	8,5%	6,7%	16,0%	10,8%	6,3%	14,9%	9,7%
➤ Epaule												
Existence d'un problème	8,2%	16,5%	11,5%	7,3%	15,1%	10,2%	5,4%	20,1%	11,8%	7,2%	17,1%	11,2%
Plaintes ou signes cliniques	7,9%	16,2%	11,2%	7,1%	14,7%	9,9%	5,4%	20,1%	11,8%	7,0%	16,9%	11,0%
Gêne dans le travail	5,4%	10,2%	7,3%	2,9%	11,3%	6,0%	2,7%	12,8%	7,1%	4,0%	11,2%	6,9%
Consommation médic.	2,5%	8,9%	5,1%	1,7%	9,3%	4,5%	1,5%	9,7%	5,1%	2,0%	9,2%	4,9%
Pathologie diagnostiquée	5,5%	9,7%	7,2%	2,7%	11,0%	5,7%	3,0%	13,2%	7,5%	4,0%	11,0%	6,8%
➤ Coude												
Existence d'un problème	2,0%	6,4%	3,7%	2,7%	5,9%	3,9%	3,3%	5,4%	4,2%	2,5%	6,0%	3,9%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	6,4%	3,6%	2,7%	5,9%	3,9%	3,3%	5,4%	4,2%	2,5%	6,0%	3,9%
Gêne dans le travail	1,3%	4,1%	2,4%	1,2%	4,2%	2,3%	2,4%	4,3%	3,2%	1,6%	4,2%	2,6%
Consommation médic.	0,5%	3,1%	1,5%	1,0%	3,3%	1,8%	0,9%	3,1%	1,9%	0,7%	3,1%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	3,8%	2,2%	1,2%	3,8%	2,2%	2,1%	4,3%	3,1%	1,4%	3,9%	2,4%
➤ Poignet												
Existence d'un problème	3,7%	6,9%	5,0%	5,1%	10,1%	6,9%	6,6%	7,7%	7,1%	4,9%	8,0%	6,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,7%	6,9%	5,0%	4,9%	9,7%	6,6%	6,6%	6,9%	6,8%	4,8%	7,6%	5,9%
Gêne dans le travail	2,2%	4,3%	3,0%	2,0%	7,1%	3,9%	4,8%	5,0%	4,9%	2,8%	5,3%	3,8%
Consommation médic.	0,5%	3,3%	1,6%	1,2%	5,0%	2,6%	2,1%	3,5%	2,7%	1,1%	3,8%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	1,7%	4,3%	2,7%	2,9%	5,1%	3,7%	3,6%	5,8%	4,6%	2,5%	4,9%	3,5%

Etat de santé	86. Activités pour la santé humaine			87. Hébergement médico-social et social			88. Action sociale sans hébergement			Q. Santé humaine et action sociale		
	<45ans n=612	≥45ans n=400	Ensembles n=1012	<45ans n=419	≥45ans n=245	Ensembles n=664	<45ans n=341	≥45ans n=261	Ensembles n=602	<45ans n=1373	≥45ans n=907	Global n=2280
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	6,9%	12,7%	9,2%	9,0%	16,5%	11,8%	9,9%	18,6%	13,7%	8,3%	15,4%	11,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	12,2%	8,9%	9,0%	16,5%	11,8%	9,4%	17,9%	13,1%	8,1%	15,0%	10,8%
Gêne dans le travail	4,2%	6,1%	5,0%	4,2%	9,7%	6,2%	4,8%	7,4%	6,0%	4,3%	7,4%	5,6%
Consommation médic.	1,8%	4,9%	3,0%	2,0%	8,9%	4,5%	1,8%	8,2%	4,6%	1,9%	6,9%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	3,4%	8,4%	5,4%	6,1%	11,5%	8,1%	5,1%	13,7%	8,9%	4,6%	10,7%	7,1%
Troubles ostéoarticulaires du rachis												
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>												
Existence d'un problème	26,8%	37,9%	31,2%	30,7%	34,5%	32,1%	28,6%	41,5%	34,2%	28,4%	38,0%	32,3%
Plaintes ou signes cliniques	26,5%	37,6%	30,9%	30,7%	33,8%	31,8%	28,6%	41,5%	34,2%	28,3%	37,7%	32,0%
Gêne dans le travail	15,8%	21,6%	18,1%	15,5%	20,9%	17,5%	18,1%	30,0%	23,3%	16,3%	23,8%	19,3%
Consommation médic.	8,2%	20,5%	13,1%	5,8%	17,9%	10,2%	9,5%	19,3%	13,8%	7,8%	19,4%	12,4%
Pathologie diagnostiquée	13,8%	28,3%	19,6%	11,8%	22,9%	15,9%	12,7%	25,2%	18,2%	12,9%	25,9%	18,1%
➤ Vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	11,5%	18,2%	14,2%	12,3%	19,0%	14,8%	8,5%	25,2%	15,9%	11,0%	20,4%	14,8%
Plaintes ou signes cliniques	11,4%	17,9%	14,0%	12,3%	18,6%	14,7%	8,5%	24,5%	15,6%	11,0%	20,0%	14,6%
Gêne dans le travail	7,1%	9,5%	8,1%	6,9%	12,7%	9,0%	4,9%	16,4%	9,9%	6,5%	12,4%	8,8%
Consommation médic.	3,9%	9,2%	6,0%	2,5%	10,1%	5,3%	3,7%	11,5%	7,1%	3,4%	10,1%	6,1%
Pathologie diagnostiquée	5,9%	11,8%	8,3%	5,2%	10,2%	7,1%	2,8%	15,1%	8,1%	4,9%	12,3%	7,9%
➤ Vertèbres dorsolombaires												
Existence d'un problème	21,6%	28,5%	24,3%	22,7%	27,2%	24,4%	24,3%	29,8%	26,7%	22,6%	28,5%	25,0%
Plaintes ou signes cliniques	21,1%	28,2%	23,9%	22,7%	26,8%	24,2%	24,3%	29,8%	26,7%	22,4%	28,3%	24,7%
Gêne dans le travail	12,3%	17,2%	14,2%	10,4%	16,6%	12,7%	16,2%	21,1%	18,4%	12,7%	18,2%	14,9%
Consommation médic.	6,5%	15,9%	10,2%	4,2%	14,5%	8,0%	7,6%	13,6%	10,3%	6,1%	14,9%	9,6%
Pathologie diagnostiquée	10,7%	21,6%	15,0%	7,7%	18,5%	11,7%	11,0%	16,8%	13,5%	9,8%	19,4%	13,7%