



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009

Détail par secteur d'activité

(NAF 2008)

**Le détail du secteur «F. Construction»**

**Juin 2010**



Université Lille 2  
Droit et Santé

Description de la population	43. Travaux de construction spécialisés n=1487	F. Construction n=2005
Cadres	3,5%	4,9%
Intermédiaires	11,9%	12,7%
Employés	4,8%	5,4%
Ouvriers	78,5%	75,9%
Répartition homme/femme	93,5%/6,5%	92,1%/7,9%
≤24ans	20,6%	18,3%
25-34ans	24,3%	25,1%
35-44ans	26,6%	27,1%
45-54ans	22,2%	22,8%
≥55ans	6,3%	6,7%

Conditions de travail	43. Travaux de construction spécialisés n=1487	F. Construction n=2005
Changement de travail depuis 1an :		
Non	88,6%	89,8%
Oui, raison médicale	0,5%	0,5%
Oui, autre raison	10,8%	9,6%
Oui, raison non précisée	0,1%	0,0%
Personnes travaillant à temps plein	93,9%	93,9%
Travail en journée normale	95,8%	94,9%
Coupures de plus de 2 heures	7,1%	7,1%
Horaires décalés	10,9%	12,0%
Horaires irréguliers ou alternés	8,8%	10,1%
Travail de nuit	3,8%	4,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	11,5%	12,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	39,4%	41,1%
Parmi eux :		
➤ Perturbe le travail	51,3%	50,5%
➤ Sans conséquence	43,8%	44,3%
➤ Aspect positif sur le travail	38,3%	39,0%
Dépasser horaires normaux	32,7%	34,4%
Sauter repas ou pas de pause	12,4%	13,6%
Traiter trop vite une opération	15,4%	16,7%
Travail ne permet pas d'apprendre	10,3%	10,1%
Travail pas varié	8,7%	8,6%
Pas de choix dans la façon de procéder	19,3%	20,3%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	11,5%	10,8%
Travail pas reconnu	14,7%	14,3%
Formations et informations insuffisantes	18,3%	18,0%
Objectifs et consignes pas clairement définis	16,0%	15,1%
Pression temporelle forte (>5)	30,9%	31,1%

<b>Charge physique du poste de travail</b>	<b>43. Travaux de construction spécialisés n=1487</b>	<b>F. Construction n=2005</b>
Postures contraignantes :		
Non	22,8%	24,7%
Oui, difficile ou pénible	42,6%	41,3%
Oui, pas difficile ou pénible	32,2%	31,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,4%	2,2%
Effort, Port de charges lourdes :		
Non	23,7%	27,7%
Oui, difficile ou pénible	43,1%	40,5%
Oui, pas difficile ou pénible	30,7%	29,6%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,6%	2,2%
Gestes répétitifs :		
Non	28,2%	29,1%
Oui, difficile ou pénible	26,3%	26,1%
Oui, pas difficile ou pénible	42,8%	42,5%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,7%	2,3%
Importants déplacements à pieds :		
Non	47,7%	46,5%
Oui, difficile ou pénible	14,0%	14,6%
Oui, pas difficile ou pénible	35,9%	36,9%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,4%	2,0%
Station debout prolongée :		
Non	26,1%	28,0%
Oui, difficile ou pénible	21,7%	21,7%
Oui, pas difficile ou pénible	49,8%	48,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,4%	2,0%

<b>Expositions</b>	<b>43. Travaux de construction spécialisés n=1487</b>	<b>F. Construction n=2005</b>
Produits chimiques	38,6%	36,7%
Poussières, fumées	77,4%	75,2%
Rx ionisants	2,3%	2,1%
Vibrations	55,4%	56,6%
Gêne sonore	63,6%	63,8%
Bruit > 80db	54,9%	57,4%
Contrainte visuelle	23,2%	24,2%
Conduite routière prolongée	21,4%	22,4%
Chaleur intense	21,2%	21,3%
Froid intense	22,7%	21,8%
Intempéries	50,9%	53,9%
Pression psychologique	19,3%	19,9%
Agent biologique	4,5%	4,5%
Contact avec public	69,7%	66,3%

<b>Formation</b>	<b>43. Travaux de construction spécialisés n=1487</b>	<b>F. Construction n=2005</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	33,6%	36,2%
Parmi eux :		
➤ En rapport avec travail actuel	93,6%	92,3%
➤ En rapport avec travail futur	24,0%	22,8%
➤ Formation d'intérêt général	40,9%	43,4%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	23,7%	24,1%

<b>Mode de vie</b>	<b>43. Travaux de construction spécialisés n=1487</b>	<b>F. Construction n=2005</b>
Activité sportive régulière	40,6%	40,6%
Consommation de tabac	49,8%	46,9%
Consommation de tabac > 15 cig / j	20,1%	19,2%
Consommation de café	85,2%	85,3%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	17,7%	17,3%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	15,8%	18,7%

Etat de santé	43. Travaux de construction spécialisés			F. Construction		
	<45 ans n=1063	≥45 ans n=424	Ensembles n=1487	<45 ans n=1414	≥45 ans n=591	Ensembles n=2005
<b>Indice de masse corporelle</b>						
➤ Normaux ou maigres	59,9%	42,3%	54,9%	58,1%	39,2%	52,5%
➤ Surpoids	29,8%	41,3%	33,1%	30,8%	42,2%	34,1%
➤ Obèses	10,3%	16,4%	12,0%	11,2%	18,6%	13,3%
<b>Appareil respiratoire</b>						
Existence d'un problème	4,2%	6,7%	4,9%	4,0%	6,5%	4,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,9%	6,2%	4,6%	3,7%	6,2%	4,5%
Gêne dans le travail	1,1%	1,4%	1,2%	1,1%	1,5%	1,2%
Consommation médicamenteuse	2,4%	3,4%	2,7%	2,2%	2,9%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	3,2%	5,3%	3,8%	3,1%	5,1%	3,7%
<b>Appareil cardio vasculaire</b>						
Existence d'un problème	1,4%	8,2%	3,4%	2,2%	7,0%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,1%	7,0%	2,8%	1,6%	6,0%	2,9%
Gêne dans le travail	0,4%	1,7%	0,8%	0,4%	1,5%	0,7%
Consommation médicamenteuse	0,5%	4,6%	1,6%	0,6%	4,0%	1,6%
Pathologie diagnostiquée	1,2%	6,7%	2,8%	1,7%	5,7%	2,9%
<b>HTA</b>						
Existence d'un problème	3,0%	17,5%	7,2%	3,6%	18,1%	7,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,0%	12,7%	5,1%	2,7%	13,8%	6,0%
Gêne dans le travail	0,3%	1,2%	0,6%	0,3%	1,0%	0,5%
Consommation médicamenteuse	1,6%	11,3%	4,4%	1,8%	12,1%	4,9%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	12,3%	4,8%	2,3%	12,8%	5,4%
➤ <b>Lassitude, fatigue</b>						
Existence d'un problème	10,9%	19,2%	13,2%	11,4%	16,9%	13,0%
Plaintes ou signes cliniques	10,9%	18,6%	13,1%	11,4%	16,4%	12,8%
Gêne dans le travail	4,2%	8,5%	5,4%	4,4%	6,8%	5,1%
Consommation médicamenteuse	0,5%	1,4%	0,8%	0,6%	1,6%	0,9%
Pathologie diagnostiquée	1,6%	4,1%	2,3%	1,9%	4,0%	2,5%
➤ <b>Anxiété, nervosité</b>						
Existence d'un problème	11,4%	16,3%	12,8%	12,1%	16,7%	13,4%
Plaintes ou signes cliniques	11,3%	15,3%	12,4%	12,0%	15,9%	13,1%
Gêne dans le travail	4,6%	3,9%	4,4%	5,1%	4,2%	4,8%
Consommation médicamenteuse	1,9%	2,7%	2,1%	2,1%	2,8%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	2,7%	3,2%	2,8%	3,3%	3,3%	3,3%
➤ <b>Trouble du sommeil</b>						
Existence d'un problème	9,4%	13,8%	10,7%	9,5%	15,3%	11,2%
Plaintes ou signes cliniques	9,1%	13,3%	10,3%	9,1%	14,9%	10,8%
Gêne dans le travail	2,9%	2,4%	2,8%	3,3%	2,4%	3,1%
Consommation médicamenteuse	1,0%	1,9%	1,2%	1,3%	2,6%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	3,4%	2,8%	2,5%	4,0%	3,0%
<b>Troubles neuropsychiques</b> (les 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	2,0%	3,4%	2,4%	2,3%	4,0%	2,8%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	3,1%	2,3%	2,2%	3,8%	2,6%
Gêne dans le travail	0,6%	0,7%	0,6%	0,9%	0,7%	0,8%
Consommation médicamenteuse	0,1%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%	0,3%
Pathologie diagnostiquée	0,3%	0,5%	0,3%	0,6%	0,7%	0,7%

Etat de santé	43. Travaux de construction spécialisés			F. Construction		
	<45 ans n=1063	≥45 ans n=424	Ensembles n=1487	<45 ans n=1414	≥45 ans n=591	Ensembles n=2005
<b>Digestif</b>						
Existence d'un problème	5,2%	9,0%	6,3%	5,1%	9,2%	6,3%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	8,1%	5,8%	4,7%	8,2%	5,7%
Gêne dans le travail	1,3%	2,0%	1,5%	1,2%	1,9%	1,4%
Consommation médicamenteuse	1,8%	4,6%	2,6%	1,7%	4,5%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	5,9%	3,5%	2,4%	5,9%	3,4%
<b>Dermatologie</b>						
Existence d'un problème	4,7%	6,3%	5,1%	4,0%	6,2%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	6,3%	5,0%	3,9%	5,9%	4,5%
Gêne dans le travail	0,8%	1,7%	1,0%	0,6%	1,7%	1,0%
Consommation médicamenteuse	2,0%	1,9%	2,0%	1,7%	1,6%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	3,6%	4,8%	4,0%	3,1%	4,5%	3,5%
<b>Troubles de l'audition</b>						
Existence d'un problème	6,0%	22,1%	10,6%	6,4%	19,8%	10,3%
Plaintes ou signes cliniques	5,2%	20,0%	9,4%	5,6%	17,8%	9,2%
Gêne dans le travail	0,7%	5,3%	2,0%	0,8%	5,0%	2,0%
Consommation médicamenteuse	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	4,5%	15,7%	7,7%	4,4%	14,3%	7,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b> <i>(l'un des 3 signes ci-dessous)</i>						
Existence d'un problème	10,7%	24,3%	14,6%	10,3%	22,6%	14,0%
Plaintes ou signes cliniques	10,5%	24,0%	14,4%	10,2%	22,5%	13,8%
Gêne dans le travail	7,3%	14,2%	9,3%	6,9%	12,7%	8,6%
Consommation médicamenteuse	2,2%	7,7%	3,8%	2,0%	7,3%	3,6%
Pathologie diagnostiquée	5,5%	15,2%	8,2%	5,5%	13,7%	7,9%
➤ <b>Epaule</b>						
Existence d'un problème	5,9%	17,0%	9,1%	6,1%	15,0%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	16,3%	8,8%	6,0%	14,5%	8,5%
Gêne dans le travail	3,8%	9,6%	5,5%	3,8%	8,1%	5,1%
Consommation médicamenteuse	1,2%	5,5%	2,5%	1,2%	5,0%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	10,3%	4,8%	2,9%	8,8%	4,7%
➤ <b>Coude</b>						
Existence d'un problème	2,7%	11,3%	5,1%	2,4%	10,0%	4,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	11,3%	5,1%	2,3%	10,0%	4,6%
Gêne dans le travail	1,8%	8,7%	3,8%	1,6%	7,3%	3,3%
Consommation médicamenteuse	0,7%	5,3%	2,0%	0,7%	4,3%	1,7%
Pathologie diagnostiquée	1,3%	7,2%	3,0%	1,2%	6,4%	2,8%
➤ <b>Poignet</b>						
Existence d'un problème	4,6%	6,5%	5,1%	4,0%	6,5%	4,8%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	6,2%	5,0%	4,0%	6,4%	4,7%
Gêne dans le travail	3,0%	4,3%	3,3%	2,7%	3,8%	3,0%
Consommation médicamenteuse	0,8%	2,9%	1,4%	0,7%	2,6%	1,3%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	4,3%	3,0%	2,3%	3,6%	2,7%

Etat de santé	43. Travaux de construction spécialisés			F. Construction		
	<45 ans n=1063	≥45 ans n=424	Ensembles n=1487	<45 ans n=1414	≥45 ans n=591	Ensembles n=2005
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>						
Existence d'un problème	8,7%	19,4%	11,8%	8,7%	17,6%	11,3%
Plaintes ou signes cliniques	8,7%	18,9%	11,6%	8,7%	17,3%	11,2%
Gêne dans le travail	5,5%	13,0%	7,6%	5,3%	11,1%	7,0%
Consommation médicamenteuse	1,6%	9,2%	3,8%	1,5%	7,6%	3,3%
Pathologie diagnostiquée	5,0%	12,5%	7,1%	5,1%	11,3%	6,9%
<b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>						
Existence d'un problème	21,0%	34,4%	24,8%	21,4%	33,0%	24,9%
Plaintes ou signes cliniques	20,6%	34,1%	24,5%	21,0%	32,9%	24,6%
Gêne dans le travail	11,2%	24,6%	15,1%	11,9%	23,6%	15,4%
Consommation médicamenteuse	3,8%	15,9%	7,3%	4,0%	14,7%	7,2%
Pathologie diagnostiquée	8,0%	22,2%	12,1%	8,7%	20,2%	12,1%
➤ <b>Vertèbres cervicales</b>						
Existence d'un problème	5,0%	14,6%	7,7%	4,9%	12,7%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	5,0%	14,4%	7,7%	4,9%	12,5%	7,2%
Gêne dans le travail	2,2%	8,6%	4,0%	2,2%	7,9%	3,9%
Consommation médicamenteuse	1,1%	6,7%	2,7%	1,1%	6,0%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	8,9%	3,6%	1,7%	7,2%	3,3%
➤ <b>Vertèbres dorsolombaires</b>						
Existence d'un problème	18,7%	29,5%	21,8%	19,3%	28,9%	22,1%
Plaintes ou signes cliniques	18,3%	29,3%	21,5%	18,9%	28,7%	21,8%
Gêne dans le travail	10,3%	22,8%	13,9%	11,1%	21,7%	14,3%
Consommation médicamenteuse	3,4%	14,2%	6,5%	3,7%	13,3%	6,6%
Pathologie diagnostiquée	7,1%	19,2%	10,6%	8,0%	18,0%	10,9%