



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2009-2010 Détail par Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS-ESE 2003)

Le détail des

«641A. Conducteurs routiers et grands routiers»

« 641B. Conducteurs de véhicule routier de transport en commun»

«643A. Conducteurs livreurs, coursiers»

Au sein des

«64. Chauffeurs»

Juin 2011

Les 1066 Chauffeurs (code PCS 64) se répartissent de la façon suivante :

64. Chauffeurs	Effectifs	%
641a Conducteurs routiers et grands routiers	485	45,5
641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun	200	18,8
642a Conducteurs de taxi	25	2,3
642b Conducteurs de voiture particulière	14	1,3
643a Conducteurs livreurs, coursiers	233	21,9
644a Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères	23	2,2
Niveau 4 pcs non précisé	86	8,1
Total	1066	100,0

Les « Conducteurs routiers et grands routiers » (n=485), les « Conducteurs de véhicule routier de transport en commun » (n=200) et les « Conducteurs livreurs, coursiers » (n=233) sont suffisamment représentés pour pouvoir faire l'objet d'un descriptif spécifique de la profession.

Description de la population	641a Conducteurs routiers et grands routiers n=485	641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun n=200	643a Conducteurs livreurs, coursiers n=233	64 Chauffeurs (total) n=1066
Répartition homme/femme	95,9% / 4,1%	83,0% / 17,0%	92,7% / 7,3%	91,4% / 8,6%
≤24ans	4,7%	2,5%	7,3%	5,3%
25-34ans	19,0%	15,5%	26,2%	20,9%
35-44ans	35,5%	30,5%	29,2%	32,9%
45-54ans	34,0%	29,0%	27,0%	29,9%
≥55ans	6,8%	22,5%	10,3%	11,0%
C Industrie manufacturière	4,3%	0,0%	9,4%	4,4%
F Construction	8,9%	0,5%	0,9%	4,8%
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	6,4%	0,5%	43,3%	13,2%
H Transports et entreposage	68,2%	94,0%	29,6%	61,6%
I Hébergement et restauration	0,0%	0,0%	1,3%	0,5%
J Information et communication	0,2%	0,0%	0,9%	0,3%
K Activités financières et d'assurance	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	0,2%	0,0%	3,9%	0,9%
N Activités de services administratifs et de soutien	5,6%	0,5%	4,7%	4,8%
O Administration publique	0,2%	2,0%	0,0%	1,1%
Q Santé humaine et action sociale	0,4%	1,0%	2,6%	2,7%
S Autres activités de services	0,0%	0,5%	1,7%	0,8%

Conditions de travail	641a Conducteurs routiers et grands routiers n=485	641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun n=200	643a Conducteurs livreurs, coursiers n=233	64 Chauffeurs (total) n=1066
Changement de travail depuis 1an :				
Non	89,1%	89,9%	81,5%	87,0%
Oui, raison médicale	0,6%	1,5%	1,3%	1,1%
Oui, autre raison	9,7%	8,0%	16,4%	11,2%
Oui, raison non précisée	0,6%	0,5%	0,9%	0,7%
Personnes travaillant à temps plein	94,8%	75,0%	83,7%	86,9%
Travail en journée normale	69,0%	55,7%	71,6%	66,9%
Coupures de plus de 2 heures	27,2%	61,1%	21,7%	32,6%
Horaires décalés	54,7%	69,8%	38,7%	54,1%
Horaires irréguliers ou alternés	41,2%	66,0%	27,4%	44,2%
Travail de nuit	37,8%	17,2%	24,2%	29,5%
Déplacements professionnels de plus de 24h	31,6%	6,1%	3,6%	18,0%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	14,8%	12,2%	16,1%	15,1%
Parmi eux :				
➤ Perturbe le travail	45,7%	65,2%	44,4%	48,1%
➤ Sans conséquence	42,9%	21,7%	44,1%	39,2%
➤ Aspect positif sur le travail	38,2%	40,9%	40,0%	38,4%
Dépasser ses horaires normaux	36,2%	20,0%	42,1%	34,9%
Sauter le repas ou la pause	31,8%	30,5%	24,5%	31,0%
Traiter trop vite une opération	13,3%	15,2%	15,9%	14,4%
Travail ne permet pas d'apprendre	33,4%	43,2%	40,5%	37,5%
Travail pas varié	29,1%	44,9%	38,8%	35,5%
Pas de choix dans la façon de procéder	32,7%	68,7%	22,9%	37,3%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	22,4%	28,7%	28,9%	25,3%
Travail pas reconnu	24,2%	26,6%	27,1%	25,8%
Formations et informations insuffisantes	14,1%	14,6%	22,1%	16,8%
Objectifs et consignes pas clairement définis	10,3%	14,1%	15,2%	12,9%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	22,4%	33,7%	36,4%	29,0%

Charge physique du poste de travail	641a Conducteurs routiers et grands routiers n=485	641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun n=200	643a Conducteurs livreurs, coursiers n=233	64 Chauffeurs (total) n=1066
Postures contraignantes :				
Non	40,0%	44,4%	30,5%	38,2%
Oui, difficile ou pénible	25,9%	28,8%	33,0%	28,2%
Oui, pas difficile ou pénible	31,5%	24,2%	34,3%	31,2%
Oui, difficile ou pénible non précisé	2,5%	2,5%	2,1%	2,5%
Effort, Port de charges lourdes :				
Non	46,5%	81,6%	19,0%	45,9%
Oui, difficile ou pénible	26,3%	7,1%	45,3%	27,3%
Oui, pas difficile ou pénible	25,7%	8,7%	32,3%	24,5%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,5%	2,6%	3,4%	2,3%
Gestes répétitifs :				
Non	33,5%	23,2%	25,5%	28,5%
Oui, difficile ou pénible	17,1%	26,3%	27,7%	21,6%
Oui, pas difficile ou pénible	46,4%	46,5%	42,9%	46,2%
Oui, difficile ou pénible non précisé	3,0%	4,0%	3,9%	3,6%
Importants déplacements à pieds :				
Non	70,7%	91,4%	50,4%	69,1%
Oui, difficile ou pénible	6,9%	1,5%	19,0%	8,5%
Oui, pas difficile ou pénible	21,4%	6,6%	27,6%	21,0%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,0%	0,5%	3,0%	1,4%
Station debout prolongée :				
Non	66,4%	91,4%	61,4%	70,1%
Oui, difficile ou pénible	10,4%	3,0%	11,6%	9,1%
Oui, pas difficile ou pénible	22,1%	4,6%	24,9%	19,5%
Oui, difficile ou pénible non précisé	1,0%	1,0%	2,1%	1,3%

Expositions	641a Conducteurs routiers et grands routiers n=485	641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun n=200	643a Conducteurs livreurs, coursiers n=233	64 Chauffeurs (total) n=1066
Produits chimiques	16,9%	6,6%	11,7%	14,0%
Poussières, fumées	46,7%	34,7%	27,2%	38,9%
Rx ionisants	0,8%	1,5%	0,0%	0,9%
Vibrations	57,5%	69,8%	35,9%	53,7%
Gêne sonore	43,0%	48,2%	25,0%	39,1%
Bruit > 80db	23,7%	17,0%	10,9%	18,9%
Contrainte visuelle	47,6%	59,1%	35,5%	45,7%
Conduite routière prolongée	74,5%	78,7%	67,4%	73,5%
Chaleur intense	14,8%	15,6%	11,8%	14,7%
Froid intense	16,7%	9,6%	16,7%	15,6%
Intempéries	54,2%	28,3%	52,6%	48,6%
Pression psychologique	23,3%	39,8%	22,6%	26,1%
Agent biologique	2,3%	4,6%	3,9%	4,9%
Contact avec le public	80,9%	95,0%	87,8%	84,6%

Formation	641a Conducteurs routiers et grands routiers n=485	641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun n=200	643a Conducteurs livreurs, coursiers n=233	64 Chauffeurs (total) n=1066
A bénéficié d'une formation depuis un an	36,7%	46,7%	29,9%	36,8%
Parmi eux :				
➤ En rapport avec le travail actuel	93,6%	92,3%	88,4%	92,1%
➤ En rapport avec le travail futur	9,2%	15,1%	6,3%	10,4%
➤ Formation d'intérêt général	38,3%	50,6%	36,5%	40,9%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	9,3%	11,7%	14,9%	11,2%

Mode de vie	641a Conducteurs routiers et grands routiers n=485	641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun n=200	643a Conducteurs livreurs, coursiers n=233	64 Chauffeurs (total) n=1066
Activité sportive régulière	39,8%	50,5%	46,9%	43,7%
Consommation de tabac	46,9%	36,4%	44,3%	44,3%
Consommation de tabac>15 cig / jour	19,4%	9,2%	12,2%	14,6%
Consommation de café	89,1%	83,2%	83,6%	86,2%
Consommation de café sup à 4 tasses / jour	23,3%	18,3%	19,5%	21,3%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	11,4%	8,9%	12,1%	10,6%

Etat de santé	641a Conducteurs routiers et grands routiers			641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun			643a Conducteurs livreurs, coursiers			64 Chauffeurs (total)		
	<45ans n=287	≥45ans n=198	Ens. n=485	<45ans n=97*	≥45ans n=103	Ens. n=200	<45ans n=146	≥45ans n=87*	Ens. n=233	<45ans n=630	≥45ans n=436	Ens. n=1066
Indice de masse corporelle												
➤ Normaux ou maigres	38,6%	27,1%	33,9%	47,4%	37,6%	42,3%	51,1%	31,8%	43,8%	43,4%	30,6%	38,2%
➤ Surpoids	38,3%	43,2%	40,3%	37,9%	34,7%	36,2%	31,2%	41,2%	35,0%	37,4%	41,4%	39,0%
➤ Obèses	23,1%	29,7%	25,8%	14,7%	27,7%	21,4%	17,7%	27,1%	21,2%	19,2%	28,0%	22,8%
Appareil respiratoire												
Existence d'un problème	2,9%	5,2%	3,8%	5,3%	7,0%	6,2%	4,9%	2,3%	3,9%	3,4%	5,4%	4,2%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	4,2%	3,4%	4,2%	7,0%	5,6%	4,2%	2,3%	3,5%	3,1%	4,9%	3,8%
Gêne dans le travail	0,0%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,4%	0,2%	0,7%	0,4%
Consommation médic.	1,8%	1,6%	1,7%	4,2%	4,0%	4,1%	2,8%	1,2%	2,2%	2,3%	2,4%	2,3%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	2,6%	2,1%	4,2%	5,0%	4,6%	4,2%	2,3%	3,5%	2,6%	3,3%	2,9%
Appareil cardio vasculaire												
Existence d'un problème	2,9%	7,7%	4,9%	1,1%	8,0%	4,6%	1,4%	11,6%	5,2%	1,8%	8,9%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	6,2%	3,4%	1,1%	6,0%	3,6%	1,4%	8,1%	3,9%	1,1%	7,0%	3,6%
Gêne dans le travail	0,7%	1,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%	1,3%	0,3%	1,2%	0,7%
Consommation médic.	1,8%	4,6%	3,0%	1,1%	7,0%	4,1%	0,0%	10,5%	3,9%	1,0%	7,0%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	2,9%	6,7%	4,5%	1,1%	7,0%	4,1%	0,0%	11,6%	4,3%	1,5%	8,2%	4,2%
HTA												
Existence d'un problème	6,2%	20,6%	12,2%	4,3%	30,7%	17,9%	3,5%	20,2%	9,7%	4,6%	23,7%	12,5%
Plaintes ou signes cliniques	4,7%	15,0%	9,0%	4,3%	23,8%	14,4%	1,4%	15,5%	6,6%	3,3%	17,4%	9,1%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	0,5%	0,0%	1,2%	0,4%	0,3%	0,5%	0,4%
Consommation médic.	2,9%	14,6%	7,7%	2,1%	23,8%	13,3%	0,7%	13,1%	5,3%	2,1%	17,0%	8,2%
Pathologie diagnostiquée	2,9%	15,6%	8,2%	4,3%	25,7%	15,4%	2,8%	10,7%	5,7%	3,0%	18,2%	9,2%
➤ Lassitude, fatigue												
Existence d'un problème	14,3%	17,0%	15,4%	16,8%	9,9%	13,3%	9,7%	13,1%	11,0%	13,5%	14,6%	13,9%
Plaintes ou signes cliniques	13,9%	17,0%	15,2%	16,8%	9,9%	13,3%	9,7%	13,1%	11,0%	13,2%	14,6%	13,7%
Gêne dans le travail	7,1%	8,2%	7,6%	4,2%	6,0%	5,1%	3,5%	6,0%	4,4%	5,8%	6,8%	6,2%
Consommation médic.	1,1%	0,0%	0,6%	1,1%	1,0%	1,0%	0,0%	2,4%	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	3,6%	2,6%	3,2%	4,3%	2,0%	3,1%	0,7%	2,4%	1,3%	2,9%	2,6%	2,8%
➤ Anxiété, nervosité												
Existence d'un problème	16,2%	21,6%	18,5%	15,8%	15,2%	15,5%	13,2%	15,5%	14,0%	14,7%	19,1%	16,5%
Plaintes ou signes cliniques	15,9%	21,1%	18,1%	15,8%	14,1%	14,9%	12,6%	15,5%	13,7%	14,2%	18,6%	16,0%
Gêne dans le travail	6,2%	6,7%	6,4%	6,3%	6,1%	6,2%	4,9%	6,0%	5,3%	6,1%	6,6%	6,3%
Consommation médic.	1,1%	1,5%	1,3%	2,1%	4,1%	3,1%	4,2%	1,2%	3,1%	2,3%	2,1%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	4,6%	3,0%	4,2%	4,1%	4,1%	2,8%	1,2%	2,2%	2,5%	3,5%	2,9%
➤ Trouble du sommeil												
Existence d'un problème	9,4%	14,5%	11,5%	10,6%	12,9%	11,8%	9,2%	20,0%	13,3%	9,2%	15,0%	11,6%
Plaintes ou signes cliniques	9,4%	13,5%	11,1%	10,6%	12,9%	11,8%	9,2%	20,0%	13,3%	9,2%	14,6%	11,4%
Gêne dans le travail	4,0%	5,2%	4,5%	3,2%	3,0%	3,1%	2,8%	6,0%	4,0%	3,6%	4,7%	4,1%
Consommation médic.	1,5%	2,6%	1,9%	1,1%	2,0%	1,5%	0,7%	2,4%	1,3%	1,3%	2,6%	1,8%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	3,1%	2,1%	2,1%	4,0%	3,1%	0,7%	2,4%	1,3%	1,7%	3,3%	2,3%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)												
Existence d'un problème	3,2%	4,1%	3,6%	3,2%	4,0%	3,6%	2,1%	5,9%	3,5%	2,9%	4,7%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	4,1%	3,4%	3,2%	3,0%	3,1%	2,1%	5,9%	3,5%	2,8%	4,4%	3,5%
Gêne dans le travail	1,4%	1,5%	1,5%	0,0%	1,0%	0,5%	1,4%	1,2%	1,3%	1,1%	1,4%	1,2%
Consommation médic.	1,1%	0,0%	0,6%	0,0%	1,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,2%	0,4%
Pathologie diagnostiquée	1,1%	0,5%	0,8%	1,1%	1,0%	1,0%	0,7%	0,0%	0,4%	0,8%	0,7%	0,8%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	641a Conducteurs routiers et grands routiers			641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun			643a Conducteurs livreurs, coursiers			64 Chauffeurs (total)		
	<45ans n=287	≥45ans n=198	Ens. n=485	<45ans n=97*	≥45ans n=103	Ens. n=200	<45ans n=146	≥45ans n=87*	Ens. n=233	<45ans n=630	≥45ans n=436	Ens. n=1066
Digestif												
Existence d'un problème	4,4%	6,9%	5,4%	6,3%	11,0%	8,7%	5,0%	8,2%	6,3%	5,1%	7,7%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,4%	6,3%	5,2%	4,2%	11,0%	7,7%	2,9%	8,2%	5,0%	4,3%	7,4%	5,6%
Gêne dans le travail	1,5%	2,1%	1,7%	1,1%	3,0%	2,1%	0,7%	1,2%	0,9%	1,0%	1,9%	1,4%
Consommation médic.	1,5%	3,2%	2,2%	1,1%	6,0%	3,6%	1,4%	2,4%	1,8%	1,5%	3,6%	2,4%
Pathologie diagnostiquée	2,6%	3,2%	2,8%	4,2%	5,0%	4,6%	2,9%	2,4%	2,7%	2,5%	3,3%	2,8%
Dermatologie												
Existence d'un problème	2,9%	7,3%	4,7%	6,3%	5,0%	5,6%	5,1%	3,5%	4,5%	4,3%	5,4%	4,7%
Plaintes, signes cliniques	2,9%	6,7%	4,4%	5,3%	5,0%	5,1%	4,3%	3,5%	4,0%	3,9%	4,9%	4,3%
Gêne dans le travail	0,7%	0,5%	0,6%	3,2%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,2%	0,6%
Consommation médic.	1,4%	3,1%	2,1%	4,2%	0,0%	2,1%	2,9%	1,2%	2,3%	2,3%	1,6%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	7,3%	4,4%	6,3%	3,0%	4,6%	4,3%	1,2%	3,1%	3,6%	4,5%	4,0%
Troubles de l'audition												
Existence d'un problème	3,6%	14,9%	8,3%	5,3%	8,0%	6,7%	4,9%	15,3%	8,8%	4,3%	12,4%	7,6%
Plaintes, signes cliniques	3,2%	13,9%	7,6%	4,2%	7,0%	5,6%	4,9%	14,1%	8,4%	3,8%	11,0%	6,8%
Gêne dans le travail	0,4%	3,1%	1,5%	1,1%	0,0%	0,5%	1,4%	0,0%	0,9%	0,7%	1,4%	1,0%
Consommation médic.	0,0%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,4%	0,0%	0,5%	0,2%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	8,8%	4,7%	3,2%	6,0%	4,6%	4,2%	9,4%	6,2%	2,6%	8,0%	4,8%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)												
Existence d'un problème	9,0%	15,5%	11,7%	13,7%	12,1%	12,9%	13,3%	27,9%	18,8%	10,9%	17,9%	13,8%
Plaintes, signes cliniques	8,6%	15,5%	11,4%	12,6%	11,1%	11,9%	13,3%	27,9%	18,8%	10,6%	17,7%	13,5%
Gêne dans le travail	5,7%	9,8%	7,4%	6,3%	7,1%	6,7%	5,6%	12,8%	8,3%	6,0%	10,6%	7,9%
Consommation médic.	3,2%	2,1%	2,8%	3,2%	4,1%	3,6%	2,1%	5,8%	3,5%	3,1%	4,0%	3,5%
Pathologie diagnostiquée	4,7%	5,8%	5,1%	7,4%	8,2%	7,8%	6,3%	15,1%	9,6%	5,7%	9,5%	7,3%
➤ Epaule												
Existence d'un problème	5,0%	11,3%	7,6%	7,4%	8,0%	7,7%	7,0%	19,8%	11,8%	6,2%	12,2%	8,6%
Plaintes, signes cliniques	5,0%	11,3%	7,6%	7,4%	8,0%	7,7%	7,0%	19,8%	11,8%	6,2%	12,2%	8,6%
Gêne dans le travail	3,2%	8,2%	5,3%	4,2%	5,1%	4,6%	1,4%	7,0%	3,5%	2,9%	7,3%	4,7%
Consommation médic.	2,1%	1,5%	1,9%	3,2%	2,0%	2,6%	0,7%	3,5%	1,7%	2,1%	2,4%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	3,6%	2,5%	4,2%	4,0%	4,1%	2,1%	9,3%	4,8%	2,4%	5,4%	3,7%
➤ Coude												
Existence d'un problème	2,9%	2,6%	2,7%	3,2%	3,0%	3,1%	2,1%	4,7%	3,1%	2,6%	3,5%	3,0%
Plaintes, signes cliniques	2,9%	2,1%	2,5%	3,2%	3,0%	3,1%	2,1%	4,7%	3,1%	2,6%	3,3%	2,9%
Gêne dans le travail	1,8%	1,6%	1,7%	2,1%	2,0%	2,0%	1,4%	3,5%	2,2%	1,8%	2,3%	2,0%
Consommation médic.	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,4%	1,2%	1,3%	1,1%	0,9%	1,1%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	1,6%	1,7%	3,2%	3,0%	3,1%	1,4%	3,5%	2,2%	2,0%	2,6%	2,2%
➤ Poignet												
Existence d'un problème	3,2%	4,7%	3,8%	5,3%	3,0%	4,1%	5,6%	9,3%	7,0%	3,9%	5,2%	4,4%
Plaintes, signes cliniques	2,9%	4,1%	3,4%	4,2%	2,0%	3,1%	5,6%	9,3%	7,0%	3,6%	4,7%	4,0%
Gêne dans le travail	2,1%	1,6%	1,9%	2,1%	1,0%	1,5%	2,8%	3,5%	3,1%	2,3%	2,1%	2,2%
Consommation médic.	1,1%	0,0%	0,6%	0,0%	1,0%	0,5%	1,4%	1,2%	1,3%	1,0%	0,9%	1,0%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	1,0%	1,5%	2,1%	3,0%	2,6%	4,2%	3,5%	3,9%	2,4%	2,4%	2,4%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	641a Conducteurs routiers et grands routiers			641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun			643a Conducteurs livreurs, coursiers			64 Chauffeurs (total)		
	<45ans n=287	≥45ans n=198	Ens. n=485	<45ans n=97*	≥45ans n=103	Ens. n=200	<45ans n=146	≥45ans n=87*	Ens. n=233	<45ans n=630	≥45ans n=436	Ens. n=1066
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur												
Existence d'un problème	6,4%	11,9%	8,7%	7,4%	9,9%	8,7%	7,0%	10,5%	8,3%	7,0%	10,6%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	10,9%	8,3%	7,4%	8,9%	8,2%	6,3%	10,5%	7,9%	6,5%	9,9%	7,9%
Gêne dans le travail	3,6%	4,7%	4,0%	1,1%	5,9%	3,6%	2,8%	4,7%	3,5%	2,6%	5,0%	3,6%
Consommation médic	0,7%	2,6%	1,5%	0,0%	4,0%	2,0%	2,1%	3,5%	2,6%	1,1%	3,1%	1,9%
Pathologie diagnostiquée	2,1%	5,8%	3,6%	3,2%	8,9%	6,1%	4,2%	8,1%	5,7%	3,4%	6,9%	4,8%
Troubles ostéoarticulaires du rachis												
(l'un des 2 signes ci-dessous)												
Existence d'un problème	20,5%	35,6%	26,7%	25,3%	17,8%	21,4%	24,6%	28,2%	26,0%	22,2%	29,3%	25,1%
Plaintes ou signes cliniques	20,5%	32,6%	25,4%	25,3%	17,8%	21,4%	24,6%	28,2%	26,0%	22,2%	27,9%	24,5%
Gêne dans le travail	10,1%	24,0%	15,7%	19,1%	9,0%	13,9%	13,6%	11,8%	12,9%	12,2%	17,5%	14,3%
Consommation médic	4,3%	12,6%	7,7%	10,6%	3,0%	6,7%	8,6%	8,2%	8,4%	6,2%	9,0%	7,4%
Pathologie diagnostiquée	8,3%	17,4%	12,0%	11,7%	11,0%	11,3%	12,8%	14,1%	13,3%	9,7%	15,0%	11,8%
➤ Vertèbres cervicales												
Existence d'un problème	5,7%	12,0%	8,3%	8,4%	9,9%	9,2%	4,3%	10,6%	6,6%	5,7%	10,6%	7,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,7%	11,0%	7,9%	8,4%	9,9%	9,2%	4,3%	10,6%	6,6%	5,7%	10,2%	7,5%
Gêne dans le travail	3,6%	7,9%	5,3%	6,3%	5,0%	5,6%	1,4%	5,9%	3,1%	3,3%	6,7%	4,6%
Consommation médic	1,1%	4,7%	2,6%	2,1%	2,0%	2,1%	1,4%	5,9%	3,1%	1,3%	4,3%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	4,8%	3,0%	2,1%	6,0%	4,1%	2,8%	7,1%	4,4%	1,8%	5,7%	3,4%
➤ Vertèbres dorsolombaires												
Existence d'un problème	18,0%	32,0%	23,7%	23,2%	12,9%	17,9%	22,2%	24,7%	23,1%	19,7%	25,3%	22,0%
Plaintes ou signes cliniques	17,7%	28,8%	22,2%	23,2%	12,9%	17,9%	22,2%	24,7%	23,1%	19,6%	23,8%	21,3%
Gêne dans le travail	8,3%	21,2%	13,6%	16,0%	7,0%	11,3%	12,6%	10,6%	11,8%	10,5%	15,1%	12,4%
Consommation médic.	4,0%	10,9%	6,8%	10,6%	2,0%	6,2%	7,7%	8,2%	7,9%	5,7%	7,8%	6,6%
Pathologie diagnostiquée	6,9%	15,5%	10,4%	11,7%	7,0%	9,3%	11,2%	12,9%	11,8%	8,7%	12,5%	10,2%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence