



## Evolution et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009  
Détail par Professions et Catégories Socioprofessionnelles  
(PCS-ESE 2003)

**Le détail des**

**« 542A. Secrétaires »**

**« 543B. Employés qualifiés des services comptables ou financiers »**

**Au sein des « 54. Employés administratifs d'entreprise »**

**Juin 2010**

| Description de la population  | 542A.<br>Secrétaires<br>n=657 | 543B. Employés<br>qualifiés<br>des services<br>comptables ou<br>financiers<br>n=333 | 54. Employés administratifs<br>d'entreprise<br>n=2494 |
|---|-------------------------------|---|---|
| C Industrie manufacturière  | 9,4%                          | 14,7%   | 8,8%  |
| E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 2,0%                          | 0,0%  | 0,9%  |
| F Construction  | 8,5%                          | 6,0%  | 4,0%  |
| G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles                                  | 14,6%                         | 19,5%   | 14,6%   |
| H Transports et entreposage   | 2,9%                          | 3,3%  | 7,0%  |
| I Hébergement et restauration   | 0,6%                          | 0,9%  | 1,1%  |
| J Information et communication  | 1,4%                          | 2,4%  | 4,2%  |
| K Activités financières et d'assurance  | 4,3%                          | 7,2%  | 14,1%   |
| L Activités immobilières  | 1,5%                          | 2,7%  | 1,7%  |
| M Activités spécialisées, scientifiques et techniques                                   | 12,9%                         | 22,2%   | 11,5%   |
| N Activités de services administratifs et de soutien                                    | 5,9%                          | 4,8%  | 6,4%  |
| O Administration publique   | 4,3%                          | 2,7%  | 7,6%  |
| P Enseignement  | 3,8%                          | 0,9%  | 2,1%  |
| Q Santé humaine et action sociale   | 16,4%                         | 5,7%  | 6,9%  |
| S Autres activités de services  | 6,2%                          | 1,5%  | 3,6%  |
| Répartition homme/femme   | 4,0%/96,0%                    | 19,5%/80,5%   | 16,4%/83,6%   |
| ≤24ans  | 5,3%                          | 4,5%  | 7,7%  |
| 25-34ans  | 20,5%                         | 28,8%   | 28,7%   |
| 35-44ans  | 32,1%                         | 29,4%   | 27,3%   |
| 45-54ans  | 31,1%                         | 28,2%   | 26,7%   |
| ≥55ans  | 11,0%                         | 9,0%  | 9,6%  |

| Conditions de travail                                  | 542A.<br>Secrétaires<br>n=657 | 543B. Employés<br>qualifiés<br>des services<br>comptables ou<br>financiers<br>n=333 | 54. Employés administratifs<br>d'entreprise<br>n=2494 |
|--|-------------------------------|---|---|
| Changement de travail depuis 1an :                     |                               |   |   |
| Non  | 89,0%                         | 87,9%   | 85,4%   |
| Oui, raison médicale                                   | 0,2%                          | 0,6%  | 0,5%  |
| Oui, autre raisons                                     | 10,2%                         | 11,2%   | 13,7%   |
| Oui, raison non précisée                               | 0,6%                          | 0,3%  | 0,5%  |
| Personnes travaillant à temps plein                    | 71,5%                         | 79,4%   | 79,0%   |
| Travail en journée normale                             | 92,7%                         | 94,1%   | 89,4%   |
| Coupures de plus de 2 heures                           | 14,2%                         | 9,3%  | 10,7%   |
| Horaires décalés                                       | 4,4%                          | 5,5%  | 9,9%  |
| Horaires irréguliers ou alternés                       | 11,4%                         | 3,9%  | 13,5%   |
| Travail de nuit  | 0,5%                          | 1,0%  | 2,2%  |
| Déplacements professionnels de plus de 24h             | 1,9%                          | 1,8%  | 2,3%  |
| Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue | 68,3%                         | 63,3%   | 60,5%   |
| Parmi eux :  |                               |   |   |
| ➤ Perturbe travail                                     | 57,1%                         | 60,2%   | 58,1%   |
| ➤ Sans conséquence                                     | 45,7%                         | 39,1%   | 43,3%   |
| ➤ Aspect positif sur travail                           | 40,8%                         | 41,5%   | 42,3%   |
| Dépasser horaires normaux                              | 28,4%                         | 38,4%   | 31,0%   |
| Sauter repas ou pas de pause                           | 13,6%                         | 13,9%   | 15,3%   |
| Traiter trop vite une opération                        | 20,7%                         | 25,5%   | 22,0%   |
| Travail ne permet pas d'apprendre                      | 14,8%                         | 12,6%   | 16,2%   |
| Travail pas varié                                      | 12,9%                         | 13,3%   | 16,7%   |
| Pas de choix dans la façon de procéder                 | 16,9%                         | 14,8%   | 24,6%   |
| Pas de possibilité suffisante d'entraide               | 17,2%                         | 16,6%   | 15,8%   |
| Travail pas reconnu                                    | 22,1%                         | 18,5%   | 24,9%   |
| Formations et informations insuffisantes               | 21,5%                         | 21,5%   | 22,3%   |
| Objectifs et consignes pas clairement définis          | 21,2%                         | 22,5%   | 20,6%   |
| Pression temporelle forte (>5)                         | 30,0%                         | 37,1%   | 34,2%   |

| <b>Charge physique du poste de travail</b> | <b>542A. Secrétaires<br/>n=657</b> | <b>543B. Employés qualifiés<br/>des services<br/>comptables ou financiers<br/>n=333</b> | <b>54. Employés administratifs<br/>d'entreprise<br/>n=2494</b> |
|--|------------------------------------|---|--|
| Postures contraignantes :                  |                                    |   |  |
| Non  | 71,7%                              | 79,3%   | 72,0%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 13,8%                              | 8,4%  | 13,2%  |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 13,1%                              | 10,8%   | 13,6%  |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 1,4%                               | 1,5%  | 1,3%   |
| Effort, Port de charges lourdes :          |                                    |   |  |
| Non  | 85,3%                              | 89,1%   | 85,1%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 5,8%                               | 3,6%  | 6,2%   |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 8,1%                               | 6,6%  | 7,8%   |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 0,8%                               | 0,6%  | 0,8%   |
| Gestes répétitifs :                        |                                    |   |  |
| Non  | 47,2%                              | 53,6%   | 48,4%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 9,6%                               | 7,8%  | 11,0%  |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 39,5%                              | 34,0%   | 37,3%  |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 3,7%                               | 4,5%  | 3,3%   |
| Importants déplacements à pieds :          |                                    |   |  |
| Non  | 88,7%                              | 94,0%   | 87,3%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 2,3%                               | 0,6%  | 2,2%   |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 8,5%                               | 5,4%  | 9,8%   |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 0,5%                               | 0,0%  | 0,7%   |
| Station debout prolongée :                 |                                    |   |  |
| Non  | 88,2%                              | 94,8%   | 86,0%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 3,5%                               | 1,5%  | 4,8%   |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 7,2%                               | 3,3%  | 8,2%   |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 1,1%                               | 0,3%  | 1,0%   |

| <b>Expositions</b>          | <b>542A. Secrétaires<br/>n=657</b> | <b>543B. Employés qualifiés<br/>des services<br/>comptables ou financiers<br/>n=333</b> | <b>54. Employés administratifs<br/>d'entreprise<br/>n=2494</b> |
|-----------------------------|------------------------------------|---|--|
| Produits chimiques          | 4,0%                               | 1,2%  | 2,8%   |
| Poussières, fumées          | 7,3%                               | 6,6%  | 9,8%   |
| Rx ionisants                | 2,0%                               | 0,3%  | 0,9%   |
| Vibrations                  | 0,9%                               | 1,2%  | 1,7%   |
| Gêne sonore                 | 16,2%                              | 15,4%   | 22,5%  |
| Bruit > 80db                | 3,7%                               | 2,4%  | 4,6%   |
| Contrainte visuelle         | 48,7%                              | 53,5%   | 49,4%  |
| Conduite routière prolongée | 0,9%                               | 2,4%  | 2,9%   |
| Chaleur intense             | 3,2%                               | 5,2%  | 6,4%   |
| Froid intense               | 2,6%                               | 1,5%  | 3,4%   |
| Intempéries                 | 0,8%                               | 0,9%  | 1,9%   |
| Pression psychologique      | 19,4%                              | 20,9%   | 22,8%  |
| Agent biologique            | 3,5%                               | 0,6%  | 1,7%   |
| Contact avec public         | 68,5%                              | 49,4%   | 60,5%  |

| <b>Formation</b>                         | <b>542A. Secrétaires<br/>n=657</b> | <b>543B. Employés qualifiés<br/>des services<br/>comptables ou financiers<br/>n=333</b> | <b>54. Employés administratifs<br/>d'entreprise<br/>n=2494</b> |
|--|------------------------------------|---|--|
| A bénéficié d'une formation depuis un an | 32,8%                              | 45,5%   | 44,4%  |
| Parmi eux :                              |                                    |   |  |
| ➤ En rapport avec travail actuel         | 89,1%                              | 90,5%   | 87,8%  |
| ➤ En rapport avec travail futur          | 15,0%                              | 12,3%   | 14,9%  |
| ➤ Formation d'intérêt général            | 44,6%                              | 39,9%   | 46,0%  |
| Rôle de formateur ou tuteur depuis un an | 19,1%                              | 24,8%   | 22,7%  |

| <b>Mode de vie</b>                         | <b>542A. Secrétaires<br/>n=657</b> | <b>543B. Employés qualifiés<br/>des services<br/>comptables ou financiers<br/>n=333</b> | <b>54. Employés administratifs<br/>d'entreprise<br/>n=2494</b> |
|--|------------------------------------|---|--|
| Activité sportive régulière                | 53,2%                              | 55,3%   | 50,3%  |
| Consommation de tabac                      | 30,6%                              | 24,0%   | 30,6%  |
| Consommation de tabac > 15 cig / j         | 5,1%                               | 6,4%  | 5,7%   |
| Consommation de café                       | 77,5%                              | 77,0%   | 74,7%  |
| Consommation de café sup à 4 tasses / j    | 8,8%                               | 10,0%   | 10,9%  |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 12,2%                              | 16,8%   | 16,5%  |

| Etat de santé   | 542A. Secrétaires |                  |                    | 543B. Employés qualifiés<br>des services<br>comptables ou financiers |                  |                    | 54. Employés administratifs<br>d'entreprise |                  |                     |
|---|-------------------|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|---|------------------|---------------------|
|   | <45 ans<br>n=381  | ≥45 ans<br>n=276 | Ensembles<br>n=657 | <45 ans<br>n=209   | ≥45 ans<br>n=124 | Ensembles<br>n=333 | <45 ans<br>n=1589                           | ≥45 ans<br>n=905 | Ensembles<br>n=2494 |
| <b>Indice de masse corporelle</b>                           |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| ➤ Normaux ou maigres  | 70,7%             | 64,6%            | 68,1%              | 67,2%  | 54,5%            | 62,4%              | 70,4%                                       | 60,2%            | 66,7%               |
| ➤ Surpoids  | 19,5%             | 24,3%            | 21,5%              | 22,1%  | 32,5%            | 26,0%              | 20,6%                                       | 26,0%            | 22,6%               |
| ➤ Obèses  | 9,9%              | 11,2%            | 10,4%              | 10,8%  | 13,0%            | 11,6%              | 9,0%  | 13,8%            | 10,8%               |
| <b>Appareil respiratoire</b>                                |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème                                     | 3,4%              | 4,1%             | 3,7%               | 1,9%   | 7,3%             | 4,0%               | 2,9%  | 4,8%             | 3,6%                |
| Plaintes ou signes cliniques                                | 2,9%              | 3,7%             | 3,2%               | 1,9%   | 6,5%             | 3,6%               | 2,4%  | 4,4%             | 3,1%                |
| Gêne dans le travail  | 0,8%              | 0,7%             | 0,8%               | 0,0%   | 1,6%             | 0,6%               | 0,4%  | 1,0%             | 0,7%                |
| Consommation<br>médicamenteuse                              | 2,1%              | 1,9%             | 2,0%               | 1,9%   | 4,1%             | 2,7%               | 2,2%  | 3,1%             | 2,6%                |
| Pathologie diagnostiquée                                    | 2,7%              | 3,3%             | 2,9%               | 1,9%   | 5,7%             | 3,3%               | 2,4%  | 3,9%             | 3,0%                |
| <b>Appareil cardio vasculaire</b>                           |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème                                     | 3,2%              | 5,5%             | 4,2%               | 2,4%   | 5,7%             | 3,6%               | 2,9%  | 6,2%             | 4,1%                |
| Plaintes ou signes cliniques                                | 2,7%              | 4,4%             | 3,4%               | 2,4%   | 5,7%             | 3,6%               | 2,6%  | 5,0%             | 3,5%                |
| Gêne dans le travail  | 0,3%              | 0,7%             | 0,5%               | 0,0%   | 0,8%             | 0,3%               | 0,4%  | 1,1%             | 0,7%                |
| Consommation<br>médicamenteuse                              | 1,6%              | 3,3%             | 2,3%               | 0,5%   | 1,6%             | 0,9%               | 0,9%  | 3,5%             | 1,8%                |
| Pathologie diagnostiquée                                    | 2,4%              | 4,4%             | 3,2%               | 1,5%   | 3,3%             | 2,1%               | 1,9%  | 4,6%             | 2,8%                |
| <b>HTA</b>  |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème                                     | 3,2%              | 14,4%            | 7,9%               | 4,4%   | 14,6%            | 8,2%               | 3,0%  | 16,5%            | 7,9%                |
| Plaintes ou signes cliniques                                | 2,7%              | 11,5%            | 6,3%               | 2,0%   | 10,6%            | 5,2%               | 2,0%  | 11,8%            | 5,6%                |
| Gêne dans le travail  | 0,8%              | 0,7%             | 0,8%               | 1,0%   | 1,6%             | 1,2%               | 0,3%  | 0,9%             | 0,5%                |
| Consommation<br>médicamenteuse                              | 2,4%              | 12,2%            | 6,5%               | 2,9%   | 11,4%            | 6,1%               | 1,9%  | 14,2%            | 6,4%                |
| Pathologie diagnostiquée                                    | 2,4%              | 12,2%            | 6,5%               | 3,4%   | 12,2%            | 6,7%               | 2,1%  | 14,4%            | 6,6%                |
| ➤ <b>Lassitude, fatigue</b>                                 |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème                                     | 20,5%             | 22,9%            | 21,5%              | 17,9%  | 17,9%            | 17,9%              | 21,2%                                       | 25,1%            | 22,6%               |
| Plaintes ou signes cliniques                                | 20,5%             | 22,9%            | 21,5%              | 17,4%  | 17,9%            | 17,6%              | 21,0%                                       | 24,9%            | 22,4%               |
| Gêne dans le travail  | 8,8%              | 9,6%             | 9,1%               | 7,2%   | 8,2%             | 7,6%               | 9,2%  | 12,2%            | 10,3%               |
| Consommation<br>médicamenteuse                              | 5,1%              | 2,6%             | 4,0%               | 1,4%   | 4,1%             | 2,4%               | 4,0%  | 5,2%             | 4,5%                |
| Pathologie diagnostiquée                                    | 7,0%              | 6,3%             | 6,7%               | 2,4%   | 4,9%             | 3,3%               | 4,6%  | 8,0%             | 5,8%                |
| ➤ <b>Anxiété, nervosité</b>                                 |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème                                     | 23,9%             | 28,0%            | 25,6%              | 21,7%  | 23,6%            | 22,4%              | 21,6%                                       | 29,4%            | 24,4%               |
| Plaintes ou signes cliniques                                | 23,9%             | 28,0%            | 25,6%              | 21,7%  | 23,6%            | 22,4%              | 21,2%                                       | 28,9%            | 24,0%               |
| Gêne dans le travail  | 9,0%              | 11,9%            | 10,2%              | 7,7%   | 10,7%            | 8,8%               | 9,2%  | 13,1%            | 10,6%               |
| Consommation<br>médicamenteuse                              | 5,9%              | 8,1%             | 6,8%               | 1,9%   | 8,3%             | 4,3%               | 5,4%  | 9,9%             | 7,0%                |
| Pathologie diagnostiquée                                    | 8,1%              | 9,0%             | 8,5%               | 3,4%   | 8,3%             | 5,2%               | 6,3%  | 10,5%            | 7,8%                |
| ➤ <b>Trouble du sommeil</b>                                 |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème                                     | 18,4%             | 28,7%            | 22,7%              | 15,2%  | 25,4%            | 19,0%              | 16,8%                                       | 28,8%            | 21,2%               |
| Plaintes ou signes cliniques                                | 18,1%             | 27,9%            | 22,3%              | 14,8%  | 25,4%            | 18,8%              | 16,6%                                       | 28,3%            | 20,9%               |
| Gêne dans le travail  | 4,0%              | 5,9%             | 4,8%               | 5,9%   | 6,6%             | 6,2%               | 5,4%  | 9,2%             | 6,7%                |
| Consommation<br>médicamenteuse                              | 5,1%              | 8,5%             | 6,5%               | 3,4%   | 7,4%             | 4,9%               | 3,7%  | 8,7%             | 5,5%                |
| Pathologie diagnostiquée                                    | 6,2%              | 8,9%             | 7,3%               | 2,9%   | 7,4%             | 4,6%               | 4,0%  | 8,1%             | 5,5%                |
| <b>Troubles neuropsychiques</b><br>(les 3 signes ci-dessus) |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème                                     | 7,7%              | 11,4%            | 9,2%               | 6,3%   | 7,4%             | 6,7%               | 7,4%  | 12,1%            | 9,1%                |
| Plaintes ou signes cliniques                                | 7,4%              | 11,0%            | 8,9%               | 5,9%   | 7,4%             | 6,4%               | 7,2%  | 11,6%            | 8,8%                |
| Gêne dans le travail  | 1,1%              | 3,3%             | 2,0%               | 1,5%   | 3,3%             | 2,1%               | 2,4%  | 4,2%             | 3,1%                |
| Consommation<br>médicamenteuse                              | 0,8%              | 1,5%             | 1,1%               | 0,5%   | 1,6%             | 0,9%               | 0,8%  | 2,2%             | 1,3%                |
| Pathologie diagnostiquée                                    | 2,4%              | 2,6%             | 2,5%               | 1,0%   | 0,8%             | 0,9%               | 1,3%  | 3,5%             | 2,1%                |

| Etat de santé  | 542A. Secrétaires |                  |                    | 543B. Employés qualifiés<br>des services<br>comptables ou financiers |                  |                    | 54. Employés administratifs<br>d'entreprise |                  |                     |
|--|-------------------|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|---|------------------|---------------------|
|  | <45 ans<br>n=381  | ≥45 ans<br>n=276 | Ensembles<br>n=657 | <45 ans<br>n=209   | ≥45 ans<br>n=124 | Ensembles<br>n=333 | <45 ans<br>n=1589                           | ≥45 ans<br>n=905 | Ensembles<br>n=2494 |
| <b>Digestif</b>  |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 9,1%              | 8,2%             | 8,8%               | 8,0%   | 8,2%             | 8,1%               | 8,8%  | 8,4%             | 8,6%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 8,6%              | 8,2%             | 8,4%               | 7,0%   | 8,2%             | 7,5%               | 8,4%  | 8,1%             | 8,3%                |
| Gêne dans le travail   | 1,6%              | 1,1%             | 1,4%               | 1,5%   | 1,6%             | 1,6%               | 1,6%  | 1,9%             | 1,7%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 4,3%              | 5,2%             | 4,7%               | 3,0%   | 3,3%             | 3,1%               | 3,8%  | 4,3%             | 4,0%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 5,1%              | 5,6%             | 5,3%               | 4,5%   | 5,8%             | 5,0%               | 4,5%  | 5,9%             | 5,0%                |
| <b>Dermatologie</b>  |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 5,6%              | 5,5%             | 5,6%               | 5,3%   | 6,6%             | 5,8%               | 5,6%  | 5,5%             | 5,5%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 5,3%              | 5,2%             | 5,3%               | 5,3%   | 6,6%             | 5,8%               | 5,1%  | 5,3%             | 5,2%                |
| Gêne dans le travail   | 0,0%              | 0,4%             | 0,2%               | 0,0%   | 0,0%             | 0,0%               | 0,3%  | 0,2%             | 0,2%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 1,9%              | 3,7%             | 2,6%               | 1,5%   | 2,5%             | 1,8%               | 1,9%  | 2,6%             | 2,1%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 4,0%              | 4,1%             | 4,0%               | 4,9%   | 4,1%             | 4,6%               | 4,7%  | 3,9%             | 4,4%                |
| <b>Troubles de l'audition</b>  |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 1,9%              | 5,9%             | 3,6%               | 5,3%   | 3,3%             | 4,6%               | 3,2%  | 5,1%             | 3,9%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 1,9%              | 5,9%             | 3,6%               | 4,4%   | 3,3%             | 4,0%               | 2,9%  | 5,1%             | 3,7%                |
| Gêne dans le travail   | 1,3%              | 2,6%             | 1,9%               | 1,0%   | 2,5%             | 1,5%               | 1,4%  | 2,5%             | 1,8%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 0,0%              | 0,0%             | 0,0%               | 2,0%   | 0,0%             | 1,2%               | 0,6%  | 0,1%             | 0,5%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 1,6%              | 4,1%             | 2,6%               | 3,9%   | 1,6%             | 3,1%               | 2,4%  | 3,3%             | 2,7%                |
| <b>Troubles ostéoarticulaires du<br/>membre supérieur</b><br><i>(l'un des 3 signes ci-dessous)</i> |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 7,5%              | 20,4%            | 12,9%              | 8,2%   | 18,9%            | 12,2%              | 7,6%  | 20,0%            | 12,1%               |
| Plaintes ou signes cliniques   | 7,5%              | 20,4%            | 12,9%              | 8,2%   | 18,9%            | 12,2%              | 7,6%  | 20,0%            | 12,1%               |
| Gêne dans le travail   | 2,9%              | 7,1%             | 4,7%               | 3,9%   | 10,0%            | 6,1%               | 3,3%  | 9,1%             | 5,4%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 2,1%              | 6,7%             | 4,0%               | 1,0%   | 8,3%             | 3,7%               | 1,4%  | 7,0%             | 3,4%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 3,7%              | 7,4%             | 5,3%               | 2,9%   | 13,3%            | 6,7%               | 3,9%  | 9,5%             | 6,0%                |
| ➤ <b>Epaule</b>  |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 4,0%              | 13,6%            | 8,0%               | 3,4%   | 12,3%            | 6,7%               | 4,0%  | 13,3%            | 7,4%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 4,0%              | 13,6%            | 8,0%               | 3,4%   | 12,3%            | 6,7%               | 4,0%  | 13,3%            | 7,4%                |
| Gêne dans le travail   | 1,9%              | 4,8%             | 3,1%               | 1,4%   | 7,4%             | 3,7%               | 1,8%  | 5,8%             | 3,3%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 1,6%              | 4,8%             | 2,9%               | 1,0%   | 6,6%             | 3,1%               | 1,1%  | 4,8%             | 2,4%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 2,4%              | 5,1%             | 3,6%               | 1,4%   | 8,3%             | 4,0%               | 2,2%  | 6,1%             | 3,6%                |
| ➤ <b>Coude</b>   |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 2,1%              | 5,5%             | 3,5%               | 1,9%   | 4,9%             | 3,0%               | 2,0%  | 5,0%             | 3,1%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 2,1%              | 5,5%             | 3,5%               | 1,9%   | 4,9%             | 3,0%               | 2,0%  | 5,0%             | 3,1%                |
| Gêne dans le travail   | 0,8%              | 2,2%             | 1,4%               | 0,5%   | 3,3%             | 1,5%               | 0,9%  | 2,6%             | 1,5%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 1,1%              | 2,6%             | 1,7%               | 0,0%   | 3,3%             | 1,2%               | 0,6%  | 2,5%             | 1,3%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 1,6%              | 1,9%             | 1,7%               | 0,5%   | 4,1%             | 1,8%               | 1,2%  | 2,6%             | 1,7%                |
| ➤ <b>Poignet</b>   |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 3,7%              | 8,1%             | 5,5%               | 3,4%   | 8,2%             | 5,2%               | 3,5%  | 8,3%             | 5,3%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 3,7%              | 8,1%             | 5,5%               | 3,4%   | 8,2%             | 5,2%               | 3,5%  | 8,3%             | 5,3%                |
| Gêne dans le travail   | 1,6%              | 4,0%             | 2,6%               | 1,9%   | 3,3%             | 2,4%               | 1,9%  | 3,9%             | 2,6%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 1,3%              | 2,9%             | 2,0%               | 0,0%   | 1,6%             | 0,6%               | 0,5%  | 3,1%             | 1,5%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 1,9%              | 2,9%             | 2,3%               | 1,0%   | 4,9%             | 2,4%               | 1,5%  | 3,6%             | 2,2%                |

| Etat de santé  | 542A. Secrétaires |                  |                    | 543B. Employés qualifiés<br>des services<br>comptables ou financiers |                  |                    | 54. Employés administratifs<br>d'entreprise |                  |                     |
|--|-------------------|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|---|------------------|---------------------|
|  | <45 ans<br>n=381  | ≥45 ans<br>n=276 | Ensembles<br>n=657 | <45 ans<br>n=209   | ≥45 ans<br>n=124 | Ensembles<br>n=333 | <45 ans<br>n=1589                           | ≥45 ans<br>n=905 | Ensembles<br>n=2494 |
| <b>Troubles ostéoarticulaires du<br/>membre inférieur</b>                                |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 5,9%              | 8,8%             | 7,1%               | 7,8%   | 8,9%             | 8,2%               | 6,3%  | 10,5%            | 7,8%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 5,6%              | 8,8%             | 6,9%               | 6,9%   | 8,9%             | 7,6%               | 5,9%  | 10,5%            | 7,6%                |
| Gêne dans le travail   | 1,6%              | 2,9%             | 2,2%               | 1,5%   | 3,3%             | 2,1%               | 1,4%  | 3,4%             | 2,1%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 1,1%              | 3,0%             | 1,9%               | 0,5%   | 4,9%             | 2,1%               | 1,2%  | 4,5%             | 2,4%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 4,5%              | 4,8%             | 4,6%               | 3,9%   | 8,9%             | 5,8%               | 4,4%  | 6,9%             | 5,3%                |
| <b>Troubles ostéoarticulaires du<br/>rachis</b><br><i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i> |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 21,5%             | 37,2%            | 28,2%              | 18,0%  | 26,4%            | 21,1%              | 20,3%                                       | 30,9%            | 24,2%               |
| Plaintes ou signes cliniques   | 21,0%             | 36,3%            | 27,4%              | 17,5%  | 26,4%            | 20,8%              | 19,6%                                       | 30,6%            | 23,6%               |
| Gêne dans le travail   | 8,1%              | 16,3%            | 11,6%              | 6,8%   | 13,2%            | 9,2%               | 9,5%  | 15,5%            | 11,7%               |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 4,3%              | 12,5%            | 7,8%               | 4,9%   | 12,4%            | 7,7%               | 4,8%  | 11,1%            | 7,1%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 9,2%              | 18,1%            | 13,0%              | 8,3%   | 16,5%            | 11,3%              | 9,1%  | 16,2%            | 11,7%               |
| ➤ <b>Vertèbres cervicales</b>  |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 10,9%             | 24,1%            | 16,4%              | 11,1%  | 17,9%            | 13,6%              | 10,5%                                       | 19,3%            | 13,7%               |
| Plaintes ou signes cliniques   | 10,9%             | 23,8%            | 16,3%              | 11,1%  | 17,9%            | 13,6%              | 10,4%                                       | 19,2%            | 13,6%               |
| Gêne dans le travail   | 4,8%              | 11,4%            | 7,6%               | 4,3%   | 8,1%             | 5,8%               | 5,6%  | 9,9%             | 7,1%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 2,7%              | 8,4%             | 5,1%               | 2,9%   | 9,8%             | 5,5%               | 2,4%  | 7,6%             | 4,3%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 3,5%              | 12,5%            | 7,3%               | 3,9%   | 9,8%             | 6,1%               | 3,5%  | 9,7%             | 5,8%                |
| ➤ <b>Vertèbres<br/>dorsolombaires</b>  |                   |                  |                    |  |                  |                    |   |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 13,5%             | 23,8%            | 17,9%              | 11,3%  | 16,5%            | 13,2%              | 13,7%                                       | 19,8%            | 15,9%               |
| Plaintes ou signes cliniques   | 12,9%             | 23,1%            | 17,2%              | 10,8%  | 16,5%            | 12,9%              | 13,0%                                       | 19,6%            | 15,4%               |
| Gêne dans le travail   | 4,6%              | 10,0%            | 6,9%               | 3,9%   | 7,4%             | 5,2%               | 5,7%  | 9,6%             | 7,1%                |
| Consommation<br>médicamenteuse   | 2,4%              | 8,1%             | 4,8%               | 2,5%   | 5,0%             | 3,4%               | 2,9%  | 6,9%             | 4,4%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 6,5%              | 11,1%            | 8,5%               | 5,4%   | 9,9%             | 7,1%               | 6,5%  | 10,7%            | 8,0%                |