



## Evolution et Relations en Santé au Travail

### Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009 Détail par Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS-ESE 2003)

Le détail des

« 676A. Manutentionnaires non qualifiés »

Au sein des « 67. Ouvriers non qualifiés de type industriel »

**Juin 2010**



Université Lille 2  
Droit et Santé

| Description de la population  | 676A.<br>Manutentionnaires<br>non qualifiés<br>n=204 | 67.<br>Ouvriers non qualifiés<br>de type artisanal<br>n=1243 |
|---|--|--|
| C Industrie manufacturière  | 15,2%  | 53,8%  |
| E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 3,4%   | 1,1%   |
| F Construction  | 1,5%   | 3,8%   |
| G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles                                  | 16,7%  | 8,5%   |
| H Transports et entreposage   | 12,7%  | 5,7%   |
| I Hébergement et restauration   | 0,5%   | 0,2%   |
| J Information et communication  | 0,5%   | 0,5%   |
| K Activités financières et d'assurance  | 0,0%   | 0,2%   |
| M Activités spécialisées, scientifiques et techniques                                   | 2,0%   | 2,1%   |
| N Activités de services administratifs et de soutien                                    | 42,2%  | 18,4%  |
| O Administration publique   | 0,5%   | 0,6%   |
| Q Santé humaine et action sociale   | 1,0%   | 3,1%   |
| S Autres activités de services  | 1,0%   | 0,8%   |
| Répartition homme/femme   | 71,6%/28,4%  | 62,0%/38,0%  |
| ≤24ans  | 27,0%  | 15,4%  |
| 25-34ans  | 25,0%  | 24,2%  |
| 35-44ans  | 24,0%  | 30,0%  |
| 45-54ans  | 20,6%  | 25,1%  |
| ≥55ans  | 3,4%   | 5,2%   |
| Conditions de travail   | 676A.<br>Manutentionnaires<br>non qualifiés<br>n=204 | 67.<br>Ouvriers non qualifiés<br>de type artisanal<br>n=1243 |
| Changement de travail depuis 1an :  |  |  |
| Non   | 65,5%  | 80,2%  |
| Oui, raison médicale  | 2,5%   | 1,7%   |
| Oui, autre raison   | 30,5%  | 17,5%  |
| Oui, raison non précisée  | 1,5%   | 0,6%   |
| Personnes travaillant à temps plein   | 86,1%  | 89,1%  |
| Travail en journée normale  | 66,2%  | 56,2%  |
| Coupures de plus de 2 heures  | 10,6%  | 6,9%   |
| Horaires décalés  | 35,9%  | 40,8%  |
| Horaires irréguliers ou alternés  | 39,7%  | 38,2%  |
| Travail de nuit   | 18,5%  | 24,9%  |
| Déplacements professionnels de plus de 24h  | 0,5%   | 2,6%   |
| Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue                                  | 31,7%  | 36,4%  |
| Parmi eux :   |  |  |
| ➤ Perturbe travail  | 31,7%  | 42,1%  |
| ➤ Sans conséquence  | 48,3%  | 43,8%  |
| ➤ Aspect positif sur travail  | 53,4%  | 42,0%  |
| Dépasser horaires normaux   | 24,5%  | 16,5%  |
| Sauter repas ou pas de pause  | 16,7%  | 9,5%   |
| Traiter trop vite une opération   | 14,4%  | 14,6%  |
| Travail ne permet pas d'apprendre   | 42,4%  | 39,3%  |
| Travail pas varié   | 32,2%  | 33,7%  |
| Pas de choix dans la façon de procéder  | 43,8%  | 47,3%  |
| Pas de possibilité suffisante d'entraide  | 20,6%  | 18,7%  |
| Travail pas reconnu   | 26,4%  | 31,9%  |
| Formations et informations insuffisantes  | 26,1%  | 25,9%  |
| Objectifs et consignes pas clairement définis   | 18,3%  | 16,9%  |
| Pression temporelle forte (>5)  | 28,0%  | 31,2%  |

| <b>Charge physique du poste de travail</b> | <b>676A.<br/>Manutentionnaires<br/>non qualifiés<br/>n=204</b> | <b>67.<br/>Ouvriers non qualifiés<br/>de type artisanal<br/>n=1243</b> |
|--|--|--|
| Postures contraignantes :                  |  |  |
| Non  | 27,6%  | 26,6%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 36,0%  | 42,6%  |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 32,0%  | 27,9%  |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 4,4%   | 2,9%   |
| Effort, Port de charges lourdes :          |  |  |
| Non  | 19,7%  | 28,0%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 40,9%  | 41,2%  |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 33,5%  | 28,0%  |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 5,9%   | 2,8%   |
| Gestes répétitifs :                        |  |  |
| Non  | 9,9%   | 11,1%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 41,9%  | 41,8%  |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 43,3%  | 43,8%  |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 4,9%   | 3,3%   |
| Importants déplacements à pieds :          |  |  |
| Non  | 38,1%  | 45,6%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 24,8%  | 19,6%  |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 33,2%  | 32,7%  |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 4,0%   | 2,1%   |
| Station debout prolongée :                 |  |  |
| Non  | 12,7%  | 14,6%  |
| Oui, difficile ou pénible                  | 35,8%  | 39,6%  |
| Oui, pas difficile ou pénible              | 46,6%  | 43,0%  |
| Oui, difficile ou pénible non précisée     | 4,9%   | 2,7%   |

| <b>Expositions</b>          | <b>676A.<br/>Manutentionnaires<br/>non qualifiés<br/>n=204</b> | <b>67.<br/>Ouvriers non qualifiés<br/>de type artisanal<br/>n=1243</b> |
|-----------------------------|--|--|
| Produits chimiques          | 17,9%  | 27,4%  |
| Poussières, fumées          | 55,7%  | 56,5%  |
| Rx ionisants                | 0,0%   | 0,9%   |
| Vibrations                  | 20,3%  | 25,1%  |
| Gêne sonore                 | 54,2%  | 64,7%  |
| Bruit > 80db                | 35,5%  | 51,2%  |
| Contrainte visuelle         | 12,9%  | 24,8%  |
| Conduite routière prolongée | 4,5%   | 3,7%   |
| Chaleur intense             | 26,7%  | 23,3%  |
| Froid intense               | 31,2%  | 19,2%  |
| Intempéries                 | 17,4%  | 13,3%  |
| Pression psychologique      | 17,4%  | 19,0%  |
| Agent biologique            | 3,5%   | 4,2%   |
| Contact avec public         | 23,6%  | 16,6%  |

| <b>Formation</b>                         | <b>676A.<br/>Manutentionnaires<br/>non qualifiés<br/>n=204</b> | <b>67.<br/>Ouvriers non qualifiés<br/>de type artisanal<br/>n=1243</b> |
|--|--|--|
| A bénéficié d'une formation depuis un an | 30,0%  | 29,8%  |
| Parmi eux :                              |  |  |
| ➤ En rapport avec travail actuel         | 71,7%  | 73,9%  |
| ➤ En rapport avec travail futur          | 18,2%  | 25,3%  |
| ➤ Formation d'intérêt général            | 50,0%  | 44,3%  |
| Rôle de formateur ou tuteur depuis un an | 12,5%  | 17,6%  |

| <b>Mode de vie</b>                         | <b>676A.<br/>Manutentionnaires<br/>non qualifiés<br/>n=204</b> | <b>67.<br/>Ouvriers non qualifiés<br/>de type artisanal<br/>n=1243</b> |
|--|--|--|
| Activité sportive régulière                | 43,0%  | 37,9%  |
| Consommation de tabac                      | 47,3%  | 48,7%  |
| Consommation de tabac>15 cig / j           | 13,9%  | 13,9%  |
| Consommation de café                       | 70,2%  | 77,0%  |
| Consommation de café sup à 4 tasses / j    | 16,7%  | 20,1%  |
| Trajets domicile/travail longs ou pénibles | 14,2%  | 11,7%  |

| Etat de santé  | 676A.<br>Manutentionnaires<br>non qualifiés<br>n=204 |                  |                    | 67.<br>Ouvriers non qualifiés<br>de type artisanal<br>n=1243 |                  |                     |
|--|--|------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|
|  | <45 ans<br>n=155                                     | ≥45 ans<br>n=49* | Ensembles<br>n=204 | <45 ans<br>n=866   | ≥45 ans<br>n=377 | Ensembles<br>n=1243 |
| <b>Indice de masse corporelle</b>                            |  |                  |                    |  |                  |                     |
| ➤ Normaux ou maigres   | 67,8%  | 55,1%            | 64,7%              | 62,3%  | 44,2%            | 56,9%               |
| ➤ Surpoids   | 25,7%  | 32,7%            | 27,4%              | 24,4%  | 36,3%            | 28,0%               |
| ➤ Obèses   | 6,6%   | 12,2%            | 8,0%               | 13,2%  | 19,5%            | 15,1%               |
| <b>Appareil respiratoire</b>                                 |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                                      | 2,0%   | 6,1%             | 3,0%               | 4,9%   | 7,0%             | 5,6%                |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 2,0%   | 6,1%             | 3,0%               | 4,2%   | 5,9%             | 4,8%                |
| Gêne dans le travail   | 1,3%   | 2,0%             | 1,5%               | 0,7%   | 1,3%             | 0,9%                |
| Consommation médicamenteuse                                  | 1,3%   | 2,0%             | 1,5%               | 3,1%   | 2,2%             | 2,8%                |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 1,3%   | 4,1%             | 2,0%               | 3,7%   | 3,8%             | 3,7%                |
| <b>Appareil cardiovasculaire</b>                             |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                                      | 4,6%   | 8,2%             | 5,4%               | 3,5%   | 10,3%            | 5,6%                |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 4,6%   | 6,1%             | 5,0%               | 3,5%   | 8,1%             | 4,9%                |
| Gêne dans le travail   | 2,0%   | 2,1%             | 2,0%               | 1,3%   | 3,8%             | 2,1%                |
| Consommation médicamenteuse                                  | 2,0%   | 4,2%             | 2,5%               | 0,8%   | 5,4%             | 2,2%                |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 2,6%   | 4,2%             | 3,0%               | 2,1%   | 7,6%             | 3,8%                |
| <b>HTA</b>   |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                                      | 2,6%   | 16,3%            | 5,9%               | 3,7%   | 18,0%            | 8,0%                |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 2,6%   | 8,2%             | 4,0%               | 2,7%   | 11,5%            | 5,4%                |
| Gêne dans le travail   | 0,7%   | 2,1%             | 1,0%               | 0,2%   | 1,4%             | 0,6%                |
| Consommation médicamenteuse                                  | 1,3%   | 14,6%            | 4,5%               | 1,9%   | 14,8%            | 5,8%                |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 1,3%   | 14,6%            | 4,5%               | 2,5%   | 15,3%            | 6,4%                |
| ➤ <b>Lassitude, fatigue</b>                                  |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                                      | 16,4%  | 30,6%            | 19,9%              | 20,6%  | 31,5%            | 23,9%               |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 16,4%  | 30,6%            | 19,9%              | 20,1%  | 31,5%            | 23,6%               |
| Gêne dans le travail   | 6,6%   | 18,4%            | 9,5%               | 8,6%   | 17,6%            | 11,4%               |
| Consommation médicamenteuse                                  | 2,7%   | 0,0%             | 2,0%               | 1,7%   | 3,8%             | 2,3%                |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 4,6%   | 0,0%             | 3,5%               | 3,3%   | 6,0%             | 4,1%                |
| ➤ <b>Anxiété, nervosité</b>                                  |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                                      | 12,6%  | 36,7%            | 18,5%              | 18,1%  | 31,5%            | 22,1%               |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 12,6%  | 36,7%            | 18,5%              | 17,8%  | 31,2%            | 21,9%               |
| Gêne dans le travail   | 6,7%   | 18,4%            | 9,5%               | 7,5%   | 13,1%            | 9,2%                |
| Consommation médicamenteuse                                  | 2,7%   | 2,1%             | 2,5%               | 2,4%   | 6,0%             | 3,5%                |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 4,7%   | 4,2%             | 4,6%               | 4,9%   | 6,3%             | 5,3%                |
| ➤ <b>Trouble du sommeil</b>                                  |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                                      | 11,9%  | 22,4%            | 14,5%              | 16,4%  | 28,0%            | 19,9%               |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 11,9%  | 22,4%            | 14,5%              | 15,5%  | 27,4%            | 19,2%               |
| Gêne dans le travail   | 3,3%   | 10,2%            | 5,0%               | 6,8%   | 11,6%            | 8,3%                |
| Consommation médicamenteuse                                  | 3,3%   | 2,1%             | 3,0%               | 3,1%   | 7,3%             | 4,4%                |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 4,6%   | 2,0%             | 4,0%               | 3,5%   | 6,2%             | 4,3%                |
| <b>Troubles neuro psychiques</b><br>(les 3 signes ci-dessus) |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                                      | 3,3%   | 14,3%            | 6,0%               | 5,6%   | 12,4%            | 7,7%                |
| Plaintes ou signes cliniques                                 | 3,3%   | 14,3%            | 6,0%               | 4,9%   | 11,9%            | 7,0%                |
| Gêne dans le travail   | 1,3%   | 6,1%             | 2,5%               | 2,0%   | 4,3%             | 2,7%                |
| Consommation médicamenteuse                                  | 1,3%   | 0,0%             | 1,0%               | 0,6%   | 1,1%             | 0,7%                |
| Pathologie diagnostiquée                                     | 2,6%   | 0,0%             | 2,0%               | 1,4%   | 1,4%             | 1,4%                |

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé  | 676A.<br>Manutentionnaires<br>non qualifiés<br>n=204 |                  |                    | 67.<br>Ouvriers non qualifiés<br>de type artisanal<br>n=1243 |                  |                     |
|--|--|------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|
|  | <45 ans<br>n=155                                     | ≥45 ans<br>n=49* | Ensembles<br>n=204 | <45 ans<br>n=866   | ≥45 ans<br>n=377 | Ensembles<br>n=1243 |
| <b>Digestif</b>  |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 5,2%   | 12,2%            | 6,9%               | 6,9%   | 11,8%            | 8,4%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 5,2%   | 10,2%            | 6,4%               | 6,8%   | 11,3%            | 8,2%                |
| Gêne dans le travail   | 1,3%   | 4,1%             | 2,0%               | 0,8%   | 3,0%             | 1,5%                |
| Consommation médicamenteuse  | 2,0%   | 4,1%             | 2,5%               | 2,9%   | 6,1%             | 3,8%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 2,6%   | 4,1%             | 3,0%               | 3,5%   | 6,9%             | 4,5%                |
| <b>Dermatologie</b>  |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 7,2%   | 6,1%             | 6,9%               | 6,2%   | 7,0%             | 6,5%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 6,5%   | 4,1%             | 5,9%               | 6,0%   | 6,8%             | 6,2%                |
| Gêne dans le travail   | 0,7%   | 0,0%             | 0,5%               | 0,7%   | 1,1%             | 0,8%                |
| Consommation médicamenteuse  | 3,3%   | 4,1%             | 3,5%               | 2,5%   | 3,2%             | 2,7%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 5,3%   | 6,1%             | 5,5%               | 4,5%   | 5,7%             | 4,9%                |
| <b>Troubles de l'audition</b>  |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 4,0%   | 12,5%            | 6,1%               | 5,2%   | 17,1%            | 8,8%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 3,4%   | 10,4%            | 5,1%               | 4,4%   | 14,4%            | 7,4%                |
| Gêne dans le travail   | 0,0%   | 4,2%             | 1,0%               | 0,8%   | 4,4%             | 1,9%                |
| Consommation médicamenteuse  | 0,0%   | 0,0%             | 0,0%               | 0,2%   | 1,1%             | 0,5%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 2,7%   | 8,3%             | 4,1%               | 3,2%   | 9,8%             | 5,2%                |
| <b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b><br><i>(l'un des 3 signes ci-dessous)</i> |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 12,4%  | 37,5%            | 18,4%              | 18,2%  | 37,5%            | 24,1%               |
| Plaintes ou signes cliniques   | 12,4%  | 35,4%            | 17,9%              | 18,0%  | 36,7%            | 23,7%               |
| Gêne dans le travail   | 7,2%   | 21,3%            | 10,6%              | 10,2%  | 25,8%            | 14,9%               |
| Consommation médicamenteuse  | 3,3%   | 10,4%            | 5,0%               | 5,3%   | 13,7%            | 7,9%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 6,0%   | 17,8%            | 8,7%               | 7,7%   | 19,6%            | 11,3%               |
| ➤ <b>Epaule</b>  |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 8,5%   | 25,0%            | 12,4%              | 9,9%   | 25,3%            | 14,6%               |
| Plaintes ou signes cliniques   | 8,5%   | 22,9%            | 11,9%              | 9,8%   | 25,1%            | 14,4%               |
| Gêne dans le travail   | 5,3%   | 16,7%            | 8,0%               | 5,5%   | 18,5%            | 9,4%                |
| Consommation médicamenteuse  | 2,6%   | 6,3%             | 3,5%               | 3,2%   | 9,2%             | 5,0%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 3,3%   | 15,6%            | 6,1%               | 3,7%   | 12,9%            | 6,4%                |
| ➤ <b>Coude</b>   |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 2,0%   | 16,7%            | 5,5%               | 4,2%   | 14,0%            | 7,2%                |
| Plaintes ou signes cliniques   | 2,0%   | 14,6%            | 5,0%               | 4,1%   | 13,7%            | 7,1%                |
| Gêne dans le travail   | 2,0%   | 10,4%            | 4,0%               | 2,6%   | 10,3%            | 4,9%                |
| Consommation médicamenteuse  | 0,0%   | 4,2%             | 1,0%               | 1,4%   | 4,9%             | 2,5%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 1,3%   | 10,6%            | 3,5%               | 2,0%   | 7,1%             | 3,5%                |
| ➤ <b>Poignet</b>   |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème  | 3,3%   | 20,8%            | 7,5%               | 7,6%   | 17,7%            | 10,7%               |
| Plaintes ou signes cliniques   | 3,3%   | 18,8%            | 7,0%               | 7,6%   | 16,9%            | 10,4%               |
| Gêne dans le travail   | 1,3%   | 8,5%             | 3,0%               | 4,5%   | 9,9%             | 6,1%                |
| Consommation médicamenteuse  | 0,7%   | 6,3%             | 2,0%               | 1,9%   | 6,6%             | 3,3%                |
| Pathologie diagnostiquée   | 1,3%   | 10,6%            | 3,5%               | 3,1%   | 8,8%             | 4,8%                |

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

| Etat de santé   | 676A.<br>Manutentionnaires<br>non qualifiés<br>n=204 |                  |                    | 67.<br>Ouvriers non qualifiés<br>de type artisanal<br>n=1243 |                  |                     |
|---|--|------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|
|   | <45 ans<br>n=155                                     | ≥45 ans<br>n=49* | Ensembles<br>n=204 | <45 ans<br>n=866   | ≥45 ans<br>n=377 | Ensembles<br>n=1243 |
| <b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b> |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                               | 7,2%   | 14,3%            | 9,0%               | 10,0%  | 19,1%            | 12,8%               |
| Plaintes ou signes cliniques                          | 7,2%   | 12,2%            | 8,5%               | 9,9%   | 17,8%            | 12,3%               |
| Gêne dans le travail                                  | 4,6%   | 4,1%             | 4,5%               | 5,6%   | 10,5%            | 7,1%                |
| Consommation médicamenteuse                           | 2,0%   | 2,0%             | 2,0%               | 2,7%   | 6,8%             | 3,9%                |
| Pathologie diagnostiquée                              | 3,3%   | 8,3%             | 4,5%               | 5,4%   | 12,2%            | 7,5%                |
| <b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>           |  |                  |                    |  |                  |                     |
| <i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>                 |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                               | 15,9%  | 38,3%            | 21,2%              | 27,4%  | 39,5%            | 31,1%               |
| Plaintes ou signes cliniques                          | 15,2%  | 36,2%            | 20,2%              | 26,8%  | 39,0%            | 30,6%               |
| Gêne dans le travail                                  | 8,0%   | 20,0%            | 10,8%              | 17,1%  | 25,7%            | 19,7%               |
| Consommation médicamenteuse                           | 5,3%   | 23,4%            | 9,6%               | 8,4%   | 15,3%            | 10,5%               |
| Pathologie diagnostiquée                              | 4,0%   | 26,1%            | 9,2%               | 10,8%  | 21,6%            | 14,1%               |
| ➤ <b>Vertèbres cervicales</b>                         |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                               | 3,3%   | 16,7%            | 6,5%               | 8,4%   | 18,4%            | 11,4%               |
| Plaintes ou signes cliniques                          | 3,3%   | 14,6%            | 6,0%               | 8,4%   | 17,9%            | 11,3%               |
| Gêne dans le travail                                  | 2,0%   | 10,6%            | 4,0%               | 5,3%   | 11,2%            | 7,1%                |
| Consommation médicamenteuse                           | 0,7%   | 8,3%             | 2,5%               | 3,0%   | 6,0%             | 3,9%                |
| Pathologie diagnostiquée                              | 0,0%   | 10,9%            | 2,5%               | 3,1%   | 8,2%             | 4,6%                |
| ➤ <b>Vertèbres dorsolombaires</b>                     |  |                  |                    |  |                  |                     |
| Existence d'un problème                               | 13,8%  | 29,8%            | 17,6%              | 23,0%  | 29,2%            | 24,9%               |
| Plaintes ou signes cliniques                          | 13,2%  | 27,7%            | 16,6%              | 22,4%  | 28,9%            | 24,4%               |
| Gêne dans le travail                                  | 7,3%   | 13,3%            | 8,7%               | 14,0%  | 20,1%            | 15,8%               |
| Consommation médicamenteuse                           | 4,6%   | 17,0%            | 7,6%               | 6,3%   | 12,0%            | 8,0%                |
| Pathologie diagnostiquée                              | 4,0%   | 19,6%            | 7,6%               | 8,6%   | 17,1%            | 11,2%               |

\* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence