



## Evolutions et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009  
Détail par Professions et Catégories Socioprofessionnelles  
(PCS-ESE 2003)

**Le détail des « 684A. Nettoyeurs »**  
**Au sein des « 68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal »**

**Juin 2010**



**Droit et Santé**

Description de la population	684A. Nettoyeurs n=308	68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal n=565
C Industrie manufacturière	2,6%	7,1%
E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	1,3%	3,4%
F Construction	1,3%	17,2%
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	4,9%	6,4%
H Transports et entreposage	1,0%	0,9%
I Hébergement et restauration	1,9%	2,5%
J Information et communication	0,3%	0,2%
L Activités immobilières	1,9%	1,1%
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	1,6%	1,9%
N Activités de services administratifs et de soutien	60,1%	41,1%
O Administration publique	2,6%	3,4%
P Enseignement	1,6%	0,9%
Q Santé humaine et action sociale	10,4%	6,7%
S Autres activités de services	3,2%	3,7%
Répartition homme/femme	35,7%/64,0%	59,8%/40,0%
≤24ans	10,1%	20,4%
25-34ans	15,6%	18,8%
35-44ans	28,2%	25,1%
45-54ans	33,8%	25,8%
≥55ans	12,3%	9,9%
Conditions de travail	684A. Nettoyeurs n=308	68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal n=565
Changement de travail depuis 1an :		
Non	85,7%	84,6%
Oui, raison médicale	1,6%	1,8%
Oui, autre raison	11,4%	12,9%
Oui, raison non précisée	1,3%	0,7%
Personnes travaillant à temps plein	51,1%	64,2%
Travail en journée normale	59,4%	71,3%
Coupures de plus de 2 heures	31,7%	23,4%
Horaires décalés	42,0%	32,1%
Horaires irréguliers ou alternés	22,5%	19,2%
Travail de nuit	6,8%	6,0%
Déplacements professionnels de plus de 24h	1,3%	2,9%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	23,5%	26,7%
Parmi eux :		
➤ Perturbe travail	48,5%	46,5%
➤ Sans conséquence	41,8%	42,3%
➤ Aspect positif sur travail	43,9%	33,1%
Dépasser horaires normaux	17,4%	23,0%
Sauter repas ou pas de pause	12,5%	12,7%
Traiter trop vite une opération	18,9%	15,0%
Travail ne permet pas d'apprendre	56,0%	40,8%
Travail pas varié	54,6%	39,9%
Pas de choix dans la façon de procéder	25,3%	28,7%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	47,4%	33,5%
Travail pas reconnu	28,5%	24,7%
Formations et informations insuffisantes	30,8%	25,9%
Objectifs et consignes pas clairement définis	23,0%	18,6%
Pression temporelle forte (>5)	22,7%	23,0%

<b>Charge physique du poste de travail</b>	<b>684A. Nettoyeurs n=308</b>	<b>68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal n=565</b>
Postures contraignantes :		
Non	29,4%	23,0%
Oui, difficile ou pénible	35,9%	38,4%
Oui, pas difficile ou pénible	31,0%	35,7%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,6%	2,9%
Effort, Port de charges lourdes :		
Non	44,7%	31,2%
Oui, difficile ou pénible	32,8%	36,8%
Oui, pas difficile ou pénible	19,2%	28,9%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,3%	3,1%
Gestes répétitifs :		
Non	10,8%	11,4%
Oui, difficile ou pénible	35,0%	32,6%
Oui, pas difficile ou pénible	48,7%	51,7%
Oui, difficile ou pénible non précisée	5,6%	4,3%
Importants déplacements à pieds :		
Non	40,7%	44,0%
Oui, difficile ou pénible	21,3%	18,9%
Oui, pas difficile ou pénible	33,4%	34,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	4,6%	2,8%
Station debout prolongée :		
Non	12,1%	13,2%
Oui, difficile ou pénible	35,1%	31,7%
Oui, pas difficile ou pénible	48,9%	51,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	3,9%	3,4%

<b>Expositions</b>	<b>684A. Nettoyeurs n=308</b>	<b>68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal n=565</b>
Produits chimiques	63,4%	54,5%
Poussières, fumées	61,8%	69,2%
Rx ionisants	0,7%	1,3%
Vibrations	12,1%	31,1%
Gêne sonore	27,7%	42,6%
Bruit > 80db	18,2%	33,2%
Contrainte visuelle	7,9%	8,7%
Conduite routière prolongée	3,9%	7,7%
Chaleur intense	12,7%	19,4%
Froid intense	11,1%	17,8%
Intempéries	25,2%	34,5%
Pression psychologique	12,7%	14,1%
Agent biologique	21,7%	16,2%
Contact avec public	62,0%	60,6%

<b>Formation</b>	<b>684A. Nettoyeurs n=308</b>	<b>68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal n=565</b>
A bénéficié d'une formation depuis un an	19,3%	26,2%
Parmi eux :		
➤ En rapport avec travail actuel	83,9%	90,8%
➤ En rapport avec travail futur	20,4%	36,6%
➤ Formation d'intérêt général	40,0%	35,6%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	13,1%	12,2%

<b>Mode de vie</b>	<b>684A. Nettoyeurs n=308</b>	<b>68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal n=565</b>
Activité sportive régulière	30,9%	39,1%
Consommation de tabac	39,4%	42,7%
Consommation de tabac>15 cig / j	9,8%	12,5%
Consommation de café	80,2%	79,1%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	18,8%	17,1%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	11,4%	12,2%

Etat de santé	684A. Nettoyeurs			68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal		
	<45 ans n=166	≥45 ans n=142	Ensembles n=308	<45 ans n=363	≥45 ans n=202	Ensembles n=565
<b>Indice de masse corporelle</b>						
➤ Normaux ou maigres	65,2%	48,6%	57,4%	65,1%	44,9%	57,8%
➤ Surpoids	18,4%	27,9%	22,8%	22,4%	33,8%	26,5%
➤ Obèses	16,5%	23,6%	19,8%	12,5%	21,2%	15,6%
<b>Appareil respiratoire</b>						
Existence d'un problème	4,9%	6,5%	5,6%	6,7%	7,1%	6,8%
Plaintes ou signes cliniques	4,3%	5,8%	5,0%	6,1%	5,1%	5,8%
Gêne dans le travail	0,0%	1,4%	0,7%	1,1%	2,0%	1,4%
Consommation médicamenteuse	2,5%	1,4%	2,0%	3,3%	3,0%	3,2%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	2,9%	3,0%	4,5%	3,6%	4,1%
<b>Appareil cardiovasculaire</b>						
Existence d'un problème	3,0%	9,3%	5,9%	1,9%	8,6%	4,3%
Plaintes ou signes cliniques	2,4%	7,9%	4,9%	1,7%	6,6%	3,4%
Gêne dans le travail	1,8%	2,1%	2,0%	1,1%	2,0%	1,4%
Consommation médicamenteuse	0,6%	4,3%	2,3%	0,6%	4,5%	2,0%
Pathologie diagnostiquée	3,0%	5,7%	4,3%	1,9%	5,6%	3,2%
<b>HTA</b>						
Existence d'un problème	3,7%	15,9%	9,3%	3,3%	17,9%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	9,4%	5,6%	2,2%	11,2%	5,4%
Gêne dans le travail	0,6%	1,5%	1,0%	0,3%	2,6%	1,1%
Consommation médicamenteuse	3,1%	11,7%	7,0%	1,7%	14,9%	6,3%
Pathologie diagnostiquée	3,1%	12,4%	7,3%	2,5%	14,4%	6,7%
➤ <b>Lassitude, fatigue</b>						
Existence d'un problème	17,7%	33,6%	25,0%	16,6%	30,8%	21,6%
Plaintes ou signes cliniques	17,7%	33,6%	25,0%	16,3%	30,8%	21,5%
Gêne dans le travail	4,9%	15,7%	9,9%	5,8%	14,7%	9,0%
Consommation médicamenteuse	2,4%	7,2%	4,6%	1,4%	7,1%	3,4%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	7,2%	4,3%	2,0%	7,1%	3,8%
➤ <b>Anxiété, nervosité</b>						
Existence d'un problème	22,2%	22,1%	22,2%	16,9%	23,4%	19,2%
Plaintes ou signes cliniques	22,2%	22,1%	22,2%	16,9%	23,4%	19,2%
Gêne dans le travail	5,6%	8,6%	7,0%	5,9%	7,7%	6,5%
Consommation médicamenteuse	1,9%	7,2%	4,3%	2,3%	7,2%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	1,9%	2,9%	2,3%	3,4%	3,6%	3,5%
➤ <b>Trouble du sommeil</b>						
Existence d'un problème	17,9%	25,4%	21,3%	13,6%	25,1%	17,7%
Plaintes ou signes cliniques	17,3%	24,6%	20,7%	13,3%	24,1%	17,2%
Gêne dans le travail	3,1%	8,7%	5,7%	3,4%	8,2%	5,1%
Consommation médicamenteuse	2,5%	7,3%	4,7%	2,0%	7,8%	4,0%
Pathologie diagnostiquée	1,9%	8,1%	4,8%	2,0%	8,9%	4,4%
<b>Troubles neuro psychiques</b> (les 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	7,4%	12,9%	9,9%	5,3%	13,6%	8,3%
Plaintes ou signes cliniques	6,7%	12,1%	9,2%	5,0%	12,6%	7,7%
Gêne dans le travail	0,0%	3,6%	1,7%	1,1%	3,6%	2,0%
Consommation médicamenteuse	0,6%	1,4%	1,0%	0,6%	2,6%	1,3%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	2,2%	1,0%	0,3%	3,1%	1,3%

Etat de santé	684A. Nettoyeurs			68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal		
	<45 ans n=166	≥45 ans n=142	Ensembles n=308	<45 ans n=363	≥45 ans n=202	Ensembles n=565
<b>Digestif</b>						
Existence d'un problème	5,5%	15,6%	10,0%	4,8%	12,5%	7,5%
Plaintes ou signes cliniques	5,5%	13,4%	9,1%	4,8%	11,0%	6,9%
Gêne dans le travail	1,8%	3,7%	2,7%	1,7%	2,6%	2,0%
Consommation médicamenteuse	1,2%	9,8%	5,1%	1,1%	7,4%	3,3%
Pathologie diagnostiquée	1,8%	9,8%	5,4%	1,7%	6,9%	3,5%
<b>Dermatologie</b>						
Existence d'un problème	5,5%	7,2%	6,3%	5,6%	8,7%	6,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,5%	7,2%	6,3%	5,6%	8,7%	6,7%
Gêne dans le travail	1,2%	2,9%	2,0%	2,0%	3,1%	2,4%
Consommation médicamenteuse	1,8%	1,4%	1,7%	2,5%	1,5%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	4,3%	5,0%	4,6%	4,5%	6,7%	5,3%
<b>Troubles de l'audition</b>						
Existence d'un problème	5,5%	8,0%	6,6%	5,3%	13,3%	8,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	7,2%	6,0%	4,7%	11,8%	7,2%
Gêne dans le travail	1,8%	2,9%	2,3%	1,1%	3,1%	1,8%
Consommation médicamenteuse	0,0%	1,4%	0,7%	0,3%	1,0%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	4,3%	6,5%	5,3%	4,2%	10,3%	6,3%
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur</b> (l'un des 3 signes ci-dessous)						
Existence d'un problème	13,0%	28,8%	20,3%	15,5%	31,0%	21,0%
Plaintes ou signes cliniques	13,0%	28,8%	20,3%	15,5%	31,0%	21,0%
Gêne dans le travail	6,3%	21,6%	13,4%	7,9%	21,4%	12,7%
Consommation médicamenteuse	2,5%	10,9%	6,4%	2,3%	11,3%	5,5%
Pathologie diagnostiquée	6,3%	17,6%	11,5%	6,2%	18,7%	10,6%
➤ <b>Epaule</b>						
Existence d'un problème	6,8%	18,6%	12,3%	7,6%	20,2%	12,1%
Plaintes ou signes cliniques	6,8%	18,6%	12,3%	7,6%	19,7%	11,9%
Gêne dans le travail	3,8%	12,9%	8,0%	3,4%	13,2%	6,9%
Consommation médicamenteuse	1,3%	5,8%	3,4%	1,1%	6,2%	2,9%
Pathologie diagnostiquée	1,9%	9,4%	5,4%	2,0%	8,7%	4,4%
➤ <b>Coude</b>						
Existence d'un problème	4,9%	9,4%	7,0%	4,2%	12,7%	7,2%
Plaintes ou signes cliniques	4,9%	9,4%	7,0%	4,2%	12,7%	7,2%
Gêne dans le travail	2,5%	6,5%	4,3%	1,7%	8,7%	4,2%
Consommation médicamenteuse	1,9%	5,1%	3,3%	0,8%	6,2%	2,7%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	5,1%	3,7%	1,7%	8,2%	4,0%
➤ <b>Poignet</b>						
Existence d'un problème	7,4%	16,5%	11,6%	7,5%	15,7%	10,4%
Plaintes ou signes cliniques	7,4%	16,5%	11,6%	7,5%	15,2%	10,3%
Gêne dans le travail	3,7%	12,9%	8,0%	4,5%	11,7%	7,0%
Consommation médicamenteuse	0,6%	7,2%	3,7%	0,8%	5,6%	2,5%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	8,7%	5,4%	2,8%	8,7%	4,9%

Etat de santé	684A. Nettoyeurs			68. Ouvriers non qualifiés de type artisanal		
	<45 ans n=166	≥45 ans n=142	Ensembles n=308	<45 ans n=363	≥45 ans n=202	Ensembles n=565
<b>Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur</b>						
Existence d'un problème	8,6%	21,4%	14,6%	7,0%	21,3%	12,1%
Plaintes ou signes cliniques	8,0%	21,4%	14,2%	6,7%	21,3%	11,9%
Gêne dans le travail	5,6%	13,6%	9,3%	4,5%	13,8%	7,8%
Consommation médicamenteuse	1,2%	5,8%	3,3%	1,4%	6,2%	3,1%
Pathologie diagnostiquée	6,2%	8,7%	7,4%	4,2%	9,8%	6,2%
<b>Troubles ostéoarticulaires du rachis</b>						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>						
Existence d'un problème	24,5%	35,5%	29,6%	23,1%	35,4%	27,5%
Plaintes ou signes cliniques	23,3%	35,5%	28,9%	22,5%	34,9%	26,9%
Gêne dans le travail	13,1%	24,8%	18,5%	14,0%	23,3%	17,3%
Consommation médicamenteuse	5,7%	16,8%	10,8%	4,3%	16,6%	8,7%
Pathologie diagnostiquée	8,8%	17,6%	12,9%	8,0%	19,3%	12,0%
➤ <b>Vertèbres cervicales</b>						
Existence d'un problème	6,2%	17,1%	11,3%	4,2%	16,8%	8,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	17,1%	11,0%	3,9%	16,2%	8,3%
Gêne dans le travail	1,9%	8,7%	5,0%	1,7%	9,3%	4,4%
Consommation médicamenteuse	1,3%	8,6%	4,7%	0,8%	7,7%	3,3%
Pathologie diagnostiquée	2,5%	10,1%	6,0%	2,0%	10,3%	4,9%
➤ <b>Vertèbres dorsolombaires</b>						
Existence d'un problème	20,9%	29,7%	24,9%	20,5%	30,3%	24,0%
Plaintes ou signes cliniques	19,6%	29,7%	24,3%	19,9%	29,7%	23,4%
Gêne dans le travail	11,7%	21,7%	16,3%	12,7%	20,6%	15,5%
Consommation médicamenteuse	4,3%	14,6%	9,1%	3,4%	14,5%	7,3%
Pathologie diagnostiquée	6,8%	11,7%	9,1%	6,5%	14,5%	9,3%