



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Complément aux descriptifs nationaux 2008-2009 Détail par Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS-ESE 2003)

Le détail des
«431F. Infirmiers en soins généraux»
Au sein des « 43. Professions intermédiaires
de la santé et du travail social »

Juin 2010



Droit et Santé

Description de la population	431F. Infirmiers en soins généraux n=214	43. Professions intermédiaires de la santé et du travail social n=1035
C Industrie manufacturière	1,4%	3,2%
F Construction	0,0%	0,1%
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	0,5%	13,1%
H Transports et entreposage	0,0%	0,4%
I Hébergement et restauration	0,0%	1,1%
J Information et communication	0,5%	0,2%
K Activités financières et d'assurance	0,0%	0,4%
L Activités immobilières	0,0%	0,2%
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	0,0%	1,4%
N Activités de services administratifs et de soutien	1,4%	0,7%
O Administration publique	0,5%	5,1%
P Enseignement	0,5%	1,4%
Q Santé humaine et action sociale	93,9%	65,5%
S Autres activités de services	1,4%	5,5%
Répartition homme/femme	12,6%/87,4%	21,6%/78,4%
≤24ans	8,4%	8,9%
25-34ans	34,1%	33,2%
35-44ans	23,4%	25,8%
45-54ans	26,6%	24,7%
≥55ans	7,5%	7,3%

Conditions de travail	431F. Infirmiers en soins généraux n=214	43. Professions intermédiaires de la santé et du travail social n=1035
Changement de travail depuis 1an :		
Non	91,1%	87,8%
Oui, raison médicale	0,9%	0,7%
Oui, autre raison	7,9%	11,4%
Oui, raison non précisée	0,0%	0,1%
Personnes travaillant à temps plein	71,4%	76,1%
Travail en journée normale	69,7%	74,9%
Coupures de plus de 2 heures	10,5%	18,2%
Horaires décalés	46,9%	29,6%
Horaires irréguliers ou alternés	46,7%	33,3%
Travail de nuit	34,0%	14,8%
Déplacements professionnels de plus de 24h	1,0%	3,1%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue	60,8%	61,3%
Parmi eux :		
➤ Perturbe travail	76,6%	66,4%
➤ Sans conséquence	33,1%	36,6%
➤ Aspect positif sur travail	23,8%	31,9%
Dépasser horaires normaux	53,1%	46,0%
Sauter repas ou pas de pause	51,2%	32,8%
Traiter trop vite une opération	39,8%	31,2%
Travail ne permet pas d'apprendre	4,7%	5,7%
Travail pas varié	9,9%	8,2%
Pas de choix dans la façon de procéder	26,4%	22,2%
Pas de possibilité suffisante d'entraide	11,3%	12,7%
Travail pas reconnu	17,1%	20,5%
Formations et informations insuffisantes	19,9%	15,8%
Objectifs et consignes pas clairement définis	17,0%	18,5%
Pression temporelle forte (>5)	46,7%	41,3%

Charge physique du poste de travail	431F. Infirmiers en soins généraux n=214	43. Professions intermédiaires de la santé et du travail social n=1035
Postures contraignantes :		
Non	17,8%	44,7%
Oui, difficile ou pénible	45,3%	27,6%
Oui, pas difficile ou pénible	34,6%	25,8%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,3%	1,9%
Effort, Port de charges lourdes :		
Non	15,1%	45,3%
Oui, difficile ou pénible	58,5%	31,0%
Oui, pas difficile ou pénible	24,5%	22,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,9%	1,5%
Gestes répétitifs :		
Non	41,1%	53,8%
Oui, difficile ou pénible	17,3%	13,1%
Oui, pas difficile ou pénible	40,7%	31,3%
Oui, difficile ou pénible non précisée	0,9%	1,9%
Importants déplacements à pieds :		
Non	32,9%	56,1%
Oui, difficile ou pénible	25,8%	13,9%
Oui, pas difficile ou pénible	39,0%	27,7%
Oui, difficile ou pénible non précisée	2,3%	2,3%
Station debout prolongée :		
Non	14,0%	31,8%
Oui, difficile ou pénible	45,8%	28,3%
Oui, pas difficile ou pénible	38,8%	37,4%
Oui, difficile ou pénible non précisée	1,4%	2,6%

Expositions	431F. Infirmiers en soins généraux n=214	43. Professions intermédiaires de la santé et du travail social n=1035
Produits chimiques	43,3%	29,6%
Poussières, fumées	3,8%	10,3%
Rx ionisants	10,5%	6,2%
Vibrations	0,9%	4,6%
Gêne sonore	23,1%	30,0%
Bruit > 80db	3,4%	8,3%
Contrainte visuelle	26,1%	24,4%
Conduite routière prolongée	6,3%	8,7%
Chaleur intense	7,6%	6,2%
Froid intense	3,8%	2,2%
Intempéries	3,3%	4,2%
Pression psychologique	45,2%	41,8%
Agent biologique	75,5%	34,9%
Contact avec public	97,7%	93,8%

Formation	431F. Infirmiers en soins généraux n=214	43. Professions intermédiaires de la santé et du travail social n=1035
A bénéficié d'une formation depuis un an	64,9%	57,8%
Parmi eux :		
➤ En rapport avec travail actuel	94,7%	94,1%
➤ En rapport avec travail futur	12,0%	12,9%
➤ Formation d'intérêt général	57,3%	51,7%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	48,8%	38,6%

Mode de vie	431F. Infirmiers en soins généraux n=214	43. Professions intermédiaires de la santé et du travail social n=1035
Activité sportive régulière	55,1%	52,2%
Consommation de tabac	26,7%	28,9%
Consommation de tabac>15 cig / j	3,8%	6,1%
Consommation de café	73,8%	74,5%
Consommation de café sup à 4 tasses / j	15,7%	12,6%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	17,2%	16,6%

Etat de santé	431F. Infirmiers en soins généraux			43. Professions intermédiaires de la santé et du travail social		
	<45 ans n=141	≥45 ans n=73*	Ensembles n=214	<45 ans n=703	≥45 ans n=332	Ensembles n=1035
Indice de masse corporelle						
➤ Normaux ou maigres	63,5%	69,4%	65,6%	69,8%	59,2%	66,4%
➤ Surpoids	22,6%	25,0%	23,4%	22,0%	27,4%	23,7%
➤ Obèses	13,9%	5,6%	11,0%	8,2%	13,4%	9,9%
Appareil respiratoire						
Existence d'un problème	0,7%	1,4%	1,0%	2,6%	3,7%	2,9%
Plaintes ou signes cliniques	0,7%	1,4%	1,0%	2,3%	3,7%	2,7%
Gêne dans le travail	0,0%	1,4%	0,5%	0,4%	0,9%	0,6%
Consommation médicamenteuse	0,0%	1,4%	0,5%	1,9%	2,8%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	0,7%	1,4%	1,0%	2,2%	3,4%	2,6%
Appareil cardiovasculaire						
Existence d'un problème	3,6%	2,8%	3,3%	3,3%	3,7%	3,4%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	2,8%	2,9%	3,0%	2,8%	2,9%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,6%	0,9%
Consommation médicamenteuse	1,4%	0,0%	1,0%	1,3%	1,5%	1,4%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	1,4%	1,9%	2,3%	3,1%	2,6%
HTA						
Existence d'un problème	2,2%	10,0%	4,9%	2,3%	14,4%	6,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,5%	4,3%	2,5%	1,5%	7,7%	3,5%
Gêne dans le travail	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,2%
Consommation médicamenteuse	2,2%	10,0%	4,9%	2,0%	12,3%	5,3%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	10,0%	4,9%	2,0%	12,0%	5,2%
➤ Lassitude, fatigue						
Existence d'un problème	21,9%	19,4%	21,1%	20,7%	28,4%	23,2%
Plaintes ou signes cliniques	21,9%	19,4%	21,1%	20,7%	27,2%	22,8%
Gêne dans le travail	10,2%	8,3%	9,6%	8,8%	15,5%	11,0%
Consommation médicamenteuse	0,7%	2,8%	1,4%	3,0%	5,8%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	5,6%	3,3%	5,1%	7,8%	5,9%
➤ Anxiété, nervosité						
Existence d'un problème	18,8%	8,3%	15,2%	20,6%	25,1%	22,0%
Plaintes ou signes cliniques	18,8%	8,3%	15,2%	20,4%	24,5%	21,8%
Gêne dans le travail	6,5%	2,8%	5,2%	9,5%	11,0%	10,0%
Consommation médicamenteuse	2,9%	1,4%	2,4%	3,2%	6,5%	4,2%
Pathologie diagnostiquée	5,8%	1,4%	4,3%	5,8%	9,3%	7,0%
➤ Trouble du sommeil						
Existence d'un problème	14,6%	18,1%	15,8%	15,6%	26,5%	19,1%
Plaintes ou signes cliniques	14,6%	18,1%	15,8%	15,5%	25,9%	18,8%
Gêne dans le travail	5,1%	6,9%	5,7%	6,1%	10,2%	7,4%
Consommation médicamenteuse	1,5%	5,6%	2,9%	2,2%	6,5%	3,6%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	4,2%	2,9%	4,4%	9,1%	5,9%
Troubles neuro psychiques (les 3 signes ci-dessus)						
Existence d'un problème	6,5%	2,8%	5,2%	6,9%	11,6%	8,4%
Plaintes ou signes cliniques	6,5%	2,8%	5,2%	6,8%	11,3%	8,3%
Gêne dans le travail	0,7%	1,4%	1,0%	1,6%	4,6%	2,6%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	1,5%	1,0%
Pathologie diagnostiquée	0,7%	0,0%	0,5%	2,0%	3,7%	2,6%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	431F. Infirmiers en soins généraux			43. Professions intermédiaires de la santé et du travail social		
	<45 ans n=141	≥45 ans n=73*	Ensembles n=214	<45 ans n=703	≥45 ans n=332	Ensembles n=1035
Digestif						
Existence d'un problème	6,6%	4,2%	5,8%	7,8%	9,9%	8,5%
Plaintes ou signes cliniques	6,6%	4,2%	5,8%	7,7%	9,9%	8,4%
Gêne dans le travail	1,5%	0,0%	1,0%	1,5%	3,4%	2,1%
Consommation médicamenteuse	3,0%	4,2%	3,4%	3,6%	6,2%	4,4%
Pathologie diagnostiquée	3,7%	4,2%	3,9%	4,4%	8,0%	5,6%
Dermatologie						
Existence d'un problème	10,3%	8,3%	9,6%	8,0%	6,7%	7,6%
Plaintes ou signes cliniques	10,3%	8,3%	9,6%	7,6%	6,7%	7,3%
Gêne dans le travail	4,4%	6,9%	5,3%	1,3%	1,5%	1,4%
Consommation médicamenteuse	5,9%	2,8%	4,8%	3,8%	2,1%	3,3%
Pathologie diagnostiquée	7,4%	6,9%	7,2%	5,7%	5,8%	5,7%
Troubles de l'audition						
Existence d'un problème	0,7%	4,3%	2,0%	1,2%	6,2%	2,8%
Plaintes ou signes cliniques	0,7%	4,3%	2,0%	1,0%	5,9%	2,6%
Gêne dans le travail	0,7%	1,4%	1,0%	0,3%	4,3%	1,6%
Consommation médicamenteuse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,5%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	1,4%	0,5%	0,7%	4,3%	1,9%
Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessous)						
Existence d'un problème	8,0%	16,7%	11,0%	7,1%	18,4%	10,7%
Plaintes ou signes cliniques	7,3%	16,7%	10,5%	6,7%	17,8%	10,3%
Gêne dans le travail	5,8%	12,5%	8,1%	3,6%	12,3%	6,4%
Consommation médicamenteuse	2,2%	8,3%	4,3%	1,7%	8,6%	3,9%
Pathologie diagnostiquée	5,1%	13,9%	8,1%	3,3%	12,3%	6,2%
➤ Epaule						
Existence d'un problème	6,5%	11,1%	8,1%	3,9%	12,8%	6,8%
Plaintes ou signes cliniques	5,8%	11,1%	7,6%	3,8%	12,5%	6,6%
Gêne dans le travail	4,3%	6,9%	5,2%	2,3%	8,6%	4,3%
Consommation médicamenteuse	1,4%	5,6%	2,9%	1,0%	7,0%	3,0%
Pathologie diagnostiquée	3,6%	8,3%	5,2%	1,7%	9,2%	4,1%
➤ Coude						
Existence d'un problème	0,0%	4,2%	1,4%	1,7%	3,7%	2,4%
Plaintes ou signes cliniques	0,0%	4,2%	1,4%	1,6%	3,7%	2,3%
Gêne dans le travail	0,0%	4,2%	1,4%	0,4%	2,8%	1,2%
Consommation médicamenteuse	0,0%	2,8%	1,0%	0,4%	1,2%	0,7%
Pathologie diagnostiquée	0,0%	2,8%	1,0%	0,6%	2,1%	1,1%
➤ Poignet						
Existence d'un problème	2,9%	6,9%	4,3%	2,8%	6,4%	3,9%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	6,9%	4,3%	2,6%	6,2%	3,7%
Gêne dans le travail	2,2%	5,6%	3,3%	1,4%	4,6%	2,5%
Consommation médicamenteuse	0,7%	5,6%	2,4%	0,7%	3,4%	1,6%
Pathologie diagnostiquée	1,5%	6,9%	3,3%	1,4%	4,6%	2,5%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence

Etat de santé	431F. Infirmiers en soins généraux			43. Professions intermédiaires de la santé et du travail social		
	<45 ans n=141	≥45ans n=73*	Ensembles n=214	<45 ans n=703	≥45 ans n=332	Ensembles n=1035
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur						
Existence d'un problème	4,3%	11,1%	6,7%	8,0%	10,5%	8,8%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	9,7%	5,7%	7,6%	9,5%	8,2%
Gêne dans le travail	1,4%	5,6%	2,9%	3,8%	4,0%	3,9%
Consommation médicamenteuse	1,4%	4,2%	2,4%	1,7%	3,1%	2,2%
Pathologie diagnostiquée	2,2%	9,7%	4,8%	5,1%	6,5%	5,5%
Troubles ostéoarticulaires du rachis						
<i>(l'un des 2 signes ci-dessous)</i>						
Existence d'un problème	25,5%	26,5%	25,9%	23,5%	35,3%	27,3%
Plaintes ou signes cliniques	24,8%	26,5%	25,4%	23,2%	35,0%	27,0%
Gêne dans le travail	14,6%	19,1%	16,1%	12,4%	21,3%	15,2%
Consommation médicamenteuse	10,9%	11,9%	11,3%	5,7%	15,8%	8,9%
Pathologie diagnostiquée	12,4%	16,4%	13,7%	10,6%	25,2%	15,3%
➤ Vertèbres cervicales						
Existence d'un problème	11,0%	13,4%	11,8%	9,5%	17,1%	11,9%
Plaintes ou signes cliniques	10,3%	13,4%	11,3%	9,4%	17,1%	11,8%
Gêne dans le travail	5,9%	10,4%	7,4%	4,5%	10,9%	6,6%
Consommation médicamenteuse	5,1%	7,5%	5,9%	2,6%	8,1%	4,4%
Pathologie diagnostiquée	3,7%	6,1%	4,5%	3,8%	11,0%	6,1%
➤ Vertèbres dorsolombaires						
Existence d'un problème	20,3%	21,4%	20,7%	18,1%	26,4%	20,8%
Plaintes ou signes cliniques	19,6%	21,4%	20,2%	17,8%	26,1%	20,5%
Gêne dans le travail	10,9%	15,7%	12,5%	9,8%	15,5%	11,6%
Consommation médicamenteuse	8,0%	10,0%	8,7%	4,5%	11,2%	6,7%
Pathologie diagnostiquée	9,4%	14,3%	11,1%	8,5%	18,8%	11,8%

* Les effectifs de ce groupe sont faibles, les % présentés sont donc peu précis et à interpréter avec prudence